

BULLETIN MENSUEL  
DE LA  
**SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON**  
FONDÉE EN 1822

RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE PAR DÉCRET DU 9 AOÛT 1937  
des SOCIÉTÉS BOTANIKES DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON  
REUNIES  
et de son GROUPE RÉGIONAL DE ROANNE

**Siège social et Secrétariat général : 33, rue Bossuet, 69006 Lyon**

### TRESORERIE :

#### T A R I F

|                                                           | 1983  |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Abonnement France .....                                   | 95 F  |
| Membre scolaire .....                                     | 45 F  |
| Abonnement Etranger .....                                 | 115 F |
| Changement d'adresse, inscription ou réintégration en sus | 10 F  |

**N.B.** — Les virements à notre C.C.P. **LYON 101-98 H** ou les chèques bancaires, doivent être rédigés au nom de la SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON.

### SOMMAIRE

|                                                                                                                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BOUR R. et DUBOIS A. — Statut nomenclatural et spécimens-types d' <i>Emys pseudogeographica</i> Gray, 1931 et d' <i>Emys lesueuri</i> Gray, 1931 (Reptilia, Chelonii, Emydidae) | 42 |
| HONRUBIA M., BERTHET P. et LLIMONA X. — Contribution à la connaissance des champignons du Sud-Est de l'Espagne. VII. Pezizales (Ascomycètes)                                    | 46 |
| CHEVIN H. — Note sur les Hyménoptères Tenthredoïdes (IX) : Deux espèces nouvelles pour la France : <i>Parna kamijoi</i> Togashi et <i>Pareophora collaris</i> n. sp.            | 62 |

- ROGERS J. K., DUMONT K. P., KORF R. P., 1971. — Nomenclatural notes VIII. *Stromatinia*, an available generic name (not to be replaced by *Tarzetta*, the correct name for *Pustulina*). *Mycologia*, 63, 1084-1086.
- SACCARDO P. A., 1889. — Sylloge Fungorum, vol. 8.
- SVRCEK M., 1948. — Bohemian species of *Pezizaceae* subf. *Lachneoideae*. *Sbornik národn. Mus. Praze*, 4, B, n° 6.
- TORRE M. DE LA, 1974. — Estudio Sistemático, Ecológico y Corológico de Ascomicetes españoles. Tesis Doctoral Inéd., Madrid.
- TORRE M. DE LA, 1975 a. — El género *Helvella* en España. *Bol. Est. Centr. Ecol. I cona*, 8 : 39-47, Madrid.
- TORRE M. DE LA, 1975 b. — Estudio sobre discomicetes operculados, clave y géneros nuevos para la flora española peninsular. *Ann. Inst. Bot. A. J. Cav.* 32 (2) : 85-101, Madrid.
- TORRE M. DE LA, 1976. — Aportación al estudio del género *Gyromitra* Fr. em. Harmaja en España. *Bol. Est. Centr. Ecol. I cona* 5 (10) : 33-38, Madrid.
- TORRE M. DE LA & CALONGE F. D., 1977. — Contribución al estudio del género *Peziza* (Dill.) L. ex St. Amans en España. *Ann. Inst. Bot. A. J. Cav.* 34 (1) : 33-38, Madrid.

**NOTE SUR LES HYMENOPTERES TENTHREDOIDES (IX) \* :**  
**DEUX ESPECES NOUVELLES POUR LA FRANCE :**  
**PARNA KAMIJOI Togashi ET PAREOPHORA COLLARIS n. sp.**

par H. CHEVIN.

Résumé. — L'auteur signale la présence en France d'une espèce décrite du Japon : *Parna kamijoi* Togashi 1980, donne quelques précisions complémentaires sur cette espèce et décrit une nouvelle espèce de *Blennocampinae* : *Pareophora collaris* n. sp.

Abstract. — This note deals with two new French species of sawflies. *Parna kamijoi* which was discovered in Japan is reported from several localities. *Pareophora collaris* n. sp. collected in western France is described and illustrated.

**20. Parna kamijoi Togashi 1980, espèce nouvelle pour la France**

Depuis quelques années nous récoltons régulièrement dans le parc de Versailles, au moyen de pièges colorés, une Tenthredé proche de *Parna tenella* (Klug) mais légèrement différente de celle-ci par les tegulae claires, les fémurs assombrés et la morphologie de la tarière. Nous avions également remarqué des différences dans la nervation des ailes, en particulier la nervure basale de l'aile antérieure était en courbe régulière au lieu de former un coude brusque comme chez *P. tenella*. Par la suite, quelques individus de cette « nouvelle espèce » ne présentant pas ce dernier caractère nous avons remis, jusqu'à plus ample information, la description de cette Tenthredé.

Récemment TOGHASHI (1980) l'a décrite du Japon sous le nom de *Parna kamijoi* et les caractères qu'il indique se retrouvent sans aucune hésitation sur les exemplaires français que nous avons examinés. Il signale comme plante-hôte *Tilia maximowiziana* Shiras., mais nous avons obtenu cette espèce de feuilles de *Tilia cordata* Mill. récoltées dans le parc de Versailles.

Cette nouvelle espèce doit avoir un développement parthénogénétique et, en France, elle semble plus commune que *P. tenella* : 68 femelles observées contre 13 mâles et 12 femelles pour cette dernière espèce. Elle apparaît plus précocément, les dates extrêmes de capture étant 23 avril - 14 mai pour *kamijoi*, 7 mai - 9 juin pour *tenella*. Enfin les deux espèces semblent cohabiter et nous avons noté leur présence commune dans les départements de l'Aisne, de la

\* Note précédente : Bull. mens. Soc. Linn. Lyon, 51, 78-80.

Côte-d'Or, de Seine-et-Marne et des Yvelines ; *P. kamijoi* a été prise seule dans le département d'Eure-et-Loir.

## 21. Un nouvel Hyménoptère Tenthredinidae : *Pareophora collaris* n. sp.

Au cours de l'identification d'un important matériel récolté par notre collègue J. PELLETIER nous avons examiné une Tenthredine très proche de *Pareophora pruni* (L.) mais légèrement différente par la coloration du thorax. Un examen plus approfondi nous a convaincu qu'il s'agissait d'une espèce inédite que nous décrivons ci-après sous le nom de :

*Pareophora collaris* n. sp.

**Femelle** : Tête et thorax entièrement noirs sauf les angles postérieurs du pronotum très largement marqués d'orangé ainsi qu'une étroite marge de même couleur au bord externe des tegulae. Abdomen de couleur orangée sauf le premier et le neuvième tergite abdominal entièrement noirs ainsi que les côtés du huitième tergite et le fourreau de la scie. Hanches et trochanters entière-




Fig. : 1, 2 - détail de la tarière : 1, *Pareophora pruni* ; 2, *P. collaris* ; 3, 4 - valve du pénis : 3, *Pareophora pruni* ; 4, *P. collaris*.

ment noirs ; fémurs noirs à la base, rougeâtres dans leur tiers apical ; tibias rougeâtres, assombris au côté externe ; tarses noirâtres. Ailes un peu enfumées sur toute leur surface, nervures et stigma noirs.

Ponctuation de la tête et du thorax un peu plus dense que chez *P. pruni*, en particulier les tempes ont un aspect mat et rugueux au lieu d'être brillantes entre des points fins et bien séparés.

Troisième article antennaire deux fois aussi long que le quatrième ; chez *P. pruni* ce rapport est au plus égal à 1,25. Dans notre exemplaire, le troisième article des deux antennes est un peu déformé, sans doute à la suite d'un incident lors de la mue imaginaire.

Tarière un peu plus courte que celle de *P. pruni* avec 13 dents au lieu de 10 et par conséquent celles-ci sont nettement moins espacées dans la nouvelle espèce. De plus, les petits denticules qui précèdent les dents médianes sont au nombre de 4 ou 5 contre 9 ou 10 chez *P. pruni* et n'occupent que la moitié de l'intervalle séparant deux dents (figures 1 et 2).

Mâle : Même coloration générale que la femelle : tête et thorax entièrement noirs sauf les angles postérieurs du pronotum qui sont rouge orangé ainsi qu'une large bordure aux tegulae ; abdomen entièrement orangé sauf le premier tergite abdominal et la plaque sous-génitale qui sont noirs ; hanches, trochanters et base des fémurs noirs, tiers apical des fémurs et tibias rougeâtres, ces derniers plus sombres au côté externe ; tarses noirâtres.

Tempes mates et d'aspect rugueux.

Troisième article antennaire deux fois aussi long que le quatrième.

Valve du pénis légèrement différente de celle de *P. pruni*, en particulier l'épine latérale est nettement plus courte (figures 3 et 4).

Holotype : 1 ♀, Bretignolles-sur-Mer (Vendée), capturée entre le 1<sup>er</sup> et le 20 juillet 1978 (J. PELLETIER, rec.).

Paratype : 1 ♂, Forêt de l'Hermitain (Deux-Sèvres), le 15 avril 1972 (P. CANTOT, rec.).

Holotype et paratype sont déposés dans les collections du Laboratoire de Faunistique écologique, I.N.R.A., Versailles.

Larve et plante-hôte inconnues.

Nous avons recherché, sans succès, cette nouvelle espèce dans diverses collections du Muséum nationale d'Histoire naturelle de Paris. Il est curieux de noter que les deux exemplaires actuellement connus proviennent de deux départements limitrophes du centre-ouest de la France.

Ls genre *Pareophora* Konow 1886 renferme ainsi quatre espèces paléarctiques : d'une part *P. pumilio* Konow 1898 du littoral de la mer Caspienne et *P. gracilis* Takeuchi 1952 du Japon, à l'abdomen entièrement noir, d'autre part *P. pruni* (Linné, 1758) d'Europe et *P. collaris* n. sp., à l'abdomen en grande partie orangé. Deux espèces se développent sur *Prunus* : *P. pruni* et *P. gracilis*.

Laboratoire de Faunistique écologique, I.N.R.A. - Zoologie,  
78000 Versailles.

#### BIBLIOGRAPHIE

- TOGASHI I., 1980. — The genus *Parna* Benson in Japan, with description of a new species and key to the Japanese genera of the tribe Fenusini (Hymenoptera). *Tenthredinidae*. *Kontyu*, 48 (2), 213-217.