

ANNALES

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE

DE LYON

Année 1868.

—

(NOUVELLE SÉRIE.)

—

TOME SEIZIÈME

PARIS

F. SAVY, LIBRAIRE

rue Hautefeuille, 24.

—

28 Décembre 1868.

DESCRIPTION

D'UNE

ESPÈCE NOUVELLE D'HÉMIPTÈRE HÉTÉROPTÈRE

CONSTITUANT UN NOUVEAU GENRE

Dans la Famille des REDUVIENS

Par E. MULSANT et VALÉRY MAYET.

(Présentée à la Société linnéenne le 9 mars 1868)

Genre *Oreada*, ORÉADE; Mulsant et Mayet

CARACTÈRES: *Bec* incurbé, ne dépassant pas le bord antérieur des hanches de devant; de trois articles: le 2^e, près d'une fois plus long que le 1^{er}.

Tête presque en losange; au moins aussi longue depuis les yeux jusqu'à la base du bec, que depuis les yeux jusqu'au bord antérieur du prothorax; graduellement rétrécie depuis les yeux jusqu'au cou; celui-ci, de moitié aussi long que la partie postérieure de la tête.

Yeux situés sur les côtés de la tête, vers la moitié de la longueur de celle-ci, échancrés à leur partie postérieure.

Antennes insérées au-devant des yeux: de quatre articles: le 2^e, près d'une fois plus grand que le 1^{er}: les 3^e et 4^e plus grêles, à peine plus longs, pris ensemble, que le 2^e.

Prothorax muni en devant d'un bourrelet séparé de la partie suivante par un profond sillon, échancré en arc à son bord antérieur et avancé en pointe obtuse à ses angles de devant; presque carré après le bourrelet, c'est-à-dire aussi long que large, étranglé sur les côtés après la moitié de sa longueur, élargi ensuite jusqu'aux angles posté-

rieurs qui sont aigus; trouqué en ligne à peu près droite à la base; plus grand que les meso et méthatorax réunis; creusé longitudinalement d'un sillon médiaire profond.

Écusson triangulaire, non détaché des parties latérales.

Élytres et ailes nulles.

Abdomen ovale-oblong, rétréci postérieurement; relevé sur les côtés; de neuf segments: le 1^{er} court: les 2^e à 7^e presque égaux: les 8^e à 9^e à peine plus longs pris ensemble que le 7^e.

Prosternum obtriangulaire; creusé d'un sillon longitudinal.

Mésosternum chargé sur sa ligne médiane d'une carène sensible.

Hanches médiocrement allongées: les antérieures, faiblement séparées par le prosternum: les intermédiaires un peu plus par le mésosternum: les postérieures très-largement par le métasternum.

Pieds allongés. Tarses de trois articles: le dernier terminé par deux ongles.

***Oreada luctuosa*; Mulsant et Mayet.**

Noire; glabre: une tache au côté interne de chaque œil, deux taches contiguës à la base du cou, et rebord des sept premiers arceaux du dessus de l'abdomen, d'un jaune testacé. Pieds hérissés de poils courts.

Long. 0^m,0225 (4 l.). — Larg. du thorax 0^m,0033 à 0^m,0036 (4 l. 1/2 à 4 l. 2/3). — Largeur du ventre dans son diamètre transversal le plus grand 0^m,0100 (4 l. 1/2).

Corps oblong; noir ou d'un noir brunâtre.

Tête creusée d'un sillon transversal sur la suture frontale; creusée d'un autre sillon transversal sur le front, vers la moitié de la longueur des yeux; séparée du cou par un sillon transversal; noire; parée après le sillon frontal, d'une bande d'un jaune testacé, interrompue dans son milieu, constituant une tache transverse au côté interne de chaque œil.

Cou marqué à sa base de taches d'un jaune testacé, contiguës à la ligne médiane.

Yeux arrondis en devant, échancrés postérieurement.

Antennes à peine plus longuement prolongées que le bord postérieur du thorax ; noires ; hérissées de longs poils

Bec noir.

Prothorax noir ; glabre ; muni en devant d'un bourrelet très-prononcé ; creusé longitudinalement, sur le reste, d'un sillon profond ; étranglé, sur les côtés, vers les trois cinquièmes de sa longueur ; marqué vers cet étranglement, d'un sillon transverse limité par le bord du sillon longitudinal ; marqué, de chaque côté, sur sa partie antérieure, de deux lignes enfoncées, convergeant vers le sillon du milieu, et naissant : l'externe, des angles antérieurs qui sont arrondis : l'interne, du bord antérieur de la base.

Meso et métathorax noirs ; glabres ; presque parallèles sur les côtés. un peu étranglé vers le point de leur union.

Écusson obtriangulaire, marqué, de chaque côté de la ligne médiane, de stries obliques.

Abdomen ovale-oblong, rétréci postérieurement ; offrant, presque vers la moitié de sa longueur, son diamètre transversal le plus grand, deux fois et demie aussi large dans ce point que le prothorax ; relevé sur les côtés ; glabre ; noir ou d'un noir brun, avec le bord postérieur du rebord des sept premiers arceaux d'un jaune testacé.

Dessous du corps noir, glabre.

Pieds noirs, assez grêles ; garnis de poils bruns assez courts ou peu allongés. *Tarses* de trois articles : le 1^{er} plus court.

Cette espèce remarquable se trouve dans les Pyrénées.

Obs. Nous n'en avons vu qu'un exemplaire, privé d'ailes et d'élytres, mais qui néanmoins semblait être à son état parfait.