

Tome 68

fascicule 6

0*20
Juin 1999

Abonnement 190 F — Le numéro 25 F

ISSN 0366-1326

BULLETIN MENSUEL
DE LA
SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

Siège social : 33 rue Bossuet, F 69006 LYON

Rédaction : P. BERTHET

Catalogue commenté et étude bibliographique des Coléoptères Cerambycidae du département de l'Hérault

*Jérôme Sudre**, *Antoine Foucart*** et *Christian Cocquempot****

* 99 rue des Horts, F. 34570 Murviel-lès-Montpellier.

** la Traversière C-180, 383 rue du Pioch de Boutonnet, F. 34090 Montpellier.

*** 2 lotissement les Sophoras, F. 34270 Sainte-Croix-de-Quintillargues.

Résumé. - Une première partie présente les principaux artisans de l'étude des Cerambycidae qui se sont succédés en Languedoc : Jules et Jean Lichtenstein, Charles Marquet, Valéry Mayet, Henri Lavagne, François Picard et Léon Schaefer. Des nouvelles informations sont données sur la biographie d' H. Lavagne et L. Schaefer. Une brève présentation biogéographique de l'Hérault précède la liste commentée des 160 espèces recensées à ce jour. Une seconde liste donne les noms de 25 espèces absentes de notre recensement mais dont la présence est probable dans le département et qui portent le potentiel de l'Hérault à 185 espèces. Ces listes sont établies sur la base de notes manuscrites inédites de V. Mayet et H. Lavagne et par l'étude d'une imposante bibliographie dont plus d'une centaine de références (75 rien que pour L. Schaefer) sont étroitement liées à l'Hérault. Elles sont complétées par les observations des auteurs et les informations issues de la consultation de collections institutionnelles et privées. La conclusion fournit des informations sur diverses espèces dont la présence dans l'Hérault est invalidée ou ne peut être totalement exclue.

Mots-clés. - Hérault, Coleoptera, Cerambycidae, biographie, faunistique, étude bibliographique.

Annotated catalog and bibliographic study of longhorn beetles of the mediterranean French department : Hérault.

Summary. - A first part present the main personalities of longhorn's study who succeed one another in Languedoc : Jules and Jean Lichtenstein, Charles Marquet, Valéry Mayet, Henri Lavagne, François Picard and Léon Schaefer. New informations are given about the biography of H. Lavagne and L. Schaefer. A brief biogeographical presentation of Hérault precede the updated list of the 160 recorded species. A second list gives the names of 25 missing species probably present in the department and giving al potential of 185 species for Hérault. These lists are established by the study of original handwritten notes of V. Mayet and H. Lavagne and by the analysis of imposing bibliography of which more than 100 references are closed to Hérault (75 from L. Schaefer). They are completed by autors records and informations given by the study of established or private collections. The conclusion gives informations about some species of which the recording in Hérault is denied or cannot be absolutely excluded.

Keys-words. - France, Hérault, Coleoptera, Cerambycidae, biography, faunistic, bibliographical study.

Accepté pour publication le 18 février 1999

INTRODUCTION

Le département de l'Hérault ayant attiré de nombreux entomologistes et ayant été parcouru par des célébrités en la matière, nous avons voulu éviter de tomber dans la simplicité d'une énumération d'espèces. La particularité de notre travail repose, en premier lieu, sur la présentation d'un chapitre entièrement consacré aux principales personnalités régionales et comportant des informations inédites à leur sujet. Nous proposons en second lieu, une étude faunistique étayée par l'analyse d'une bibliographie imposante dépassant souvent le cadre régional. Nous nous sommes astreints à de vastes recherches de publications et au long travail d'analyse afin d'y déceler les plus minces informations sur le sujet qui nous intéresse mais nous ne prétendons évidemment pas être exhaustifs. La base faunistique de ce travail s'appuie donc sur l'étude d'une bibliographie qui dépasse largement le cadre départemental et dont le nombre important de références est lié à l'activité de certains auteurs comme L. Schaefer dont nous avons retenu pas moins de 75 références.

La liste principale est composée de l'ensemble des espèces recensées dans l'Hérault par l'étude bibliographique, la consultation de collections institutionnelles et par la communication de données inédites des auteurs et de leurs correspondants. Nous proposons également une étude de la faune potentielle du département en dehors des espèces déjà répertoriées. Nous évoquons en conclusion, un certain nombre de Cerambycidae susceptibles de concerner notre département à divers titres ou pour des raisons d'actualité.

Un bilan est établi sous la forme d'un recensement de 160 espèces soit les deux tiers de la faune de France. Nous estimons à 235 (+ ou - 5) le nombre d'espèces actuellement présentes en France (hors Vesperidae). Ces chiffres tiennent compte des doutes émis pour certaines espèces par VILLIERS (1978), des espèces découvertes ou réhabilitées depuis et de leur éventuelle pérennité dans le pays ainsi que des espèces qui pourraient avoir disparu. Cette étude permet en outre, d'apprécier la progression ou la raréfaction de certains Longicornes depuis le début du siècle ainsi que l'absence de certains genres comme le genre *Vesperus* Latreille (Vesperidae).

HISTORIQUE

Un certain nombre d'entomologistes éminents ont marqué la vie scientifique du Languedoc. Il aurait été irrespectueux de ne pas rendre hommage à ceux qui ont servi avec dévouement la cause de l'entomologie régionale et nationale. Nous présentons à partir de documents existants et d'informations inédites, certains aspects de la vie et de l'œuvre de quelques personnalités marquantes en matière de longicornes dans l'Hérault.

Jules Lichtenstein (1816-1886) : Français d'origine allemande, il est né et mort à Montpellier mais n'y séjourna pas en permanence. Nous avons trouvé deux références signalant des longicornes dans l'Hérault. La liste générale de ses travaux est donnée par V. MAYET (1887).

Nous n'oublions pas son petit fils, **Jean Lichtenstein** (1893-1930), souvent confondu avec son grand père. Il fut nommé chef de travaux à la Faculté de Montpellier en 1920 puis, sous-directeur de la station zoologique de Cette (Sète). Ses travaux, dont il publia certains d'entre eux avec F. Picard, concernent essentiellement les Hyménoptères parasites. On trouvera de plus amples renseignements sur ce dernier dans le Bulletin de

la Société entomologique de France (séance du 9 juillet 1930), dans *Miscellanea entomologica* (32 (11) : 111), par LÉCLANT (1998) et surtout dans le *Bulletin de l'Académie des Sciences et des lettres de Montpellier* (1930, 60).

Charles Marquet (1820-1900) : Il s'intéressa aux Coléoptères dont il avait réuni une belle collection durant la période de ses activités professionnelles. Il transposa son principal intérêt sur les Hyménoptères et les Orthoptères une fois à la retraite. Il chassait souvent en compagnie de V. Mayet et du frère de celui-ci. Les environs de Toulouse et de Béziers furent les principales zones qu'il prospecta ainsi que l'étang de Vendres où il se rendait au moins une fois par an. Il publia de nombreux travaux dont on retiendra surtout ses catalogues des Coléoptères du Languedoc.

On trouvera plus d'informations sur sa vie et ses travaux en consultant *Miscellanea entomologica* (1900, 8 (5-6) : 70), E. TRUTAT (1900) et H. DU BUYSSON (1925).

Il a publié le catalogue des Coléoptères du Languedoc en six fascicules de 1869 à 1882. Un septième fascicule est parut en 1897 simultanément à une réédition complète de cette œuvre.

Nous avons uniquement exploité la seconde version éditée en une seule fois en 1897 parce qu'elle comportait, pour les Cérambycides, des indications biogéographiques qui sont absentes dans l'autre version.

A propos de ce catalogue Valéry Mayet, d'après DARNAUD (1978), commentait ce travail de la façon suivante : *“ Le titre est un peu prétentieux, de notre département (l'Hérault), l'auteur ne connaissait bien que l'arrondissement de Béziers d'où il était originaire et où il avait séjourné près de 40 ans. Les notes par nous fournies sur le reste du département ont été assez mal utilisées par l'ami regretté, si souvent compagnon de nos chasses. Ce travail d'un octogénaire affaibli par l'âge semble, de plus, avoir été revu à la correction des épreuves, par quelqu'un qui n'était pas entomologiste ”*.

C. Marquet ne fait aucune allusion à ses travaux de catalogues dans une publication de 1881. Il signale par contre, que le Capitaine Gaubil chassait vers l'embouchure de l'Orb en aval du village de Sérignan. Nous n'avons pas retrouvé pour l'instant de trace de compte rendu de ses chasses.

Valéry Mayet (1839-1909) : Il fut Professeur de Zoologie et de Sériciculture à l'École Nationale d'Agriculture de Montpellier. Il a publié de nombreux articles sur les Coléoptères du Languedoc et des Albères. Il avait commencé à publier un catalogue de Coléoptères de l'Hérault dans le bulletin de la Société d'Histoire naturelle de Toulouse mais cette œuvre resta malheureusement inachevée (carabes et carabiques uniquement). Comme il était de tradition, il a fait relier le catalogue des coléoptères de France de DES GOZIS (1875) en intercalant des pages blanches pour colliger ses nombreuses notes manuscrites. Ces notes inédites concernent essentiellement le département de l'Hérault et sont citées dans le texte sous la mention : *“ V. Mayet, notes manuscrites ”* dont nous donnons un extrait (Fig. 1a).

La découverte de ce catalogue manuscrit des Coléoptères de l'Hérault revient au Dr. J. Balazuc qui l'acquit en 1982 chez un bouquiniste de Grospièrres (Ardèche) et l'offrit à notre ami et collègue H.-P. Aberlenc.

La collection de V. Mayet fut achetée par le Dr. Bettinger de Reims mais elle disparu à la suite de la tragique déportation de ce dernier et des bouleversements de la seconde guerre mondiale.

On trouvera de nombreux renseignements sur la vie de cet entomologiste dans *Miscellanea entomologica* (1909,16 (12) : 57 et 1910,17 (2-3) : 15-17) ainsi que les notes de DU BUYSSON (1926) et de LECLANT (1998).

Henri Lavagne (1871-1929) : Il fut un des compagnons de chasse de V. Mayet et récolta beaucoup de Coléoptères dans l'Hérault. Il annota, lui aussi, un catalogue : la seconde édition du *Catalogus Coleopterorum* (HEYDEN et al., 1906) en y ajoutant les observations de V. Mayet. Ce catalogue et ces notes manuscrites, reliés sous la forme d'un gros ouvrage, ont été découverts par notre collègue F. Soldati dans la bibliothèque de feu J. Théron au Muséum d'Histoire naturelle de Nîmes. L'essentiel des notes manuscrites de H. Lavagne est retranscrit en italiques dans notre travail et un extrait est présenté en figure 1b.

Originaire de Castelnaud-le-Lez, il fut avocat et adjoint au maire de la ville de Montpellier. Il était membre à vie de la Société entomologique de France depuis le 9 mars 1904. Il est décédé à Clermont-l'Hérault le 22 avril 1929 dans sa 58^e année. Il fut enterré à Montpellier ce qui ne fit que quatre lignes dans le Bulletin de la Société entomologique de France (C.R. de la séance du 8 mai 1929) et guère plus dans *Miscellanea entomologica* (1929, 32 (2) : 24).

François Picard (1879-1939) : Il fut Professeur de Zoologie appliquée à l'École Nationale d'Agriculture de Montpellier et directeur de la station entomologique de 1909 à 1921. Il fit de nombreux élevages de xylophages pour étudier leur biologie et leurs parasites. Il apparaît comme le principal artisan, de son époque, pour l'étude des cérambycides du Languedoc et de la France. On retrouve la trace de ses nombreuses observations dans sa thèse sur les insectes du figuier (1919) et surtout dans sa Faune (1929a). La vie et l'œuvre de cet auteur sont retracées par BERLAND (1939) et LECLANT (1998).

Léon Schaefer (1900-1989) : Personnage incontournable de l'entomologie régionale pour laquelle il œuvra inlassablement. Ingénieur chimiste de formation, il travailla, entre autres, au Service de la Protection des Végétaux de Montpellier. Coléoptériste, il était surtout connu pour ses compétences en matière de Buprestidae mais il était également féru de Coléoptères aquatiques. Il possédait de grandes connaissances tant en systématique qu'en faunistique sur l'ensemble des Coléoptères parmi lesquels les Cerambycidae avaient une place prépondérante.

Il n'a jamais publié de catalogue sur les Coléoptères de l'Hérault comme il l'a fait pour d'autres régions. Il a publié par contre, de nombreuses notes et il était l'auteur des procès verbaux de la section d'entomologie de la Société d'Horticulture et d'Histoire naturelle de l'Hérault dont il fut le Secrétaire de 1952 à 1970 puis le Président de 1970 à 1985 (en remplacement de G. de Vichet).

Il notait méthodiquement toutes ses récoltes dans des carnets de chasses que l'on n'a malheureusement jamais retrouvés. Très conservateur dans ses méthodes de chasse, il n'a pratiquement jamais utilisé le piégeage aérien mais était un remarquable et effréné adepte de la nappe montée.

Sa vie a été retracée par J. VIALIER (1990). La majeure partie de sa collection est conservée au Muséum national d'Histoire naturelle de Paris. Sa littérature est abondante et comporte des œuvres majeures que l'on retrouvera dans la liste établie par A. FOUCART et J.-M. MALDÈS (1993) et dans l'imposante analyse bibliographique de J. FOREL (1993-1995).

Rhopalopus spinicornis 2 indiv. pris dans l'Herbage
 à Valflamines près le Pic d'Espey (en Combes)
 1 à l'École d'Agri. sous les grands chênes 20/6
 it champes ^{Espey murier} ^{Chimarguier} ^{Espey} ^{Espey} ^{Espey} 1894
Purpuricenus Brevensis Montp. (1894) sorti d'une
 l'ovuche ~~sur~~ chêne vert à Darmi morte.
 1 an. S^t Guilhem prise à St Valotte par Montp. le 20 juin 1892
 en Lisson La larve, s^t jaune côtelé avec les segments rouges,
 Je l'ai élevée en lui renouvelant plusieurs fois les
 branches vivantes. Jacquet avait l'espèce de Nîmes,
 pour l'Espagne 1893 p. 87
Oxypleurus Nothieri 1 exemplaire pris en Languedoc
 fin de l'été = Guilhem 20/5 1896 pris avec *Mimodes* &
 1 autre pris en 1897 par un tel qui me l'a donnée, - de Calais.
 2 autres pris par Savagne (an ?) qui a perdu le flacon.
 nombre de sa. de plus.
Cyssoma scalarum Compeste près Evreux
 ex Greister

Figure 1 : A : Fac simulé d'un extrait des notes manuscrites de Valéry Mayet.

Periclyptus fasciata Vallflamines chine (Mayet)
Hesperophanes periclyptus Liguier S^t Guilhem / Roujan B
Hesperophanes cinereus Liguier. mubles Castellan Montpellier
Cerambyx cerdo chine Montpellier jardin fleur. Mayet
Cerambyx miles chine Montpellier S^t Jean de Puy Mayet
Cerambyx velutinus chine S^t Guilhem Evreux Mayet
Cerambyx Scopii S^t Guilhem garrigues Castellan ruffin. l'été saules

B : Fac simulé d'un extrait des notes manuscrites d'Henri Lavagne.




Figure 2 : Situation géographique et présentation des principales localités entomologiques de l'Hérault.

Collections consultées.

Les collections P. Macaire et H. Clavier se trouvent dans les locaux de la Société d'Horticulture et d'Histoire naturelle de l'Hérault au 125, rue du Moulin de Sémalen à Montpellier. La collection J. Thérond est déposée au Musée d'Histoire naturelle de Nîmes. La collection F. Mouret est conservée au Musée d'Histoire naturelle de Béziers et la collection J.-M. Maldès se trouve au Musée d'Histoire naturelle de Troyes.

Les collections de l'École Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier (ENSA-M.) sont composées essentiellement, pour ce qui concerne les Cerambycidae, de matériel récolté par Lavagne et Bérard mais, on y trouve également des insectes provenant de Lichtenstein, Delmas et Puel.

GÉNÉRALITES BIOGÉOGRAPHIQUES ET FAUNISTIQUES

La biogéographie appliquée à l'entomologie du département de l'Hérault nécessiterait à elle seule un long chapitre détaillé accompagné d'une analyse relationnelle avec les Cerambycidae régionaux. Dans le cadre des objectifs de ce travail, nous limiterons ce chapitre à une présentation succincte rappelant les principales caractéristiques géographiques départementales. Les 6224 km² de surface départementale sont répartis sur une longueur d'est en ouest de 130 km et une largeur moyenne de 65 km du sud au nord (Fig. 2). Les terres cultivées (34,2%) et les secteurs urbanisés (9,3%) laissent une place importante aux espaces naturels qui représentent

56,5% de la superficie départementale, Ces espaces sont distribués en 37,1% de bois et forêts, 16,3% de garrigues et 3,1% d'étangs ou zones humides. Ces proportions sont favorables à la pratique de l'entomologie mais certaines zones de grand intérêt faunistique ont déjà disparu ou sont fortement menacées notamment sur le littoral. Le réseau hydrographique comprend de nombreux cours d'eau dont certains sont temporaires et dont les principaux sont l'Hérault (165 km) et l'Orb (145 km). Le littoral avec ses étangs et ses secteurs sableux, la garrigue associée à l'yessaie et les contreforts du Massif Central, sont les trois grandes zones écologiques de l'Hérault qui culmine à 1124 m d'altitude au sommet de l'Espinouse. Les principaux sites entomologiquement réputés sont l'étang de Vendres, le littoral de Sète à La Grande-Motte, le Sud du plateau du Larzac, les monts d'Orb et de l'Espinouse, le massif du Caroux et le Minervois. Le plus célèbre d'entre eux est évidemment la mythique localité de Saint-Guilhem-le-Désert qui mérite des commentaires supplémentaires tout comme la zone urbaine de Montpellier.

La zone qui s'étend dans un périmètre compris entre le Pont-du-Diable au sud, le mont Saint-Baudille à l'ouest, les Lavagnes au nord et les gorges de l'Hérault à l'est est probablement l'une des plus fréquentée par les entomologistes français. Le résultat de cette concentration géographique des recherches exagère largement la valeur faunistique du site en comparaison avec des localités héraultaises moins connues et fréquentées mais qui ont un potentiel sans doute égal à celui de Saint-Guilhem. Pas moins de 96 espèces sont bibliographiquement signalées dans ce quadrilatère. Nos observations inédites en ajoutent neuf et nous pensons qu'une vingtaine d'autres, dont des banalités, sont effectivement présentes sur ce site.

La bibliographie signale également 81 espèces pour Montpellier et ses environs immédiats auxquelles nous y ajoutons deux inédites. Une quinzaine d'autres espèces sont vraisemblablement présentes dans ce secteur. Au vu de l'intensification et l'extension de l'urbanisation, il est à craindre que bon nombre des espèces citées, notamment à la fin du siècle dernier et au début du présent, sont aujourd'hui extrêmement rares voire disparues des limites montpelliéraines.

LISTE DES ESPÈCES RECENSÉES DANS L'HÉRAULT

Le premier paragraphe est consacré aux données bibliographiques lorsque nous en avons trouvé. Afin d'éviter de multiples répétitions, nous avons sélectionné et compilé pour chaque espèce, toutes les informations biogéographiques issues de la bibliographie et nous les avons fait suivre par les références dans lesquelles le lecteur pourra retrouver une ou plusieurs de ces données. Ces informations sont précédées par les notes manuscrites originales de V. Mayet et H. Lavagne.

Le second paragraphe relate une sélection d'informations originales des auteurs ou communiquées par de nombreux collègues dont les initiales suivent les citations. Certaines espèces banales ou largement distribuées n'ont pas fait l'objet de ces compléments.

D'autres paragraphes suivent plus ou moins régulièrement. Ils sont constitués par des remarques de biogéographie régionale et tentent de répondre à certaines questions de systématique ou de taxonomie.

Notre travail prend en compte également, l'évolution des connaissances taxonomiques depuis la parution de la Faune de VILLIERS (1978). Nous avons adopté l'ordre systématique et la nomenclature les plus récents et les plus complets proposés

par ATLHOFF et DANILEVSKY (1997) en connaissance des ouvrages de PESARINI et SABBADINI (1994), BENSE (1995) et les travaux de SAMA (1984 ; 1991 ; 1994 ; 1995 ; 1996).

***Ergates faber* (Linné, 1767)**

Montpellier VII, VIII (V. MAYET, notes manuscrites) ; *Fontfroide, pin* (Mayet) (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Valflaunès, Vias, Saint-Guilhem-le-Désert, Argelliers, Carlencas, Pignan (MARQUET, 1897 ; MAYET, 1898 ; SCHAEFER, 1952 ; 1961c ; ROUDIL, 1993 ; GUERROUMI, 1997).

Agde IX-1983 (MA) ; Pignan VII-1988 (CB) ; Villeneuve près de Clermont-l'Hérault VIII-1980 (JFV) ; Minerve VII-1986, Murviel-lès-Montpellier VII-1989, Riols VII-1993 (JS) ; Castries VII-1987 (AF).

Commun dans les zones de conifères, notamment en plaine et piémont jusqu'à Montpellier même.

***Prionus coriarius* (Linné, 1758)**

Pas rare en avril dans les environs de La Salvetat (V. MAYET, notes manuscrites) ; *Fontfroide* (Mayet) (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Vallée de l'Agout, La Salvetat à Rieumajou, La Salvetat (Deheeger), massif du Caroux, Cambon (Adgé) (MAYET, 1898 ; GALIBERT, 1932 ; HERVÉ, 1953 ; SCHAEFER, 1971a).

Repris depuis au Poujol-sur-Orb VII-1993 (RR).

Rarement trouvé dans le département, sans doute plus commun dans les forêts froides de La Salvetat au Larzac.

***Megopis (Aegosoma) scabricorne* (Scopoli, 1763)**

Campestre près de Lodève (ex. Gresler) (V. MAYET, notes manuscrites) ; *Montpellier, cerisier, tilleul, noyer et saule* (Mayet) (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Non signalé de Montpellier ni de la plaine de l'Hérault (PICARD, 1929a ; SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, 1937). Saint-Bauzille-de-Putois VIII-1962 sous des écorces de *Populus nigra* déperissant, Saint-Étienne-d'Issensac (Moreau), Mas-Blanc (Vayssières), très rare dans l'Hérault (SCHAEFER, 1963a ; 1968a ; 1982 ; VILLIERS, 1978).

Saint-Étienne-d'Issensac sur *Populus* en VII-1986 (PM et RO) ; Boisseron VII-1991 sur *Celtis australis* Linné (BDM) ; Baillargues VII-1992 (JMM) ; Lunel (RR) ; Gornies VII-1996 sur *Populus* sp. (JS).

Rarement signalé mais sans doute largement distribué le long des vallées et dans les montagnes.

***Rhagium (Rhagium) inquisitor* (Linné, 1758)**

La Salvetat. Saint-Guilhem sur pin, imagos fin août (V. MAYET, notes manuscrites) ; *Saint-Guilhem-le-Désert, pin et Cette* (Mayet) (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Saint-Guilhem-le-Désert élevé du *Pinus salzmannii*, Argelliers, Carlencas, forêt de l'Escandorgue (MAYET, 1898 ; PICARD, 1929a ; SCHAEFER, 1961c ; 1979b).

Saint-Guilhem-le-Désert VI-1988 (AF) et VII-1993 (RR) ; Cambon-et-Salvergue VII-1993 (PS).

Moitié nord du département, très commun dans les peuplements naturels de pins et de sapins de mai à août.

***Rhagium (Hagrium) bifasciatum* (Fabricius, 1775)**

Hautes vallées de l'Agout, La Salvetat (V. MAYET, 1898 et notes manuscrites) ; *Rieumajou sur la route près d'une haie de peuplier* (H. LAVAGNE, notes manuscrites).

La Salvetat à Rieumajou, Plateau du Somail, forêt du Crouzet (Mourgues), mont Caroux, Crouzet (GALIBERT, 1932 ; SCHAEFER, 1956a ; SCHAEFER et MOREAU, 1960).
Rosis V-1960 (RR).

Limité aux forêts froides.

Rhagium (Megarhagium) mordax (Degeer, 1775)

La Salvetat (V. MAYET, notes manuscrites) ; *Saint-Guilhem-le-Désert sur pin, La Salvetat sur hêtre (Mayet)* (H. LAVAGNE, notes manuscrites). La Salvetat parasité par *Ischnocerus rusticus* Fourcroy (Hymenoptera, Ichneumonidae), Le Soulié, forêt de l'Escandorgue à la Bergerie (LICHTENSTEIN, 1919 ; GALIBERT, 1932 ; SCHAEFER, 1979b).

Nord et Nord-Ouest du département dans divers peuplements forestiers d'altitude.

Rhagium (Megarhagium) sycophanta (Schrank, 1781)

Saint-Guilhem-le-Désert sur pin, La Salvetat sur chêne blanc (Mayet) (H. LAVAGNE, notes manuscrites). SCHAEFER (1959b) ne le connaissait pas du Languedoc.

Retrouvé à Pierrefite au cirque de Modasse (P. Leblanc) puis à Riols (IV-1992) en loge dans une souche de hêtre (FS et LS), à Saint-Maurice-Navacelles VI-1996 et Saint-André-de-Buèges au lieu dit Mastargues V.1997 (CC).

Mal connu dans le département, il doit probablement se trouver plus abondamment au Nord-Ouest de l'Hérault (monts d'Orb et du Somail) ainsi que plus à l'Ouest vers les monts du Minervois, le cours supérieur de la Cesse et dans les zones à vieux chênes de moyenne altitude.

Akimerus schaefferi (Laicharting, 1784)

Nous est connu que d'un seul exemplaire, dont il manque la tête et une partie du pronotum. Il a été pris à Brissac dans un piège aérien le long de la route qui mène à l'Hérault, au cours de la deuxième quinzaine de mai 1984 par P. Bruneau de Miré (collection du laboratoire de Faunistique du C.I.R.A.D.).

Cette espèce a été capturée à plusieurs reprises au Pompidou (Lozère) en châtaigneraie dans des pièges à carabes (MOURGUES, 1959 ; SCHAEFER, 1959a ; 1970 ; 1971c), et reprise par J.-F. Vayssières à Pont-Ravagers également en Lozère (SCHAEFER, 1983a).

Rare et vraisemblablement localisé, éventuellement dans d'autres massifs forestiers de moyenne altitude.

Brachyta interrogationis (Linné, 1758)

Cette espèce est présente dans les Alpes, les Vosges et le Massif Central (VENET, 1929 ; VILLIERS, 1978). La découverte de trois exemplaires à Saint-Guilhem-le-Désert, en juillet 1971 par J.-M. Lucien, est remarquable. Ces captures ainsi que celles effectuées par J. Sudre à Ferrières dans le Tarn (4 individus en VIII-1985) étendent sensiblement la répartition de l'espèce vers le Sud et l'Ouest.

Dans le Massif Central, les larves se développent dans les racines de *Geranium silvaticum* L. (VINCENT et GUILLOT, 1983) espèce végétale présente dans l'Hérault (VILAIN, 1996).

Acmaeops marginatus (Fabricius, 1781)

Capturé à Saint-Guilhem-le-Désert par J. Milliat (SCHAEFER, 1965 ; VILLIERS, 1978) mais pas repris depuis. L. Schaefer l'a capturé dans le massif de L'Aigoual (Gard) et dans les Pyrénées-Orientales, au battage de *Pinus nigra salzmannii* ; il est également connu de l'Aveyron (MURIAUX et FAGES, 1969).

***Dinoptera collaris* (Linné, 1758)**

Aucune référence bibliographique.

Très commun dans l'Hérault de mai à juillet mais, plus rare sur le littoral.

***Grammoptera ustulata* (Schaller, 1783)**

Grammont (V. MAYET, notes manuscrites). Héric, massif du Caroux, Saint-Jean-de-la-Blaquière en mai 1980, forêt de l'Escandorgue (SCHAEFER, 1954b ; 1980 ; 1981c ; SCHAEFER et MOREAU, 1960).

Mons-la-Trivalle VII-1953 (LS) ; Murles 3-V-1972 (FB) ; Murviel-lès-Montpellier VI-1991 sur châtaigniers en fleurs, Boisset VII-1993, Minerve VII-1993 (JS) ; forêt de l'Escandorgue à Lauroux VI-1981, Saint-Martin-de-Londres VI-1983 (OI).

Commun dans le département.

***Grammoptera abdominalis* (Stephens, 1831) (= *variegata* Germar, 1824)**

Une seule station connue pour le département. Saint-Martin-de-Londres (variété *nigrescens* Weise) (SCHAEFER, 1953 ; 1954c).

Fréquente régulièrement les fleurs de chênes autres que *Q. ilex* Linné.

Bien que rare il devrait se retrouver ailleurs.

***Grammoptera ruficornis* (Fabricius, 1781)**

Lodève (V. MAYET, notes manuscrites). Massif du Caroux (SCHAEFER et MOREAU, 1960).

Massif du Caroux VII-1989 sur pommier, Minerve VII-1993 sur aulne, Murviel-lès-Montpellier VI-1991 (JS) ; Cazevieille VI-1984 ; Saint-Guilhem-le-Désert VI-1976 (JMM) ; La Billière VII-1985 (OI).

Très commun dans l'Hérault.

***Alosterna tabacicolor* (Degeer, 1775)**

Rieumajou près de La Salvetat en mai et juin, Saint-Guilhem-le-Désert, Saint-Gély-du-Fesc (GALIBERT, 1932 ; SCHAEFER, 1953 ; 1954c ; 1958a).

Cambon-et-Salvergues VII-1993 (JS) ; Brissac VI-1988 (AF).

Commun et largement distribué dans l'Hérault.

***Pseudovadonia livida* (Fabricius, 1776)**

École VI, çà et là environs de la ville (Montpellier) sur fleurs d'ombellifères et de scabieuses, Grammont (Mayet) (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Massif du Caroux, Pignan : variété *steigerwaldi* Heyrovsky (SCHAEFER et MOREAU, 1960 ; ROUDIL, 1993).

Très commun du début du printemps jusqu'à la fin de l'été, de la plaine jusqu'en montagne.

***Vadonia unipunctata unipunctata* (Fabricius, 1787) morphe *occidentalis* Daniel, 1891.**

Saint-Guilhem-le-Désert, Saint-Jean-de-Buèges (V. MAYET, notes manuscrites) ; *Leptura unipunctata var occidentalis et jacqueti, pas le type. Saint-Guilhem-le-Désert sur aubépine et buissons fleuris en VI, sur valériane VI-VII (Mayet)* (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Manque totalement dans les environs de Montpellier (PICARD, 1929a). Saint-Guilhem-le-Désert, environs de Montpellier, Les Matelles, Aniane, Lunas, Saint-Martin-de-Londres, Saint-Jean-de-Buèges, Saint-Gély-du-Fesc, Cazevieille, Pignan (IABLOKOFF, 1950 ; HERVÉ, 1953 ; SCHAEFER, 1952 ; VILLIERS, 1978 ; ROUDIL, 1993 ; CLAVIER, 1994 ; GUERROUMI, 1997 ; COMELADE 1998a).

Lauroux VIII-1993 (FS et LS) ; Combaillaux VII-1983, Murviel-lès-Montpellier VII-1993 sur fleurs de *Ligustrum* sp. (JS).

La morphe *jacqueti* Pic, à élytres noirs, se prend parfois à Saint-Guilhem-le-Désert VI-1971 (FB) ; V-1994 (MH et JM).

***Anoplodera sexguttata* (Fabricius, 1775)**

Capturé dans le ravin de la Virenque, à la limite Nord-Ouest du département par P. Bruneau de Miré (SCHAEFER, 1966).

Rosis VII-1986 sur *Rubus* sp., La Salvetat-sur-Agout VII-1993 au battage sur *Cornus sanguinea* Linné (JS) ; Mons-la-Trivale, gorges d'Héric VI-1987 (AF) ; Combes VI-1996 (OS). Espèce cantonnée au secteur montagneux du département, on la trouve de mai à août sur diverses fleurs.

***Anoplodera rufipes* (Schaller, 1783)**

Sorbs, vallée de la Virenque au Nord du Cros (SCHAEFER, 1967a ; 1968a ; 1976b).

Les Rives VII-1989 (JS) ; Le Cros VII-1981 (OI) ; Le Soulié VII-1994 (DM).

Espèce rare et localisée dans le département où elle a été capturée uniquement sur le Cause du Larzac et tout dernièrement en forêt du Somail.

***Corymbia rubra* (Linné, 1758)**

Une femelle prise à Lamalou en août 1887. un mâle pris en battant un pin à Saint-Guilhem-le-Désert le 15-VII-1903 (V. MAYET, notes manuscrites) ; Saint-Guilhem en VII sur pin (Mayet) (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Languedoc commune sur les fleurs, Argelliers, Carlenca, bois de la Blanque, forêt du Crouzet, La Salvetat-sur-Agout (Deheeger) (MARQUET, 1897 ; SCHAEFER, 1961c ; 1968a ; 1971a).

Très abondant partout.

***Corymbia fontenayi* (Mulsant, 1839)**

Cette (V. MAYET notes manuscrites ; H. LAVAGNE notes manuscrites). Béziers sur ronce : rare, environs de Montpellier : type, Saint-Bauzille-de-Putois, Mons-la-Trivalle, La Billière, Le Bousquet-d'Orb, gorges d'Héric, col des Treize-Vents (Schaefer) (MULSANT, 1839 ; MARQUET, 1897 ; SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, 1937 ; SCHAEFER, 1954c ; 1968a ; 1972b ; VILLIERS, 1978).

Le Bousquet-d'Orb VII-1976, Saint-André-de-Buèges VII-1984 (OI) ; Brissac VII-1987 (AF) ; Saint-Privat VI et VII 1991 (CA) ; Murviel-lès-Montpellier VII-1994 (JS).

Cette espèce a été décrite d'après un individu des environs de Montpellier. Assez commun par place, de juin à août dans divers peuplements de feuillus, surtout de chênes verts.

***Brachyleptura scutellata scutellata* (Fabricius, 1781)**

Gorges d'Héric (Gobert) (LESEIGNEUR, 1960).

Rosis VII-1989 sur *Fagus sylvatica* Linné (JS) ; Colombières-sur-Orb VII-1992 (FS et LS) ; Aniane VII-1984 (RR) ; Le Soulié (coll. ENSA-M.).

Doit pouvoir se trouver plus fréquemment dans les massifs forestiers peuplés de hêtres mais également de vieux chênes même clairsemés.

***Brachyleptura cordigera cordigera* (Füsslins, 1775)**

Partout plage, plaine et montagne : Palavas, Nizas, Castelnau, Saint-Guilhem et La Salvetat. Cette (Mayet) (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Languedoc : commune sur les ombellifères, Saint-Guilhem-le-Désert, massif du Caroux, étangs du Bagnas près d'Agde, Pignan (MARQUET, 1897 ; IABLOKOFF, 1950 ; SCHAEFER et MOREAU, 1960 ; SCHAEFER, 1981d ; ROUDIL, 1993 ; COMELADE, 1998a).

Une des lectures les plus communes du département, avec une fréquence plus élevée dans la zone de l'olivier.

***Brachyleptura trisignata* (Fairmaire, 1852)**

Montpellier (V. MAYET, notes manuscrites). Béziers, Montpellier (Mayet, Avezou), Hérault, gorges d'Héric en juillet 1953, Saint-Gély-du-Fesc en juin 1954, Saint-Guilhem, Mons-la-Trivalle VII-1953, mont Caroux, Saint-Martin-de-Londres, Causse-de-la-Selle, Octon, Les Plans, Frouzet, Viols-le-Fort, (MARQUET, 1897 ; PLANET, 1924 ; PICARD, 1929a ; PODANY, 1954-1962 ; REYMOND, 1945 ; SCHAEFER, 1953 ; 1954c ; 1968a ; 1980 ; 1985 ; SCHAEFER et MOREAU, 1960 ; VILLIERS, 1978).

Cazevieille VII-1984 (HPA) ; Brissac VII-1987 (AF) ; Montpeyroux VII-1986 (JS) ; Saint-Gély-du-Fesc VII-1982 (LS) ; Argelliers V-1983 (GD) ; Courmonterral VI-1990 (FB) ; Ceyras VII (RR) ; Mireval V-1997 (CC).

Assez commun et largement répandu.

***Brachyleptura erythroptera* (Hagenbach, 1822)**

Une seule citation pour le département à Saint-Guilhem-le-Désert en juin (IABLOKOFF, 1950).

Pas revu depuis, mais cité du Gard (THÉLOT, 1966) et de La Bastide en Lozère (Mourgues) (SCHAEFER, 1969).

Assez rare et localisé mais probablement plus fréquent que le nombre de capture ne le laisse supposer. Espèce discrète essentiellement capturée par piégeage.

***Brachyleptura fulva* (Degeer, 1775)**

Montpellier en juin, La Salvetat en août (V. MAYET, notes manuscrites) ; École VI, Saint-Guilhem-le-Désert, Cette (Mayet) (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Saint-Guilhem-le-Désert, massif du Caroux, Pignan (IABLOKOFF, 1950 ; SCHAEFER et MOREAU, 1960 ; ROUDIL, 1993 ; COMELADE, 1998a).

Nous est connu de nombreuses localités héraultaises.

***Brachyleptura hybrida* (Rey, 1885)**

Voir si elle n'est pas sur l'Espinouse (V. MAYET, notes manuscrites). L'Espinouse, Le Somail, massif du Caroux, forêt du Crouzet, Calcadel près de Saint-Vincent-d'Olargues (GALIBERT, 1932 ; SCHAEFER et MOREAU, 1960 ; SCHAEFER, 1962c ; 1968a ; VILLIERS, 1978).

La Salvetat et Cambon-et-Salvergues VII-1993 (JS).

Relativement commun, de mai à août, dans les pinèdes et sapinières de montagne.

***Brachyleptura stragulata* (Germar, 1824)**

Découvert récemment dans l'Hérault et pris en nombre au col du Cabaretou en juillet et août 1978 (DEVECIS, 1979). Repris depuis en 1983 à La Salvetat-sur-Agout par R. Delmas et à Truscas, dans les monts d'Orb, par G. Bonthoux. Cette dernière localisation a été mise en doute (SCHAEFER, 1985), mais fut confirmée par de nouvelles captures (VII-1987) entre le Pas de la Lauze et le col de l'Ourtigas puis au Nord du bois de Bétirac (CLAVIER, 1994).

La capture inédite de H. Chevin à Rieussec "Sainte-Colombe" en VI-1977 apparaît être la plus ancienne pour l'Hérault. Prémian, Rieussec, Saint-Pons, Riols, Courniou VII-1993 et une capture vraisemblablement accidentelle à Minerve (JS).

Commun mais actuellement localisé dans le secteur nord-ouest du département.

***Anastrangalia sanguinolenta* (Linné, 1761)**

Saint-Guilhem-le-Désert, Carlencas (IABLOKOFF, 1950 ; SCHAEFER, 1952 ; 1961c).
Prémian, La Salvetat, Riols, Cambon-et-Salvergues VII-1993 (JS) ; Saint-André-de-Buèges VI.1997 (CC).

Commun et largement distribué dans les pinèdes en dehors du littoral.

***Anastrangalia dubia* (Scopoli, 1763)**

Saint-Guilhem-le-Désert avec la variété chamomillae (V. MAYET, notes manuscrites ; H. LAVAGNE, notes manuscrites). Hérault, Montpellier sur fleur de *Lepidium draba* Linné (= *Cardaria draba* (Linné) : sans doute importée avec les bois de construction (PLANET, 1924 ; SCHAEFER, 1957b).

La Salvetat, Cambon-et-Salvergues, Riols VII-1993 (JS) ; Saint-Martin-de-Londres VII-1988 (RR).

Cette espèce est surtout cantonnée dans les massifs montagneux et bien moins fréquente ailleurs.

***Pachytodes cerambyciformis* (Schrank, 1781)**

La Salvetat en VI, sur fleurs (H. LAVAGNE, notes manuscrites). La Salvetat à Rieumajou (GALIBERT, 1932).

La Salvetat VII-1993, Les Rives, VII-1987, Prémian, Riols, Cambon-et-Salvergues, Ferrals-les-Montagnes VII-1993 (JS) ; Pégairolles-de-Buèges VI-1971 (JML) ; Lamalou-les-Bains VI-1993 (HL) ; Poujols-sur-Orb VI-1994 (RR).

Moitié nord du département, très commun dans les montagnes sur diverses fleurs.

***Leptura quadrifasciata* Linné, 1758**

La Salvetat, ravin du Devez VIII un seul individu sur une ombelle, un autre dans le bois de Label (V. MAYET, notes manuscrites) ; *La Salvetat V : Rieumajou sur aulne* (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Vallée de l'Agout, La Salvetat (MAYET, 1898 ; GALIBERT, 1932).

Cantonné au secteur montagneux de l'Ouest du département où il semble rare et localisé.

***Leptura aurulenta* Fabricius, 1792**

Rieumajou près de La Salvetat, La Salvetat (Deheeger) (GALIBERT, 1932 ; SCHAEFER, 1971a).

Saint-Guilhem-le-Désert à la source du Cabriet VI-1988 (AF) ; Le Soulié (coll. ENSA-M.).

Peu commun et localisé.

***Ruptela maculata* (Poda, 1761)**

Pas rare à La Salvetat en juillet et août (V. MAYET, notes manuscrites) ; *La Salvetat : Rieumajou* (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Assez commun dans tout le Languedoc : sur les fleurs, vallée de l'Agout, plateau du Somail, massif du Caroux, Saint-Guilhem-le-Désert (MARQUET, 1897 ; MAYET, 1898 ; GALIBERT, 1932 ; SCHAEFER et MOREAU, 1960 ; COMELADE, 1998a).

Connu de très nombreuses localités surtout dans la moitié nord du département.

***Stenurella melanura* (Linné, 1758)**

Saint-Guilhem, garrigues sur buissons en fleur, Béziers (Mayet) (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Béziers : commune sur les fleurs, La Salvetat à Rieumajou, plateau du Somail, Pignan, Saint-Guilhem-le-Désert (MARQUET, 1897 ; GALIBERT, 1932 ; ROUDIL, 1993 ; COMELADE, 1998a).

Partout de mai à juillet, du littoral jusqu'en montagne.

***Stenurella bifasciata* (Mueller, 1776)**

Saint-Guilhem, dans les mêmes conditions que S. melanura (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Montpellier au bois de Montmaur, Pignan (SCHAEFER, 1964c ; ROUDIL, 1993).

Espèce très commune dans tout le département, souvent dans les mêmes habitats que l'espèce précédente.

***Stenurella nigra* (Linné, 1758)**

Saint-Guilhem en mai (Lavagne) (V. MAYET, notes manuscrites). Assez commune dans tout le Languedoc (MARQUET, 1897).

Commun partout.

***Pedostrangalia (Pedostrangalia) revestita* (Linné, 1767)**

Assez rare, Montpellier à l'esplanade VI, avenue de l'École sur les platanes. Lattes (Mayet) (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Béziers : rare, Montpellier : un exemplaire de la variété *labiata* Mulsant, Saint-Martin-de-Londres au battage sur *Quercus pubescens*, Saint-Guilhem-le-Désert au Roc-de-la-Vigne sur aubépine (MARQUET, 1897 ; PICARD, 1929a ; SCHAEFER, 1957b ; 1961c ; VILLIERS, 1978).

Saint-Guilhem-le-Désert VII-1982 (OI) ; Mireval, massif de la Gardiole VI-1989 (AF) ; Vendargues sur cerisier (HPA) ; Montpellier (coll. ENSA-M.).

Rare et localisé, de mai à juin sur diverses essences feuillues. Cette espèce n'est pas aussi rare que le nombre de ses captures ne le laisse entendre. Elle est précoce (avril-mai) et affectionne particulièrement les vieux chênes du débourement à la floraison.

***Necydalis ulmi* Chevrolat, 1838**

Montpellier sur orme, chêne vert et mûrier (V. MAYET, notes manuscrites) ; *Cette (Mayet)* (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Montpellier : éclos en mai 1891 et 1911 en nombre d'un tronc décomposé de *Populus nigra*, considéré dans l'Hérault comme nuisible aux mûriers, Languedoc, Saint-Gély-du-Fesc sur noyer et chêne vert ; 2-VI et 11-VI-1953, Béziers, Saint-Étienne-d'Issensac, Saint-Guilhem-le-Désert (PICARD, 1912 ; 1919a ; 1929a ; PLANET, 1924 ; SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, 1937 ; REYMOND, 1945 ; SCHAEFER, 1953 ; 1954c ; 1980 ; VILLIERS, 1978 ; COMELADE, 1998a).

Pignan VII-1987 sur fleur de châtaignier (AF), Saint-Étienne-d'Issensac VII-1989 (JFV) ; Saint-Martin-de-Londres VII-1981 sur *Fraxinus* sp. (PM) et VII-1987 (AF).

Rarement abondant mais largement distribué et assez fréquent dans l'Hérault notamment par piégeage aérien.

***Oxypleurus nodieri* Mulsant, 1839**

Un exemplaire pris en battant un pin de Salzmann à Saint-Guilhem le 20-V-1896, un autre pris en 1897 par Puel qui me l'a donné. Deux autres pris par Lavagne en juillet qui a perdu son flacon, nombreux exemplaires depuis (V. MAYET, notes manuscrites et 1898) ; *Saint-Guilhem sur pin IV-V-VI* (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Saint-Guilhem-le-Désert à partir du *Pinus salzmannii*, Argelliers, Montarnaud, Carlencas-Levas, (Mayet, 1900 ; PICARD, 1929a ; SCHAEFER, 1936 ; 1952 ; 1955a ; 1961c et d ; 1982 ; 1983b ; IABLOKOFF, 1950 ; MARRES et al., 1974 ; TÉOCCHI, 1975 ; VILLIERS, 1978 ; ROUDIL, 1987 ; GUERROUMI, 1997).

Montarnaud VI-1969 (JMM) ; Arboras, IV-1987 (JS) ; Saint-Étienne-de-Gourgas IV-V-VI 1995 (DC) ; Sainte-Croix-de-Quintillargues XII-1997 (CC).

Espèce reprise régulièrement par de nombreux entomologistes. Il est devenu un classique de Saint-Guilhem-le-Désert. Elle est probablement beaucoup plus commune et largement répandue qu'elle ne le paraît.

***Arhopalus ferus* (Mulsant, 1839) (= *tristis* (Fabricius, 1787))**

Montpellier (Mayet) (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Montpellier, Hérault, Saint-Guilhem-le-Désert, Argelliers, Carlenças (MARQUET, 1897 ; PLANET, 1924 ; PICARD, 1929a ; IABLOKOFF, 1950 ; SCHAEFER, 1952 ; 1961c ; GUERROUMI, 1997).

Combaillaux, Murviel-lès-Montpellier en VII-1985 et 1986 (JS) ; Montagnac (JMM) ; Saint-Georges-d'Orques (OI) ; Lunel VIII-IX aux lumières (RR) ; Montarnaud VII-1980 sur pin brûlé, Montpellier VIII-1994 (FB).

Commun de juin à août dans la moitié Sud du département, dans les forêts de résineux. Il a été trouvé en nombre sur les troncs brûlés.

***Arhopalus rusticus* (Linné, 1758)**

Saint-Guilhem-le-Désert, forêt du Crouzet, Les Escampats près de Riols (Deheeger), Pignan (IABLOKOFF, 1950 ; SCHAEFER, 1962c ; 1968a ; 1972a ; ROUDIL, 1993).

Saint-Privat VI-1990 (CA) ; Lunel aux lumières en compagnie de *A. ferus* (RR) ; Saint-Étienne-de-Gourgas VII-VIII 1996 (DC).

Moins abondant que le précédent et plus septentrional.

***Arhopalus syriacus* (Reitter, 1895)**

Saint-Guilhem-le-Désert au Roc-de-la-Jarre, Hérault, Argelliers, Montarnaud, Montpellier, obtenu par Comelade de branche de pin d'Alep en provenance de Clapiers (SCHAEFER, 1947 ; 1952 ; 1961c et d ; 1964e ; 1968b ; 1973 ; 1976c ; TÉOCCHI, 1970 ; MARRES et al., 1974 ; VILLIERS, 1978 ; GUERROUMI, 1997).

Argelliers VII-1975 (OI) ; Montferrier-sur-Lez IX-1995 (DC).

Était probablement confondu avec *A. ferus* par PICARD (1929a). Assez commun à basse altitude.

***Asemum striatum* (Linné, 1758)**

Un exemplaire pris à Saint-Guilhem-le-Désert par Lavagne le 20-V, un autre le 24-V (V. MAYET, notes manuscrites) ; *Saint-Guilhem sur pin, Rieumajou VI sur pin avec la variété agreste* (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Languedoc : peu commun, Rieumajou près de La Salvetat, plateau du Somail, Saint-Guilhem-le-Désert sur *Pinus* divers, Carlenças (MARQUET, 1897 ; GALIBERT, 1932 ; IABLOKOFF, 1950 ; SCHAEFER, 1961c).

Ganges VII-1993 (JS) ; forêt de l'Espinouse, Cambon-et-Salvergues VII-1993 (PS).

***Tetropium castaneum* (Linné, 1758)**

Languedoc : peu commun, variété *luridum* Linné, forêt du Crouzet : variété *luridum* (Mourgues et Deheeger), massif du Caroux, (MARQUET, 1897 ; SCHAEFER, 1956a ; 1958c ; 1972a ; SCHAEFER et MOREAU, 1960).

Montarnaud VI-1986 (JMM).

***Spondylis buprestoides* (Linné, 1758)**

Saint-Guilhem-le-Désert, souches de pin (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Languedoc : rare, La Salvetat à Rieumajou, Saint-Guilhem-le-Désert, Argelliers (MARQUET, 1897 ; GALIBERT, 1932 ; SCHAEFER, 1952 ; 1961c ; GUERROUMI, 1997).

Repris à Argelliers en 1978 (PM) et 1988 (JS) ; Montpeyroux VII-1983 (RO) ; Balaruc-les-Bains sur pin ouvré VI-1991 (JML) ; forêt domaniale du Minervois VI-1986 (JS) ; Cambon-et-Salvergues VII-1993 (PS).

Assez commun dans la zone des peuplements naturels de pins et autres conifères, plus fréquent en montagne et dans l'arrière pays.

***Icosium tomentosum atticum* Ganglbauer, 1881**

P. Leblanc a retrouvé récemment un exemplaire inédit (coll. Darge) pris en 1916 et provenant de Saint-Pons. VILLIERS (1978) estimait que l'espèce n'était pas présente en France continentale et ne connaissait que la sous espèce typique de Corse. La découverte de cette espèce dans les Bouches-du-Rhône en septembre 1988 (PELLEGRIN, 1990) nous obligeait à considérer comme probable sa présence dans l'Hérault avant d'avoir connaissance des informations de P. Leblanc, d'autant que sa répartition générale est circuméditerranéenne. L'état de conservation de l'exemplaire de Saint-Pons ne permet pas d'être absolument certain de l'appartenance à une des deux sous espèces, mais tout semble néanmoins indiquer qu'il s'agit bien d'un exemplaire de la sous-espèce *atticum* (P. LEBLANC, com. pers.). Cette découverte confirme les observations de PELLEGRIN (1990) qui l'a retrouvé dans le Gard (PELLEGRIN, com. pers.) et porte à croire que *I. tomentosum* Lucas, 1854 est une espèce indigène en France continentale représentée par sa sous espèce *atticum*, dont la fréquence et la répartition sont fort mal connues.

***Hesperophanes sericeus* (Fabricius, 1787)**

Montpellier, VIII, un exemplaire (V. MAYET, notes manuscrites) ; Saint-Guilhem figuier VII, Roujan VIII (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Hérault (Mayet), Saint-Guilhem-le-Désert (Lavagne), Argelliers, plus rare en bas Languedoc qu'en Provence, trouvé à Palavas par J. Vitou, Prades-le-Lez, Villeneuve, (PICARD, 1919a ; 1929a ; SCHAEFER, 1961c ; 1980 ; 1985 ; VILLIERS, 1978).

Montagnac VII-1986 aux lumières (JMM) ; Saint-Guilhem-le-Désert, Saint-Georges-d'Orques (OI) ; Agde VII-1988 (MA) ; Pignan VII-1988 et 89, Sainte-Croix-de-Quintillargues VII-1997 (CC) ; Lunel, Clermont-l'Hérault VIII et IX-1989 (RA) ; Causse-de-la-Selle VII-1986 (FB).

Disséminé sur tout le département à l'exception des secteurs montagneux. Rarement abondant.

***Trichoferus griseus* (Fabricius, 1792)**

Figuiers : Castelnau, La Lironde (Lichtenstein) (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Montpellier (= *Hesperophanes pallidus* Olivier), Béziers, Montpellier sur les vieux figuiers, Saint-Gély-du-Fesc écloso de figuier et parasité par le Braconide *Iphiaulax flavator* F., tous les départements riverains de la Méditerranée (LICHTENSTEIN, 1873 ; 1919 ; MARQUET, 1897 ; LICHTENSTEIN et PICARD, 1918b ; PICARD, 1919a et b ; 1929a (note infrapaginale) ; PLANET, 1924 ; VILLIERS, 1978).

Saint-Guilhem-le-Désert VII-1989 (JS) ; Castries VII-1988 (AF).

S'obtient facilement par élevage. Les nombreuses informations biologiques données par PICARD (1919a) sont issues d'observations héraultaises. Il se développe surtout sur figuier et accessoirement sur grenadier, mûrier, lentisque, laurier-rose et érable (BALACHOWSKY, 1962).

***Trichoferus fasciculatus* (Faldermann, 1837)**

Figuier : meubles Montpellier (V. MAYET, notes manuscrites) ; *La Lironde* : figuier mêlé à *T. griseus* (Lichtenstein) (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Saint-Gély-du-Fesc, Montpellier, Saint-Guilhem, Argelliers, Hérault (PICARD, 1919a ; 1929a ; SCHAEFER, 1961c ; VILLIERS, 1978).

Très nombreuses stations : Lunel VII-1993 (RA) ; Minerve VII-1986 (JS) ; Lamalou-les-Bains VII-1993 (PS) ; Lattes VII-1994 (CC).

Très commun et très facile à élever.

***Trichoferus cinereus* (Villers, 1789)**

Figuier et meubles : Castelnau, Montpellier (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Languedoc : très commun, Hérault (Mayet), Les Matelles sur mûrier (Aygalin), Viols-le-Fort (MARQUET, 1897 ; PICARD, 1919a ; SCHAEFER, 1961a ; 1985).

Saint-Jean-de-Buèges (coll. ENSA-M.) ; Saint-Guilhem-le-Désert (RR).

Moins abondant que les deux espèces précédentes. Il s'élève facilement mais le cycle est deux à trois fois plus long que celui de *T. fasciculatus*.

***Trichoferus pallidus* (Olivier, 1789)**

Montpellier (Rey), Hérault (MARQUET, 1897 ; PLANET, 1924).

Saint-Martin-de-Londres VII-1988 (JS) ; Lamalou-les-Bains VII-1993 (PS).

Rare et plutôt dans l'arrière pays, le piégeage aérien devrait favoriser de futures découvertes. La citation de Montpellier nous apparaît suspecte.

***Stromatium fulvum* (Villers, 1789) (= *unicolor* (Olivier, 1795))**

Ormeaux, poutres, abricotier : Montpellier (Mayet) (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Montpellier aux environs, Hérault, La Paillade (Mourgues), tous les départements bordant la Méditerranée (MULSANT, 1862-1863 ; MARQUET, 1897 ; PLANET, 1924 ; PICARD, 1929a ; SCHAEFER, 1976a ; VILLIERS, 1978).

Montpellier VIII-1919 (coll. ENSA-M.) ; Saint-Guilhem-le-Désert (H. Lavagne) (coll. Darge).

Aucune capture récente nous a été communiquée.

***Penichroa fasciata* (Stephens, 1831)**

4 exemplaires sortis d'un manche de hache (en chêne blanc ou en arbre de Judée) en juillet chez M. Combres à Valflaunès au pied du pic Hortus, canton de Claret (Hérault). L'insecte avait vécu sous l'écorce et ne se trouvait dans le bois que pour la nymphe (V. MAYET, notes manuscrites) ; Valflaunès, chêne (Mayet) (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Montpellier, Hérault, pic Saint-Loup, Murles, Vailhauquès, Pégairolles-de-Buèges (PICARD, 1929a ; PODANY, 1954-1962 ; VILLIERS, 1978 ; SCHAEFER, 1985).

Minerve VII-1989, aux lumières (JS).

Insecte discret probablement plus répandu et fréquent qu'il n'y paraît.

***Gracilia minuta* (Fabricius, 1781)**

Castelnau sur églantier, Lattes sur peuplier IV, Clermont-l'Hérault IV-V-VI sur églantier, Saint-Guilhem sur chêne vert, Cette (Mayet) (H. LAVAGNE, notes manuscrites). En abondance à Cette, Languedoc : chez les vanniers, Lamalou dans des branches mortes de châtaignier, Montpellier sur figuier et dans un panier en osier, abondant dans l'Hérault Saint-Guilhem-le-Désert, massif du Caroux (LICHTENSTEIN, 1870 ; Mayet, 1877 ; MARQUET, 1897 ; PICARD, 1919a ; 1929a ; SCHAEFER, 1952 ; 1961b ; SCHAEFER et MOREAU, 1960 ; GUERROUMI, 1997).

Saint-Guilhem-le-Désert au Pont-du-Diable VII-1971, Cazevieille VI-1971 ; Agde VIII-1978 (MA) ; Pouzolles VI-1996, abondant sur branchettes mortes d'amandier (CC) ; Saint-Gervais-sur-Mare VI-1996 (OS).

***Lucasianus levaillanti* (Lucas, 1849)**

Jardin des plantes sur cyprès pris aussi par Sicard et Mayet (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Montpellier, jardin des plantes découvert en décembre 1904, lors de l'abattage de plusieurs cyprès (*Cupressus sempervirens*) mourants à la suite d'un incendie (MAYET, 1905). Ces informations ont été reprises par PLANET (1924), PICARD (1929a et b), SAINTE-CLAIRE-DEVILLE (1937) et PODANY (1954-1962). Il s'est maintenu pendant près de soixante dix ans dans un des cyprès survivants et à fait l'objet de nombreux élevages avant de disparaître récemment (Schaefer) (VILLIERS, 1978). Ce dernier auteur considère que la présence de cette espèce en France est actuellement douteuse. Nous rappelons ici qu'il fut question d'une importation et acclimatation dans les Bouches-du-Rhône (REYNIER, 1929). Cette rumeur fut formellement démentie suite à l'examen d'exemplaires en provenance de Graveson qui révéla le *Phymatodes lividus* Rossi (PICARD, 1929b).

La présence de cette espèce à Montpellier reste énigmatique, car il ne se retrouve au plus près qu'au Sud de l'Espagne, au Portugal (SAMA, 1992) et plus récemment dans la province de Cadix (Espagne) (PAEZ, 1995). Nous partageons le scepticisme de Villiers mais, a-t-il été recherché correctement depuis sa dernière capture? Des investigations précises mériteraient d'être entreprises afin de vérifier son éventuel maintien dans le Jardin des Plantes ou à proximité.

***Nathrius brevipennis* (Mulsant, 1839)**

Castelnaud sur clématites, Saint-Guilhem VI sur chênes verts, Jardin des Plantes sur mûrier de Chine, École, Béziers (Mayet) (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Hérault (explicitement!), Montpellier (PICARD, 1919a ; 1929a).

Saint-Guilhem-le-Désert (coll. ENSA-M.) ; Béziers VI-1921 (FM).

Peu de références pour l'Hérault mais s'y trouve sûrement presque partout avec des fluctuations d'effectifs importantes mais localisées.

***Glaphyra umbellatarum umbellatarum* (Schreber, 1759)**

Saint-Guilhem-le-Désert sur les Rosacées arborescentes et pommiers sauvages, Saint-Martin-de-Londres, Le Cros, La Vacquerie (IABLOKOFF, 1950 ; SCHAEFER, 1952 ; 1954c ; VILLIERS 1978).

Ravin de la Virenque VII-1978 (BDM) ; Joncels VI-1993 (HL) ; Lauroux VI-1994 (MH) ; forêt de l'Escandorgue VI-1994 (CC).

***Glaphyra marmottani marmottani* (Brisout, 1863)**

Une femelle éclore en avril, chez H. Lavagne, de bois de pin venant de Saint-Guilhem, un mâle pris en battant un pin laricio fraîchement abattu à Saint-Guilhem le 24-V-1900, nombreux exemplaires obtenus de fagots mis en sac d'élevage de 1904 à 1908 (V. MAYET, notes manuscrites) ; *Saint-Guilhem, sur pin, j'ai décrit la larve et l'accouplement* (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Saint-Guilhem-le-Désert (Darboux et Lavagne), Pégairolles-de-Buèges, Argelliers : cette espèce attaque non seulement le pin de Salzmann mais aussi le pin d'Alep et le pin sylvestre de mai au début de juillet, Hérault (MAYET, 1900 ; LAVAGNE, 1902a et b ; PLANET, 1924 ; PICARD, 1929a ; SCHAEFER et VEYRET, 1936 ; SCHAEFER, 1936 ; 1947 ; 1952 ; 1955a ; 1961c et d ; 1974d ; 1977a ; 1980 ; SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, 1937 ; IABLOKOFF, 1950 ; PODANY,

1954-1962 ; SIMON, 1954 ; MARREŞ et al., 1974 ; VILLIERS, 1978 ; Sama, 1995 ; GUERROUMI, 1997).

Saint-Guilhem-le-Désert VI-1979 (JFV) ; Pégairolles-de-Buèges VI-1988 (AF).

***Stenopterus rufus* (Linné, 1767)**

Montpellier, Pézenas pas commun (V. MAYET, notes manuscrites). Palavas sur petites euphorbes et ombellifères, Saint-Guilhem dans les garrigues (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Languedoc : commun, massif du Caroux, Montpellier au bois de Montmaur, Pignan (MARQUET, 1897 ; SCHAEFER et MOREAU, 1960 ; SCHAEFER, 1964c ; ROUDIL, 1993).

Ganges VI-1964 (FB) ; Fabrègues V-1988 (CC) ; éclos de piquets de vigne à Vendargues en VI-1996 (CC).

Très commun et largement répandu.

***Callimus angulatus angulatus* (Schrank, 1789)**

Saint-Martin-de-Londres, Saint-Gély-du-Fesc IV au battage de branches mortes de *Q. pubescens*, sommet du Roc-Blanc de la Séranne sur viorne, Hérault (SCHAEFER, 1953, 1957c, 1977a ; VILLIERS, 1978).

Lauroux VI-1977 (JMM) ; Le Cros VII-1981 (OI) ; Puéchabon V-1993, Cazevieille IV-1994 (FB) ; Viols-le-Fort IV-1996 (A. Migeon).

***Callimus abdominale* (Olivier, 1795)**

Découvert dans les gorges d'Héric près de Lamalou-les-Bains et repris au même endroit par Deheeger, Hérault : nouveau pour le département, Les Matelles (Aygalin), Carlencas sur fleur de *Cistus monspeliensis* en mai 1959, Saint-Vincent-d'Olargues, Octon, Bédarieux sur noyer, Saint-Pons-de-Thomières (Clavier), forêt de Carlencas, Le Mas-Blanc, Castanet-le-Bas (HERVÉ, 1953 ; SCHAEFER, 1955a et b ; 1961c ; 1963b ; 1972a ; 1980 ; 1985 ; VILLIERS, 1978).

Saint-Mathieu-de-Trévières VI-1995 (OS).

Assez commun et largement répandu dans l'Hérault.

***Certallum ebulinum* (Linné, 1767) morphe *ruficolle* Fabricius, 1781**

La Valette, Palavas sur petites euphorbes et diverses fleurs, Cette (Mayet) (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Environs de Montpellier, Béziers : commun, Montpellier, Hérault (JACQUELIN-DUVAL et LANEYRIE, 1852 ; MARQUET, 1897 ; MAYET, 1898 ; PICARD, 1929a ; VILLIERS 1978).

Nombreuses localités : Montagnac V-1980 (JMM) ; Mireval Vi-1987 (AF) ; Agde V-1981 (BDM) ; Saint-Brès V-1987 (RR) ; Murviel-lès-Montpellier V-1981 (JS) ; Fabrègues VI-1984 (CC) ; Fabrègues et Saint-Martin-de-Londres V-1986 (FB).

Se capture en fauchant les Malvacées.

***Obrium brunneum* (Fabricius, 1792)**

Récemment découvert dans l'Hérault. Plusieurs exemplaires ont été récoltés dans la forêt de l'Escandorgue, en juin 1994 lors de la sortie annuelle de la Société entomologique de France, par de nombreux collègues sur des ombellifères près des épiceas.

Espèce à rechercher dans les secteurs de montagne.

***Deilus fugax* (Olivier, 1790)**

Saint-Guilhem : garrigues, *Castelnau* : la larve vit dans le chêne vert (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Cette, Béziers assez rare, garrigues et environs de Montpellier, Saint-Jean-de-la-Blaquière en mai 1980 (MARQUET, 1897 ; PICARD, 1929a ; VILLIERS 1978 ; SCHAEFER, 1980).

Très commun partout, vit dans les genêts et non dans le chêne vert comme l'a prétendu H. Lavagne.

***Cerambyx (Cerambyx) cerdo* Linné, 1758**

Montpellier sur chêne, Jardin des Plantes (Mayet) (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Montpellier : commun (donné rare par ailleurs!) de juin, parfois dès la fin mai, jusqu'à la fin juillet. Le *C. mirbecki* Lucas se montre en août et est appelé par les paysans *Manga pero* (mange poire), Cette (= *C. heros* Scopoli, 1763), Lamalou au vol dans une châtaigneraie, Languedoc : très commun, Saint-Guilhem-le-Désert au bord de l'Hérault, Hérault, Jardin des Plantes de Montpellier, route de Ganges (Eroux), Pignan (FAIRMAIRE, 1857 ; LICHTENSTEIN, 1870 ; MAYET, 1877 ; 1881 ; MARQUET, 1897 ; PLANET, 1924 ; PICARD, 1929a ; REYMOND, 1945 ; SCHAEFER, 1958a ; 1964a ; BERTRAND, 1960 ; FAVARD, 1962 ; ROUDIL, 1993 ; COMELADE, 1998a).

Très commun partout dans le département où il est connu pour ses ravages sur les fruits mûrs sur l'arbre et parfois dans les bois ouvrés.

***Cerambyx (Cerambyx) welensii* Kuster, 1846 (= *velutinus* Brullé, 1832)**

Jardin des Plantes de Montpellier, se prend facilement fin juin sur les chênes verts (V. MAYET, notes manuscrites) ; *Saint-Guilhem sur chêne, École (Mayet)* (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Lamalou dans un tronc caverneux de châtaigner, Montpellier en juillet à la lanterne sur le tronc des chênes, Languedoc : très commun sur chêne, environs de Montpellier et Jardin des Plantes, Hérault, Pignan, Saint-Guilhem-le-Désert (MAYET, 1877 ; 1881 ; 1898 ; MARQUET, 1897 ; PLANET, 1924 ; PICARD, 1929a ; ROUDIL, 1993 ; COMELADE, 1998a).

Saint-Martin-de-Londres VII-1982, Argelliers VII-1982 (FB) ; Saint-Martin-de-Londres, Saint-Étienne-d'Issensac VII-1984 au piège aérien (PM) et en loge le 13-IV-1985 (CC) ; Saint-André-de-Buèges, Murviel-lès-Montpellier VIII-1993 (JS) ; Lamalou-les-Bains VII-1993 (PS) ; Pignan VII-1980 (RR) ; Clermont-l'Hérault VII-1993 (RA) ; Saint-Mathieu-de-Trévières VII-1995 (OS).

Commun et largement répandu en bas Languedoc, plus tardif que *C. cerdo*.

***Cerambyx (Cerambyx) miles* Bonelli, 1823**

Montpellier sur chêne, Saint-Jean-de-Buèges (Mayet) (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Environs de Montpellier ou de Cette, au crépuscule autour des chênes verts, Montpellier, Béziers, Vias pris une fois en quantité sur *Crataegus azarolus* (Mayet), Hérault : commun, garrigues de l'Hérault avec *C. cerdo*, vallée de l'Hérault, Saint-Guilhem-le-Désert au bord de l'Hérault, entre Octon et le Salagou (FAIRMAIRE, 1857 ; LICHTENSTEIN, 1870 ; MAYET, 1881 ; MARQUET, 1897 ; PLANET, 1924 ; PICARD, 1929a ; SCHAEFER, 1955a ; 1958a ; 1974a ; VILLIERS, 1978 ; COMELADE, 1998a).

Saint-Martin-de-Londres VII-1993 (JPB) ; Minerve VII-1993 (JS) ; Lamalou-les-Bains VII-1993 (PS) ; Saint-Mathieu-de-Trévières VII-1995 (OS) ; Murviel-lès-Montpellier VII-1989 (CC).

Localement commun sur les vieux chênes en compagnie de *C. cerdo* et *C. welensii*.

***Cerambyx (Mesocerambyx) scopolii* Füsslins, 1775**

Saint-Guilhem garrigues, Castelnau néflier, Lattes saules (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Languedoc : très commun, Saint-Guilhem-le-Désert (MARQUET, 1897 ; COMELADE, 1998a).

Partout dans le département, c'est l'espèce la plus commune du genre.

***Purpuricenus kaehleri* (Linné, 1758)**

Saint-Guilhem : chêne vert avec la variété bipunctatus Villa (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Saint-Guilhem-le-Désert, Puéchabon (une femelle de la variété *budensiformis* Heyrovsky) (SCHAEFER, 1952 ; 1958a ; GUERROUMI, 1997 ; COMELADE, 1998a ; RENAUDIE, 1998).

Commun dans le département et connu de nombreuses localités. Sa fréquence était méconnue par les anciens auteurs qui pratiquaient rarement le piégeage.

***Purpuricenus globulicollis* Mulsant, 1839**

Avène (Clavier), Saint-Guilhem-le-Désert aux Lavagnes (Moragues), vallée de la Virenque, Labeil sur la commune de Lauroux (Maldès), Viols-le-Fort (CLAVIER, 1983 ; 1994 ; SCHAEFER, 1985 ; RICHOUX et al., 1986 ; BRUNEAU DE MIRÉ, 1990 ; COMELADE, 1998b).

Saint-Maurice-Navacelles, nombreux exemplaires dans des pièges aériens de VII à VIII-1996 (CC).

Espèce réhabilitée depuis que les techniques de piégeage permettent d'en obtenir des séries. Assez commun dans la chênaie de moyenne altitude, sans doute largement répandu dans ce contexte écologique. Obtenu presque exclusivement par piégeage.

***Purpuricenus budensis* (Goeze, 1783)**

Sorti d'une branche de chêne vert à demi morte prise à La Valette près de Montpellier le 20-VI-1892, 1 exemplaire de Saint-Guilhem (ex. Tisson). 1 exemplaire à la Magdeleine sur des fleurs de ronces le 1^{er} VII (ex. Sicard) (V. MAYET, notes manuscrites) ; *La Valette, chêne vert (Mayet)* (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Montpellier, Hérault, Murles, Frouzet avec l'aberration *punctiger* Apfelbeck, Pignan, Saint-Guilhem-le-Désert, tous les départements riverains de la Méditerranée, Saint-Thibery (PICARD, 1929a ; PODANY, 1954-1962 ; SCHAEFER, 1968a et b ; DARNAUD, 1978 ; VILLIERS, 1978 ; CARRIÈRE, 1990 ; ROUDIL, 1993 ; COMELADE, 1998a).

Nombreuses observations, commun dans les garrigues et en bordure des bois de chênes verts, le plus floricole du genre.

***Aromia moschata moschata* (Linné, 1758)**

Lattes sur saule, Saint-Guilhem sur peuplier, La Salvetat (Mayet) (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Assez commune chez nous!, Languedoc : sur les saules très commun, Saint-Guilhem-le-Désert sur carie de *Salix alba* avec la variété *nigrocyanea* Reitter, Agde un exemplaire vert récolté par Adgé, la variété à prédominance noir bleuté à noire (*nigrocyanea* Reitter) est exclusive en bas Languedoc (LICHTENSTEIN, 1870 ; MARQUET, 1897 ; DEMAUX, 1954 ; SCHAEFER, 1958a ; 1972b ; 1976c ; VILLIERS, 1978 ; COMELADE, 1998a). La sous espèce *ambrosiaca* (Stevens, 1809) est par ailleurs citée des bords du Libron au Nord de Béziers (TARNIQUET, 1878) ce qui nous surprend beaucoup.

Palavas VII-1989, piège à vin (AF) ; Agde VII-1986 (MA) ; Saint-Gervais-sur-Mare VII-1993 (JS) ; Lamalou-les-Bains VII-1993 (PS) ; Vendres VI-1920, Valras VI-1927 (FM) ; Lunel, Clermont-l'Hérault et Ceras VII-1993 (RA).

***Rosalia alpina* (Linné, 1758)**

L'Espinouse VII hêtre (Mayet) (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Le Caroux à Lafage près de Lamalou-les-Bains (Prioton), forêt du Crouzet (Saury), Douch (Schaefer), hêtraie de Perpignan-de-la-Grave à Douch : abondante en juillet 1986, Lunas dans la vallée de Nize (Bonthoux et Schaefer), forêt des monts d'Orb, entrée de la grotte de Labeil (Bruneau de Miré), Octon (Schaefer), hêtraie des Valettes à 1,5 km du Perthus (Schaefer), forêt de l'Escandorgue (Schaefer, Maldès et Bruneau de Miré), Castanet-le-Bas, vallée du Vernoubel en amont de Mas-Blanc (Vayssières), Saint-Jean-de-la-Blaquière et au bord de la Lergue près de Saint-Fréchoux (Vitou), Ceilhes (Legendre), haute vallée de l'Orb plusieurs exemplaires obtenu en juillet 1982 de bûches d'aulne glutineux (*Alnus glutinosa*), Poujol-sur-Orb un exemplaire sur amandier, Cessenon-sur-Orb (HERVÉ, 1953 ; PRIOTON, 1966 ; SCHAEFER, 1968a ; 1974c ; 1977b ; 1978b ; 1978c ; 1979a et b ; 1981b ; LEGENDRE, 1977 ; VILLIERS, 1978 ; QUÉAU, 1985 ; LOPEZ, 1992 ; CLAVIER, 1994).

Carlencas VIII-1988 (GD) ; Colombières-sur-Orb VII-1993 une femelle pondant sur aulne glutineux (FS) ; Cébazan, hameau de Gache VIII-1987, Rabieux VII-1994 (RA) ; Saint-Privat VII-1994 (CA).

Cette espèce est régulièrement observée dans les hêtraies du Larzac, du Caroux et dans la vallée de Nize sur aulne et sur frêne. Elle atteint la zone de garrigues où ses plantes hôtes (frênes...) et sa distribution sont encore à préciser (LOPEZ, 1992).

***Hylotrupes bajulus* (Linné, 1758)**

Bois morts et ouvrés de pin et surtout de sapin. Saint-Guilhem, Castelnaud, Palavas (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Languedoc : excessivement commun dans les bois de construction, Saint-Guilhem-le-Désert, bois de Grammont aux environs de Montpellier, Argelliers, Carlencas (MARQUET, 1897 ; IABLOKOFF, 1950 ; SCHAEFER, 1952 ; 1961c ; HARANT et JARRY, 1960 ; GUERROUMI, 1997).

Gignac sur poteaux téléphoniques traités VI-1994 (JS) ; Montpellier quartier des Aubes VII-1988 (AF) ; bois des Aresquiers VI-1971 (FB).

Redoutable ravageur des bois ouvrés résineux, partout dans le département s'attaquant parfois aux poteaux téléphoniques.

***Semanotus laurasi laurasi* (Lucas, 1852)**

Montpellier sur cyprès 25-V (Mayet), École 5-IV-1902 (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Montpellier (Mayet) dans les vieux troncs de genévrier : commun, Languedoc, région de Montpellier, Hérault (MARQUET, 1897 ; MAYET, 1905 ; PLANET, 1924 ; PICARD, 1929a ; THÉRON, 1976 ; VILLIERS, 1978).

Béziers (coll. Mouret) ; Montpellier III-1967 (coll. ENSA-M.) ; Aniane aux Bernargues pris en IV-1986 et en X-1991 (JMM) ; Murviel-lès-Montpellier II-1997, nombreuses larves et un cadavre en loge dans un *Juniperus ocycedrus* Linné (JS).

Commun et largement distribué dans les juniperaies mais toujours difficile à observer.

***Ropalopus clavipes* (Fabricius, 1775)**

École Nationale d'Agriculture, pris un individu au vol près de gros chênes (V. MAYET, notes manuscrites ; H. LAVAGNE, notes manuscrites). Saint-Guilhem-le-Désert sur *Salix alba* et sur *Ulmus*, Saint-Étienne-d'Issensac, Saint-Bauzille-de-Putois sur saule, vallée de l'Hérault, Pignan (SCHAEFER, 1954c ; 1955a ; 1958a ; ROUDIL, 1993 ; COMELADE, 1998a).

Saint-Privat VII-1987 (RR) ; Palavas VII-1987 (RO) ; Saint-Martin-de-Londres et Pignan VII-1987 (AF) ; Saint-Jean-de-Buèges VI-1985 (JMM) ; Boisset VII-1993, Arboras sur pommier VI-1987 (JS) ; Saint-Maurice-Navacelles VII-1996 (CC).

Assez commun, mais souvent par exemplaire isolé.

***Ropalopus spinicornis* (Abeille, 1869)**

*Deux individus pris dans l'Hérault : un à Valflaunès près du pic Saint-Loup (ex. Combres) : un à l'École d'Agronomie sous grands chênes le 20-VI-1894 (V. MAYET, notes manuscrites) ; pic d'Hortus (Mayet) (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Les Thières au dessus de Saint-Guilhem-le-Désert pris par C. Puissegur dans un piège à carabes, Saint-Gély en mai sur *Quercus pubescens*, Notre-Dame-de-Londres, Saint-Martin-de-Londres (SCHAEFER, 1958a ; 1959b ; VILLIERS, 1978).*

Murles VII-1984 (OI) ; Viols-en-Laval VI-1995, Saint-Maurice-Navacelles VII-1996, Saint-André-de-Buèges à Mastargues V-1997 (CC).

Très commun dans les pièges aériens.

***Pyrrhidium sanguineum* (Linné, 1758)**

La Salvetat (V. MAYET, notes manuscrites) ; Montpellier chêne blanc chez les menuisiers, Cette (Mayet) (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Languedoc : dans le bois de chêne au premier printemps, paraît rare à Montpellier où l'on se chauffe avec du chêne vert écorcé, Saint-Guilhem-le-Désert (MARQUET, 1897 ; PICARD, 1929a ; IABLOKOFF, 1950).

Assas III-1988 (AF) ; Boisset VII-1993 (JS).

***Phymatodes testaceus* (Linné, 1758)**

*Valflaunès, pic Saint-Loup, en ville sort des bûches de chêne vert. Cette (Mayet) (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Languedoc : bois mort : commun avec les variétés *fennicus* F. et *praeustus* F., La Salvetat avec la variété *nigricollis* Mulsant (MARQUET, 1897 ; SCHAEFER, 1972a).*

Parfois dans les habitations, introduit avec le bois de chauffage. Nombreuses localités.

***Reitteroderus pusillus pusillus* (Fabricius, 1787)**

Saint-Guilhem sur chêne vert VII, bûches en ville (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Découvert en 1952 à Saint-Gély, Saint-Martin-de-Londres, Notre-Dame-de-Londres, La Boissière (SCHAEFER, 1957c ; VILLIERS, 1978).

Saint-Guilhem-le-Désert VII-1982, Murles VII-1985 (OI) ; Cazevieille VII-1988 (AF).

Cette espèce est généralement précoce (IV-V) et devient erratique ensuite, ce qui limite le nombre des observations. Elle fréquente les branches mortes de chênes de l'année précédente sur lesquelles elle peut parfois se trouver en petite colonie tôt en saison. Peut être plus abondante dans l'arrière pays.

Nous rappelons que SAMA (1991) a validé le genre *Reittoderus* à la place de *Phymatoderus* Reitter, 1912 pour cause d'homonymie avec le genre *Phymatoderus* Dejean, 1837.

***Reitteroderus glabratus* (Charpentier, 1825)**

Saint-Guilhem-le-Désert (IV ou V-1904) un flacon envoyé par Causse, le garde forestier, à Tisson ; 1 exemplaire pris sans doute sur genévrier. Je le mets en collection, un deuxième exemplaire du flacon reçu le 15-IV-1905 de Causse (V. MAYET, notes manuscrites) ; Béziers, Saint-Guilhem sur genévrier (Mayet) (H. LAVAGNE, notes

manuscrites). Béziers (= *Callidium castaneum* Redtenbacher, 1849), Languedoc, Hérault, Montpellier, repris à Faïssas, Saint-Guilhem-le-Désert (Schaefer) (AUBÉ, 1868 ; MAYET, 1905 ; PLANET, 1924 ; PICARD, 1929a ; PODANY, 1954-1962 ; SCHAEFER, 1961c ; VILLIERS, 1978).

Agde VII-1979 (MA) ; Saint-Martin-de-Londres VI-1985 (JS).

Espèce relativement précoce dont la fréquence des observations serait plus élevée si la technique de l'éclosoir était plus utilisée vis à vis des branchages de *Juniperus* spp. aux aiguilles rougissantes.

***Reitteroderus lividus* (Rossi, 1794)**

Sortis, avec *P. testaceus*, en 1904 de branches de chêne vert qui en 1903 avaient donné *Coroebus fasciatus* (Col. Buprestidae) (V. MAYET, notes manuscrites) ; Saint-Guilhem du chêne VIII, région du châtaignier détruit les cercles des tonneaux. École orme, La Valette chêne vert (Mayet) (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Languedoc : bois mort assez rare, Montpellier, Argelliers aux Chambertes, Hérault, Saint-Jean-de-la-Blaquière en V-1980 (MARQUET, 1897 ; PICARD, 1929a ; PODANY, 1954-1962 ; PRIOTON, 1971 ; VILLIERS, 1978 ; SCHAEFER, 1980).

Murviel-lès-Montpellier VI-1987, Juvignac VII-1993 (JS) ; Pignan VII-1987 (AF) ; Montagnac VI-1984, Aniane V-1992, Montferrier-sur-Lez IV-1995 (JMM) ; Palavas V-1984, Mireval V-1985, Aumelas IV-1997 (CC, JS) ; Saint-Guilhem-le-Désert aux Lavagnes VI-1986, Puéchabon V-1993 (FB).

Très commun partout, l'observation de V. Mayet est tout à fait pertinente.

***Phymatodellus rufipes* (Fabricius, 1776)**

Pas de citation bibliographique et une seule capture connue à Notre-Dame-de-Londres VII-1982 (OI).

Jamais commun mais largement répandu, il doit se trouver ailleurs dans l'Hérault.

***Paraphymatodes fasciatus* (Villers, 1789)**

Sortis, avec *P. lividus*, en 1904 de branches de chêne vert qui en 1903 avaient donné *Coroebus fasciatus* (Col. Buprestidae) (V. MAYET, notes manuscrites) ; Montpellier IV sarments de vigne en nombre chez Puel, Saint-Guilhem. Lattes (Mayet) (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Environs de Montpellier et de Cette commun dans les fagots de sarments, éclos en nombre de vieux sarments provenant des Matelles, Hérault (FAIRMAIRE, 1857 ; PICARD, 1929a ; SCHAEFER, 1954c ; PODANY, 1954-1962 ; VILLIERS, 1978).

Garrigues de l'Hérault et Montpellier (coll. ENSA-M.) ; Saint-Saturnin VII-1986 (JS) ; Saint-André-de-Sangonis VI-1989 (RR).

Il peut être localement abondant mais son observation n'est pas très fréquente en dépit de l'importance du vignoble régional.

***Poecilium alni alni* (Linné, 1767)**

Chêne : Nizas III, Grammont IV, Cette (Mayet) (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Saint-Guilhem-le-Désert avec la variété *infuscatus* Chevrolat (COMELADE, 1998a).

Saint-Martin-de-Londres VII-1987 (OI) ; Cazevieille V-1984 (JMM) ; Montarnaud XI-1984 (GD) ; Clermont-l'Hérault IV-1993 (RA) ; Viols-le-Fort V-1972 (FB).

Très commun et largement répandu, fréquent sur les branches de chênes tuées par les *Coroebus* sp. (Col. Buprestidae).

***Anaglyptus gibbosus* (Fabricius, 1787)**

Languedoc, Saint-Guilhem-le-Désert à Faïssas sur *Spartium junceum*, Pégairolles-de-Buèges (SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, 1937 ; SCHAEFER, 1952 ; 1958a ; 1985 ; VILLIERS, 1978 ; GUERROUMI, 1997).

Saint-Guilhem-le-Désert, Saint-Jean-de-Buèges (coll. ENSA-M.) ; Joncels VI-1990 sur *Laserpitium gallicum* Linné (AF) ; forêt de l'Escandorgue VI-1978, Saint-Martin-de-Londres VII-1984 (JMM).

Généralement peu commun mais largement répandu dans l'Hérault.

***Anaglyptus mysticus* (Linné, 1758)**

Forêt de l'Escandorgue (Vayssières) avec la variété *albofasciatus* Degeer, sur noisetier et hêtre (SCHAEFER, 1979b).

Rosis, Douch VI-1987 (RR) ; Colombières-sur-Orb VII-1993 (JS) ; Saint-Félix-de-l'Héras V-1997 (CC).

Les quelques captures régionales concernent le Nord du département où il semble confiné et peu fréquent.

***Xylotrechus (Xylotrechus) arvicola* (Olivier, 1795)**

Bois morts pieux et piquets en ville, Castelnau. Cette (Mayet) (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Poussan : obtenu de figuier, très commun dans l'Hérault, Montpellier, Saint-Guilhem-le-Désert (PICARD, 1919a ; 1929a ; PODANY, 1954-1962 ; REYMOND, 1945 ; SCHAEFER, 1968b ; GUERROUMI, 1997).

Joncels VI-1990 (AF) ; Douch sur hêtre VII-1989, Minerve VII-1993, Saint-Guilhem-le-Désert VII-1989 (JS) ; Montagnac VII-1978, Montpellier VII-1987, La Boissière VII-1987 (JMM) ; Balaruc VI-1990 (JML) ; Clermont-l'Hérault VI-1928 (JT) ; Agde VIII-1970 (MA) ; Pignan VII-1988 et VII-1989, Saint-Maurice-Navacelles VIII-1996 (CC).

Commun et largement répandu dans l'Hérault, connu de nombreuses localités.

***Xylotrechus (Xylotrechus) antilope* (Schönherr, 1817)**

Mons-la-Trivalle VII sur *Daucus*, Avène sur ombellifère, Saint-Guilhem-le-Désert (SCHAEFER, 1964d ; 1968a ; 1985 ; CLAVIER, 1994 ; COMELADE, 1998a).

Murviel-lès-Montpellier VII-1990 (JS) ; Saint-Maurice-Navacelles VIII-1996 (CC).

Plus commun dans l'arrière pays que vers le littoral.

***Xylotrechus (Xylotrechus) rusticus* (Linné, 1758)**

Minerve (V. MAYET, notes manuscrites) ; *Mérifons (Bérard), La Salvetat VI* (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Saint-Guilhem-le-Désert au Pont-du-Diable (SCHAEFER, 1961c ; COMELADE, 1998a).

Saint-Étienne-d'Issensac VII-1980 (PM) ; Pignan IX-1973 (RR) ; Saint-Jean-de-Buèges VI-1993 (JPB) ; Lunel IV-1994 (RA) ; Lattes à Maurin VII-1997 (CC).

Assez commun sur *Populus* spp.

***Plagionotus arcuatus* (Linné, 1758)**

La Salvetat (V. MAYET, notes manuscrites) ; *Montpellier sur chêne blanc, Courniou (Mayet), La Salvetat VI chêne et hêtre avec variété connatus Mors.* (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Vallée de l'Agout, forêt de l'Escandorgue sur chêne, La Vacquerie, Ganges (MAYET, 1898 ; SCHAEFER, 1979b).

Boisset VII-1993 (JS) ; Saint-Privat V-1989 (CA) ; Lauroux VI-1979 (JFY) ; Saint-Maurice-Navacelles VI et VIII-1996 (CC).

Sur les troncs et branches de chênes récemment coupés, commun par place.

***Plagionotus detritus* (Linné, 1758)**

Montpellier : Peyrou 5-VII, pris par Sicard (V. MAYET, notes manuscrites). Absent du Languedoc (SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, 1937). Le Bousquet-d'Orb en juillet, Saint-Guilhem-le-Désert (SCHAEFER, 1967b ; 1968a ; 1985 ; COMELADE, 1998a).

Montpellier (coll. ENSA-M.) ; Saint-Martin-de-Londres VII-1987 (AF).

Plus rare en région méditerranéenne que le précédent mais, capturé çà et là au piège aérien.

***Echinocerus floralis* (Pallas, 1773)**

Montpellier un exemplaire sur fleur de *Daucus* sp. École au Verdanson, pris par l'élève Rocherole en avril. Deux exemplaires au bord de l'Estagnole le 15-VIII par Sicard (V. MAYET, notes manuscrites) ; La Valette sur *Eryngium*. Verdanson (Mayet) (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Environs de Montpellier ou de Cette, Béziers et Cette sur les fleurs : rare, Hérault, Saint-Martin-de-Londres, Saint-Jean-de-Védas, Mauguio (Schaefer) (FAIRMAIRE, 1857 ; MARQUET, 1897 ; PLANET, 1924 ; PICARD, 1929a ; SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, 1937 ; PODANY, 1954-1962 ; VILLIERS, 1978).

Villeneuve-lès-Maguelone (coll. ENSA-M.) ; Saint-Martin-de-Londres VI-1985 (OI).

Ça et là, rare et très localisé.

***Chlorophorus pilosus glabromaculatus* (Goeze, 1777)**

Grammont VI sur chêne vert, Castelnau VI sur figuier, École, Saint-Guilhem, Palavas (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Languedoc : assez commun, Montpellier éclos de figuier du chêne vert et du saule et parasités par le *Pristaulacus chlapovskii* Kieffer (Hymenoptera, Evaniidae), Montpellier éclos de figuier parasité par le Braconide *Doryctes leucogaster* Nees, commun dans l'Hérault : hôte constant du figuier, Saint-Guilhem-le-Désert (MARQUET, 1897 ; LICHTENSTEIN et PICARD, 1918a ; 1919 ; PICARD, 1919a ; COMELADE, 1998a).

Saint-Maurice-Navacelles VIII-1996 (CC).

Facilement attiré par les pièges aériens, assez tardif en moyenne altitude.

***Chlorophorus varius* (Müller, 1766)**

Palavas, Fabrègues VIII, Nizas VIII garrigues, Cette (Mayet) (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Environs de Montpellier ou de Cette, Languedoc : très commun sur ombellifères, Saint-Guilhem-le-Désert, Cazevieille (JACQUELIN-DUVAL et LANEYRIE, 1852 ; FAIRMAIRE, 1857 ; MARQUET, 1897 ; IABLOKOFF, 1950 ; CLAVIER, 1994).

Commun dans tout le département, sur les fleurs.

***Chlorophorus figuratus* (Scopoli, 1763)**

Pas de donnée bibliographique.

Saint-Gervais-sur-Mare VII-1987, Pignan VI-1993 (CC) ; Minerve VII-1993 (JS).

Abondant partout.

***Chlorophorus sartor* (Müller, 1766)**

Montpellier, Saint-Guilhem-le-Désert (V. MAYET, notes manuscrites) ; Saint-Guilhem, garrigues (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Béziers sur les *Eryngium* : rare, très rare dans la plaine de l'Hérault, éclos en nombre notable de figuier provenant de Saint-Gély-du-Fesc, Hérault : rare, Saint-Guilhem-le-Désert sur diverses fleurs, Cazevieille (MARQUET, 1897 ; PICARD, 1919a ; 1929a ; PODANY, 1954-1962 ; IABLOKOFF, 1950 ; CLAVIER, 1994).

Argelliers VI-1987, Vailhauquès VII-1989, Murviel-lès-Montpellier VII-1989 (CC) ; La Livinière sur *Acer campestre* Linné (JH).

Il est bien plus fréquent que ne le signale la bibliographie.

***Chlorophorus ruficornis* (Olivier, 1790)**

Jardin des Plantes de Montpellier sur noyer noir d'Amérique (V. MAYET, notes manuscrites ; H. LAVAGNE, notes manuscrites). Jardin des Plantes de Montpellier sur noyer noir d'Amérique et sur *Quercus ilex*, Saint-Guilhem-le-Désert, Saint-Étienne-d'Issensac, Saint-Bauzille-de-Putois, Saint-Gély-du-Fesc (Comelade), massif du Caroux à l'entrée des gorges d'Héric, Le Bousquet-d'Orb, Mons-la-Trivalle, Frouzet, Notre-Dame-de-Londres, col du Cabaretou, près de Bordevieille, Cazevieille (MAYET, 1898 ; PICARD, 1929a ; SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, 1937 ; SCHAEFER, 1954c ; 1958a ; 1968a ; 1975 ; SCHAEFER et MOREAU, 1960 ; VILLIERS, 1978 ; DEVECIS, 1979 ; CLAVIER, 1994).

Argelliers VIII-1982, Murles VII-1992 (FB) ; Vailhauquès VII-1989, Saint-Guilhem-le-Désert VII-1989 (CC).

Commun mais plus localisé que les précédents.

***Chlorophorus trifasciatus* (Fabricius, 1781)**

Lamalou (V. MAYET, notes manuscrites) ; *Cette* (Mayet) (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Montpellier, Cette, Béziers assez commun, Saint-Guilhem-le-Désert dans les prairies sur diverses fleurs, massif du Caroux, Cazevieille (FAIRMAIRE, 1857 ; MARQUET, 1897 ; IABLOKOFF, 1950 ; SCHAEFER et MOREAU, 1960 ; CLAVIER, 1994 ; GUERROUMI, 1997).

Lauroux, Saint-Privat VII-1991 (CA) ; Murviel-lès-Montpellier VII-1986, Saint-Martin-de-Londres VII-1988, Montagnac VII-1978, Montarnaud VI-1977 (JMM) ; La Boissière et Aniane VII-1993 (JS) ; Saint-Gervais-sur-Mare VII-1989 (CC).

Commun partout.

***Pseudosphegistes cinereus* (Castelnau et Gory, 1836)**

Sorti en juillet de branche de chêne venant de Ribaute, près de Béziers, chez Joseph Coste, deux individus en 1878, un en 1879 (V. MAYET, notes manuscrites). Montpellier (Abeille de Perrin), un exemplaire à Béziers, Hérault, Clermont-l'Hérault, Mons-la-Trivalle (MARQUET, 1897 ; PLANET, 1924 ; PICARD, 1929a ; SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, 1937 ; PODANY, 1954-1962 ; VILLIERS, 1978 ; SCHAEFER, 1980).

Mons-la-Trivalle VII-1968 (ID) ; Saint-Maurice-Navacelles VIII-1996 (CC).

Relativement commun surtout par piégeage.

***Clytus tropicus* (Panzer, 1795)**

Saint-Martin-de-Londres VII-1986 (JFV) ; Saint-André-de-Buèges à Mastargues V-1997 (CC).

Espèce prise régulièrement dans les chênaies grâce au piégeage aérien. Probablement largement répandu en dehors du littoral.

***Clytus arietis* (Linné, 1758)**

Montpellier, École 25 IV (V. MAYET, notes manuscrites) ; *Castelnau sur les fleurs, Saint-Guilhem chêne vert. En ville, apporté par des maraîchers* (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Languedoc : assez commun, espèce banale et polyphage très commune dans l'Hérault, Jardin des Plantes de Montpellier, Pignan (MARQUET, 1897 ; PICARD, 1919a ; BERTRAND, 1960 ; ROUDIL, 1993).

Très commun dans tout le département.

***Clytus rhamni bellieri* Gautier, 1862**

Chêne vert VI, également à Grammont (V. MAYET, notes manuscrites) ; *Saint-Guilhem* (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Très rare dans la plaine de l'Hérault : élevé du figuier, rare dans l'Hérault, Saint-Guilhem-le-Désert, Saint-Jean-de-la-Blaquière en V-1980, Pignan, Cazevieille (PICARD, 1919a ; 1929a ; IABLOKOFF, 1950 ; PODANY, 1954-1962 ; SCHAEFER, 1980 ; ROUDIL, 1993 ; CLAVIER, 1994 ; COMELADE, 1998a).

Considéré comme rare au début du siècle, il est désormais commun partout.

***Mesosa curculionoides* (Linné, 1761)**

Prise le 22-VII-1898 au vol à l'École d'Agriculture par Lafont. Elle abîme les robiniers de la conciergerie (V. MAYET, notes manuscrites) ; *Saint-Guilhem, Castelnau, Grammont sur acacia et figuier, École (Mayet)* (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Montpellier : commun, bas Languedoc, Saint-Guilhem-le-Désert au Pont-du-Diable, Argeliers, Carlenças, Notre-Dame-de-Londres, Saint-Gély, Ganges (PICARD, 1919a ; 1929a ; REYMOND, 1945 ; SCHAEFER, 1961c ; 1964b ; COMELADE, 1998a).

Montpellier V-1991 (FB) ; Montpellier quartier des Aubes sur *Ficus carica* Linné V-1987 (AF) ; Murviel-lès-Montpellier sur cerisier VII-1985 (JS) ; Montferrier-sur-Lez et Saint-Guilhem-le-Désert VI-1988 (JMM) ; Lunel IV-1994 (RR) ; Saint-Jean-de-Buèges V-1995 (OS).

Apparaît relativement commun à Montpellier et semble en général plus fréquent et plus largement distribué que *A. nebulosa* (Fabricius).

***Aphelocnemia nebulosa* (Fabricius, 1781)**

La Salvetat, Saint-Jean-de-Buèges (Sicard) IX, noisetier (V. MAYET, notes manuscrites). Vallée de l'Agout, Rieumajou près de La Salvetat, très commun et considéré comme une plaie dans les sacs d'élevage, sommet du Roc-Blanc de la Séranne (MAYET, 1898 ; GALIBERT, 1932 ; SCHAEFER, 1977a).

Carnon VI-1994 (JS).

Semble rare dans le département et probablement plus répandu dans les forêts du nord et nord-ouest que dans le reste de la région.

***Parmena balteus* (Linné, 1767)**

Lodève, Béziers, Cazillac (SAMA, 1984).

Brissac, un exemplaire sous l'écorce d'un chêne vert et un autre en loge dans un amadouvier (*Fomes formentarius*) en compagnie du Tenebrionidae *Bolitophagus reticulatus* Linné XII-1992, l'Abeil à Lauroux en tamisant de l'humus au pied d'un peuplier VIII-1996 (JS) ; gorges d'Héric au battage sur lierre V-1987 (JFV).

Pas très abondant dans notre département. Il semble marquer une préférence pour les tiges de lierre dépérissant, ce qu'avait remarqué J. THÉRON (1976) mais, il peut se trouver également sur cytise, chêne, euphorbe, sapin, etc.

***Parmena solieri solieri* Mulsant, 1839**

Commune à La Gardiole sur *Euphorbia charachias*, VII-VIII. Cette (Mayet) (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Béziers, Cette pas rare sur les euphorbes, Montpellier et environs, Hérault, plages de Maguelone et des Aresquiers au pied d'*Euphorbia paralias* Linné, la Gardiole, Mireval, Sète (MARQUET, 1897 ; MAYET, 1898 ; PLANET, 1924 ; PICARD, 1929a ; SCHAEFER, 1968a ; THÉRON, 1976 ; VILLIERS, 1978).

Mireval (coll. ENSA-M.) ; Saint-Guilhem-le-Désert (Bérard coll. Théron) ; Sète XII-1992 au pied et avec des larves dans les tiges de *Camphorosma monspeliaca* (FS, JS) ; Gigean à Saint-Félix-de-Monceau où il est commun dans les tiges mortes d'euphorbe (CC).

C'est le *P. pubescens* Dalman, 1817 *sensu* VILLIERS (1978). Commun par petite colonie, sa distribution départementale reste à préciser mais il semble plus fréquent dans la zone de l'olivier. Il affectionne particulièrement les euphorbes dans lesquelles il s'élève facilement comme l'avait noté FAVARD (1967).

***Monochamus galloprovincialis galloprovincialis* (Olivier, 1795)**

Un exemplaire pris sous mes yeux par le Lieutenant Scalabre le I-VII-1895, sur un tamarix, route de Palavas à la hauteur des Cabanes de Palavas qui sont entourées de pins. Il est probable que l'insecte habite dans les autres pinèdes du département mais rare à coup sûr. L'exemplaire en question est dans ma collection. Plusieurs exemplaires capturés par nos élèves à Palavas chez un constructeur de barques m'ont convaincu que ces longicornes sortaient de pièces de bois des Landes (*Pinus maritimus*) employées par le constructeur. Le Capitaine Minsmer en a capturé un en wagon en revenant de Palavas le 10-VII-1895. L'insecte n'a plus été retrouvé (VII-1898) (V. MAYET, notes manuscrites) ; Saint-Guilhem sur pin VIII, deux ans avant d'éclore. Palavas importés (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Commun à Saint-Guilhem-le-Désert dans le pin de Salzmann et même dans les rues de Montpellier, où il est apporté avec des chargements de pins d'Alep, Argelliers, Carlenças (PICARD, 1929a ; IABLOKOFF, 1950 ; SCHAEFER, 1952 ; 1961c ; GUERROUMI, 1997).

Très commun dans toutes les zones de résineux tant en plaine (Montpellier) qu'en montagne (Saint-Étienne-de-Gourgas).

***Herophila tristis tristis* (Linné, 1767)**

Lattes : platane de la route, lièvre ; saule. Cette (Mayet) (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Cet insecte est bien le *Cerambyx tristis* de Linné ; il avait été trouvé par Gouan dans les environs de Montpellier, Béziers, Montpellier : au pied des saules, des acacias et des sureaux, Hérault, Maurin dans les débris déposés par les inondations de la Mosson en X-1953, Lattes dans des pièges à carabes posés dans la zone littorale de Montpellier, (MULSANT, 1862-1863 ; MARQUET, 1897 ; PICARD, 1919a ; 1929a ; PLANET, 1924 ; MOURGUES, 1954 ; SCHAEFER, 1954a ; 1974c ; 1985 ; VILLIERS, 1978).

Montpellier devant la Maison pour Tous du quartier des Aubes sur *Ficus carica*. Ils apparaissaient avec ponctualité le 1^{er} mai V-VI-1989-90-91 (AF) ; Murviel-lès-Montpellier IV et VII au pied des figuiers (JS) ; Agde V-1993 (MA) ; Montferrier sur le campus de La Valette au CIRAD V-1993 (AF) ; vallée de la Buèges VI-1993 (FT).

Commun en plaine et le long des cours d'eau, il semble plus fréquent sur le figuier jadis cultivé, que sur les autres plantes hôtes potentielles.

Cette espèce a été décrite par Linné sur un exemplaire de Montpellier. SAMA (1991) a réhabilité le genre *Herophila* Mulsant, 1863 aux dépens du genre *Dorcatypus* Thomson, 1867.

***Morinus asper* (Sulzer, 1776)**

La Salvetat sur hêtre et chêne, Lamalou sur peuplier (V. MAYET, notes manuscrites) ; peuplier, hêtre, figuier et chêne Bédarioux, Lamalou (Mayet) (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Vallée de l'Agout, Béziers : rare, Hérault, zone littorale de Montpellier dans des pièges à carabes, trouvé par Bonthoux à Truscas (MARQUET, 1897 ; MAYET, 1898 ; PLANET, 1924 ; MOURGUES, 1954 ; SCHAEFER, 1985).

Forêt de l'Escandorgue VI-1994 (sortie de la Société entomologique de France) ; Montpellier IX-1996 (FB) ; Saint-Mathieu-de-Trévières IX-1997 (OS).

Cette espèce n'est pas très commune dans le département.

***Lamia textor* (Linné, 1758)**

Courniou sur la route ; Lamalou sur saule ; Montpellier, bord de La Mosson ; Béziers, Beauséjour (V. MAYET, notes manuscrites). Languedoc : assez commun sur saule et peuplier, La Paillade (Mourgues) sur *Salix*, Truscas (Bonthoux), Bione près de Juvignac au pied d'un *Populus alba*, vallée de la Buèges (MARQUET, 1897 ; SCHAEFER, 1976a ; 1985).

Canet, environs du pic Saint-Loup 22-IV-1931 sur saule osier (coll. ENSA-M.) ; Minerve VII-1988 sur aulne (JS) ; Villeneuve-les-Béziers VII-1992 sur peuplier (AT) ; Saint-Privat V-1989 (CA) ; Rieussec IV-1982 (MA) ; Clermont-l'Hérault au bord de la Lergue sur saule et peuplier VI-1995 (RA) ; Saint-Jean-de-Buèges V-1996 (RE) ; Les Rives près des Sièges V-1997 (MM).

Sa répartition suit celles des rivières et points d'eau où poussent ses plantes hôtes (*Salix* spp.). Peu commun et localisé, le nombre des stations potentielles tend à se réduire du fait de l'exploitation des zones riveraines.

***Iberodorcadion (Hispanodorcadion) molitor molitor* (Fabricius, 1775)**

La Salvetat V, Saint-Guilhem V, Castelnau, Fonfroide, École commun certaines années (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Caroux : en redescendant sur Lamalou (= *lineola* Illiger), Hérault : très commun, l'Espinouse, Saint-Guilhem-le-Désert, Villeneuve-lès-Maguelone, vallée de la Buèges, massif du Caroux, col de Douch, Les Thières, Faïssas, La Vacquerie, cause du Larzac au mas du Rouquet (Deheeger), Ferrières-les-Verreries, Cazevieille (Comelade), tous les départements méditerranéens (MAYET, 1877 ; 1882 ; PLANET, 1924 ; PICARD, 1929a ; GALIBERT, 1932 ; SCHAEFER, 1952 ; 1954c ; 1956b ; 1959a ; 1971b ; 1974b ; SCHAEFER et MOREAU, 1960 ; VILLIERS, 1978 ; GUERROUMI, 1997). Talus du bord de l'étang de Vendres sous les *Camphorosma monspeliaca* L., Montpellier aux environs de la ville, Cette, Montpellier dans les endroits sablonneux et les lieux arides. Souvent au pied de *C. monspeliaca*, Béziers (MARQUET, 1881 ; 1897).

Castelnau-le-Lez IV-1904 et Montpellier 1909 et 1910 (coll. ENSA-M.) ; Notre-Dame-de-Londres V-1987, Les Rives V-1988 (AF) ; Aumelas IV-1992 (FB), V-1992 (AF) et III-1997 (CC) ; Saint-Guilhem-le-Désert aux Lavagnes V-1986 (FB) ; Lauroux VI-1984, Aniane IV-1992, Puéchabon V-1995 (JMM) ; Pégairolles-de-Buèges V-1983 (JML) ; Rosis VII-1993 (PS) ; Murviel-lès-Montpellier II-1988 ; Saint-Maurice-Navacelles IV-1995, Montarnaud, Viols-en-Laval, Saint-Martin-de-Londres III-1997 (CC) ; Clermont-l'Hérault IV-1995 (RR) ; Navacelles IV-1995 (JS).

Il fréquentait Montpellier au début du siècle mais il se raréfie dans la plaine du fait du morcellement et de la disparition de son habitat. Plus commun dans l'Est et le Nord où il existe pratiquement dans toutes les étendues herbacées comprenant suffisamment de plantes nourricières (Poacées principalement). Nous pensons que les citations de MARQUET (1881 et 1897) sont entachées d'une confusion avec des *Parmena* Latreille. Sa période d'apparition et son abondance fluctuent sensiblement d'une année à l'autre.

***Pterolophia m-grisea* (Mulsant, 1846)**

La Gardiole, Castelnau quartier de la Courtarelles sur genêts épineux VII-VIII. La Valette (Mayet) (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Décrit sur un exemplaire récolté par Foudras à Saint-Georges près de Montpellier (MULSANT, 1846 ; PLANET, 1924). Citation

originale reprise avec : Talus du bord de l'étang de Vendres, environs de Béziers, Cette, Béziers sur les genêts épineux : en juillet, Montpellier : type, garrigues de Montpellier, Saint-Guilhem-le-Désert sur *Genista scorpius* (Linné), (MULSANT, 1846, 1862-1863 ; MARQUET, 1881 ; 1897 ; PICARD, 1929a ; SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, 1937 ; IABLOKOFF, 1950 ; SCHAEFER, 1952).

Murviel-lès-Montpellier VII-1993, La Boissière VII-1993, Causse-de-la-Selle VIII-1993, Argelliers, Pignan, Aumelas, Montarnaud VII-1994 (JS) ; Montagne de la Gardiole VI-1987 (CC).

Commun en juillet et août dans les garrigues du département sur le genêt scorpiion.

Le *Pogonocerus accentifer* Fairmaire, 1856 des environs de Béziers (FAIRMAIRE, 1856) se rapporte à cette espèce (MULSANT, 1862-1863 ; VILLIERS, 1978) mais cela ne semble pas évident pour BENSE (1995).

Pogonocherus (Pogonocherus) fasciculatus (Degeer, 1775)

Saint-Guilhem-le-Désert, 12-VI sur Pinus salzmannii (V. MAYET, notes manuscrites) ; *Saint-Guilhem-le-Désert, IV-V-VI sur pin* (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Saint-Guilhem-le-Désert, Hérault, Argelliers, Carlenças, Camp-Rouch (LICHTENSTEIN et PICARD, 1918b ; PLANET, 1924 ; PICARD, 1929a ; IABLOKOFF, 1950 ; SCHAEFER, 1952 ; 1961c ; 1980 ; VILLIERS, 1978 ; ROUDIL, 1987 ; GUERROUMI, 1997).

Saint-Just VII-1991 sur pin d'Alep (JS) ; Saint-Étienne-de-Gourgas VII-1996 (DC).

Pas très commun mais sans doute largement distribué dans les résineux à plus de 500 m d'altitude.

Nous n'avons pas suivi ici la nomenclature d'ALTHOFF et DANILEVSKY (1997) qui, propose le genre *Pityphilus* Mulsant, 1863, car elle est surprenante et ne semble pas reposer sur une étude taxonomique.

Pogonocherus (Pogonocherus) decoratus (Fairmaire, 1855)

Un exemplaire reçu de Tisson est marqué Aimargues. Cette localité est à 4 km de l'Hérault (V. MAYET, notes manuscrites ; H. LAVAGNE, notes manuscrites). Plateau du Somail, Carlenças (GALIBERT, 1932 ; SCHAEFER, 1961c).

Il n'a pas été repris depuis la dernière citation de Schaefer. Il est vraisemblablement rare et plutôt confiné au Nord du département. On le retrouvera sûrement notamment sur les conifères incendiés depuis peu.

Pogonocherus (Pogonocherus) ovatus (Goeze, 1777)

Lamalou-les-Bains sur châtaigniers (V. MAYET, notes manuscrites) ; *Saint-Guilhem-le-Désert, plus rare VI sur pin. Lamalou sur châtaigniers (Mayet)* (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Rieumajou près de La Salvetat au battage sur chêne, Saint-Guilhem-le-Désert (Tisson) (GALIBERT, 1932 ; VILLIERS, 1978).

Il ne semble pas avoir été repris depuis une vingtaine d'années. Il est sans doute assez rare mais largement répandu. Davantage de perspicacité dans les battages devrait permettre de le retrouver çà et là notamment sur des vieux chênes rabougris de l'arrière pays.

Pogonocherus (Eupogonocherus) hispidulus (Piller et Mitterpacher, 1783)

Saint-Guilhem-le-Désert, un exemplaire pris avec Darboun, nouveau sentier versant nord, élytres blanches à moitié. Saint-Jean-de-Buèges, (VII) noisetier (VII) (Sicard) (V. MAYET, notes manuscrites) ; *Colombières-sur-Orb sur aulne, Saint-Jean-de-Buèges, Saint-Guilhem (Mayet)* (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Héric et gorges d'Héric (Mourgues), Barrage de Bertrand, environs de Ganges (SCHAEFER, 1954b ; 1956b ; SCHAEFER et MOREAU, 1960).

Il a été repris en VII-1993 à Gourniès et à Ferrals-les-Montagnes (JS). Bien moins fréquent que le suivant et plus septentrional.

***Pogonocherus (Eupogonocherus) hispidus* (Linné, 1758)**

Saint-Guilhem-le-Désert, La Salvetat (V. MAYET, notes manuscrites) ; *Saint-Guilhem, La Salvetat VI, Castelnau éclosion de figuier* (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Pas rare dans l'Hérault (*dentatus* Fourcroy), Saint-Guilhem-le-Désert, massif du Caroux (PICARD, 1919a ; IABLOKOFF, 1950 ; SCHAEFER et MOREAU, 1960).

Lauroux VI-1991 (CA) ; Montagnac X-1993 (JMM) ; Boisset VII-1993 battage figuier, Gourniès VIII-1993, Saint-Maurice-Navacelles VII-1993 sur aubépine (JS).

Commun et largement répandu.

***Pogonocherus (Eupogonocherus) perroudi perroudi* Mulsant, 1839**

Saint-Guilhem, éclosion 1902 (V. MAYET, notes manuscrites) ; *Fonfroide V-VI, Saint-Guilhem sur pin commun* (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Environs de Montpellier, Saint-Guilhem-le-Désert, Hérault, le Somail, Argelliers, Carlenças, (MAYET, 1898 ; LICHTENSTEIN et PICARD, 1918b ; PLANET, 1924 ; PICARD, 1929a ; GALIBERT, 1932 ; IABLOKOFF, 1950 ; SCHAEFER, 1952 ; 1961c ; GUERROUMI, 1997).

Montpellier XII-1986 (AF) ; Béziers IV-1919 (FM) ; Montarnaud III-1995 (JMM) ; Montarnaud VII-1980, Saint-Guilhem-le-Désert VI-1971, Puéchabon V-1972 et Assas III-1974 (FB) ; Saint-Étienne-de-Gourgas III et IV-1996 (DC).

Commun localement, il se trouve presque en toutes saisons.

***Pogonocherus (Eupogonocherus) caroli* Mulsant, 1863**

Saint-Guilhem-le-Désert, 7 individus le 12-VI-1879, 1 le 10-IX sur Pinus salzmannii (V. MAYET, notes manuscrites) ; *Saint-Guilhem VI sur pin* (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Saint-Guilhem-le-Désert, Argelliers, Carlenças (MAYET, 1898 ; 1900 ; PICARD, 1929a ; IABLOKOFF, 1950 ; SCHAEFER, 1952 ; 1961c et d ; 1982 ; GUERROUMI, 1997).

Argelliers V-1984 (OI) ; Saint-Guilhem-le-Désert II-1995 (CC) ; Saint-Étienne-de-Gourgas III-1996 (DC).

Moins commun que le précédent mais souvent associé.

***Deroplia troberti* (Mulsant, 1843)**

Saint-Guilhem, VII éclosion de 2 exemplaires du chêne vert (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Saint-Guilhem-le-Désert au col de Pousterle en mai en battant des branches mortes de *Quercus ilex* tuées par les *Coroebus* : pris également au bord de l'Hérault (SCHAEFER, 1954c ; 1958 a et b ; 1985 ; VILLIERS, 1978).

Pas repris depuis la dernière citation de Schaefer soit près de 40 ans ! Cette espèce apparaît, dans l'Hérault, en limite d'aire de répartition occidentale et ne se retrouve qu'au Sud de l'Espagne (BENSE, 1995).

C'est SAMA (1996) qui a rétabli ici le nom de Genre *Deroplia* Dejean, 1835 à la place de *Stenidea* Mulsant, 1842.

***Deroplia genei* (Aragona, 1830)**

Un individu pris à La Valette près de Montpellier sur une branche sèche de l'année, encore en feuille, de chêne vert le 25-V-1894 (V. MAYET, notes manuscrites) ; *La Boissière, V sur chêne blanc. La Valette chêne vert* (Mayet) (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Saint-Guilhem-le-Désert, Saint-Martin-de-Londres, Saint-Gély, les Matelles, Hérault en raréfaction progressive (SCHAEFER, 1953 ; 1954c ; 1985).

Boisset VII-1993, La Boissière V-1996 (JS) ; Clermont-l'Hérault V-1985 (RR) ; Viols-le-Fort V-1972, Cazevieille V-1994 (FB) ; Murviel-lès-Montpellier IV-1985, cause d'Aumelas à Lamouroux IV-1996 (CC).

Assez commun et largement distribué dans les chênaies. Il se prend régulièrement au battage, sur les branches tuées l'année précédente par le *Coroebus florentinus* Herbst (Col. Buprestidae).

***Anaesthetis testacea* (Fabricius, 1781)**

Montpellier, École d'Agriculture obtenu de branches de noyer en VII ; source du Lez (V. MAYET, notes manuscrites ; H. LAVAGNE, notes manuscrites). Hérault (VILLIERS, 1978).

Saint-Chinian (coll. ENSA-M.) ; Pignan VI-1987 (AF) ; Boisset VII-1993, La Boissière VIII-1993 (JS) ; Saint-Maurice-Navacelles II-VIII-1996 (CC).

Peu fréquent, il apparaît plus abondant en châtaigneraie, notamment dans les Cévennes non loin des limites départementales (Mandagout dans le Gard, VII-1987 (CC)).

***Acanthocinus griseus griseus* (Fabricius, 1792)**

Bois de La Valette près de Montpellier, Saint-Guilhem-le-Désert, Les Matelles sur pin d'Alep, Argelliers, Carlenças, Montpellier au bois de Montmaur, Clapiers dans un pin brûlé (Comelade) (VERDIER et al., 1950 ; SCHAEFER, 1952 ; 1953 ; 1961c ; 1964c ; 1974b ; GUERROUMI, 1997).

Carlenças V-1989 (JS) ; Montarnaud VII-1980 (FB) ; Montferrier-sur-Lez au campus de Baillarguet III, VI et IX-1995 (CC).

Assez commun et semble plus méridional que le suivant.

***Acanthocinus aedilis* (Linné, 1758)**

Saint-Guilhem, Fonfroide IV-V sur souche de pin (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Languedoc : assez commun dans les vieilles souches de pin, Hérault, Saint-Guilhem-le-Désert, Argelliers, Carlenças (MARQUET, 1897 ; PICARD, 1929a ; SCHAEFER, 1961c).

Pégairolles-de-Buèges V-1986 (AF) ; Laroque III-1993 (JPB) ; Saint-Étienne-de-Gourgas IV à VII-1996 (DC).

Commun et largement distribué.

***Leiopus nebulosus* (Linné, 1758)**

Lamalou dans des branches mortes de châtaignier, La Salvetat à Rieumajou, plateau du Somail abondant dans un grand nombre d'essences dont le pin : véritable plaie des élevages (MAYET, 1877 ; 1898 ; GALIBERT, 1932).

Lodève VII-1987, Murviel-lès-Montpellier VII-1985, Mérifons sur piquet d'acacia VII-1987, Cambon-et-Salvergue VII-1993 (JS) ; Pignan VI-1987 (AF) ; Le Bousquet-d'Orb VII-1982 (OI) ; Saint-Gervais-sur-Mare VII-1985 (CC).

Commun partout.

***Exocentrus adpersus* Mulsant, 1846**

Béziers VI, chêne (V. MAYET, notes manuscrites). Non cité de l'Hérault (SCHAEFER, 1959b). Saint-Guilhem-le-Désert (ROUDIL, 1987).

Le Bousquet-d'Orb VII-1982 (OI) ; Saint-Guilhem-le-Désert VIII-1986 (RR).
Sans doute peu commun mais probablement mal recherché.

***Exocentrus punctipennis* Mulsant et Guillebeau, 1856**

Lattes sur saule (Lichtenstein) (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Montpellier : rare, vit sous les écorces du saule blanc et de l'orme en Languedoc, Saint-Guilhem-le-Désert au bord de l'Hérault (MARQUET, 1897 ; LICHTENSTEIN, 1918 ; PLANET, 1924 ; PICARD, 1929a ; SCHAEFER, 1958a).

Aniane IV-1992 (JMM) ; Saint-Gély-du-Fesc VI-1986 (AF) ; Argelliers VII-1984 (OI).

Probablement plus fréquent que le précédent.

***Aegomorphus clavipes* (Schrank, 1781)**

Montpellier sur mûrier (V. Mayet, notes manuscrites) ; mûrier, cerisier et peuplier Montpellier (Mayet), Mérifons (Bérard) (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Béziers : assez rare, Hérault, l'Espinouse, Saint-Guilhem-le-Désert au Pont-du-Diable, Octon, (MARQUET, 1897 ; PLANET, 1924 ; GALIBERT, 1932 ; SCHAEFER, 1961c ; 1974a).

Commun dans tout le département sur divers feuillus, les stères de bois et les troncs morts, pris dans de très nombreuses localités.

A. clavipes a été déplacé du genre *Acanthoderes* Serville, 1835 vers le genre *Aegomorphus* Haldeman, 1847 (SAMA, 1994).

***Tetrops praeusta* (Linné, 1758)**

Sur de petites branches de saule à Lattes (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Béziers : assez commun (MARQUET, 1897).

Montpellier : La Paillade, La Boissière (coll. ENSA-M.) ; La Salvétat VII-1993, Ferrals-les-Montagnes VII-1993 (JS) ; Montarnaud V-1986 (RR).

Commun et presque partout notamment sur les fleurs d'aubépines.

***Tetrops starkii* Chevrolat, 1859**

Espèce réhabilitée récemment pour la faune de France par COCQUEMPOT (1992) et signalée par BERGER (1996) de Notre-Dame-de-Londres VI-1964 (coll. J. Milliat).

A rechercher sur frêne pour confirmation.

***Anaerea carcharias* (Linné, 1758)**

Un ex. à la lumière au jardin de l'Esplanade, La Lironde sur peuplier, La Salvétat (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Languedoc : assez commune sur peuplier, dunes de Carnon sur *Populus alba*, Montpellier à la cité Mion, Agde (Vitou) (MARQUET, 1897 ; SCHAEFER, 1962b ; 1979a ; 1981a).

Saint-Jean-de-Buèges (coll. ENSA-M.) ; Montpellier VIII-1970 (FB) ; Montpellier dans le quartier des Aubes au bord du Lez VIII-1987 (AF) ; Montferrier sur le campus du CIRAD à La Valette IX-1978 (JMM) ; Mons-la-Trivalle VII-1993 (JS) ; Lunel VII-1993 (RA).

Çà et là dans les peupleraies départementales.

***Anaerea similis* (Laicharting, 1784)**

Lamalou, saule marsault (Mayet) (H. LAVAGNE, notes manuscrites) ; *Lamalou-les-Bains* (V. MAYET, notes manuscrites). Lamalou-les-Bains sur saule marsault : rare, pic Saint-Loup, Saint-Guilhem-le-Désert, Saint-Étienne-d'Issensac, Saint-Bauzille-de-Putois, Saint-Martin-de-Londres, Pégairolles-de-Buèges, Murles, Hérépian, Carlenas vers La Braunhe, Argelliers, vallée de l'Hérault (MAYET, 1898 ; MARQUET, 1897 ; HOLLANDE, 1930 ; IABLOKOFF, 1950 ; DEMAUX, 1954 ; SCHAEFER, 1954c et d ; 1955a ; 1958a ; 1961c).

Assas, bord du Salaison sur *Salix* sp., VI-1990 (AF).

Discret mais répandu dans tous les peuplements de saules de l'Hérault.

***Saperda scalaris scalaris* (Linné, 1758)**

Languedoc : pas rare sur le peuplier et l'aune, Rieumajou près de La Salvetat rare en chasse mais abondant en élevage, Saint-Guilhem-le-Désert à Faïssas sur noyer (MARQUET, 1897 ; PICARD, 1929a ; GALIBERT, 1932 ; SCHAEFER, 1958a).

Dio au Mas-Blanc VII-1980 (JMM) ; Pignan sur cerisier VII-1986 (AF) ; Lamalou-les-Bains VII-1993 (PS).

Un peu partout et bien que susceptible d'être localement et ponctuellement abondant, il se prend généralement par exemplaire isolé.

***Saperda punctata* (Linné, 1767)**

Cette, Montpellier (Mayet) (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Montpellier : route du cimetière Saint-Lazare. Languedoc : sur l'orme pas rare, Hérault, commun à Montpellier, Saint-Guilhem-le-Désert, Pignan (LICHTENSTEIN, 1870 ; MARQUET, 1897 ; PLANET, 1924 ; PICARD, 1929a ; IABLOKOFF, 1950 ; ROUDIL, 1993 ; COMELADE, 1998a).

Nombreuses localités : Agde VII-1972 (MA) ; Murviel-lès-Montpellier VII-1987 (JS) ; Saint-Georges-d'Orques VII-1987, Assas VII-1988 (AF) ; Aniane VIII-1987 (JMM) ; Lunel VI-1995 (RA) ; Montpellier sur l'avenue d'Assas VI-1997 (CC).

Toujours aussi commun dans les repousses d'anciennes haies d'ormes jusqu'en ville.

***Saperda octopunctata* (Scopoli, 1772)**

Sur ormeau route de Castelnaud (H. LAVAGNE, notes manuscrites) ; Béziers : très rare, Hérault, Languedoc (MARQUET, 1897 ; PLANET, 1924 ; SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, 1937).

Confusion possible avec *S. punctata*. Aucune capture à notre connaissance n'a été faite depuis un siècle. A rechercher plus particulièrement sur les tilleuls et peut être sur les ormes en mélange avec l'espèce précédente.

***Compsidia populnea* (Linné, 1758)**

Lattes IV-V-VI, fait un renflement sur la branche. Villeneuve-lès-Maguelone (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Languedoc dans les peupliers : commune, se transforme dans les branches vivantes du peuplier et se prend au vol autour, dunes de Carnon sur *Populus alba*, Lattes (MARQUET, 1897 ; SCHAEFER, 1962b ; SUIRE, 1963b).

Pégairolles-de-Buèges V-1987 (AF) ; Viols-le-Fort VI-1988 (OI) ; Minerve au bord de la Cesse, Saint-Maurice-de-Navacelles VII-1993 (JS) ; Lunel IV-V-1994 (RA).

Commun et confiné aux peupliers, notamment *Populus tremula* Linné.

***Stenostola dubia* (Laicharting, 1784)**

Sorbs, vallée de La Virenque au Nord du Cros (= *S. nigripes* Fabricius, 1792) (SCHAEFER, 1967a ; 1968a).

Une seule citation. Les espèces du genre *Stenostola*, Mulsant, 1839 apparaissent ici en limite continue de distribution méridionale et occidentale. Elles sont donc probablement rares et localisées notamment dans les forêts froides du nord et nord-ouest du département.

***Oberea (Oberea) oculata* (Linné, 1758)**

Montpellier, saules de l'Octroi des Arceaux, 27-VI, et osiers de l'École (V. MAYET, notes manuscrites) ; Montpellier sur saule, La Salvetat sur saule marsault (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Languedoc : assez commun, Saint-Guilhem-le-Désert (MARQUET, 1897 ; IABLOKOFF, 1950 ; DEMAUX, 1954 ; SCHAEFER, 1958a ; COMELADE, 1998a).

Source de la Buèges V-1987 ; Assas au bord du Salaison VI-1988 (AF).

Commun au bord des cours d'eau sur diverses espèces de saules.

***Oberea (Oberea) pupillata* (Gyllenhal, 1817)**

Montpellier, un exemplaire pris au vol par l'élève Godinaud, sur une haie le long de l'aqueduc près de l'École. L'insecte était mou quand il me l'a donné, il y a des chèvrefeuilles le long de toutes nos haies. Un second exemplaire à Saint-Guilhem-le-Désert (Sicard) (V. MAYET, notes manuscrites ; H. LAVAGNE, notes manuscrites). Saint-Guilhem-le-Désert au lieu dit Les Plos, La Tour-sur-Orb, mont Caroux près de la table d'orientation (SCHAEFER, 1961c ; 1985).

Mireval VI-1987, Villeuneuve-lès-Maguelone VII-1988 (AF) ; Mons-la-Trivalle dans les gorges d'Héric VI-1980 (RR) ; Colombières-sur-Orb VI-1990 (JS).

Exclusivement sur les chèvrefeuilles (*Lonicera* spp.). Un peu partout, il peut être localement abondant.

***Oberea (Oberea) linearis* (Linné, 1761)**

Saint-Guilhem-le-Désert (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Languedoc sur les noisetiers assez commun, Saint-Gély-du-Fesc sur noyer, Saint-Guilhem-le-Désert sur aulne, noyer et noisetier, vallée de la Buèges, forêt de l'Escandorgue, (MARQUET, 1897 ; IABLOKOFF, 1950 ; SCHAEFER, 1954c ; 1956b ; 1958a ; 1981c).

Pégairolles-de-Buèges sur noisetier VI-1988 (AF) ; Boisset, La Salvetat VII-1993 (JS) ; Lauroux, forêt de l'Escandorgue VI-1994 (CC).

Assez commun au battage des noisetiers.

***Oberea (Amaurostoma) erythrocephala erythrocephala* (Schrank, 1776)**

Saint-Guilhem (Mayet), Castelnau VI sur *Euphorbia* (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Mireval au Crosse-de-Miège sur *Euphorbia cyparissia*, bord de l'étang de Vendres près du château de Beau-séjour, Béziers sur les euphorbes : rare, Hérault, Saint-Guilhem-le-Désert sur *Euphorbia characias*, Montpellier à La Paillade, Murviel-lès-Montpellier, entre Octon et le Salagou, Saint-Jean-de-la-Blaquière en mai 1980 (FAIRMAIRE, 1857 ; MARQUET, 1881 ; 1897 ; PLANET, 1924 ; IABLOKOFF, 1950 ; SCHAEFER, 1952 ; 1974a ; 1980 ; 1982 ; SUIRE, 1963a ; 1964 ; GUERROUMI, 1997).

Mireval VI-1987 sur *E. characias* Linné, Mons-la-Trivalle VII-1987 (AF) ; Cournonterral VI-1993 (JS) ; Saint-Gély-du-Fesc VII-1984, Rosis VI-1987 (OI) ; Lunel VI-1993 (RA).

Commun sur diverses euphorbes.

***Musaria rubropunctata* (Goeze, 1777)**

Montpellier : Un énorme individu pris au vol par un élève le 24-VI-1894 près de la baraque de la Paillade. La Valette 10-VI, sur genêt épineux (V. MAYET, notes manuscrites ; H. LAVAGNE, notes manuscrites). Saint-Guilhem-le-Désert, pris par Aygalin sur le sentier des crêtes, Hérault, Notre-Dame-de-Londres, Ganges sur *Phlomis lychnitis*, Argelliers (SCHAEFER, 1955b ; 1958a ; 1985 ; VILLIERS, 1978).

Probablement plus fréquent qu'il ne le paraît, mais localisé dans les massifs montagneux au-delà de 600 m d'altitude où poussent ses plantes hôtes : *Seseli montanum* Linné, *Trinium glaucum* (Linné)... toutes signalées de l'Hérault (VILAIN, 1996).

***Phytoecia cylindrica* (Linné, 1758)**

Forêt de l'Escandorgue sur *Chaerophyllum bulbosa* Linné (SCHAEFER, 1978b et 1979b).

Mons-la-Trivalle dans les gorges d'Héric VI-1986 (AF) ; Lauroux V-1991 (CA) ; Clermont-l'Hérault IV-1993 (RA).

Espèce peu fréquente et plutôt septentrionale.

***Phytoecia nigricornis* (Fabricius, 1781)**

Découvert par Deheeger dans la forêt du Crouzet (SCHAEFER, 1972a).

Une seule citation qui signifie sans doute que cette espèce est rare et localisée dans le département. Quelques investigations plus précises, notamment sur les armoises et la tanaïsie, permettront peut être de la retrouver çà et là au Nord et au Nord-Ouest de l'Hérault.

***Phytoecia icterica* (Schaller, 1783)**

Prairie à côté de la gare de Lattes pris par l'élève de Mortillet le 27-V-1879 ; commune à Saint-Guilhem-le-Désert dans la prairie du Pertus sur *Daucus carota* (20-V) (V. MAYET, notes manuscrites) ; Lattes à Maupas en VI au fauchoir (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Montpellier, Saint-Guilhem-le-Désert en fauchant, Languedoc (PICARD, 1929a ; IABLOKOFF, 1950 ; VILLIERS, 1978).

Mons-la-Trivalle VI-1981 (OI).

Rarement abondant mais un peu partout dans les prairies.

***Phytoecia pustulata* (Schrank, 1776)**

• Saint-Guilhem-le-Désert, Lamalou-les-Bains (V. MAYET, notes manuscrites). Environs de Montpellier ou de Cette, Béziers : pas rare sur les fleurs, sommet du Roc-Blanc de la Séranne (FAIRMAIRE, 1857 ; MARQUET, 1897 ; SCHAEFER, 1977a).

Rosis VII-1988, Cournonterral sur *Daucus* sp. VII-1992 (JS) ; Saint-Gervais-sur-Mare VII-1987 (CC).

Assez commun et largement répandu.

***Phytoecia virgula* (Charpentier, 1825)**

Castelnau, Béziers (Mayet) (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Béziers assez rare sur les graminées, Hérault, Argelliers sur *Centaurea calcitrapa* ; Carlencas sur *Echinops ritro*, Mons-la-Trivalle (MARQUET, 1897 ; PLANET, 1924 ; SCHAEFER, 1961c ; CARRIÈRE, 1996a).

Saint-Guilhem-le-Désert VI-1971, Saint-Martin-de-Londres V-1986, Cazevieille VI-1971, Aumelas VI-1990 (FB) ; Saint-André-de-Sangonis VI-1985 (JS) ; Aniane VI-1989 (AF) ; Murviel-lès-Montpellier VI-1987 (CC).

Assez commun et largement répandu.

***Phytoecia rufipes* (Olivier, 1795)**

Languedoc (PLANET, 1924) : dans cet ouvrage à la bibliothèque de l'ENSA-M. (Zoologie), cette citation est assortie d'une annotation anonyme : "*Mauguio* (H.) sur fenouil, 5 juin 1955", Doscare près de Montpellier en VI sur les tiges de fenouil (Schaefer), mont Saint-Martin au Cap-d'Agde de la fin juin à la mi juillet sur fenouil (MULSANT, 1862-1863 ; VILLIERS, 1978 ; SCHAEFER, 1985 ; CLAVIER, 1994).

Agde en loge dans le fenouil IX-1993 (LL).
Sans doute rare mais il n'est pas facile à observer.

***Phytoecia erythrocnema* Lucas, 1849**

Vendres sur chardons, Béziers, Montpellier (Mayet) (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Environs de Cette (Mayet), Béziers rare sur les euphorbes et en juin sur les onopordons, au bord de l'étang de Vendres, près de l'embouchure de l'Aude (Mayet) et près du château de Beau-séjour, garrigues de La Paillade (Picard), Les Matelles : sa plante hôte dans le département serait *Daucus maximus* Linné, Murles, Aniane, Argeliers, Castries (MULSANT, 1862-1863 ; MARQUET, 1881 ; 1897 ; MAYET, 1898 ; PLANET, 1924 ; PICARD, 1929a ; SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, 1937 ; SCHAEFER, 1953 ; VILLIERS, 1978).

Un vieil exemplaire de Maureilhan dans la collection de l'ENSA-M. ; Montagnac VI-1979 (JMM) ; Pégairolles-de-Buèges V-1980 (JD) ; Grabels VI-1987 (FB) ; Saint-Guilhem-le-Désert VI-1988, Saint-Martin-de-Londres VI-1989 (AF) ; Villeneuve-lès-Maguelone V-1997 (CC).

Peu commun et par exemplaire isolé, çà et là surtout en plaine.

***Opsilia coerulescens coerulescens* (Scopoli, 1763)**

La Salvetat, Béziers, Creux-de-Miège, Verdanson (Mayet) (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Environs de Montpellier ou de Cette, Languedoc sur *Echium vulgare* (FAIRMAIRE, 1857 ; MARQUET, 1897).

Un exemplaire de *O. uncinata* (Redtenbacher, 1842) trouvé dans les collections de l'ENSA-M. est en fait une forme individuelle noire de *O. coerulescens* (Scopoli).

Très nombreuses stations dans tout le département sur les vipérines.

***Opsilia molybdaena* (Dalman, 1817)**

Environs de Montpellier ou de Cette (FAIRMAIRE, 1857).

Quelques exemplaires provenant de localités héraultaises dans la collection F. Mouret (Muséum de Béziers) se sont avérés être des petits exemplaires de *O. coerulescens*.

Il n'a pas été revu depuis un siècle et demi et les citations de Fairmaire sont à confirmer. Sa présence est probable dans l'Hérault car il a été cité de Lozère : Pont-Ravagers (Mourgues) (SCHAEFER, 1962a) mais, il y est sans doute très rare et localisé. A rechercher sur les Borriginacées.

***Calamobius filum* (Rossi, 1790)**

Frontignan un exemplaire en fauchant (V. MAYET, notes manuscrites). Environs de Montpellier ou de Cette, Languedoc (Rey), Hérault, commun à Montpellier dans les lieux incultes sur *Avena elatior*, Le Petit-Bagnas, Pignan, cause de Fauzan, Castelnaule-Lez, Portiragnes, étang de Vendres, cause de Neffiès, pic de Vissous, environs de Béziers (FAIRMAIRE, 1857 ; MARQUET, 1898 ; PLANET, 1924 ; PICARD, 1929a ; SCHAEFER et ADGÉ, 1982 ; ROUDIL, 1993 ; CARRIÈRE, 1996b ; 1996d).

Nombreuses stations : Murviel-lès-Montpellier VI-1985, Saint-Georges-d'Orques V-1990 (JS) ; Saint-Paul-et-Valmalle VI-1991 (JMM) ; Villeneuve-lès-Maguelone VI-1987, Colombières-sur-Orb VII-1987 (CC) ; Rosis VI-1995 (OS).

Largement répandu et abondant dans les friches et les bordures de chemins. A été parfois cité comme causant des dégâts aux cultures de céréales (BALACHOWSKY, 1962).

***Agapanthia asphodeli* (Latreille, 1804)**

Saint-Guilhem, La Gardiole, La Paillade, Bel-air (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Environs de Montpellier ou de Cette, Béziers, Cette dans les asphodèles du littoral : pas rare, Hérault (nombreuses localités citées), Saint-Guilhem-le-Désert, commun dans tous les départements méditerranéens, Pignan, monts du Minervoï et col de la Moutoune en forêt domaniale de la Bouïsse, Portiragnes au bord de la Rivierette et de la Grande-Maïre, cause de Minerve, Fabrègues, La Chapelle-Sainte-Baudille, La Redoute-Plage (FAIRMAIRE, 1857 ; MARQUET, 1897 ; PLANET, 1924 ; PICARD, 1929a ; SCHAEFER, 1952 ; VILLIERS, 1978 ; ROUDIL, 1993 ; CARRIÈRE, 1991 ; 1993 ; 1994 ; 1995 ; 1996a ; 1996b ; 1996c ; GUERROUMI, 1997).

Arboras V-1987, pic Saint-Loup V-1986, massif de la Gardiole, commun sur les asphodèles IV-V-1985 (CC) ; Murviel-lès-Montpellier IV-1986, Aumelas V-1992, Saint-Georges-d'Orques IV-1988, Cournonterral V-1988, Saint-Guilhem-le-Désert IV-1989 (JS).

Très commun partout où poussent les asphodèles et au moment de leur floraison.

***Agapanthia kirbyi* (Gyllenhal, 1817)**

Pas-de-l'Escalette près de Lodève (V. MAYET, notes manuscrites ; H. LAVAGNE, notes manuscrites). Pas-de-l'Escalette près de Lodève, Béziers un exemplaire pris par M. Chalande, Lamalou-les-Bains (Mayet), Languedoc à moyenne altitude, Saint-Guilhem-le-Désert au vallon de l'Ermitage, gorges d'Héric sur *verbascum* sp., Saint-Martin-de-Londres (Schaefer), Les Matelles, Saint-Gély-du-Fesc, la forme ardéchoise serait différente de celle de l'Hérault, Saint-Jean-de-Fos (De Boubers), Hérault (nombreuse localités connues), Faugères au Plan-de-l'Euze (MAYET, 1898 ; MARQUET, 1897 ; PLANET, 1924 ; PICARD, 1929a ; SAINTE-CLAIRE-DEVILLE, 1937 ; IABLOKOFF, 1950 ; SCHAEFER, 1952 ; 1954c ; BALAZUC et DEMAUX, 1973 ; VILLIERS, 1978 ; CARRIÈRE, 1992 ; 1995).

Notre-Dame-de-Londres VI-1986, Pignan VI-1987 (AF) ; Saint-Jean-de-Fos VI-1989, Murviel-lès-Montpellier VII-1990 (JS) ; Aumelas VI-1990 (FB) ; Viols-le-Fort VII-1986, Murles VI-1986 (OI) ; Saint-Gervais-sur-Mare VII-1987 (CC).

***Agapanthia dahli dahli* (Richter, 1821)**

Saint-Guilhem, Bel-Air, La Gardiole avec A. asphodeli (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Languedoc sur les chardons : pas rare, Montpellier, Le Petit-Bagnas, Pignan, Hérault, mont Ramus à Saint-Thibéry, au Nord de Faugères (MARQUET, 1897 ; PICARD, 1929a ; SCHAEFER et ADGÉ, 1982 ; ROUDIL, 1993 ; CARRIÈRE, 1992 ; 1995 ; 1996b).

Commun partout.

***Agapanthia villosviridescens* (DeGeer, 1775)**

Garrigues sur chardons (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Environs de Béziers (Reiche), Il s'agit de la description d'*A. acutipennis* Mulsant qui n'est en fait qu'une simple variété de *A. villosviridescens*, forêt de l'Escandorgue où il est commun à la bergerie sur panais, ortie et *Chaerophyllum* sp., peu répandu dans l'Hérault, Les Matelles en 1953, Castanet-le-Bas, Faugères au Plan-de-l'Euze (MULSANT, 1862-1863 ; SCHAEFER, 1979b ; CARRIÈRE, 1992 ; 1995).

Pas fréquent mais un peu partout et surtout vers le nord.

***Agapanthia cardui* (Linné, 1767)**

Partout (V. MAYET, notes manuscrites) ; *varie de forme suivant les localités de plaine, garrigues ou montagne. Palavas, Saint-Guilhem, Castelnau* (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Environs de Montpellier ou de Cette, carrières des Bréginès près de Béziers sur *Onopordon illyricum*, Languedoc : assez commune sur les chardons, très commun dans le Midi de la France, Saint-Guilhem-le-Désert sur chardons, Le Petit-Bagnas en juin, Pignan, Hérault (FAIRMAIRE, 1857 ; JUMEAU, 1877 ; MARQUET, 1897 ; PICARD, 1929a ; IABLOKOFF, 1950 ; SCHAEFER et ADGÉ, 1982 ; ROUDIL, 1993 ; CARRIÈRE 1995 ; 1996b ; 1996d ; 1998).

Commun partout. Le type est de la région montpelliéraine (G. SAMA, com. pers.).

Agapanthia pannonica Kratochvil, 1985 n'a pas de validité quel que soit son niveau taxonomique. Le type de *cardui* est de la région méditerranéenne et doit logiquement se référer à la forme aux élytres arrondis à l'apex (CARRIÈRE 1998 et SAMA, com. pers.). *A. pannonica* apparaît donc synonyme de la forme typique de *cardui*. La forme aux élytres acuminés (*cardui s. str.* d'après KRATOCHVIL, 1985) doit porter un autre nom qui est à rechercher, en premier lieu, parmi les plus anciens synonymes actuels d'*A. cardui*.

***Agapanthia violacea* (Fabricius, 1775)**

Saint-Guilhem-le-Désert, La Boissière sur chardons (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Salvergues, le Soulié dans les endroits frais, Saint-Guilhem-le-Désert, Hérault, l'Espinouse (GALIBERT, 1932 ; IABLOKOFF, 1950 ; SCHAEFER, 1952 ; 1978a ; DAJOZ, 1978 ; CARRIÈRE, 1995 ; 1996d ; GUERROUMI, 1997).

Saint-Jean-de-Fos V-1979 (RR) ; Rosis VII-1995 (OS).

Pas si commun que cela mais largement distribué.

A. intermedia Ganglbauer, 1883 a été élevé au rang d'espèce (FRIESER, 1976). Il est signalé de l'Hérault suite à l'étude de matériel confié à R. Frieser (SCHAEFER, 1978a). Ce taxon est désormais considéré comme une simple variété de *violacea* (BENSE, 1995) et une étude montre que c'est la variété *intermedia* qui se rencontre à Saint-Guilhem-le-Désert (DAJOZ, 1978).

LISTE DES ESPÈCES POTENTIELLES
À RECHERCHER DANS L'HÉRAULT

***Rhamnusium bicolor bicolor* (Schrank, 1781)**

Cité des départements alentours : Aude (GAVOY, 1905), Tarn (GALIBERT, 1932), considéré comme banal à Ispagnac en mai sur les rives du Tarn (VERDIER et al., 1949). Aveyron (LAGARRIGUE et LAGARRIGUE, 1947) et Gard (THÉRON, 1976). A rechercher dans le département dès le mois de mai et en juin dans les arbres creux ou avec une plaie cicatrisée.

***Stenocorus meridianus* (Linné, 1758)**

Espèce septentrionale dont la présence dans notre département étendrait notablement sa répartition géographique en France. Connue d'Espagne et plus récemment d'Ariège (HOLLIGER et BRUSTEL, 1997), on peut espérer la rencontrer un jour dans les limites qui nous intéressent en dehors de la zone de l'olivier.

***Gnathacmaeops pratensis* (Laicharting, 1783)**

Il est connu de l'Aude et de l'Aigoual (Gard) (SCHAEFER, 1958c). Il doit être possible de le rencontrer dans les zones montagneuses de l'Hérault.

***Cortodera humeralis* (Schaller, 1783)**

Plus occidental que le signale VILLIERS (1978). L'Hérault se situe dans un espace compris entre la limite d'aire Sud-Ouest et un foyer isolé des Pyrénées-Orientales. Nous voulons croire ici que cet espace n'est pas aussi dépeuplé.

***Cortodera femorata* (Fabricius, 1787)**

Il faut être optimiste pour croire en sa présence dans notre département car, en dehors de son aire de répartition classique, il n'est connu que de l'Ardèche (VILLIERS, 1978 ; BALAZUC, 1984).

***Brachyleptura maculicornis maculicornis* (Degeer, 1775)**

Au vu de sa répartition générale et de sa présence dans les Cévennes et les Pyrénées (VILLIERS, 1978), il est probable qu'il appartient à la faune héraultaise et qu'il pourrait se trouver dans nos hauts cantons.

***Pachytodes erraticus* (Dalman, 1817)**

A rechercher car souvent localisé et négligé par amalgame avec le banal *P. cerambyciformis*.

***Necydalis major* (Linné, 1758)**

Cette espèce a été citée du département : Béziers, assez rare (MARQUET, 1897) donnée reprise par VILLIERS (1978) ; *Montpellier, jardin du Peyrou* (V. MAYET, notes manuscrites) ; *dans l'orneau Montpellier au Peyrou* (Mayet) (H. LAVAGNE, notes manuscrites). Nous pensons qu'il s'agit probablement de confusions avec *N. ulmi*. Nous avons vu également un exemplaire de *N. ulmi* provenant de Saint-Martin-de-Londres, déterminé par L. Schaefer comme étant un *N. major*.

N. major est plutôt montagnard en région méditerranéenne, sa présence qui doit être confirmée, est probable dans nos hauts cantons et un piégeage judicieux devrait la révéler.

***Tetropium gabrieli* Weise, 1905**

Présent dans le Massif Central (SCHAEFER, 1958c ; VILLIERS, 1978), sa découverte dans notre département ne constituerait pas une grande surprise. Il sera néanmoins difficile à trouver.

***Tetropium fuscum* (Fabricius, 1787)**

Connu du Massif Central puis de l'Ariège (HOLLIGER et BRUSTEL, 1997), il fait parfois l'objet d'introductions involontaires et pourrait se trouver un jour ou l'autre dans les limites qui nous intéressent.

***Molorchus minor* (Linné, 1758)**

A rechercher au printemps dans les forêts de conifères de l'arrière pays.

***Stenopterus ater* (Linné, 1758)**

Sporadique à l'Ouest du Rhône, il semble manquer dans l'Hérault (PICARD, 1929a ; VILLIERS, 1978) mais, se trouve jusqu'en Espagne et au Portugal. Actuellement inconnu dans le Gard (THÉRON, 1976) et dans l'Hérault, sa présence y est néanmoins probable ou du moins possible. Il est sans doute rare mais un peu plus d'attention faciliterait sa

découverte notamment dans l'Ouest du département car il existe à Treilles non loin de Carcassonne (Aude) VII-1985 (JS).

***Obrium cantharinum* (Linné, 1767)**

Notre région constitue la limite Sud-Ouest de son extension (BENSE, 1995). Il est toutefois connu du Gard (THÉRON, 1976) et de l'Ariège (HOLLIGER et BRUSTEL, 1997). La probabilité de découverte dans l'Hérault est donc bien réelle.

***Ropalopus femoratus* (Linné, 1758)**

SCHAEFER (1952) l'avait annoncé des Thières aux environs de Saint-Guilhem-le-Désert avant de corriger son diagnostic en *R. spinicornis* Abeille et de préciser que *R. femoratus* manque aux environs de Montpellier (SCHAEFER, 1958a). Il a été très récemment cité à nouveau des crêtes et plateaux des environs de Saint-Guilhem-le-Désert (GUERROUMI, 1997).

Nous pensons que Saint-Guilhem-le-Désert ne constitue pas une zone favorable à cette espèce puisqu'elle a été parcourue depuis fort longtemps par de nombreux et éminents entomologistes qui n'y ont toujours vu que le *R. spinicornis* (Abeille). La référence de Guerroumi nous apparaît suspecte et mériterait d'être expertisée mais, Saint-Guilhem nous a déjà réservé tant de surprises que tout est possible.

La probabilité de rencontrer cette espèce nous paraît plus logique dans les hauts cantons.

***Callidium violaceum* (Linné, 1758)**

Connu du Massif Central (VILLIERS, 1978 ; BENSE, 1995), sa découverte dans l'Hérault constituerait une extension de son aire actuelle mais, par optimisme nous n'excluons pas sa présence dans nos forêts d'altitude.

***Callidostola aenea* (Degeer, 1775)**

Il n'était connu au plus près et plus à l'ouest, de Notre-Dame-des-Neiges en Ardèche (VILLIERS, 1978 ; BALAZUC, 1984). Deux exemplaires ont été pris dans le Gard à Camprieu et à L'Espérou au col de la Cereirède en 1990 (ROUDIL, 1990). Ces observations nous confortent dans notre hypothèse quant à la présence de l'espèce dans l'Hérault. Il doit être possible de le rencontrer dans les peuplements de conifères des secteurs de la Salvetat-sur-Agout et de Cambon-et-Salvergues.

***Parmena meregallii* Sama, 1984**

Cette forme récemment décrite comme sous espèce de *balteus* (Linné) (SAMA, 1984), a été élevée récemment au rang d'espèce (SAMA, 1992). Elle est facilement différenciable de *P. balteus* et d'*unifasciata* (Rossi). Sa répartition actuelle comprend la Catalogne espagnole ainsi que les Pyrénées-Orientales et l'Aude (SAMA, 1984 ; 1985). Nous pensons que cette distribution, qui est à compléter au vu de sa récente description, peut atteindre l'Ouest de notre département. Comme pour *P. unifasciata*, la collecte de matériel complémentaire et une étude approfondie des *P. balteus* héraultais permettrait de vérifier nos hypothèses.

La présence de *Parmena unifasciata* (Rossi) dans l'Hérault est évoquée dans nos conclusions car nous jugeons nos connaissances insuffisantes pour présenter ce taxon dans cette liste.

***Monochamus sutor* (Linné, 1758)**

Cette espèce est bien connue des Pyrénées, des Alpes et du Massif Central jusqu'au mont Aigoual (SCHAEFER, 1958c ; VILLIERS, 1978). Nous présentons la présence de cette espèce dans les monts d'Orb et de l'Espinouse voire sur les contreforts du Larzac. Elle a été signalée de la forêt de la Tenelle (SCHAEFER, 1957a ; PRIOTON, 1966) mais ces citations sont entachées du même doute que nous avons émettons pour *M. sutor* dans nos conclusions.

***Iberodorcadion (Iberodorcadion) fuliginator* (Linné, 1758)**

D'après la carte publiée par VILLIERS (1978), *I. fuliginator monticola* Mulsant se trouve non loin des limites de notre département, sans jamais y avoir été trouvé. Des points d'interrogation laissent un doute que n'a pas levé L. Schaefer malgré ses nombreuses recherches. Le *I. fuliginator meridionale* Mulsant a été cité de l'Hérault (Clermont-l'Hérault et Cette) (MARQUET, 1897 ; PLANET, 1924) mais ces citations sont erronées d'après VILLIERS (1978, note infrapaginale) qui par ailleurs cite une référence de C. Marquet datée de 1899 que l'on ne retrouve pas dans sa bibliographie! Une variété à pieds rouges et élytres noirs rayés blanc d'un *Dorcadion fuliginator* est citée de l'Aigoual (Gard) par H. Lavagne dans ses notes manuscrites.

Nous pensons qu'il peut se rencontrer vers les monts d'Orb et de l'Espinouse voire sur le Larzac sous une forme sans doute ambiguë car ces secteurs correspondent à une zone de confluence plus ou moins possible de cinq sous espèces : *meridionale*, *monticola*, *striola* Mulsant, *obesum* Mulsant et la forme typique.

Un *Dorcadion lineatum* Fabricius a été cité des environs de Béziers d'après Ecoffet (MULSANT, 1862-1863). Nous ne savons à quelle espèce rattacher cette citation car nous ne connaissons qu'un *D. (Pedestredorcadion) scopolii* morphe *lineatum* F. qui, habitant la Hongrie, la Slovaquie ect., ne peut se trouver dans le Languedoc.

***Nymphona picticornis* Mulsant, 1839**

Pas trouvé dans l'Hérault (PICARD, 1919a) ; cité du Gard par THÉRON (1976), "*de la Camargue au bois des Rièges en juin sur lentisque*" (H. LAVAGNE, notes manuscrites) et de la Lozère : Gabriac, Pont-Ravagers (MOURGUES, 1959 ; SCHAEFER, 1959a). VILLIERS (1978) ne le mentionne pas de l'Hérault mais VIVES (1984), SAMA (1988) et BENSE (1995) le signalent sur tout le littoral méditerranéen français. Il serait surprenant qu'il soit absent de l'Hérault où sa fréquence est vraisemblablement plus faible qu'ailleurs.

***Exocentrus lusitanus* (Linné, 1767)**

E. lusitanus est inféodé au tilleul. Il faudrait concentrer les recherches sur les peuplements de cet arbre, peu fréquent dans notre département, afin de permettre sa découverte tout à fait probable.

***Saperda perforata* (Pallas, 1773)**

A été cité de l'Hérault avec réserves par VILLIERS (1978) et nous ne l'avons pas de ce fait retenu dans notre inventaire actuel. Sa présence n'est pas évidente mais, quelques captures récentes signalées çà et là en France semblent traduire une extension occidentale, ce qui nous laisse quelques espoirs.

***Menesia bipunctata* (Zoubkoff, 1829)**

Sporadique et relativement rare en France, *M. bipunctata* pourrait se trouver dans les zones humides où pousse la Bourdaine (*Frangula alnus* Miller) signalée de l'Hérault (VILAIN, 1996).

***Stenostola ferrea* (Schrank, 1776)**

Les deux espèces françaises du genre sont difficiles à différencier et, de plus, elles sont relativement rares ou discrètes. Nous estimons que *S. ferrea* comme *S. dubia* (Scopoli), dont on ne connaît qu'une citation, pourrait se trouver dans les forêts du Nord du département notamment dans les monts de l'Espinouse et d'Orb.

***Phytoecia vulneris* Aurivillius, 1923**

Cité du Gard, Nîmes (Gaubil) (VILLIERS, 1978), à rechercher dans le département.

La découverte de la biologie de cette espèce (PAULIAN *et al.*, 1988) devrait faciliter sa recherche et permettrait d'accroître sensiblement nos connaissances sur sa distribution géographique. Elle semble cantonnée à la Provence mais, il conviendrait de surveiller les zones de croissance de sa plante hôte (*Plantago serpentina* Allioni) présent dans l'Hérault (VILAIN, 1996) et dont nous avons repéré un peuplement du coté des Rives.

CONCLUSION

Nous avons estimé la faune potentielle du département de l'Hérault à 185 espèces. Cette estimation tient compte de la distribution générale des espèces concernées et des nouveautés biogéographiques et taxonomiques. Nous avons recensé la présence de 160 espèces (certaines ont peut-être disparu depuis leur dernière observation). Parmi ces espèces, *H. tristis tristis* (Linné), *C. fontenayi* (Mulsant), *P. m-grisea* (Mulsant) et *A. cardui* (Linné) ont été décrites sur des exemplaires en provenance de Montpellier ou de ses environs immédiats.

Un rapide décompte permet de constater que 25 espèces potentielles n'ont pas été répertoriées à ce jour. Nous donnons également la liste commentée de ces Cerambycidae dont nous pressentons la présence dans l'Hérault. Il est évident que celle-ci n'est pas exhaustive et qu'elle est volontairement limitée aux espèces dont la répartition géographique actuellement connue permet de soupçonner leur présence dans l'Hérault.

D'autres espèces pourront peut être compléter ces listes par suite d'introduction ou d'extension biogéographique telles que *Oxymirus cursor* (Linné) et *Anisorus quercus* (Götz).

Quelques taxons supplémentaires justifient à nos yeux et à divers titres, nos remarques et certains commentaires. Le *Parmena unifasciata* (Rossi), considéré comme sous espèce de *P. balteus* (Linné) par VILLIERS (1978), est jugé comme bonne espèce par SAMA (1984). Il est cité des Alpes-Maritimes aux Pyrénées-Orientales (SAMA, 1984, 1985 ; BENSE, 1995). Les deux taxons sont difficiles à dissocier et le manque de matériel départemental ne nous permet pas de nous prononcer actuellement sur la présence du *P. unifasciata* dans l'Hérault.

Lepturobosca virens (Linné) a également été donné très commun sur la vipérine dans le Languedoc (MARQUET, 1897). Il s'agit d'une grossière erreur ou d'une coquille d'impression.

P. Leblanc nous a signalé l'existence d'un exemplaire de *Pidonia lurida* (Fabricius, 1792) (variété *suturalis* Olivier) provenant de Saint-Guilhem-le-Désert dans l'ex collection Darge. Cette localisation nous apparaît suspecte et nous considérons qu'il s'agit probablement d'une ancienne erreur d'étiquetage.

Agapanthia cynarae cynarae (Germar) a été cité de l'Hérault et des Cévennes sur aconit (*Aconitum napellus* Linné) (PLANET, 1924) et de quelques autres départements français (VILLIERS, 1978) ; il n'a jamais été revu depuis. Cette espèce se rencontre en Europe centrale et méridionale, ex. U.R.S.S., Caucase, Transcaucasie et Algérie mais, VILLIERS (1946) ne le citait pas de l'Afrique-du-Nord. On le trouve également au sud de la Crimée (PANIN et SAVULESCU, 1961), ex Tchécoslovaquie, France méridionale, Caucase, Syrie, Asie mineure, Balcons, Anatolie, Iran et Italie du Nord, orientale et méridionale (Vénetie, Julienne, Pouilles, Calabre) (SAMA, 1988) et de Lombardie et du Piémont (PORTA, 1934). Il nous semble, en accord avec notre collègue P. Berger et la publication de J. CARRIÈRE (1996b), que cette espèce soit à rayer de la faune départementale et même nationale. VILLIERS (1978) était d'ailleurs très évasif dans ces citations et un exemplaire de Villeneuve-lès-Maguelone de la collection de l'ENSA-M. est en fait un *A. asphodeli* (Latreille).

La redécouverte du *Leioderes kollari* Redtenbacher (BERGER, 1981) nous montre qu'il faut être prudent quant à la présence, absence ou disparition des espèces. Nous ne pensons pas que le *L. kollari* se trouvera un jour dans l'Hérault mais nous n'oserons pas l'affirmer.

L'extension du *Phoracantha semipunctata* (Fabricius) a permis sa récente découverte sur le littoral méditerranéen (BERGER, 1992 ; COCQUEMPOT, 1993). Les eucalyptus sont assez rares dans notre département et l'apparition de ce ravageur apparaît peu probable mais ne peut être totalement exclue en regard de sa distribution actuelle, de l'extention de la culture de l'eucalyptus et des évidentes aptitudes colonisatrices de l'espèce.

Neoclytus acuminatus (Fabricius) a été cité à plusieurs reprises de France dans le Var à Cogolin en 1976 (B. Lacroix) et 1977 (B. Fayolle) (VILLIERS, 1979 ; SERMET, *in litteris*), dans le Tarn (importation d'Italie?) (BIJAOU, 1980 et (fortuitement?) dans la Vienne à Rouillé (CANTOT, 1990). Il est actuellement en régression et il ne semble ne pas s'être développé et maintenu en France. Il ne devrait donc pas concerner l'Hérault dans un avenir proche.

Pachyta quadrimaculata (Linné), *Lepturobosca virens* et *Monochamus sartor* (Fabricius) auraient été trouvés dans la forêt de la Tenelle (Aveyron) à la limite de notre département par un certain M. Bouyer en 1950 (SCHAEFER, 1957a et c ; PRIOTON, 1966). Ils ne semblent pas avoir été repris depuis ni par Schaefer lui-même, qui est retourné sur les lieux, ni dans l'ensemble du Massif Central. Nous sommes persuadés que ces espèces ne concernent pas la faune régionale et qu'il s'agit d'une méprise sur la localité de capture ou d'une mystification.

Un groupe d'espèces jadis associé aux longicornes se singularise par son absence dans l'Hérault et le Gard alors qu'il est présent sur l'ensemble du pourtour de la Méditerranée occidentale. Le genre *Vesperus* Latreille, 1829 est désormais séparé des Cerambycidae et s'intègre dans la nouvelle famille des Vesperidae (SVACHA et DANILEVSKY, 1987). Trois espèces sont connues de France dont deux fréquentent des départements proches de l'Hérault. Elles n'y ont jamais été trouvées si l'on excepte la citation du Languedoc pour *V. strepens strepens* (Fabricius) (MARQUET, 1897) qui nous apparaît plus que douteuse. Nous ne pensons pas qu'elles fassent partie du patrimoine entomologique de notre région mais nous rappelons ici que *V. luridus* (Rossi) est présent en Crau du côté de Saint-Martin-de-Crau (F.13) soit 55 kilomètres à l'Est de l'Hérault et que *V. xatarti* Dufour est présent dans les Pyrénées-Orientales et l'Aude faisant ainsi de l'Hérault et du Gard les deux seuls départements du littoral méditerranéen à ne pas posséder de représentant de cette famille.

Remerciements.

Nous remercions tout particulièrement les collègues qui nous ont aidé lors de nos recherches : Mme M. Lapeyre, Béziers (34) et MM. R. Allemand, Lyon (69) ; M. Bataillon, Castelnau (34) ; P. Berger, Meylan (38) ; J. Carrière, Béziers (34) ; J. Dalmon, Grenoble (38) ; J. Forel, Tours (37) ; R. Jeantet, Nîmes (30) ; P. Leblanc, Troyes (10) ; F. Leclant, Montpellier (34) ; L. Leseigneur, Meylan (38) ; G. Sama, Cesena (Italie) ; A. Sermet, Yverdon (Suisse).

Nous remercions également les personnes qui nous ont communiqué la liste de leurs captures. Elles sont désignées dans le texte par leurs initiales que nous donnons ci après.

H.-P. Aberlenc (HPA), M. Adgé (MA), J.-P. Bataille (JPB), P. Bruneau de Miré (BDM), F. Burle (FB), J. Carrière (JC), C. Castan (CA), C. Clavier (CL), C. Cocquempot (CC), D. Coutinot (DC), J. Dalmon (JD), G. Delvare (GD), I. Dufis (ID), A. Foucart (AF), J. Hamon (JH), M. Huet (MH), O. Icard (OI), H. Labrique (HL), L. Leseigneur (LL), J.-M. Lucien (JML), P. Macaire (PM), J.-M. Maldès (JMM), M. Martinez (MM), J. Moratti (JM), D. Morin (DM), F. Mouret (FM), R. Ramos (RA), R. Renard (RE), R. Roudil (RR), R. Roussel (RO), O. Simonot (OS), F. Soldati (FS), L. Soldati (LS), P. Stephanie (PS), J. Sudre (JS), F. Tessier (FT), J. Théron (JT), A. Tichet (AT), J.-F. Vayssière (JFV).

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- ATLHOFF J. et DANILEVSKY M.L., 1997 - *A check-list of longicorn beetles (Coleoptera, Cerambycoidea) of Europe*. Slovensko entomolosko drustvo Stefana Michielija, Ljubljana : 64 pp.
- AUBÉ C., 1868. - Communication. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 8 (2), 4ème série, *Bull. ent.* : XLIX.
- BALACHOWSKY A.S., 1962. - *Entomologie appliquée à l'agriculture*, T. I (1) Coléoptères. Masson et Cie. Ed., Paris : 564 pp.
- BALAZUC J., 1984. - *Coléoptères de l'Ardèche*. Supplément du Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon, 53 : 1-334.
- BALAZUC J. et DEMAUX J., 1973. - Captures intéressantes de Coléoptères dans le département de l'Ardèche. *L'Entomologiste*, 29 (3) : 105-111.
- BENSE U., 1995. - *Longhorn Beetles : Illustrated key to the Cerambycidae and Vesperidae of Europe*. Margraf, Weikersheim : 512 pp.
- BERGER P., 1981. - Sur la présence en France de *Leioderus kollari* (Col. Cerambycidae). *L'Entomologiste*, 37 (6) : 228-233.
- BERGER P., 1992. - Présence de *Phoracantha semipunctata* (F.) dans le sud de la France : une menace pour les eucalyptus (Coleoptera, Cerambycidae). *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 61 (10) : 301-304.
- BERGER P., 1996. - *Tetrops starkii* Chevrolat, espèce nouvelle pour la faune de France (Coleoptera, Cerambycidae). *L'Entomologiste*, 52 (2) : 83-87.
- BERLAND L., 1939. - François Picard (1879-1939). *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 58 : 173-181.
- BERTRAND O., 1960. - Contribution à l'étude de la faune du Jardin des Plantes, sixième note. *Ann. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 100 (2) : 113-117.
- BIJAOUI R., 1980. - Notes de chasses et observations diverses : *Neoclytus acuminatus* (Col. Cerambycidae) dans le Tarn. *L'Entomologiste*, 36 (6) : 268.
- BRUNEAU de MIRÉ P., 1990. - A propos du *Purpuricenens globullicollis* Mulsant, 1839. *L'Entomologiste*, 46 (1) : 1-6.
- BUYSSON H. du, 1925. - Mon souvenir à ceux qui ont le plus entretenu en moi la vie entomologique (suite). *Misc. ent.*, 29 (2-3) : 20-27.
- BUYSSON H. du, 1926. - Mon souvenir à ceux qui ont le plus entretenu en moi la vie entomologique (suite). *Misc. ent.*, 29 (5) : 41-46.
- CANTOT P., 1990. - Un longicorne nouveau pour la faune de France : *Neoclytus acuminatus* F. (Col. Cerambycidae). *L'Entomologiste*, 46 (5) : 205-208.
- CARRIÈRE J., 1990. - D'un "aberrant chromatique" de *Purpuricenens* aux incertitudes de la détermination (Coleoptera, Cerambycidae) (faune de France). *Bull. Soc. Sci. Nat.*, N°69 : 22-24.
- CARRIÈRE J., 1991. - *Agapanthia asphodeli* (Latreille, 1804) en région littorale languedocienne: quelques notes étho-écologiques. *Bull. Soc. Sci. Nat.*, N°71 : 21-27.
- CARRIÈRE J., 1992. - *Agapanthia kirbyi* (Gyllenhal, 1817) en région héraultaise: quelques notes étho-écologiques (Coleoptera, Cerambycidae). *Bull. Soc. Sci. Nat.*, N°75-76 : 62-67.
- CARRIÈRE J., 1993. - *Agapanthia asphodeli* (Latreille, 1804): essai de répartition bio-géographique et altitudinale pour le département de l'Hérault, particularités éthologiques (Coleoptera, Cerambycidae). *Bull. Soc. Sci. Nat.*, N°78 : 29-36.
- CARRIÈRE J., 1994. - D'*Agapanthia asphodeli* (Latreille, 1804) à *Xylocopa iris* (Christ, 1791) un bel exemple de coévolution sur même support végétal. *Lambillonea*, 94 : 400-409.
- CARRIÈRE J., 1995. - *Gentiana lutea* L., plante-hôte attractive pour *Agapanthia villosiviridescens* (Degeer, 1775). (Coleoptera, Cerambycidae). *Lambillonea*, 95 : 91-100.

- CARRIÈRE J., 1996 a. - Approche étho biologique de *Phytoecia virgula* (Charpentier) sur *Echinops ritro* en région héraultaise (Coleoptera, Cerambycidae). *Lambillonea*, 96 : 63-68.
- CARRIÈRE J., 1996 b. - Oviposition et stade post-embryonnaire d'Agapanthiini : A propos d'*Agapanthia asphodeli* (Latreille, 1804) et d'*Agapanthia dahli* (Richter, 1821) en région héraultaise - généralités, aspect iconographique (Coleoptera, Cerambycidae). *Lambillonea*, 96 : 109-121.
- CARRIÈRE J., 1996 c. - A propos d'Agapanthiini : note biologique complémentaire (Coleoptera, Cerambycidae). *Lambillonea*, 96 : 561-567.
- CARRIÈRE J., 1996 d. - Note d'éthologie comparée : A propos de *Callamobius filum* (Rossi, 1790) (Coleoptera, Cerambycidae). *Lambillonea*, 96 : 623-630.
- CARRIÈRE J., 1998. - L'imbroglia taxonomique des formes héraultaises d'*Agapanthia cardui* (Linné, 1767) (Coleoptera, Cerambycidae). *Lambillonea*, 98 : 38-45.
- CLAVIER H., 1983. - Entomologie, séance du 5 novembre 1983. *Ann. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 123 (3) : 56.
- CLAVIER H., 1994. - Sur quelques Cérambycides et un Buprestide de l'Hérault (Col.). *L'Entomologiste*, 50 (6) : 347-349.
- COCQUEMPOT C., 1992. - Réhabilitation de la présence de *Tetrops starki* Chevrolat en France (Col. Cerambycidae). *L'Entomologiste*, 48 (4) : 201-202.
- COCQUEMPOT C., 1993. - Notes de chasses et Observations diverses : Nouvelle extension pour *Phoracantha semipunctata* (F.) (Col. Cerambycidae). *L'Entomologiste*, 49 (1) : 37.
- COMELADE J., 1998 a. - Saint-Guilhem-le-Désert (Hérault) localité remarquable, suite (Coleoptera). *Rev. As. rous. Ent.*, 7 (1) : 1-2.
- COMELADE J., 1998 b. - Deux nouvelles espèces pour le Languedoc-Rousillon (Coleoptera-Cerambycidae). *Rev. As. rous. Ent.*, 7 (1) : 11.
- DAJOZ R., 1978. - La variabilité géographique de *Agapanthia violacea* (Col. Cerambycidae). *L'Entomologiste*, 34 (3) : 127-133.
- DARNAUD J., 1978. - Catalogue des Cerambycidae du Piémont pyrénéen. *L'Ent. toulousain*, 1978 : 1-41.
- DEMAUX J., 1954. - Sur l'éthologie de *Saperda (Amillia) similis* Laich. 1784 (Col. Cerambycidae) et sur la faune de *Salix alba* L. et de *Pinus laricio* Poir. ssp. *cebennensis* rehd ; à Saint-Guilhem-le-Désert (Hérault). *Bull. Mayenne Science* : 60-69.
- DES GOZIS M., 1875. - *Catalogue des Coléoptères de France* - Imprimerie Crépin-Leblond, Montluçon : 108 pp. (notes manuscrites de V. Mayet, Cerambycidae : 80-84).
- DEVÉCIS J., 1979. - *Brachyleptura stragulata* dans l'Hérault (Col. Cerambycidae). *L'Entomologiste*, 35 (2) : 89-90.
- FAIRMAIRE L., 1856. - *Miscellanea entomologica*, première partie. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 4 (3ème série) : 517-548.
- FAIRMAIRE L., 1857. - Rapport sur la session extraordinaire tenue à Montpellier au mois de juin 1857. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 5 (3ème série) : 619-647.
- FAVARD P., 1962. - *Contribution à l'étude de la Faune Entomologique du Chêne Vert en Provence*. Thèse de Doctorat, Faculté des Sciences de l'Université d'Aix-Marseille : 138 pp.
- FAVARD P., 1967. - Sur l'élevage de *Parmena pubescens* Dalm. var. *solieri* Muls. *L'Entomologiste*, 23 (2) : 42-45.
- FOREL J., 1993-1995. - Essai bibliographique et analytique de l'oeuvre de Léon Schaefer (1900-1989) (8 parties). *Bull. Ent. tourangelle*, 14 (1) : 1-6 ; (2) : 11-17 ; (3) : 24-33 ; 15 (1-4) : 40-43 ; 16 (1) : 7-18 ; (2) : 23-39 ; (3) 41-66 ; (4) : 75-96.
- FOUCART A. et MALDÈS J.-M., 1993. - Liste des publications et notes scientifiques de Léon Schaefer (1900-1989). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 98 (2) : 149-160.

- FRIESER R., 1976. - Cerambycidenstudien (Cöl. Cerambycidae). - *Nachrichtenbl. Bayer. Ent.*, 25 : 43-44.
- GALIBERT H., 1932. - Dix-huit années de chasse aux Coléoptères dans le bassin de l'Agout (Tarn), catalogue des espèces recueillies pendant cette période - *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse*, 67 (1) : 27-477.
- GAVOY L., 1905. - Catalogue des insectes Coléoptères trouvés jusqu'à ce jour dans le département de l'Aude. *Bull. Soc. Ét. sc. Aude*, 16 : 1-316.
- GUERROUMI R., 1997. - Saint-Guilhem-le-Désert (Hérault) (Coleoptera). *Rev. As. rous. Ent.*, 6 (2) : 40-41.
- HARANT H. et JARRY D., 1960. - Grammont, site privilégié aux environs de Montpellier. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 100 (2) : 74-81.
- HERVÉ P., 1953. - A propos de St-Guilhem-le-Désert. *L'Entomologiste*, 9 (1-2) : 23-24.
- HEYDEN L.V., REITTER E. et WEISE J., 1906. - *Catalogus Coleopterorum Europae, Caucasi et Armeniae Rossicae* - (seconde édition) Reitter, Berlin : 774 pp. + notes manuscrites d' H. Lavagne.
- HOLLANDE A., 1930. - Notes de chasse - Nouveautés pour la faune franco-rhénane (*Amilia similis* Laich.). *Misc. Ent.*, 32 (10) : 103.
- HOLLIGER B. et BRUSTEL H., 1997. - *Atlas préliminaire des Coléoptères Cerambycidae.*, Inventaire faunistique n° 11 D. A.N.A., La Bastide-Sérou : 80 pp.
- IABLOKOFF A. K., 1950. - Sur les particularités de la faune de la région de Saint-Guilhem-le-Désert. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 50 (7) : 102-112.
- JACQUELIN-DUVAL C. et LAREYNIÉ P., 1852. - Quelques observations sur les Coléoptères des environs de Montpellier. *Anns. Soc. ent. Fr.*, 10 (2ème série) : 719-735.
- JUMEAU G., 1877. - Compte-rendu sur les excursions faites aux carrières des Bréguines, près de Béziers. *Bull. Soc. Et. Sc. nat. Béziers*, 2 : 89-99.
- KRATOCHVIL J., 1985. - Two new european species of Cerambycidae (Coleoptera). *Annotationes zoologicae et botanicae*, N°167 : 1-7.
- LAGARRIGUE J. et LAGARRIGUE J., 1947. - Cerambycidae de l'Aveyron. *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse*, 1947 : 21-29.
- LAVAGNE H., 1902 a. - Description de la larve de *Caenoptera marmottani* Bris. *L'Echange*, 17 (215) : 72-73.
- LAVAGNE H., 1902 b. - Note sur le *Caenoptera marmottani* Bris. *L'Echange*, 17 (216) : 85-86.
- LECLANT F., 1998 - L'Agro de Montpellier fête ses 150 ans. *Phytoma, la Défense des Végétaux*, 509 : 12-15.
- LEGENDRE R., 1977. - Présence du coléoptère Cerambycidae *Rosalia alpina* Linnaeus, 1758 dans les forêts des monts d'Orb. *Bull. Soc. Et. Sc. nat. Béziers*, N.S., 5 (46) : 4-5.
- LESEIGNEUR L., 1960. - Note sur *Leptura scutellata* Fab. (Col. Cerambycidae), Systématique et répartition géographique. *L'Entomologiste*, 16 (4) : 67-75.
- LICHENSTEIN J., 1870. - Manuel d'entomologie à l'usage des horticulteurs du Midi de la France. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 2 (2ème série) : 209-220.
- LICHENSTEIN J., 1873. - Communications : 3° Sur les moeurs d'une espèce de Braconide. *Anns. Soc. ent. Fr.*, (5° Série, 3) *Bulletin entomologique* : 22.
- LICHENSTEIN J., 1917. - A propos de *Raymondionymus marqueti* Aubé. *Misc. Ent.*, 24 (1) : 17-19.
- LICHENSTEIN J., 1918. - Notes biologiques sur quelques Coléoptères de l'Hérault. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1918 (4) : 91-95.
- LICHENSTEIN J., 1919. - Notes biologiques sur les Hyménoptères méditerranéens. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1919 (15) : 270-275.
- LICHENSTEIN J. et PICARD F., 1918 a. - Biologie des *Pristaulacus* Kieffer (Hym. Evaniidae) et leur répartition en France. *Bull. Soc. ent. Fr.* 1918 (5) : 177-174.

- LICHTENSTEIN J. et PICARD F., 1918 b. - Notes biologiques sur les Braconides (Hym.) (1^{re} note). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1918 (11) : 172-174.
- LICHTENSTEIN J. et PICARD F., 1919. - Notes biologiques sur les Braconides (Hym.) (2^e note). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1919 (2) : 62-64.
- LOPEZ A., 1992. - Observations zoologiques dans le Saint-Chinianais : Insectes et Arachnides. *Bull. Soc. arch. scient. litt. Béziers*, (8^{ème} Série, 3) : 59-62.
- MARQUET C., 1881. - Notice entomologique sur l'étang de Vendres. *Bull. Soc. Et. Sc. nat. Béziers*, 6 : 9-18.
- MARQUET C., 1897. - Catalogue des Coléoptères du Languedoc, espèces observées dans quelques régions de cette province, notamment à Toulouse. Béziers, Cette etc. *Bull. Hist. nat. Toulouse*, 31(5) : 5-240. [Cerambycidae : 203-210].
- MARRES P., VERNET J.-L., PRIOTON J., TANTON B., SCHAEFER L. et BOURNIER A., 1974. - Colloque sur la forêt de St-Guilhem-le-Désert. Ses mérites, son passé, son avenir in Section entomologique, extraits des procès verbaux. *Ann. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 114 (1) : 16-27.
- MAYET V., 1877. - Liste des insectes coléoptères recueillis à Lamalou et au Caroux dans l'excursion des 8 et 9 juillet. *Bull. Soc. Et. Sc. nat. Béziers*, 2 : 118-120.
- MAYET V., 1881. - Bulletin entomologique, Compte rendu de la séance du 28 décembre 1881 : note sur les moeurs des *Cerambyx*. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1 (6^{ème} série) : CLXII-CLXIV.
- MAYET V., 1882. - Bulletin entomologique, Compte rendu de la séance du 22 mars 1882 : note sur les métamorphoses des *Dorcadion*. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 2 (6^{ème} série) : LIX-LXI.
- MAYET V., 1887. - Notice nécrologique sur Jules Lichtenstein. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 7 (6^{ème} série) : 49-58.
- MAYET V., 1898. - *Essai de géographie zoologique de l'Hérault, faune terrestre* - Société Languedocienne de Géographie, Montpellier : 119 pp.
- MAYET V., 1900. - Note sur le *Caenoptera (Molorchus) marmottani* Ch. Brisout (Col.) et description du mâle de cette espèce. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1905 (11) : 226-228.
- MAYET V., 1905. - Le *Lucasianus levaillantii* Lucas (Col.), sa découverte en France et ses moeurs. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1905 (19) : 277-279.
- MOURGUES A., 1954. - Notes au sujet du piègçage des Carabes dans la zone littorale. *Ann. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 94 (1) : 20.
- MOURGUES A., 1959. - Notes de chasse en Lozère. *Ann. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 99 (4) : 191-192.
- MULSANT E., 1839. - *Histoire naturelle des coléoptères de France. Longicornes*. Paris, Maisson : 304 pp.
- MULSANT E., 1846. - *Histoire naturelle des Coléoptères de France, supplément aux Longicornes* : 16 pp.
- MULSANT E., 1862-1863. - *Histoire naturelle des Coléoptères de France – Longicornes (2^e édition)*. Annales de la Société impériale d'Agriculture, d'histoire naturelle et des Arts utiles de Lyon, Magnin, Blanchard et Cie., Paris : 590 pp.
- MURIAUX L. et FAGES A., 1969. - Le Causse Noir (Aveyron). Peuplement des Coléoptères Carabidae. *L'Entomologiste*, 25 (4) : 80-85.
- PAEZ A.V., 1995. - *Lucasianus levaillantii* (Lucas, 1849) en la provincia de Cadiz (Coleoptera : Cerambycidae). *Bol. Soc. Ent. Arag.*, N°12 : 17.
- PANIN S. et SAVULESCU N., 1961. - *Fauna republicii populare romîne. Insecta. Vol. X (5), Coleoptera, familia Cerambycidae*. Academiei Republicii Populare Romine, Bucuresti : 523 pp.
- PAULIAN A., CHAMINADE A. et MINETTI R., 1988. - Répartition et biologie de *Phytoecia vulneris* Aurivillius (Coleoptera Cerambycidae). *L'Entomologiste*, 44 (5) : 267-279.

- PELLEGRIN D., 1990. - *Icosium tomentosum* Lucas, espèce nouvelle pour la France continentale (Col. Cerambycidae Cerambycinae). *L'Entomologiste*, 46 (4) : 167-169.
- PESARINI C. et SABBADINI A., 1994. - Insetti della fauna Europea : Coleotteri Cerambycidi. *Natura*, 85 (1-2) : 132 pp.
- PICARD F., 1912. - Notes biologiques sur quelques Coléoptères et Hyménoptères du midi de la France. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1912 (1) : 48-51.
- PICARD F., 1919 a. - Les Insectes du figuier. *Ann. Epiphyties*, 6 : 1-17.
- PICARD F., 1919 b. - Sur un Ichneumonide (*Sycophyrus hesperophanis*, n. g. et sp.) parasite de *Hesperophanes griseus* F. dans les branches de Fiquier. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1918 (3) : 77-80.
- PICARD F., 1929 a. - Faune de France n° 20, Coléoptères Cerambycidae. Office central de Faunistique, Lechevalier, Paris : 167 pp.
- PICARD F., 1929 b. - Notes de chasse - Nouveautés pour la faune franco-rhénane. *Misc. ent.*, 32 (3) : 29-30.
- PLANET L.-M. 1924. - *Histoire naturelle des Longicornes de France*. Encyclopédie entomologique II. Lechevalier, Paris : 386 pp.
- PODANY R.N.C., 1954-1962. - *Cerambycidae, Prioninoe et Cerambycinae : Principales espèces et leurs aberrations*. Supplément au Bulletin de la Société entomologique de Mulhouse : 154 pp.
- PORTA A., 1934. - Fauna Coleopterum italica, vol. 4 (Heteromera-Phytophaga) : 415 pp.
- PRIOTON J., 1966. - La Croix de Mounis (Hérault). *Ann. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 106 (4) : 247-259.
- PRIOTON J., 1971. - Le mini-camp naturaliste des Chambertes (Hérault). *Ann. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 111 (4) : 155-157.
- QUÉAU A., 1985. - *Rosalio alpina* (L.) dans le nord de l'Hérault (Col. Cerambycidae). *L'Entomologiste*, 41 (4) : 199.
- RENAUDIE P., 1998. - Contribution à l'inventaire des Cerambycidae des Pyrénées-Orientales et découverte de trois espèces nouvelles pour le département (Coleoptera - Cerambycidae). *Rev. As. Rous. Ent.*, 7 (2) : 43-45.
- REYMOND A., 1945. - Nouvelles diverses et notes de chasse : Quelques captures intéressantes de Coléoptères de France. *L'Entomologiste*, 1 (10-11) : 173-174.
- REYNIER L., 1929. - Notes sur quelques espèces de Longicornes. *Misc. ent.*, 32 (1) : 2.
- RICHOUX P., ALLEMAND R., PUIPIER R. et DELAUNAY L., 1986. - Biogéographie des *Purpuricen* (Col. Cerambycidae) dans le sud de la France. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 55 (9) : 305-318.
- ROUDIL R., 1987. - Principaux insectes rencontrés par MM. Bruger, Lhubac, Navarro, Roudil et Schaefer. *Ann. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 127 (4) : 48-49.
- ROUDIL R., 1990. - Sortie entomologique du 10/06/1990 à L'Espérou et ses environs. *Ann. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 130 (3) : 35.
- ROUDIL R., 1993. - Relevé de la faune dans une parcelle de la garrigue de Pignan. *Ann. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 133 (4) : 51-55.
- SAINTE-CLAIRE-DEVILLE J., 1937. - Catalogue raisonné des Coléoptères de France, 3ème livraison. *L'Abeille*, 36 (3) : 265-372 (Cerambycidae 327-341).
- SAMA G., 1984. - Studi sul genere *Parmena* Latreille, 1829 (Coleoptera Cerambycidae) (Prima parte). *Riv. piem. St. nat.*, 5 : 205-230.
- SAMA G., 1985. - Studi sul genere *Parmena* Latreille, 1829 (Coleoptera Cerambycidae) (Seconda parte). *Riv. piem. St. nat.*, 6 : 69-84.
- SAMA G., 1988. - *Coleoptera Cerambycidae, Catalogo topografico e sinonimico*. Fauna d'Italia, XXVI, Calderini Ed., Bologna : 216 pp.
- SAMA G., 1991. - Note sulla nomenclatura dei Cerambycidae della regione mediterranea (Coleoptera). *Bol. Soc. ent. ital., Genova*, 123 (2) : 121-128.
- SAMA G., 1992. - Note sur les longicornes de la péninsule ibérique avec description d'une espèce nouvelle de *Trichoferus* (Coleoptera, Cerambycidae). *Biocosme mésogéen*, 8 (4)-9 (1) : 395-400.

- SAMA G., 1994. - Note sulla nomenclatura dei Cerambycidae della regione mediterranea. II. Revisione di alcuni tipi di Kraatz, v. Heyden e Stierlin. (Coleoptera, Cerambycidae). *Lambillionea*, 94 (3) : 321-334.
- SAMA G., 1995. - Note sui Molorchini. II. I generi *Glaphyra* Newman, 1840 e *Nathrioglaphyra* nov. (Coleoptera Cerambycidae). *Lambillionea*, 95 (3) : 363-390.
- SAMA G., 1996. - Révision du genre *Deroplia* Dejean, 1835 (Coleoptera Cerambycidae). *Biocosme mésogéen*, 13 (2) : 23-64.
- SCHAEFER L., 1936. - Notes de chasse pour 1936. *Misc. Ent.*, 37 (9) : 85-87.
- SCHAEFER L., 1947. - Captures de Coléoptères et observations diverses. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 16 (2) : 26-29.
- SCHAEFER L., 1952. - Saint-Guilhem-le-Désert (Hérault), localité entomologique remarquable. *L'Entomologiste*, 8 (5-6) : 136-150.
- SCHAEFER L., 1953. - Capture de Coléoptères dans la région montpelliéraine et observations diverses. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 22 (6) : 161-164.
- SCHAEFER L., 1954 a. - Chasse aux Coléoptères durant les inondations. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 94 (1) : 21-23.
- SCHAEFER L., 1954 b. - Section entomologique, extraits des procès verbaux. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 94 (2) : 38-39.
- SCHAEFER L., 1954 c. - Captures intéressantes de Coléoptères dans l'Hérault. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 94 (2) : 47-48.
- SCHAEFER L., 1954 d. - Section entomologique, extraits des procès verbaux. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 94 (3) : 59-60.
- SCHAEFER L., 1955 a. - La saison entomologique 1955. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 95 (3) : 56-58.
- SCHAEFER L., 1955 b. - Section entomologique, extraits des procès verbaux. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 95 (4) : 77-79.
- SCHAEFER L., 1956 a. - Section entomologique, extraits des procès verbaux. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 96 (4) : 98-101.
- SCHAEFER L., 1956 b. - L'excursion entomologique du 27 mai 1956. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 96 (4) : 104.
- SCHAEFER L., 1957 a. - Observations sur les récoltes entomologiques de M. Bouyer dans la région de Camarès (Aveyron). *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 97 (1) : 33-34.
- SCHAEFER L., 1957 b. - Section entomologique, extraits des procès verbaux. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 97 (3) : 102-104.
- SCHAEFER L., 1957 c. - Recherches entomologiques au Mayni-la-Tenelle (Aveyron). *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 97 (4) : 129-133.
- SCHAEFER L., 1958 a. - La faune entomologique de Saint-Guilhem-le-Désert, Hérault (2^e note). *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 27 (3) : 68-74.
- SCHAEFER L., 1958 b. - Section entomologique, extraits des procès verbaux. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 98 (3) : 170-173.
- SCHAEFER L., 1958 c. - Notes entomologiques sur le Mont Aigoual. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 98 (3) : 174-176.
- SCHAEFER L., 1959 a. - Section entomologique, extraits des procès verbaux. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 99 (4) : 188-190.
- SCHAEFER L., 1959 b. - Notes entomologiques sur le bois de Valbonne (Gard). *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 99 (4) : 194-200.
- SCHAEFER L., 1961 a. - Section entomologique, extraits des procès verbaux. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 101 (2) : 83-85.
- SCHAEFER L., 1961 b. - Section entomologique, extraits des procès verbaux. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 101 (3) : 154-155.

- SCHAEFER L., 1961 c. - La biocénose coléoptérologique du Pin de Salzmann dans l'Hérault. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 101 (3) : 157-159.
- SCHAEFER L., 1961 d. - Section entomologique, extraits des procès verbaux. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 101 (4) : 236-237.
- SCHAEFER L., 1962 a. - Section entomologique, extraits des procès verbaux. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 102 (1) : 53-54.
- SCHAEFER L., 1962 b. - La vie animale sur la cote sableuse du golfe du Lion, II. - Les Coléoptères. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 102 (2) : 105-111.
- SCHAEFER L., 1962 c. - Section entomologique, extraits des procès verbaux. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 102 (4) : 220-222.
- SCHAEFER L., 1963a. - Section entomologique, extraits des procès verbaux. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 103 (2) : 85-86.
- SCHAEFER L., 1963 b. - Section entomologique, extraits des procès verbaux. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 103 (3) : 151.
- SCHAEFER L., 1964 a. - Section entomologique, extraits des procès verbaux. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 104 (1) : 53-54.
- SCHAEFER L., 1964 b. - Section entomologique, extraits des procès verbaux. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 104 (2) : 117-118.
- SCHAEFER L., 1964 c. - Section entomologique, extraits des procès verbaux. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 104 (3) : 183-184.
- SCHAEFER L., 1964 d. - Section entomologique, extraits des procès verbaux. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 104 (4) : 259-260.
- SCHAEFER L., 1964 e. - Dix voyages entomologiques en Corse (suite et fin). *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 104 (4) : 269-286.
- SCHAEFER L., 1965. - Note sur l'*Acmaeops marginata* F. (Col. Cerambycidae). *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 105 (4) : 239-241.
- SCHAEFER L., 1967 a. - Section entomologique, extraits des procès verbaux. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 107 (2) : 111-114.
- SCHAEFER L., 1967 b. - Section entomologique, extraits des procès verbaux. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 107 (4) : 197-199.
- SCHAEFER L., 1968 a. - Coléoptères nouveaux ou intéressants pour le Languedoc-Roussillon et confins. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 108 (2) : 73-83.
- SCHAEFER L., 1968 b. - Section entomologique, extraits des procès verbaux. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 108 (4) : 229-230.
- SCHAEFER L., 1969. - Section entomologique, extraits des procès verbaux. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 109 (1) : 37-38.
- SCHAEFER L., 1970. - Section entomologique, extraits des procès verbaux. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 110 (4) : 175.
- SCHAEFER L., 1971 a. - Section entomologique, extraits des procès verbaux. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 111 (1) : 27-28.
- SCHAEFER L., 1971 b. - Section entomologique, extraits des procès verbaux. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 111 (2) : 74.
- SCHAEFER L., 1971 c. - Section entomologique, extraits des procès verbaux. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 111 (4) : 175.
- SCHAEFER L., 1972 a. - Section entomologique, extraits des procès verbaux. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 112 (3) : 264-265.
- SCHAEFER L., 1972 b. - Section entomologique, extraits des procès verbaux. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 112 (4) : 328-329.
- SCHAEFER L., 1973. - Section entomologique, extraits des procès verbaux. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 113 (1) : 30-32.

- SCHAEFER L., 1974 a. - Octon : Camp naturaliste, SPNLR et SHHNN, résultats entomologiques. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 114 (2) : 82-83.
- SCHAEFER L., 1974 b. - Section entomologique, extraits des procès verbaux. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 114 (2) : 91-92.
- SCHAEFER L., 1974 c. - Section entomologique, extraits des procès verbaux. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 114 (3-4) : 144-145.
- SCHAEFER L., 1974 d. - *Entomologie*. In Marrès P., *Saint-Guilhem-le-Désert et sa région*. Edition de l'Association des Amis de Saint-Guilhem-le-Désert, Montpellier : 59-61.
- SCHAEFER L., 1975. - Section entomologique, extraits des procès verbaux. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 115 (3-4) : 127-128.
- SCHAEFER L., 1976 a. - Section entomologique, extraits des procès verbaux. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 116 (1) : 35-37.
- SCHAEFER L., 1976 b. - Section entomologique, extraits des procès verbaux. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 116 (2) : 92-93.
- SCHAEFER L., 1976 c. - Section entomologique, extraits des procès verbaux. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 116 (3-4) : 142-143.
- SCHAEFER L., 1977 a. - Section entomologique, extraits des procès verbaux. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 117 (1) : 11-13.
- SCHAEFER L., 1977 b. - Section entomologique, extraits des procès verbaux. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 117 (3-4) : 96.
- SCHAEFER L., 1978 a. - Section entomologique, extraits des procès verbaux. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 118 (1) : 28-29.
- SCHAEFER L., 1978 b. - Section entomologique, extraits des procès verbaux. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 118 (3-4) : 97-99.
- SCHAEFER L., 1978 c. - La Rosalie alpine, *Rosalia alpina* L., dans l'Hérault. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 118 (3-4) : 99.
- SCHAEFER L., 1979 a. - Section entomologique, extraits des procès verbaux. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 119 (1) : 12-15.
- SCHAEFER L., 1979 b. - Section entomologique, extraits des procès verbaux. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 119 (3-4) : 104-109.
- SCHAEFER L., 1980. - Section entomologique, extraits des procès verbaux. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 120 (3-4) : 98-100.
- SCHAEFER L., 1981 a. - Section entomologique, extraits des procès verbaux. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 121 (1) : 33-35.
- SCHAEFER L., 1981 b. - La Rosalie alpine, *Rosalia alpina* L. (Col. Cerambycidae) dans l'Hérault, 2ème note. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 121 (1) : 36.
- SCHAEFER L., 1981 c. - Section entomologique, extraits des procès verbaux. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 121 (2) : 61-66.
- SCHAEFER L., 1981 d. - Section entomologique, extraits des procès verbaux. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 121 (3-4) : 96-98.
- SCHAEFER L., 1982. - Section entomologique, extraits des procès verbaux. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 122 (3-4) : 90-91.
- SCHAEFER L., 1983 a. - Section entomologique, extraits des procès verbaux. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 123 (1-2) : 10-12.
- SCHAEFER L., 1983 b. - Section entomologique, extraits des procès verbaux : Excursion à Saint-Guilhem le 18 juin 1983. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 123 (3) : 55.
- SCHAEFER L., 1985. - Captures intéressantes de Coléoptères dans l'Hérault. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 125 (3) : 42-47.
- SCHAEFER L. et ADGÉ M., 1982. - Excursion au Petit-Bagnas (Hérault) le 29 mai 1982. *Anns. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 122 (3-4) : 87-88.

- SCHAEFER L. et MOREAU G., 1960. - Aperçu entomologique sur le Caroux. *Ann. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 100 (2) : 121-128.
- SCHAEFER L. et VEYRET P., 1936. - Coléoptères nouveaux, rares ou intéressants pour le département. *Ann. Soc. Hist. nat. Toulon*, 20 (5-6) : 139-146.
- SIMON A., 1954. - Notes de chasse et observations diverses : Une station nouvelle pour *Caenoptera marmottani* Ch. Bris. *L'Entomologiste*, 10 (1) : 30.
- SUIRE J., 1963 a. - Quelques coins de chez nous. I.- La Paillade. *Ann. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault* : 103 (1) : 27-43.
- SUIRE J., 1963 b. - Quelques coins de chez nous. II.- Lattes. *Ann. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 103 (2) : 125-137.
- SUIRE J., 1964. - Quelques coins de chez nous. IV.- Murviel. *Ann. Soc. Hort. Hist. nat. Hérault*, 104 (1) : 31-44.
- SVACHA P. et DANILEVSKY M.-L., 1987. - Cerambycoid larvae of Europe and Soviet Union (Coleoptera, Cerambycoidea). Part 1. *Acta Univ. Carolinae, Biologica*, 30 : 1-176.
- TARNIQUET F., 1878. - Excursion du dimanche 16 juin 1878, au ruisseau du Libron. *Bull. Soc. Et. Sc. nat. Béziers*, 3 (1) : 62-65.
- TÉOCCHI P., 1970. - Notes de chasse et observations diverses : *Criocephalus syriacus* Reitter au Dom de Bormes. *L'Entomologiste*, 26 (1-2) : 41.
- TÉOCCHI P., 1975. - Les points obscurs de la bionomie d'*Oxypleurus nodieri* (Col. Cerambycidae Aseminae). *L'Entomologiste*, 31 (4-5) : 149-153.
- THÉLOT J.-P., 1966. - Notes de chasse et observations diverses : Cerambycidae du Mont Aigoual. *L'Entomologiste*, 22 (1-2) : 26.
- THÉROND J., 1976. - *Catalogue des Coléoptères de la Camargue et du Gard (2^e partie)* - Mémoire n°10, Société d'Etude des Sciences naturelles, Nîmes : 223 pp.
- TRUTAT E., 1900. - Nécrologie. Charles Marquet. *Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse*, 33 : 182-187.
- VENET H., 1929. - Quatrième note contributive à la faune de la Haute-Auvergne. *Misc. Ent.*, 31 (11) : 96-97.
- VERDIER P., QUÉZEL-AMBRUNAZ P. et RIOUX J.-A., 1949. - Notes sur les Cérambycides des Cévennes. *L'Entomologiste*, 5 (1-2) : 11-13.
- VERDIER P., QUÉZEL P. et RIOUX J.-A., 1950. - Activités entomologiques du Laboratoire d'Histoire Naturelle de la Faculté de Médecine de Montpellier (note I). *L'Entomologiste*. 4 (4-5) : 132-137.
- VIALLIER J., 1990. - Léon Schaefer (1900-1989). *Bull. mens. Soc. Linn. Lyon*, 59 (1) : 6-7.
- VILAIN P., 1996. - *Liste des plantes vasculaires de l'Hérault (2^{ème} tirage)*. Société d'Horticulture et d'Histoire naturelle de l'Hérault, Montpellier : 68 pp.
- VILLIERS A., 1946. - *Faune de l'Empire français. V. Coléoptères Cérambycides de l'Afrique du Nord*. Ed. du Muséum, Lib. Larose, Paris : 153 pp.
- VILLIERS A., 1978. - *Faune des Coléoptères de France, Cerambycidae*. Lechevalier, Paris : 611 pp.
- VILLIERS A., 1979. - Notes de chasses et observations diverses : Un nouveau Clytini en France ? *L'Entomologiste*, 35 (3) : 144.
- VINCENT R. et GUILLOT J., 1983. - A propos de la biologie larvaire d'*Evodinus (Brachyta) interrogationis* L. (Col. Cerambycidae) en Europe occidentale. *Rev. Sc. nat. Auvergne*, 49 : 55-62.
- VIVES E., 1984. - *Cerambycoides (Coleoptera) de la Péninsula Iberica y de las Islas Baleares*. Treballs del Museu de Zoologia, Barcelona, 2 : 136 pp.

Addendum

par Jérôme SUDRE, Antoine FOUCART et Christian COCQUEMPOT

INTRODUCTION

La découverte de documents jusqu'alors ignorés ou récemment publiés confirme les réserves émises quant à l'exhaustivité de notre travail en dépit de notre application dans la recherche bibliographique.

Les informations nouvelles concernent l'historique avec des détails supplémentaires sur la vie et l'œuvre de Jean Lichtenstein et Valéry Mayet d'une part, et le catalogue avec des informations inédites issues de plusieurs publications.

HISTORIQUE

Valéry Mayet (1839-1909) : Un vibrant hommage lui est également rendu par FERROUILLAT (1909), portant notamment sur les activités au sein de l'École nationale d'Agriculture de Montpellier. Un portrait est également donné dans cette même référence.

Jean Lichtenstein (1893-1930) : Un hommage appuyé est rendu par H. SICARD (1931) à son compagnon d'études à l'occasion de sa nomination au sein de l'Académie des Sciences de Montpellier. G. KUHNHOLTZ-LORDAT (1931) revient sur cet hommage en réponse au discours de H. Sicard.

LISTE DES ESPÈCES

Espèces présentes au catalogue

***Vadonia unipunctata unipunctata* (Fabricius, 1787) morphe *occidentalis* Daniel, 1891.**

Béziers (de Germiny) (FAUVEL, 1884).

***Corymbia fontenayi* (Mulsant, 1839)**

Saint-Martin-de-Londres (DEBREUIL et al., 1998).

***Brachyleptura trisignata* (Fairmaire, 1852)**

Montpellier (Mayet) (FAUVEL, 1884) ; Saint-Martin-de-Londres (forme typique !) (DEBREUIL, 1998 ; DEBREUIL et al., 1998).

***Pedostrangalia (Pedostrangalia) revestita* (Linné, 1767)**

Béziers (FAUVEL, 1884). Probablement d'après MARQUET (1897)

***Necydalis ulmi* Chevrolat, 1838**

Saint-Martin-de-Londres (DEBREUIL et al., 1998).

***Arhopalus ferus* (Mulsant, 1839) (= *tristis* (Fabricius, 1787))**

Montpellier (Mayet) (FAUVEL, 1884).

SCIENTIFIC LIBRARY
MONTPELLIER

ET NUMÉRIQUE

- Trichoferus griseus* (Fabricius, 1792)
Montpellier et Béziers (Marquet) (FAUVEL, 1884) ; Hérault (PICARD, 1929).
- Trichoferus pallidus* (Olivier, 1789)
Montpellier (Rey) (FAUVEL, 1884). Cette citation à la même origine que celle de Marquet (1897) et elle est donc toute aussi suspecte.
- Stromatium fulvum* (Villers, 1789) (= *unicolor* (Olivier, 1795))
Montpellier (Mayet cité par Mulsant) (FAUVEL, 1884).
- Certallum ebulinum* (Linné, 1767) *morphe ruficollis* Fabricius, 1781
Béziers (Marquet), Vendres (FAUVEL, 1884).
- Deilus fugax* (Olivier, 1790)
Béziers (Marquet). Cette (FAUVEL, 1884).
- Cerambyx* (*Cerambyx*) *cerdo* Linné, 1758
Montpellier (Michard) donné en sous espèce *mirbecki* Lucas (FAUVEL, 1884) ;
Montpellier (Mayet) (FAUVEL, 1887).
- Cerambyx* (*Cerambyx*) *welensii* Kuster, 1846 (= *velutinus* Brullé, 1832)
Montpellier (Michard), Béziers (Marquet) (FAUVEL, 1884).
- Cerambyx* (*Cerambyx*) *miles* Bonelli, 1823
Béziers (Marquet) (FAUVEL, 1884) ; Montpellier (Mayet) (FAUVEL, 1887).
- Semanotus laurasi laurasi* (Lucas, 1852)
Montpellier (Mayet) (FAUVEL, 1884).
- Reitteroderus glabratus* (Charpentier, 1825)
Béziers (Aubé) (FAUVEL, 1884).
- Plagionotus detritus* (Linné, 1758)
Saint-Martin-de-Londres (DEBREUIL et al., 1998).
- Echinocerus floralis* (Pallas, 1773)
Cette (Lucante) (FAUVEL, 1884).
- Chlorophorus pilosus glabromocolatus* (Goeze, 1777)
Béziers (FAUVEL, 1884).
- Chlorophorus varius* (Müller, 1766)
Languedoc (Marquet) (FAUVEL, 1884) ; Montpellier (J. du Val) (= *Clytus ornatus* Herbst) (FAUVEL, 1887).
- Chlorophorus trifasciatus* (Fabricius, 1781)
Béziers (Marquet) (FAUVEL, 1884).
- Pseudosphegites cinereus* (Castelnau et Gory, 1836)
Montpellier (Abeille de Perrin) (FAUVEL, 1884).
- Mesosa curculionoides* (Linné, 1761)
Saint-Martin-de-Londres (DEBREUIL et al., 1998).
- Parmena solieri solieri* Mulsant, 1839
Béziers et Cette (Marquet), Montpellier (Mayet) (FAUVEL, 1884).
- Herophila tristis tristis* (Linné, 1767)
Montpellier (Gouan, coll. Linné) (FAUVEL, 1884).
- Morinus asper* (Sulzer, 1776)
Béziers (Marquet) (FAUVEL, 1884).
- Iberodorcadion* (*Hispanodorcadion*) *molitor molitor* (Fabricius, 1775)
Cette, Montpellier (Michard) ; Béziers (Marquet) (FAUVEL, 1884).
- Pterolophia m-grisea* (Mulsant, 1846)
Saint-Georges près de Montpellier (Mulsant), Béziers et Cette (Marquet)
(FAUVEL, 1884).

***Exocentrus punctipennis* Mulsant et Guillebeau, 1856**

Montpellier (PICARD, 1929).

***Aegomorphus clavipes* (Schrank, 1781)**

Béziers (Marquet) (FAUVEL, 1884).

***Anaerea similis* (Laicharting, 1784)**

Lamalou-les-Bains (Marquet) (FAUVEL, 1884).

***Saperda punctata* (Linné, 1767)**

Béziers (Marquet) (FAUVEL, 1884).

***Saperda octopunctata* (Scopoli, 1772)**

Béziers (Marquet) (FAUVEL, 1884).

***Oberea (Amaurostoma) erythrocephala erythrocephala* (Schrank, 1776)**

Béziers (Marquet) (FAUVEL, 1884).

***Phytoecia virgula* (Charpentier, 1825)**

Languedoc (Rey), Béziers (Marquet) (FAUVEL, 1884).

***Phytoecia rufipes* (Olivier, 1795)**

Languedoc (Mulsant) (FAUVEL, 1884).

***Phytoecia erythrocnema* Lucas, 1849**

Cette (Mayet), Béziers (Marquet) (FAUVEL, 1884).

***Calamobius filum* (Rossi, 1790)**

Languedoc (Rey) (FAUVEL, 1884).

***Agapanthia asphodeli* (Latreille, 1804)**

Cette et Béziers (Marquet) (FAUVEL, 1887) ; Montagne de la Gardiole au Roc d'Anduze (CARRIÈRE, 1998).

***Agapanthia kirbyi* (Gyllenhal, 1817)**

Lamalou-les-Bains (Marquet) (FAUVEL, 1884) ; Pic de Vissous (CARRIÈRE, 1998).

***Agapanthia cynarae cynarae* (Germar, 1817)** est cité de Béziers (Reiche) (FAUVEL, 1884) et nous rappelons que nous ne considérons pas cette espèce comme présente en France.

***Agapanthia dahli dahli* (Richter, 1821)**

Faugères au Plan de l'Euze (CARRIÈRE, 1998).

***Agapanthia cardui* (Linné, 1767)**

Larzac Sud aux environs de Saint-Martin d'Azirou, Pic de la Coquillade dans la chaîne des Avants-Monts, environs de Portiragnes (CARRIÈRE, 1998).

***Agapanthia violacea* (Fabricius, 1775)**

Nord de l'Hérault (CARRIÈRE, 1998).

Citations invalidées

***Vesperus strepens strepens* (Fabricius, 1792)**

Languedoc (Rey) (FAUVEL, 1884). Il s'agit probablement d'une redondance de la citation de MARQUET (1897) que nous n'avions pas retenue.

***Necydalis major* (Linné, 1758)**

Nous n'avions pas retenu la citation de (MARQUET, 1897). Nous ne retiendrons pas plus la citation du languedoc par FAUVEL (1884) qui n'est que la reprise de celle de Marquet.

***Iberodorcadion (Iberodorcadion) fuliginator* (Linné, 1758)**

Nous retrouvons la citation de *I. fuliginator meridionale* Mulsant à Clermont-l'Hérault et Cette (Lucante) donnée par MARQUET (1897) (FAUVEL, 1884). Une note infra paginale (FAUVEL, 1884) mentionne l'invalidation de la présence de *Dorcadion (Pedestredorcadion) scopolii* (Herbst, 1784) qui doit vraisemblablement se rattacher au *Dorcadion lineatum* Fabricius cité des environs de Béziers d'après Ecoffet (MULSANT, 1862-1863) et que nous avons rayé de la faune languedocienne.

COMMENTAIRES

La majorité de ces nouvelles informations sont redondantes avec celles données dans notre catalogue mais comportent quelques données géographiques inédites. A. FAUVEL (1884) donne des informations transmises par C. MARQUET dont certaines ne se retrouvent pas dans son catalogue du Languedoc (1897).

Remerciements

Cet addendum n'aurait pu être rédigé sans le concours de MM. J. Carrière, F. Leclant, J. Leplat et S. Roux auxquels nous exprimons toute notre gratitude.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- CARRIÈRE J., 1998.- Vers une connaissance des larves adultes d'Agapanthiaïres, influence des plantes-hôtes sur la stature imaginale. (Coleoptera, Cerambycidae). *Lambillionea*, 98 : 339-346.
- DEBREUIL M., 1998. – Notes de chasses. *Rutilans*, 1 (3) : 65.
- DEBREUIL M., LEPLAT J. et THERMES R., 1998. – Notes de chasses. *Rutilans*, 1 (2) : 55.
- FAUVEL A., 1884. – Les Longicornes Gallo-Rhénans (Suite) - Catalogue. *Revue d'Entomologie (Caen)*, 3 (3-11-12) : 317-390.
- FAUVEL A., 1887. – Supplément aux longicornes Gallo-Rhénans. *Revue d'Entomologie (Caen)*, 6 : 234-243.
- FERROUILLAT P., 1909 – Discours prononcé aux obsèques de Valéry Mayet. in DEGRULLY L., Nécrologie – Valéry Mayet. *Le Progrès agricole & viticole*, 6 (N°20) : 594-596.
- KUHNHOLTZ-LORDAT G., 1931. – Réponse au discours de réception de M. H. SICARD. *Bulletin de l'Académie des Sciences et Lettres de Montpellier*, N°61 : 122-123.
- MARQUET C., 1897. - Catalogue des Coléoptères du Languedoc, espèces observées dans quelques régions de cette province, notamment à Toulouse, Béziers, Cette etc. *Bull. Hist. nat. Toulouse*, 31(5) : 5-240. [Cerambycidae : 203-210].
- PICARD F., 1929. – Rapports sommaires sur les travaux accomplis dans les laboratoires et comptes rendus des missions d'études – Station entomologique de Montpellier. *Annales du Service des Épiphyties*, 5 : 344-346.
- SICARD H., 1931. – Discours de réception. *Bulletin de l'Académie des Sciences et Lettres de Montpellier*, N°61 : 114-122.