


Session botanique en Corse : 8-13 mai 2008

Cette session, préparée et organisée par Hélène Sondaz, s'est effectuée du jeudi 8 mai au mardi 13 mai.

Ce compte-rendu a été réalisé à partir des notes, relevés et descriptions de Danièle et Olivier Gonnet, Geneviève et Jean-Luc Macqueron, Liliane Roubaudi et Hélène Sondaz.

Jeudi 8 mai : Col de Teghine-Serra di Pignu, le matin. Plage de la Roya et marais de St Florent l'après-midi.



Lieux d'herborisation du jeudi 8 mai

Notre rendez-vous est fixé au col de Theguine (536m) le 8 mai à 9 h devant le monument aux morts, haut lieu de la résistance. (En septembre/octobre 1943, les goumis marocains, venus renforcer les résistants contre les allemands, ont libéré le col. Le monument commémore cette libération.) Le col relie deux versants, l'un vers l'est avec Bastia et la zone humide et l'étang de Biguglia et l'autre vers l'ouest vers Patrimoni (quel bon vin !) et le golfe de St Florent. Nous sommes dans la zone Est/ouest la plus étroite de l'île, à la base du Cap Corse. La vue y est splendide, après dissipation du brouillard. Le soleil est là mais les fortes rafales de vent qui ont dispersé les nuages, nous obligent à rejoindre très vite notre lieu d'herborisation.

A environ 1km du col nous empruntons, sur la gauche la D338 qui conduit au relais émetteur de la Serra di Pignu. En effet, une chaîne montagneuse, La Serra, s'étend tout le long du Cap Corse avec la Serra di Pignu (960m) au sud et le Monte di u castellu (540m) au nord. Le point culminant de cette chaîne est le Monte Stello (1307m), un des 8 sommets de la Serra situé à peu près au milieu du Cap Corse.

*Au niveau géologique nous sommes dans la « Corse alpine » (Nord Est de l'île) avec des schistes lustrés (roches acides riches en silice) avec intrusions de gabbros et serpentines (roches

basiques pauvres en silice) ; le relief en est plus doux, moins élevé et moins abrupte que dans la Corse cristalline. Les sommets sont des cipolins et calcschistes et les pentes sont des métagabbros granitisés tapissés d'éboulis quaternaires.

Nous laissons les voitures un peu en dessous des pylônes et herborisons la matinée sur les pentes proches des crêtes ainsi que sur les talus du bord de la D338. Le panorama est magnifique et les passages nuageux nous laissent entrevoir Bastia et la côte est.

Autour de la route nous découvrons deux types de végétation : celle du maquis bas et assez clair (fruticées basses) et celle des rochers.

Le maquis est composé de ligneux, d'arbustes (chaméphytes) plus ou moins rugueux et agressifs lors du passage de nos mollets avec *Anthyllis hermanniae* (anciens rameaux spinescents), *Genista corsica*, *Genista salzmanii*, *Erica arborea*, *Erica scoparia*.....etc.

Nous empruntons un sentier en direction des glaciers, localisées sur les contreforts du Pignu, façade est du Monte Murziao (785m).

Un peu d'histoire :

***« L'apparition des premières glaciers date de l'occupation Génoise. Les dernières glaciers seront définitivement abandonnées en Corse à la veille de la première guerre mondiale. Le principe général de ces glaciers est de transformer la neige en glace en l'isolant de l'extérieur. La technique est relativement simple : on creuse un puits à neige (5 à 10 m de profondeur pour 4 à 8 m de diamètre) dans un petite bâtisse aux murs en pierre très épais et qui ne possède qu'une seule ouverture orientée au nord. La construction des murs et du toit est très soignée. La neige est ramassée dans les environs puis entassée par couches dans le puits. Un feu allumé en permanence à l'extérieur permet aux ouvriers de se réchauffer. Un lit de fougères ou de bruyère sépare chaque couche. La neige est posée sur un plancher et l'eau de fusion est évacuée par un conduit percé au fond du puits, ce qui est indispensable pour l'obtention de la glace. La température intérieure, très froide, va transformer la neige en glace. Dans cette atmosphère, la glace pouvait sans doute se conserver 6 à 8 mois. Ensuite cette glace feuilletée était découpée, remontée des puits à l'aide de poulies puis transportée à dos d'ânes ou de mulets. La glace était enveloppée dans des sacs de toile ou de cuir couverts de feuilles de fougères. »*

*cf La végétation de la Corse de J.Gamisans Edisud 2006.

**La Baie de Bastia : jerome.rattat.free.fr/page_Baie_Bastia.htm

Le type de végétation le long des crêtes est essentiellement de la pelouse assez rase, pâturée par des vaches, parsemée d'arbustes et de petits arbres rabougris.

Après 1km environ, nous faisons demi-tour avant d'atteindre les glaciers, il est temps d'aller déjeuner.

Espèces relevées autour du Serra di Pignu :

<i>Aira caryophylla</i>	<i>Bellium bellidioides</i>	<i>Erica scoparia</i>
<i>Anemone hortensis</i> subsp.	<i>Carex caryophylla</i>	<i>Erodium cicutarium</i>
<i>hortensis</i>	<i>Centaurea calcitrapa</i>	<i>Genista corsica</i>
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	<i>Cerastium boissierianum</i>	<i>Genista salzmanii</i>
<i>Anthyllis hermanniae</i>	<i>Cerastium glomeratum</i>	<i>Geranium lucidum</i>
<i>Anthyllis rubriflora</i>	<i>Ceterach officinarum</i>	<i>Helichrysum italicum</i>
<i>Arabis collina</i>	<i>Cistus monspeliensis</i>	<i>Helleborus lividus</i>
<i>Arabis verna</i>	<i>Cistus salviifolius</i>	<i>Hyoseris radiata</i>
<i>Arenaria balearica</i>	<i>Cruciata glabra</i>	<i>Hypochaeris</i> sp.
<i>Asphodelus ramosus</i>	<i>Cyclamen repandum</i>	<i>Jasione montana</i>
<i>Bellis sylvestris</i>	<i>Erica arborea</i>	<i>Linaria pelisseriana</i>

<i>Lotus corniculatus</i>	<i>Polygala nicaensis</i>	<i>Saxifraga tridactylites</i>
<i>Luzula multiflora</i>	<i>Polystichum setiferum</i>	<i>Sedum brevifolium</i>
<i>Medicago minima</i>	<i>Potentilla micrantha</i>	<i>Sedum rubens</i>
<i>Neotinea maculata</i>	<i>Potentilla neumanniana</i>	<i>Senecio lividus</i>
<i>Orchis morio</i>	<i>Pteridium aquilinum</i>	<i>Sherardia arvensis</i>
<i>Pancreaticum illyricum</i>	<i>Ranunculus paludosus</i>	<i>Silene gallica</i>
<i>Parentucellia latifolia</i>	<i>Rumex acetosella</i>	<i>Teesdalia coronopifolia</i>
<i>Plantago bellardii</i>	<i>Sagina pilifera</i>	<i>Trifolium repens</i>
<i>Plantago coronopus</i>	<i>Sanguisorba minor</i>	<i>Trifolium subterraneum</i>
<i>Poa bulbosa</i>	<i>Santolina corsica</i>	<i>Vicia bithynica</i>
<i>Polycarpon tetraphyllum</i>	<i>Saxifraga corsica</i>	<i>Viola riviniana</i>

Nous repartons herboriser. Sur la D338, dans le premier virage en épingle à cheveu au dessus du col, la végétation des rochers et des pentes qui les surplombent attire notre attention : *Borago pygmaea*, *Ophrys aranifera*, *Ophrys exaltata* subsp. *morisii*, *Selaginella denticulata*.

<i>Anagallis arvensis</i>	<i>Euphorbia characias</i>	<i>Ranunculus muricatus</i>
<i>Arbutus unedo</i>	<i>Euphorbia spinosa</i>	<i>Selaginella denticulata</i>
<i>Asphodelus ramosus</i>	<i>Lavandula stoechas</i>	<i>Serapias lingua</i>
<i>Bellium bellidioides</i>	<i>Ophrys aranifera</i>	<i>Teucrium marum</i>
<i>Biscutella didyma</i>	<i>Ophrysexaltata</i> ssp. <i>morisii</i>	<i>Tuberaria guttata</i> var <i>plantaginea</i>
<i>Borago pygmaea</i>	<i>Orchis mascula</i>	<i>Valantia muralis</i>
<i>Brachypodium distachion</i>	<i>Orchis papilionacea</i>	
<i>Centaurea calcitrapa</i>	<i>Petrorhagia velutina</i>	
<i>Dittrichia viscosa</i>	<i>Polygala nicaeensis</i>	

Notre prochaine étape est la plage de la Roya à St Florent, en face de l'entrée du camping Acqua Dolce et le marais de St Florent.. Ce sont des terrains du quaternaire, sables littoraux marins et dépôts fluvio-marins. Le milieu écologique et donc la végétation sont profondément perturbés et modifiés par un tourisme intensif et un comblement des zones marécageuses.

Nous avons cependant observé : au niveau de l'arrière plage : en cherchant bien, juste entre les deux pieds d'Hélène, ô miracle ! un seul pied fleuri de *Silene coelirosa*. C'est un petit Silène des arrières-plages, protégé national, autrefois très abondant dans cette zone mais devenu extrêmement rare du fait de l'aménagement touristique de cette zone : plage très fréquentée et implantation d'un terrain de camping sur le comblement de la zone marécageuse. Sa situation est plus que précaire !

Puis nous avons herborisé dans ce qui reste du marais de l'Aqua Dolce : entre le fossé et la petite route.


<i>Aegilops neglecta</i>	<i>Atriplex prostrata</i>	<i>Catapodium maritimum</i>
<i>Aira sp.</i>	<i>Bellardia trixago</i> (Bartsia)	<i>Dittrichia viscosa</i>
<i>Allium roseum</i>	<i>Beta maritima</i>	<i>Dorycnium herbaceum</i> subsp <i>gracile</i>
<i>Allium subhirsutum</i>	<i>Blackstonia perfoliata</i>	<i>Erodium cicutarium</i>
<i>Anagallis arvensis</i> ssp <i>parviflora</i>	<i>Bolboschoenus maritimus</i>	<i>Ferula communis</i>
<i>Anthemis maritimum</i>	<i>Briza maxima</i>	<i>Festuca arundinacea</i>
<i>Arbutus unedo</i>	<i>Briza media</i>	<i>Galactites elegans</i>
<i>Artemisia arborescens</i>	<i>Cakile maritima</i>	<i>Gladiolus italicus</i>
<i>Artemisia caerulea</i>	<i>Carex cuprina</i>	<i>Halimione portulacoides</i>
<i>Asparagus acutifolius</i>	<i>Carex distans</i>	<i>Hedypnois rhagadioloides</i>
<i>Aster tripolium</i>	<i>Carex divisa</i>	<i>Hordeum maritimum</i>
<i>Atriplex halimus</i>	<i>Carex extensa</i>	<i>Hypochaeris achyrophorus</i>
	<i>Carex lachenalii</i>	

Inula crithmoides
Juncus acutus
Juncus bufonius
Juncus capitatus
Juncus maritimus
Juncus pygmaeus
Lagurus ovatus
Lathyrus clymenum
Lathyrus sphaericus
Limoniastrum monopetalum
Limonium narbonense
Limonium virgatum
Linum bienne
Limonium dubium
Medicago littoralis
Medicago orbicularis
Medicago polymorpha
Melilotus sulcatus
Ononis reclinata
Ophrys incubacea
Ornithopus compressus
Papaver dubium
Papaver rhoeas

Parapholis filiformis
Parapholis incurva
Parentucella viscosa
Plantago coronopus
Plantago crassifolia
Psilurus incurvus
Puccinellia festuciformis
Reichardia picroides
Rhamnus alaternus
Romulea ramiflora
Sarcocornia fruticosa.
Schoenus nigricans
Scirpoides holoschoenus
Scorpiurus muricatus
Serapias lingua
Serapias parviflora
Serapias vomeracea
Sherardia arvensis
Silene coelirosa
Silene gallica
Silene sericea
Silybum marianum
Sonchus maritimus

Spergularia media
Spergularia rubra
Tamaris africana
Trifolium angustifolium
Trifolium bocconeii
Trifolium campestre
Trifolium pannonicum
Trifolium resupinatum
Trifolium scabrum
Trifolium striatum
Trifolium tomentosum
Triglochin bulbosum subsp
barrelieri
Urospermum dalechampii
Vicia bithynica
Vicia disperma
Vicia hirsuta
Vicia parviflora
Vicia sativa
Vitex agnus-castus
Vulpia fasciculata

Vendredi 9 mai : dunes de l'Ostriconi et garrigues de Lozari



Lieux d'herborisation du 9 mai

Les dunes de l'Ostriconi représentent un ensemble sableux dans la cote occidentale, à l'embouchure de l'Ostriconi et de son affluent (Piobetta).

Cette zone est encadrée par la côte rocheuse avec au nord-est les granites du Désert des Agriates.

Nous traversons plusieurs milieux. :

à partir de la petite route (150m d'altitude au sud de la plage) nous descendons à la plage par un sentier assez raide taillé dans un flysch du Crétacé supérieur, avec alternance de lits de calcaires marneux et de lits de calcite. Nous traversons un maquis bas, à lentisques, cistes, filaires, calicotomes, arbousiers, oliviers, avec progressivement des plantes halophiles près des rochers inférieurs.

La plage, traversée par les méandres de l'Ostriconi et de son affluent, est occupée par un important troupeau de bovins. G. Paradis, dans le Monde des Plantes n° 446, décrit une association de dunes dégradée par le pâturage sur le littoral de cette côte. Cette association est caractérisée par 3 espèces dominantes que nous avons effectivement relevées : *Plantago coronopus*, *Lotus cytisoides* ssp. *Conradae* et *Silene succulenta* ssp. *corsica*. Dans cette partie pâturée, les feuilles sèches de Posidonies en bourrelets et en boules sont assez nombreuses, ce qui indique l'importance des herbiers sous-marins.

En s'éloignant du bord de mer vers l'intérieur, les premiers sables fixés sont colonisés par des poacées, seule *Cutandia maritima* montrait ses inflorescences. A côté nous notons *Calystegia soldanella*.

Au bord de la rivière, des roselières avec joncs, scirpes et carex.

En arrière de cette première zone, des systèmes de sables fixés et de dunes se succèdent théoriquement selon le degré de salinité. En fait les différentes zones ont été assez bouleversées et nous observons de nombreuses mosaïques entre elles. Nous remarquons particulièrement des sables fixés colonisés par les genévriers à gros fruits qui supportent bien les embruns.

Entre les dunes, les dépressions sont riches en espèces herbacées annuelles ou vivaces (hemicryptophytes, therophytes, géophytes...) ainsi les malcolmies, les mathioles, les immortelles, le crépis bulbeux, les euphorbes. Beaucoup de ces plantes sont pubescentes, laineuses, ce qui les protège du vent, du sable ; quant aux poils collants du silène succulent ils agglomèrent les grains de sable.

Les premières dunes protègent une autre zone de sables fixés, dite « arrière dune », colonisée par les éphédras, les cistes, les genêts avec de nombreuses herbacées. Cette zone s'élève progressivement vers les pinèdes implantées par l'homme.

1- Espèces relevées dans la descente à la plage depuis la route :

<i>Aegilops neglecta</i>	<i>Erica arborea</i>	<i>Phillyrea angustifolia</i>
<i>Allium triquetrum</i>	<i>Fumaria capreolata</i>	<i>Piptatherum miliaceum</i>
<i>Arbutus unedo</i>	<i>Halimium portulacoides</i>	<i>Pistacia lentiscus</i>
<i>Asparagus acutifolius</i>	<i>Hedypnois rhagadioloides</i>	<i>Pulicaria odorata</i>
<i>Asphodelus ramosus</i>	<i>Hirschfeldia incana</i>	<i>Quercus coccifera</i>
<i>Bartsia trixago</i>	<i>Hyoseris radiata</i>	<i>Rubia peregrina</i>
<i>Beta maritima</i>	<i>Juniperus oxycedrus</i>	<i>Ruscus aculeatus</i>
<i>Calicotome spinosa</i>	<i>Lagurus ovatus</i>	<i>Sherardia arvensis</i>
<i>Catapodium maritimum</i>	<i>Limonium dubium</i>	<i>Smilax aspera</i>
<i>Catapodium rigidum</i>	<i>Linum strictum</i>	<i>Stellaria media</i>
<i>Cistus creticus</i> ssp. <i>corsicus</i>	<i>Lonicera implexa</i>	<i>Tamus communis</i>
<i>Cistus monspeliensis</i>	<i>Lotus cytisoides</i> ssp. <i>cytisoides</i>	<i>Trifolium stellatum</i>
<i>Dactylis hispanica</i>	<i>Medicago polymorpha</i>	<i>Urospermum picroides</i>
<i>Daphne gnidium</i>	<i>Olea europaea</i>	<i>Urtica pilulifera</i>
<i>Dorycnium hirsutum</i>	<i>Ononis reclinata</i>	<i>Valerinella</i> sp.
<i>Dorycnium pentaphyllum</i>	<i>Parentucella latifolia</i>	

2- Approche de la plage et plage :

<i>Aegilops ovata</i>	<i>Helichrysum italicum</i>	<i>Plantago coronopus</i>
<i>Aethorhiza bulbosa</i>	<i>Lathyrus clymenum</i>	<i>Posidonia oceanica</i>
<i>Allium roseum</i>	<i>Limonium dubium</i>	<i>Reichardia picroides</i>
<i>Beta maritima</i>	<i>Lotus cytisoides ssp</i>	<i>Rubia peregrina</i>
<i>Cakile maritima</i>	<i>conradiae</i>	<i>Vicia bithynica</i>
<i>Euphorbia pithyusa</i>	<i>Ononis reclinata</i>	
<i>Euphorbia exigua</i>	<i>Parapholis incurva</i>	

3-Dunes et bord de l'Ostriconi :

<i>Aeluropus littoralis</i>	<i>Juncus maritimus</i>	<i>Rumex bucephalophorus</i>
<i>Bolbochoenus maritimus</i>	<i>Juniperus oxycedrus</i>	<i>Salsola kali</i>
<i>Calystegia soldanella</i>	subsp.macrocarpa	<i>Samolus valerandi</i>
<i>Carduus pycnocephalus</i>	<i>Lotus cytisoides ssp.</i>	<i>Schoenoplectus lacustris</i>
<i>Cerastium pumilum</i>	<i>conradiae</i>	<i>Silene gallica</i>
<i>Corynephorus articulatus</i>	<i>Malcomia ramosissima</i>	<i>Silene nicaensis</i>
<i>Cutandia maritima</i>	<i>Matthiola sinuata</i>	<i>Silene succulenta ssp</i>
<i>Ephedra distachya</i>	<i>Medicago littoralis</i>	<i>corsica</i>
<i>Eryngium maritimum</i>	<i>Medicago marina</i>	<i>Sylibum marianum</i>
<i>Euphorbia hirsuta</i>	<i>Parentucella viscosa</i>	<i>Tamaris africana</i>
<i>Euphorbia paralias</i>	<i>Paronychia argentea</i>	<i>Trifolium angustifolium</i>
<i>Helichrysum italicum</i>	<i>Phleum arenarium</i>	<i>Vulpia fasciculata</i>
<i>Inula crithmoides</i>	<i>Plantago coronopus</i>	
<i>Juncus acutus</i>	<i>Polygonum maritimum</i>	

4- Arrière-dune à éphedra :

<i>Anthemis arvensis</i>	<i>Euphorbia hirsuta</i>	<i>Paronychia argentea</i>
<i>Anthemis mixta (Ormenis,</i>	<i>Filago vulgaris</i>	<i>Petrorhagia saxifraga ssp</i>
<i>Cladanthus...)</i>	<i>Fumaria capreolata</i>	<i>gasparrinii</i>
<i>Arenaria serpyllifolia</i>	<i>Genista salzmanii</i>	<i>Petrorhagia velutina</i>
<i>Artemisia campestris</i>	<i>Geranium robertianum</i>	<i>Scirpoides holoschoenus</i>
<i>Briza maxima</i>	ssp.purpureum	<i>Sedum stellatum</i>
<i>Calendula arvensis</i>	<i>Gomphocarpus fruticosus</i>	<i>Silene gallica</i>
<i>Campanula rapunculus</i>	<i>Hypocoum procumbens</i>	<i>Stipa capensis</i>
<i>Carex distachya</i>	<i>Juncus bufonius</i>	<i>Trifolium cherleri</i>
<i>Centaurium maritimum</i>	<i>Lagurus ovatus</i>	<i>Trifolium angustifolium</i>
<i>Centranthus calcitrapae</i>	<i>Linum trigynum</i>	<i>Trifolium campestre</i>
<i>Cistus creticus</i>	<i>Ononis diffusa</i>	<i>Trifolium resupinatum</i>
<i>Cistus monspeliensis</i>	<i>Ononis reclinata</i>	<i>Trifolium scabrum</i>
<i>Clematis flammula</i>	<i>Ononis variegata</i>	<i>Trifolium tomentosum</i>
<i>Ephedra distachya</i>	<i>Ornithopus compressus</i>	<i>Umbilicus rupestris</i>
<i>Erodium cicutarium</i>	<i>Parentucella viscosa</i>	

5 – Après-midi : région de Lozari.

Entre le désert des Agriates et l'Île Rousse, la côte expose des flysch de l'éocène constitués par une alternance de lits schisteux, marneux, gréseux. Les dépôts détritiques reposent sur le socle par l'intermédiaire de poudingues et de grés, puis des marnes calcaires. Dans cette zone, à partir de la route N197, nous explorons une garrigue :

Allium roseum
Arbutus unedo
Astragalus hamosus
Borago officinalis
Bituminaria bituminosa
Blakstonia perfoliata
Calicotome spinosa
Campanula erinus
Campanula rapunculus
Catapodium rigidum
Centaurea melitensis
Centaureum tenuiflorum
Chrysanthemum myconis
(Coleostephus)
Cistus creticus
Cistus monspeliensis
Cytinus hypocistis ssp. *clusii*
Daphne gnidium
Dorycnium pentaphyllum
Dittrichia viscosa
Echium plantagineum
Fumaria officinalis

Galactites elegans
Geranium robertianum
 ssp. *purpureum*
Geranium rotundifolium
Globularia alypum
Hirschfeldia incana
Hymenocarpus circinnatus
Hyoseris radiata
Lathyrus clymenum
Linum corymbosum
Linum strictum
Linum trigynum
Lotus cytisoides
Lotus ornithopodioides
Medicago arabica
Melilotus officinalis
Nigella damasonia
Olea europea
Ononis ornithopodioides
Ononis reclinata
Oxalis pes-caprae
Papaver rhoeas

Papaver somniferum ssp. *setigerum*
Pistacia lentiscus
Polycarpon tetraphyllum
Rostraria cristata
Ruta angustifolia
Scorpiurus muricatus ssp. *villosus*
Senecio transiens
Smilax aspera
Stachys glutinosa
Tamus communis
Theligonum cynocrambe
Trifolium arvense
Trifolium tomentosum
Tripodion tetraphyllum
Urospermum dalechampii
Valerianella microcarpa
Vicia bithynica
Vicia hybrida
Vicia parviflora
Vicia pubescens

6 – Plage de Lozari :

Corrigiola litoralis
Cardaria draba
Lupinus augustifolius

Astragalus pelecinus (ex
biserrulata pelecinus)
Ornithopus pinnatus

Melilotus neapolitanus

Samedi 10 mai : Le Monte Stello depuis le village de Pozzo.



1 - Espèces notées dans la montée depuis Pozzo (227m) jusqu'à la source (840m) :

<i>Anthyllis vulneraria</i> ssp <i>rubrifolia</i>	<i>Asphodelus macrocarpus</i> ssp <i>macrocarpus</i>	<i>Lupinus micranthus</i>
<i>Arbutus unedo</i>	<i>Cistus salviifolius</i>	<i>Stachys glutinosa</i>
	<i>Daphne gnidium</i>	<i>Tuberaria lignosa</i>
		<i>Urtica atrovirens</i>

2 - Autour de la source :

<i>Anthoxanthum</i>	<i>Cerastium boissierianum</i>	<i>Orchis papilionacea</i>
<i>Anthyllis hermanniae</i>	<i>Cistus salviifolius</i>	<i>Orchis tridentata</i>
<i>Bellium bellidoides</i>	<i>Erica arborea</i>	<i>Peucedanum paniculatum</i>
<i>Borago pygmaea</i>	<i>Euphorbia gayi</i>	<i>Thymus herba-barona</i>
<i>Bunium alpinum</i> ssp. <i>corydalinum</i>	<i>Euphorbia spinosa</i>	<i>Viola corsica</i>
<i>Cardamine plumieri</i>	<i>Genista corsica</i>	
	<i>Orchis morio</i>	

3 - En montant au col et au col , Bocca di Santa Maria (1097m) :

<i>Bellium bellidoides</i>	<i>Bunium alpinum</i>	<i>Minuartia</i> sp.
<i>Brimeura fastigiata</i> (<i>Hyacinthus</i>)	<i>Cardamine plumieri</i>	<i>Morisia monanthos</i>
	<i>Hypochaeris robertia</i>	

4 - Avant-sommet et sommet du Monte Stello (1307m) :

<i>Alyssum robertianum</i>	<i>Orchis tridentata</i>	<i>Saponaria ocymoides</i> ssp.
<i>Anthyllis hermanniae</i>	<i>Orchis mascula</i>	<i>alsinoides</i>
<i>Anthyllis vulneraria</i> ssp. <i>rubrifolia</i>	<i>Serapias cordigera</i>	<i>Sedum</i> sp.
<i>Armeria leucocephala</i>	<i>Morisia monanthos</i>	<i>Thlaspi brevistylum</i>
<i>Crocus corsicus</i>	<i>Saxifraga pedemontana</i> ssp.	<i>Peucedanum paniculatum</i>
<i>Dactylorhiza insularis</i>	<i>cervicornis</i>	<i>Hypericum hircinum</i>
<i>Orchis provincialis</i>	<i>Viola</i> sp.	<i>Arenaria balearica</i>
	<i>Euphorbia spinosa</i>	

Dimanche 11 mai : gorge de la Strutta, Fiume Albino, Cathédrale du Nebbio



1 - Herborisation autour du ruisseau La Strutta, de part et d'autre du pont sur le ruisseau :

Achillea ligustica
Aegilops ovata
Allium subhirsutum
Allium roseum
Asparagus acutifolius
Asphodelus ramosus
Asterolinon linum-stellatum
Avellinia michelii
Avena sterilis
Briza maxima
Bromus tectorum
Calendula arvensis
Centaurium tenuifolium
Cistus monspeliensis
Coronilla valentina ssp.
glauca
Crepis vesicaria
Cynosurus echinatus
Dactylis hispanica

Dittrichia viscosa
Erodium malacoides
Euphorbia helioscopia
Ficus carica
Fraxinus ornus
Geranium colombinum
Hedypnois rhagadioloides
Hyparrhenia hirta
Hypochaeris achyrophorus
Lagurus ovatus
Lathyrus annuus
Lotus cytisoides
Medicago polymorpha
Myrtus communis
Olea europaea
Ophrys incubacea
Orchis anthropophora
Orchis papilionacea
Ornithogalum narbonense

Papaver dubium
Picris hieracioides
Plantago afra
Raphanus raphanistrum
Reichardia picroides
Sanguisorba minor
Sedum andegavense
Selaginella denticulata
Serapias parviflora
Serapias vomeracea
Smyrnum olusatrum
Stachys glutinosa
Teucrium marum
Tragopogon porrifolius
Trifolium stellatum
Urospermum picroides
Vulpia ciliata

2 – Un peu plus loin, en bordure de route :

Anthyllis rubriflora
Bartsia trixago
Bituminaria bituminosa
Blackstonia perfoliata
Borago officinalis
Bromus rubens
Campanula erinus
Carduus tenuifolius
Catapodium rigidum
Cistus creticus ssp. *corsicus*
Convolvulus altheoides
Convolvulus cantabricus
Crupina crupinastrum
Daucus sp.
Erodium moschatum
Euphorbia helioscopia
Foeniculum vulgare
Fumana laevipes
Fumaria capreolata

Geranium rotundifolium
Geranium lucidum
Geranium robertianum ssp.
purpureum
Globularia alypum
Hyoseris radiata
Hypochaeris achyrophorus
Knautia integrifolia
Linum strictum
Lonicera implexa
Lotus edulis
Medicago minima
Medicago orbicularis
Medicago monspeliensis (ex
trigonella)
Melilotus neapolitanus
Misopathes orontium
Ononis reclinata
Petrorhagia sp.

Phagnalon saxatile
Phagnalon sordidum
Phagnalon rupestre
Phillyrea media
Pistacia lentiscus
Rhamnus alaternus
Rosmarinus officinalis
Rostraria cristata
Sherardia arvensis
Stipa capensis
Teucrium marum
Thelygonum cynocrambe
Trifolium campestre
Trigonella monspeliensis
Tripodion tetraphyllum
Urospermum dalechampii
Valantia muralis
Vicia cracca

3 – Plage vers la Punta di Saeta :

Atriplex próstata
Beta maritima
Cakile maritima
Catapodium marinum
Crithmum maritimum
Daucus carota ssp.
hispanicus
Dorycnium hirsutum
Euphorbia pithyusa

Frankenia laevis
Frankenia pulverulenta
Gagea sp.
Glaucium flavum
Helichrysum italicum
Hymenolobus procumbens
Limonium articulatum
Limonium patrimonense
Limonium sp.

Lolium rigidum
Lotus cytisoides
Medicago marina
Obione portulacoides
(Halimione)
Parapholis incurva
Plantago coronopus
Polygonum maritimum
Reichardia picroides

<i>Romuela</i> sp.	<i>Sonchus bulbosus</i> (<i>Aethorhiza</i>)	<i>Sporobolus pungens</i> <i>Sueda maritima</i> (<i>spicata</i>) <i>Valantia muralis</i>
<i>Senecio cineraria</i> <i>Silene sericea</i>	<i>Spergularia rubra</i>	

4 - : Prospection de part et d'autre du lit du ruisseau Fiume Albino :

<i>Allium triquetrum</i> <i>Anagalis arvensis</i> <i>Arundo donax</i> <i>Atriplex prostrata</i> <i>Beta maritima</i> <i>Borago officinalis</i> <i>Briza maxima</i> <i>Bromus inermis</i> <i>Calicotome spinosa</i> <i>Carduus pycnocephalus</i> <i>Carex extensa</i> <i>Catapodium rigidum</i> <i>Chondrilla juncea</i> <i>Cistus creticus</i> <i>Cynosurus echinatus</i> <i>Dittrichia viscosa</i> <i>Echium gr. italicum</i>	<i>Equisetum ramosissimum</i> <i>Euphorbia segetalis</i> ssp. <i>pinea</i> <i>Foeniculum vulgare</i> <i>Fumaria capreolata</i> <i>Galium aparine</i> <i>Galium corsicum</i> <i>Hypericum hircynum</i> <i>Juncus acutus</i> <i>Juncus bufonius</i> <i>Lathyrus clymenum</i> <i>Lonicera etrusca</i> <i>Melica minuta</i> ssp. <i>major</i> <i>Melilotus neapolitanus</i> <i>Nerium oleander</i> <i>Parietaria judaica</i> <i>Phalaris arundinacea</i>	<i>Plantago coronopus</i> <i>Rhaphanus raphanistrum</i> ssp. <i>sativum</i> <i>Rosa sempervirens</i> <i>Samolus valerandi</i> <i>Scandix pecten veneris</i> <i>Silene gallica</i> <i>Sonchus tenerrimus</i> <i>Sonchus bulbosus</i> (ex <i>Aethorhiza</i>) <i>Spartium junceum</i> <i>Stachys glutinosa</i> <i>Tamaris</i> sp. <i>Torilis arvensis</i> <i>Urospermum dalechampii</i> <i>Veronica anagalis-aquatica</i> <i>Vitex agnus-castus</i>
--	--	---

5 – Falaises calcaires proche de la Grotta di u Banditu :

<i>Anthyllis hermanniae</i> <i>Argyrolobium zanonii</i> <i>Avena fatua</i> <i>Cistus creticus</i> <i>Convolvulus altheoides</i> <i>Coronilla scorpioides</i> <i>Coronilla valentina</i> <i>Crupina crupinastrum</i> <i>Dittrichia viscosa</i>	<i>Dorycnium hirsutum</i> <i>Dorycnium pentaphyllum</i> <i>Genista corsica</i> <i>Globularia alypum</i> <i>Hyparrhenia hirta</i> <i>Linum strictum</i> <i>Lonicera implexa</i> <i>Lotus cytisoides</i> <i>Misopathes oruntium</i>	<i>Ononis natrix</i> <i>Phagnalon sordidum</i> <i>Pistacia lentiscus</i> <i>Rapistrum rugosum</i> <i>Rhamnus alaternus</i> <i>Rosmarinus officinalis</i> <i>Ruta chalepensis</i> <i>Stachys glutinosa</i> <i>Urospermum dalechampii</i>
---	---	---

6 – Retour à St Florent. Cathédrale du Nebbio : grande chapelle au sud-ouest de St Florent.
Prospection à partir de ce monument vers des friches et terres agricoles (messicoles et orchidées) :

<i>Aegilops ovata</i> <i>Agropyron caninum</i> (<i>Elymus</i>) <i>Allium roseum</i> <i>Andryala integrifolia</i> <i>Bartsia trixago</i> <i>Briza maxima</i> <i>Bunias erucago</i> <i>Calicotome spinosa</i> <i>Carthamus caeruleus</i> = <i>Onobroma caeruleus</i> <i>Celtis australis</i> <i>Cistus monspeliensis</i>	<i>Coleostephus myconis</i> <i>Cyclamen repandum</i> <i>Daphne gnidium</i> <i>Echium plantagineum</i> <i>Emex spinosa</i> <i>Eucalyptus</i> sp. <i>Ficus carica</i> <i>Gladiolus dubius</i> <i>Hirschfeldia incana</i> <i>Knautia integrifolia</i> <i>Lathyrus annuus</i> <i>Lathyrus cicera</i> <i>Lathyrus latifolius</i>	<i>Lotus angustissimus</i> var <i>suaveolens</i> <i>Lotus ornithopoides</i> <i>Lupinus micranthus</i> <i>Medicago orbicularis</i> <i>Medicago truncatula</i> <i>Myrtus communis</i> <i>Ornithopus compressus</i> <i>Pallenis spinosa</i> <i>Papaver setigerum</i> <i>Pistacia lentiscus</i> <i>Plantago afra</i> <i>Polygonum aviculare</i>
--	---	---

Potentilla reptans
Quercus ilex
Raphanus raphanistrum

Serapias nurrica
Serapias lingua
Silene gallica

Silybum marianum
Trifolium angustifolium
Torilis nodosa
Vicia bithynica

Lundi 12 Mai : Vallon de Sisco, terrain acide, recherche de fougères. Temps pluvieux.



A partir de la Marine de Sisco, nous remontons la vallée de Sisco pour dépasser Moline. Prospection le long de la route, souvent en bordure du torrent Sisco. Arrivé à un pont sur le torrent, nous suivons son lit abrupt pour observer en particulier *Woodwardia radicans*. La pluie se fait insistante et nous décidons de rentrer déjeuner à St Florent.

Espèces relevées :

Achillea ligustica
Adiantum capillus-veneris
Allium triquetrum
Alnus cordata
Alnus glutinosa
Ammi majus
Anemone hortensis
Anogramma leptophylla
Anthoxanthum odoratum
Arisarum vulgare
Aristolochia rotunda
Asparagus acutifolius
Asplenium onopteris
Asplenium trichomanes
Athyrium filix-femina
Bellis annua
Bituminaria bituminosa
Brachypodium sylvaticum
Campanula rapunculus
Cardamine chelidonia
Cardamine hirsuta
Carex acutiformis
Carex distachya
Carex divulsa

Carex microcarpa
Carex olbiensis
Carex pendula
Carex remota
Carex sylvatica
Chaerophyllum temulum
Cistus salviifolius
Cruciata glabra
Cyclamen repandum
Cytisus villosus
Coleostephus myconis
Epipactis sp.
Equisetum telmateia
Erica arborea
Euphorbia peplis
Galium aparine
Galium scabrum
Geranium purpureum
Geranium robertianum
Geranium colombinum
Geranium lucidum
Geum urbanum
Helleborus lividus
Hieracium sp.


Hyoseris radicata
Hypericum montanum
Lathyrus venetus
Laurus nobilis
Linum bienne
Lotus ornithopoides
Luzula forsteri
Melica minuta
Melissa officinalis
ssp. altissima
Mercurialis perennis
Moehringia pentandra
Myosoton aquaticum
Myrtus communis
Ornithopus compressus
Parietaria judaica
Phyllitis scolopendrium
Pulicaria odora
Polypodium cambricum
Polystichum setiferum
Pteridium aquilinum
Quercus ilex
Ranunculus bulbosus

Rubia peregrina
ssp. longifolia
Ruscus aculeatus
Sanicula europaea
Scrofularia trifoliata
var. trifoliata
Sedum cepaea
Selaginella denticulata
Sherardia arvensis

Silene gallica
Sisymbrium officinale
Smilax aspera
Symphytum bulbosum
Stachys sylvatica
Tamus communis
Teucrium scorodonia
Thelygonum cynocrambe
Torilis nodosa

Umbilicus rupestris
Viburnum tinus
Vicia pubescens (ex
tetrasperma ssp pubescens)
Vicia sativa
Viola riviniana
Woodwardia radicans

Mardi 13 mai : retour sur Bastia, Lido de la Marana, lagune, bord de mer.



1- Bord de mer, le long des plages de la Marana :

Ammophila arenaria
Anthemis maritima
Briza maxima
Cakile martima
Calystegia soldanella
Centaurea sphaerocephala
Chamaemelum mixtum
(Anthemis, Cladanthus)
Cutandia maritima
Cyperus capitatus
Echinophora spinosa

Echium plantagineum
Elytrigia juncea
Eryngium maritimum
Euphorbia paralias
Gaudinia fragilis
Halimium halimifolium
Lupinus angustifolius
Malcolmia ramosissima
Mathiola sinuata
Medicago marina

Otanthus maritimus
(Achillea maritima)
Parentucella viscosa
Psilurus aristatus (incurvus)
Scirpoides holoschoenus
Silene gallica
Trifolium angustifolium
Trifolium cherleri
Tuberaria guttata
Vulpia fasciculata

2 - Accès à l'île de San Damiano (réserve naturelle de l'étang de Biguglia) : milieux humides, champs et messicoles :

Achillea ligustica

Allium roseum

Arundo donax

Bunias erucago
Cytisus villosus
Gladiolus dubius
Glebionis segetum
Lathyrus latifolius

Senecio aquaticus ssp.
erraticus (inflor en
corymbe)
Sonchus maritimus
Spergula pentandra

Spergularia sp.
Tolpis barbata
Trifolium angustifolium
Trifolium cherleri
Trigonella foenum-graecum

3 - Sentier découverte de la Marana (le tout début, le sentier inondé est impraticable) :

Centaurium maritimum
Cistus salviifolius
Festuca arundinacea
Inula crithmoides

Juncus acutus
Juncus bufonius
Juncus hybridus
Plantago coronopus

Ranunculus arvensis
Schoenus nigricans

