



# L'Échange, Revue Linnéenne

## Coléoptères du globe (suite)



**Niptus testaceus** n. sp. [Ptinide]. Rufus, elytris pedibusque pallidioribus, pro majore parte dense albo pubescens, elytris globulosis, sparse griseo pubescentibus et longe hirsutis, parum fortiter lineato-punctatis; thorace parum lato, postice strangulato, dense punctato. Long. 2 mill. Erythrée. — A placer près de *Hilleri* Reit.

**Mezioniptus** (s.-g. n. de *Mezium* Curtis). Thorace elongato, supra triimpresso, postice angustato; elytris parum elongatis, antice valde attenuatis. Etabli pour l'espèce suivante.

**M. impressicollis** n. sp. [Ptinide]. Elongatus, niger, dense griseo pubescens; elytris nitidis, sparse pilosis et hirsutis, nigro-piceus, capite rufo. L. 3 mill. Chine.

**Trichodesma Thereseæ** n. sp. [Anob.]. Minutus, curtus et latus, longe hirsutus, niger, dense albo pubescens et supra pro parte luteo-fulvo pubescens, elytris multi et breve piceo lineatis, ad suturam ante medium nigro fasciculatis; thorace elytris angustiore, medio gibbuloso et fulvo hirsuto; antennis tarsisque rufis. L. 3 mill. Costa-Rica. — Jolie petite espèce, à placer près de *scripta* Ch., très caractérisée par son revêtement particulier.

**Hedobia multipunctata** n. sp. [Anob.]. Oblongo-elongatus, subopacus, griseo pubescens, niger, humeris rufo-notatis, antennis rufis; capite thoraceque dense punctatis, illo postice medio elevato et lateraliter impresso; elytris multi et parum fortiter lineato-punctatis, vage costulatis. L. 7 mill. Chine. — Très distinct de *minor* Pic par la ponctuation moins forte, plus régulière des élytres avec les épaules marquées de roux.

**Theca Thereseæ** n. sp. [Anob.]. Oblongus, antice et postice attenuatus, albo pubescens et hirsutus, nitidus, niger, elytris pro parte paulo rufescentibus; thorace antice attenuato, fortiter, medio non dense punctato; elytris fortiter striato-punctatis, intervallis parum punctatis. L. 1,5 mill. Afr. Or. — Voisin de *Madoni* Pic, en diffère, à première vue, par le thorax fortement ponctué.

**Melitoma pubicollis** n. sp. [Lymex]. Angustatus, opacus, griseo pubescens, nigro fuliginosus, pro parte rufescens, elytris ad suturam anguste et apice rufis, pedibus pro parte rufis; capite, thorace pro majore parte scutelloque dense albo pubescentibus; abdomine longe prominulo. L. 12 mill. Basilan. — Ressemble à *submarginatum* Pic, facile à reconnaître par la pubescence de l'avant-corps, l'abdomen plus long.

**Phæochrous latus** n. sp. [Lamel.]. Grandis et latus, parum nitidus, rufescens, ca-

(1) Toutes les nouveautés décrites sont dans la collection Pic; plusieurs sont dédiées à la mémoire de ma femme, en souvenir de son aide continue.

pite postice, thorace medio elytrisque in medio paulo obscurioribus ; capite minutissime et sparse punctato ; thorace parum breve, in disco minute, lateraliter fortiore, sparse punctato ; elytris subarcuatis, sat minute aut regulariter punctatis, in disco medio vage tricostulatis. Long. 18 mill. Congo : Ronda. — Peut se placer près de *gigas* Sch. Caractérisé par sa forme plus élargie que d'ordinaire et sa taille avantageuse.

**P. striatus** n. sp. Oblongus, parum nitidus, rufus, capite paulo sparse et minute punctato ; thorace diverse punctato ; elytris lateraliter subarcuatis, minute et distincte striatis, striis sat fortiter punctatis, intervallis angustatis et prominulis. L. 12 mill. Sénégal. — Très caractérisé par sa sculpture élytrale.

**Antixoon maculatum** n. sp. [Malac.] Oblongo-elongatus, parum nitidus, griseo pubescens, diversicolor, capite thoraceque rufis, illo lateraliter pallidiore, elytris nigris, testaceo maculatis, maculis pro parte punctatis ; membris testaceis ; thorace breve, late marginato ; elytris parum elongatis, profunde et irregulatiè punctatis. L. 2,5 mill. Chili. — Très distinct par ses élytres foncés à dessins clairs.

**A. semirufum** mihi, du Chili, voisin du précédent, offre une coloration générale rousse ou testacée avec les élytres marqués de noir de poix sur leur base, sur les côtés antérieurs et ornés, peu après le milieu, de traits de différentes longueurs, l'abdomen est foncé.

**Laius Theresæ** n. sp. ♀ [Malac.]. Elongatus, nitidus, nigro-viridescens, antennis ad basin rufis, thorace rubro, medio nigro notato, elongato ; elytris rubris, in singulo ad basin, postice externe et apice nigro-viride notatis, ante apicem externe paulo albo signatis. L. 3,5 mill. Chine : Yunnan. Dédié à la mémoire inoubliable de ma femme et collaboratrice. — Voisin de *semilimbatus* Pic par son dessin élytral, mais thorax plus étroit, autrement coloré.

**L. Fouqueti** n. sp. ♂ Parum elongatus, nitidus, nigro-viridescens, elytris ad medium late et recte luteo fasciatis, antennis ad basin testaceis, articulo 1° nigro notato, parum lato, 3° valde dilatato et excavato. L. 3 mill. Indo-Chine. — Plus allongé que *fasciatus* Brg. et structure des antennes différente.

**L. tasmanicus** n. sp. ♀ Oblongus, nitidus, nigro-metallicus, elytris cyaneis, ad medium anguste luteo sinuate-fasciatis et apice intus luteo maculatis, his inæqualibus, pro parte fortiter punctatis ; antennis robustis. L. 3 mill. Tasmanie. — Peut se placer près de *cinctus* Redt., qui a le thorax clair.

**L. pilosifrons** n. sp. ♂. Oblongo-elongatus, parum nitidus, griseo-pubescens (capite antice densiore pubescente), niger, elytris in singulo et in disco antice et postice albo maculatis, antennis (articulo ultimo nigro) et pedibus anticis pro majore parte testaceis ; capite ad oculos profunde et late sulcato ; articulo 1° antennarum valido, subtriangulare, 3° parum dilatato, supra foveolato. L. 2,5 mill. Sebesi. — Espèce très caractérisée par la sculpture et la pubescence de la tête.

**L. apicicornis** mihi, du Tonkin, voisin du précédent, s'en distingue par la tête plus robuste, à courte impression préoculaire, le 1<sup>er</sup> article des antennes moins large, le 3<sup>e</sup> plus creusé.

**L. Coomani** n. sp. ♂. Oblongus, griseo pubescens, parum nitidus, niger, elytris

opacis, in singulo ante et post medium albo maculatis, membris nigris, articulo 3° antennarum testaceo, illo valde dilatato, subtriangulare ; capite insulcato. L. 2 mill. Tonkin. — Distinct du précédent par la tête simple, la coloration et structure des antennes différentes.

**L. testaceicornis** n. sp. ♀. Oblongo-elongatus, opacus, paulo pubescens, niger, elytris in singulo ante et post medium late albo maculatis, antennis testaceis, articulo 1° supra nigro, ultimo paulo obscuriore, 3° elongato et parum lato ; pedibus nigris, tibiis anticis tarsisque testaceis. L. 3 mill. Palawan. — Voisin de *palawanus* Pic, distinct par la coloration des antennes et les macules élytrales plus grandes.

**L. semijunctus** n. sp. ♂. Oblongo-elongatus, opacus, niger, capite antice, antennis, illis apice piceis, et pedibus anticis pro parte testaceis ; elytris in singulo ad suturam late albo-luteo maculatis et postice reducte transverse albo-luteo fasciatis ; capite antice et externe carinato ; articulis 1° et 3° antennarum transversis et irregulariter constrictis. L. 3 mill. Java. — Voisin de *borneensis* Pic, mais macules antérieures plus grandes et se joignant sur la suture.

**Microzophobas** n. g. [Héter.]. Corpus sat angustatus ; antennis thorace longe superantibus, capite elongato et angustato, insulcato, oculis minutis ; epistome truncato ; thorace non transverso et postice attenuato ; elytris antice attenuatis ; pedibus sat gracilibus. Voisin du genre *acanthobas* Geb., mais cuisses antérieures simples, tête différente, antennes à derniers articles moins larges, etc. ; établi pour l'espèce suivante.

**M. luteomaculatus** n. sp. Opacus, niger, elytris in disco ante et post medium, luteo maculatis, his striatis, intervallis subconvexis ; capite thoraceque minute et dense punctatis. L. 14 mill. Brésil.

**Nesotaurus bicoloripes** n. sp. [Héter.]. Elongatus, parum nitidus, paulo pubescens, niger, palpis, antennis, tibiis tarsisque rufis ; capite thoraceque dense ruguloso-punctatis ; thorace parum transverso, antice angustiore, ad basin impresso ; elytris thorace latioribus, elongatis, postice attenuatis, fortiter striatis, intervallis paulo elevatis et punctatis. L. 12-15 mill. Madagascar. — A placer près de *sericans* Frm.

**Anthicus cubanus** n. sp. [Héter.]. Elongatus, parum nitidus, griseo pubescens, rufus, membris et elytris testaceis, his post medium late et ad apicem minute piceo fasciatis ; capite thorace latiore, postice subarcuato, parum punctato, thorace dense punctato, parum elongato, postice strangulato, elytris latis, parum elongatis, minute punctatis. L. 3 mill. Cuba. — Peut se placer près de *cervinus* Laf.

**Zonabris nubica v. n. Espinassei.** [Héter.]. Les deux fascies médianes noires des élytres ne sont pas réunies par une ligne noire. Mauritanie:

**Z. nigrotibialis** n. sp. Elongatus, dense griseopubescens, niger, elytris luteo signatis, in singulo ; ad basin arcuate fasciatis, ad medium sinuate fasciatis, post-medium bimaculatis et ante apicem unimaculatis. L. 8 mill. Dahomey. — Diffère de *tibialis* Mars. par les pattes foncées et les dessins jaunes réduits des élytres.

**Pedrillia multisignata** n. sp. [Phyt.]. Oblongus, parum nitidus, niger, supra testaceus et nigro-signatus, capite medio late nigro, thorace transverse nigro punctato,

elytris in singulo, ad scutellum, ad humeros, postmedium bi et diverse nigro signatis (*forma typica*), aut post medium nigro trisignatis (*v. interrupta*), antè apicem anguste sinuate nigro fasciatis, antennis nigris, ad basin testaceis, pedibus testaceis, femoribus nigro notatis. L. 4 mill. Chine. — A placer près de *undulata* Baly.

**Abirus kiotensis** n. sp. [Phyt.]. Oblongus, nitidus, glaber, viridi-metallicus, antennis cyaneis, ad basin paulo rufo tinctis ; thorace sat breve, lateraliter sinuato, parum fortiter sat sparse punctato ; elytris brevibus, postice attenuatis, minute punctatis, extus pro parte transverse plicatis. L. 8 mill. Japon. — A placer près de *Yashiroi* Yuasa.

**A. Malleti** n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, sparse albo pilosus, viridescens, pro parte cyaneo tinctus, antennis nigris, elongatis ; thorace parum elongato, supra obconico, parum fortiter sat sparse punctato ; elytris sat brevibus, postice paulo attenuatis, parum punctatis, transverse multiplicatis. L. 7 mill. Tonkin. — Diffère du précédent par la forme moins robuste, le thorax plus long.

Le *latus* mihi, du Tonkin, plus robuste que le précédent, a le thorax plus court, les élytres plus larges, la ponctuation plus fine. La coloration est noire bleutée et les élytres sont teintés légèrement de bronzé. La *var. semicyaneus* a les élytres bleus bordés de vert, avec le thorax verdâtre.

**Theresina** n. gen. [Cerambyc.]. Antennis gracilibus, corpore paulo brevioribus : scapo robusto et breve, articulo 2° antennarum subglobuloso, 3-4 longissimis, cæteris brevioribus ; oculis minutis, emarginatis ; thorace elongato, lateraliter minute dentato ; pedibus parum brevibus, tibiis intermediis paulo incis. Genre établi pour *Ropica punctata* Pic (Mél. Ex. Ent. 50, 1927, p. 17), caractérisé conjointement par la structure des antennes, les yeux sans lobe supérieur saillant, le thorax muni d'une petite dent.

**Ropicomorpha** n. g. [Cerambyc.]. Capite minuto, oculis emarginatis, parum approximatis ; antennis sat gracilibus, corpore non longioribus, scapo parum robusto, breve aut parum elongato, articulis 3-4 elongatis, curvatis ; thorace non transverso, antice paulo attenuato ; pedibus sat brevibus, femoribus crassis, tibiis intermediis emarginatis. Genre proche de *Ropica* Pasc., caractérisé par la structure des yeux et des antennes. Etabli pour *Ropica minuta* Pic = *suddentaliceps* Pic et formes voisines.

**Ropica Theresæ** n. sp. [Cerambyc.]. Elongatus, nitidus, postice attenuatus, rufobrunneus, capite thoraceque medio nigris, elytris multi luteo maculatis, postice vage sinuate luteo-fasciatis, fasciis intus junctis, his thorace paulo latioribus ; thorace sat breve, antice attenuato, indistincte lineato, membris rufis, femoribus et tibiis pro parte piceis. L. 5 m. Tonkin. — Voisin de *lineatithorax* Pic, mouchetures des élytres différentes.

**R. parvula** mihi, du Tonkin, voisin du précédent, est plus petit, noir, avec des mouchetures grises aux élytres, les antennes sont foncées. L. 3 mill.

(A suivre.)

M. Pic.

Le Gérant : E. Revéret.

31.0097, Imp. Réunies, Moulins - 5-44 - Dépôt légal 1944 2<sup>e</sup> trimestre - 46.320. — Autorisation : Pb 810.