

L'Échange, Revue Linnéenne

Coléoptères du globe (suite) ⁽¹⁾

Clerus nigrohumeralis mihi [Cleride]. Oblong, brillant, noir, élytres jaunes ayant chacun une macule humérale et une fascie antéapicale un peu sinuée noires avec la suture plus ou moins et l'apex aussi noirs. Long. 6 mill. Brésil. — Voisin de *pulchellus* Klug.

Stigmatium maculosum n. sp. [Cleride]. Allongé, brillant, noir de poix, parfois teinté de roussâtre à reflets métalliques avec, en dessus, une triple ornementation pileuse, blanche ou foncée, couchée, demi-hirsute ou dressée : élytres ornés d'une bande longitudinale suturale blanche, à contours irréguliers, plus large en avant, émettant, sur chaque étui, avant et après le milieu, un prolongement, en forme de bande, étroit et oblique ; une rangée longitudinale de gros tubercules pas loin de la suture et parfois de vagues granules en surplus : élytres à stries nettes ponctuées de gros points, éloignées de l'apex. Antennes assez courtes, grêles et testacées à la base, foncées avec les articles un peu élargis à l'extrémité : pattes en majeure partie brunâtres, base des cuisses jaune. Long. 5 mill. Java. — Peut se placer près de *Souferi* Pic.

Dorcadion scabricolle v. n. **Micheli** ♀. [Long.]. Elytres avec une bande dorsale raccourcie, à contours irréguliers, ou en partie interrompue. Aresch.

Dorcadion dimidiatum v. n. **de Gaullei** ♀. Une bande discale, non régulière, blanche sur la partie antérieure noire des élytres, en plus une bande dorsale blanche plus ou moins longue. Aresch. — La var. *transitorium* mihi, de Transcaucasie, possède seulement la bande discale supplémentaire.

Ebaeus argenteonotatus n. sp. [Malac.]. Oblong, un peu brillant, noir, thorax rouge, élytres d'un noir bleuté ayant une fascie transversale étroite blanche, placée avant leur milieu, complètement bordée de blanc sur la partie postérieure avec, sur chacun, chez ♂, un appendice apical large et court, de coloration claire ; pattes testacées, tibias postérieurs subinnés, un peu épaissis vers l'extrémité ♂, ou pattes postérieures foncées et plus minces ♀. Long. 2 mill. Sikkim. — À placer près de *carinatifennis* Pic.

Carphurus nitidiceps mihi [Malac.]. Allongé, noir, brillant, base des antennes testacée, celles-ci robustes ; tête brillante, modérément ponctuée. Long. 4 mill. Tonkin. — Sans doute var. seulement de *Coomani* Pic, avec la ponctuation de la tête différente.

Attalus insuturalis v. **discithorax** mihi. Thorax marqué de foncé sur le disque. Tonkin.

(1) Les types des divers insectes décrits figurent dans ma collection.

Apalochrus janthinus v. semipurpureus mihi. Avant-corps bleu ou violacé, avec les élytres plus ou moins pourprés. Congo.

Chauliognathus morio Gorh. [Mal.]. Voici les principales modifications que je possède pour cette espèce, toutes du Brésil.

1. Elytres en majeure partie, tout au moins largement, foncés 2
 — Elytres en majeure partie clairs, marqués de foncé sur la base et vers les épaules. *v. Wiengreeni* Pic.
2. Thorax entièrement noir ou bordé de clair antérieurement, plus rarement étroitement aussi sur les côtés 3
 — Thorax entièrement clair, rouge au milieu, jaunâtre sur le pourtour. Elytres soit avec la suture claire (*v. Brydli* Pic), soit avec la suture foncée (*v. n. atrosuturalis*).
2. Thorax foncé sur le disque postérieurement, clair sur le reste (*v. n. discicollis*).
3. Sommet des élytres foncé 4
 — Sommet des élytres bordé de blanc. *v. apicealbum* mihi.
4. Suture foncée, non marquée de blanc. *v. externealbum* mihi.
 — Suture marquée de blanc. La bande externe blanche ne remonte pas sur les épaules (*forme type*), ou remonte sur les épaules jusqu'à la base (*v. prelongatum* mihi).

Dorcatoma Vaulogeri v. n. latior [Anobiide]. Un peu plus grand et plus robuste que le type, avec une coloration moins claire. Maroc.

Zonabris Laurenti n. sp. [Hétéro.]. Peu allongé, noir, revêtu d'une pubescence argentée dense sur les élytres, ceux-ci ayant, sur chacun, les dessins jaunes suivants : deux macules discales vers la base et, avant le milieu, une 3^e latérale plus allongée, avec deux étroitement jointes ; en surplus, une fascie postmédiane sinuée, éloignée de la suture, une bordure apicale ; membres rougeâtres, tarses obscurcis. Long. 9 m. Sénégal et reçu du D^r Laurent. — Espèce très particulière par son revêtement argenté et mimant *Coryna*.

Pachybrachis pradensis v. n. Schaeferi [Phyt.]. Elytres à fond largement noir sur le disque, avec quelques dessins jaunes variables faits de lignes diversement interrompues, en surplus, bords complètement, ou presque, jaunes. Décines (ex Schaefer).

Matosthetus femoralis n. sp. [Phyt.]. Large et court, un peu brillant, roux, tête bimaillée de foncé entre les yeux ; thorax avec deux macules discales et, en dessous, de chaque côté, avec une autre noires ; antennes noires à 1^{er} article roux ; pattes rousses avec les tarses postérieures noires ; les cuisses postérieures ayant une tache noire en dessous et munies d'une longue épine ; élytres ayant, sur chacun, une macule médiane discale noire, à épaules proéminentes en dehors. Long. 8 m. Brésil. — A placer près de *bipunctatus* Klug.

M. lateritius v. n. paulonotatus. Brésil. Diffère de la forme typique (ex description) par le thorax n'ayant sur les côtés latéraux, en dessous, qu'une, au lieu de plusieurs, macules, noire.

M. 7-notatus v. n. semiobliteratus. Brésil. Diffère, à première vue, du précédent, dont les dessins du thorax sont analogues, par la tête maculée de noir entre les yeux.

M. cardinalis v. n. multimaculatus. Brésil. Le dessin noir du thorax en forme de M est décomposé en de nombreuses macules noires.

Spermophagus Pellaranai n. sp. [Bruchide]. Oblongo-elongatus, antice et postice attenuatus, subnitidus, parum dense griseo pubescens, supra pro parte denudato maculatus, rufo-testaceus, capite inter oculos thoraceque medio piceo lineatis, metasterno et pedibus posticis pro parte piceis. Capite breve et robusto, oculis grandis, griseis, antennis testaceis, parum crassis; thorace sat breve, antice valde attenuato, pro parte dense punctato; elytris ad basin thorace non laticribus, lateraliter subarcuatis, postice attenuatis, distincte striatis, his multi brunneo maculatis, maculis pro parte transverse et sinuate dispositis, pedibus 4 anticis gracilibus et testaceis, posticis robustis et pro parte piceis. L. 4,3-4,5 m. Brésil. Corientes (G. Pellarana). — Espèce différant des anciennes décrites par les parties médianes de la tête et du thorax plus foncées que le reste de ces organes conjointement aux nombreuses macules dénudées brunes des élytres.

Laius nitidus n. sp. ♀ [Malac.]. Allongé, plus large postérieurement, noir, tête un peu roussâtre et à macules jaunâtres antérieurement, base des antennes testacée. chaque élytre orné, en dessous des épaules extérieurement, d'une courte fascie arquée flave, brillant avec la base des élytres densément ponctuée et subopaque, le reste presque lisse. Antennes foncées à premiers articles testacés, 1^{er} et 2^e un peu épaissis, 2^e plus long; avant-corps très brillant et lisse, thorax long, rétréci et aplani sur la partie postérieure; élytres rétrécis et aplatis en avant, élargis et convexes postérieurement, un peu brillants, à peine ponctués, pattes foncées, longues. L. 3,5 m. Luzon. — Espèce bien caractérisée par le dessus presque entièrement brillant, le dessin clair réduit des élytres.

Ebaeus pauloimpressus n. sp. [Malac.]. Oblong-suballongé, peu brillant, à pubescence grise, noir, élytres bleutés à sommet rougeâtre, thorax rouge, ce dernier assez court, subarqué sur les côtés, un peu rétréci en arrière; élytres nettement plus larges que le thorax, faiblement élargis avant l'extrémité, un peu atténués au sommet, marqués d'une impression irrégulière sur la partie rougeâtre. L. 3,3 m. Chine. Yunnan. — Voisin de *rufoapicalis* Pic, membres plus foncés, élytres moins longs, à impression apicale particulière.

? **Attalus longicornis** n. sp. Petit, étroit et allongé, pubescent de gris, un peu brillant, d'un noir olivâtre avec l'apex des élytres étroitement bordé de jaune pâle: antennes excessivement longues, à 2^e article un peu allongé, élargi au sommet ainsi que le 3^e, 4^e long et un peu épais, les suivants longs et grêles. L. 2,5 m. Chine: Kiangsu. — Espèce caractérisée par ses très longues antennes conjointement à sa forme allongée-étroite.

Malachiomimus subunicolor n. sp. [Malac.]. Assez allongé, un peu brillant, pubescent de gris avec des poils obscurs dressés, foncé, dessus métallique avec l'avant-corps un peu olivâtre et les élytres bleutés ; antennes foncées à base testacée, plus ou moins longuement flabellées après les premiers articles ; tête avec deux impressions frontales, pattes foncées. L. 3 m. Yunnan. — Voisin de *impressifrons* Pic, moins robuste, plus pubescent et moins brillant.

Anthocomus Bowringi mihi, de Hong-Kong (probablement décrit, mais ne figurant pas au *Coleopt. Catalogus* de Greiner). Forme étroite et allongée, noir olivâtre, à pubescence grise sans poils dressés, les pattes sont foncées, en partie un peu teintées de roussâtre ; les antennes foncées et testacées, sont longues, non grêles, avec les articles médians assez triangulaires. L. 3,5 m. environ.

Chauliognathus bicoloritarsis n. sp. [Malac.]. Allongé, opaque, élytres un peu brillants, roux-testacé, tarses en partie noirs, élytres sur chacun, et vers le milieu, fasciés de noir, ceux-ci fortement et densément ponctués, un peu élargis après les épaules, puis un peu atténués au sommet. L. 13 m. Brésil. — Voisin de *medionotatus* Pic.

Ch. Tixieri n. sp. Oblong-allongé, atténué postérieurement, un peu brillant, noir, abdomen, tête en partie, thorax (celui-ci au milieu à 2 macules brunes) et membres jaunes, élytres ayant chacun, sur leur base, une macule noire et au milieu une fascie noire réduite, ceux-ci à ponctuation fine, subtronqués au sommet. L. 10 m. Brésil. — Peut se placer près de *hausanus* Pic.

La v. biuninotatus est plus largement claire, le thorax est concolore et les élytres n'ont, sur chacun, qu'une macule postmédiane discale noire.

Ch. bireductipennis n. sp. Oblong-allongé, un peu brillant, jaune roux, tête en partie et membres en partie noirs, chaque élytre sur la base bimaculé de noir, ceux-ci à fine ponctuation, subparallèles au milieu sur les côtés. L. 13 m. Brésil. — A placer près de *fallax* Germ.

Ch. fallax v. n. Edmondi. Elytres jaunes, ornés d'une fascie basale et d'une autre prémédiane noires jointes par une lignenoire sur le disque, la partie noire encerclant une macule jaune présuturale. Brésil.

Ch. fallax v. n. Petri. Elytres jaunes ayant chacun trois (1, 2) macules noires. Brésil.

Ch. fallax v. n. Henrici. Elytres jaunes avec une macule noire réduite vers les épaules. Brésil.

Ch. plagiatus v. n. Orbygnyi. Thorax noir bordé de jaune, élytres jaunes, brièvement marqués de noir à la base. Brésil.

Ch. plagiatus v. n. Alcidei. Elytres jaunes, largement marqués de noir au sommet. Paraguy.

(A suivre.)

M. PIC.

Le Cérant : E. REVERET.