

L'Échange, Revue Linnéenne

Coléoptères du globe (suite)

Attalus Mackiei v. n. Kocheri [Malac.]. Les macules vertes se joignent sur chaque élytre. Maroc : Marrakech, ex Kocher, in coll. Kocher et Pic.

A. Heydeni v. n. notaticeps. Un peu allongé, élargi postérieurement, verdâtre, devant de la tête blanc avec une bande transversale noire, dessous des premiers articles des antennes roussâtres ; antennes assez longues ; avant-corps peu ponctué ; élytres peu fortement et densément ponctués. L. 4,5. Environs de Mogador (1). — Diffère de *Heydeni* Ab., par la forme moins ramassée, la coloration verte.

Dinometopus unifasciatus n. sp. [Malac.]. Oblong-allongé, noir, élytres avec une fascie flave antémédiane éloignée de la suture, base des antennes et pattes antérieures testacées. L. 3,5 m. Le Cap. — Diffère, à première vue, de *cavifrons* Boh. par les élytres fasciés.

Malthinus maculaticeps mihi, du Maroc. Tête bicolore, testacée, noire postérieurement avec une macule frontale jaune ; thorax jaune sur les bords, largement foncé au milieu avec ligne médiane claire pouvant disparaître, plus long que large ; élytres en dessus clairs et foncés avec l'apex jaune soufre ; membres bicolores. — Voisin de *Olceseii v. limbatus* Pic.

Plateros fortocostatus n. sp. [Malac.]. Allongé, opaque moins l'avant-corps un peu brillant, noir avec les côtés du thorax et les élytres orangés, ceux-ci ayant des lignes noires préscutellaires et une petite macule apicale noire, remontant un peu sur son milieu ; antennes plates, angulées au sommet des articles ; élytres ayant peu de côtes marquées, non régulières, quelques-unes étant plus saillantes. Cette particulière sculpture élytrale peut motiver la création d'un sous-genre que je nomme *Costatoplateros*. L. 9 mill. Brésil.

Sculptocalleros n. gen. Elytres ayant chacun 4 côtes régulières, peu élevées et bien distinctes, sans aucune trace de côtes intermédiaires, même sur leur base, intervalles à ponctuation aréolée double, en partie embrouillée ; antennes assez longues, un peu fortes, atténuées à l'extrémité. La particulière sculpture élytrale distinguera ce genre, voisin de *Calleros* Gorh., que j'ai établi pour l'espèce nouvelle suivante :

S. discithorax n. sp. Un peu allongé, ayant les élytres un peu plus larges que le thorax, presque opaque, noir avec le thorax orné d'une macule discale postérieure subtransversale orangée, celui-ci transversal, subarqué en avant, droit sur les côtés, à angles postérieurs obtus, à long et étroit sillon médian précédé d'une petite carène ; pattes aplaties, nettement sillonnées. Long. 7 mill. Brésil.

(1) Quand il n'y a pas de désignation spéciale, les types font partie de ma collection.

Lycus (Haplolycus) Laurenti n. sp. Allongé, étroit, orangé, tête, membres en majeure partie, une double ligne raccourcie sur le milieu postérieur du thorax et sommet des élytres assez largement noirs. Antennes noires, très peu marquées de clair en-dessous des articles 2 et 3; thorax peu large, un peu plus étroit que les élytres, un peu rétréci en avant et faiblement prolongé sur son milieu antérieur; élytres longs, très faiblement rétrécis vers la base, un peu élargis et subparallèles en-dessous des épaules, brièvement atténués au sommet; pattes noires avec la base des cuisses largement claire; sommet de l'abdomen en-dessus avec une bande noire médiane longitudinale. L. 18 mill. Sénégal: Tamla (D' Laurent). — Peut se placer près de *Dulmani* Brg., très caractérisé par le dessin particulier du thorax et les cuisses largement claires sur leur base.

Discodon submarginatum n. sp. [Malac.]. Peu allongé, faiblement brillant. A double pubescence claire, noir, partie de la tête en-dessous des yeux flave; thorax testacé sur les côtés, assez étroit, nettement incisé au milieu, bien plus étroit que les élytres; élytres noirs, ornés d'une bande latérale claire qui laisse un étroit rebord latéral noir et n'atteint pas le sommet. L. 6 m. Rép. Argentine. — Voisin de *nigromaculatus* Pic, thorax moins large et bande latérale des élytres plus réduite, éloignée du bord externe.

D. nigrocephalum n. sp. Un peu large, peu brillant, complètement pubescent, noir, avec les côtés du thorax largement jaunes, cet organe court et large, très faiblement rugueux. L. 7 m. Brésil. — Voisin de *puceronum* Pic et s'en distinguant de suite par la tête foncée.

D. subunicolorum n. sp. Testacé, un peu roussâtre, faiblement rembruni par places, avec les élytres d'un roux brunâtre, bordés de flave sur la suture et les côtés, sauf à l'extrémité. L. 9 m. Brésil. — A placer près de *bahiensis* Pic, en diffère par la coloration presque toute claire.

Zonitoscema nigrapicalis n. sp. [Vésicant]. Étroit et allongé, peu brillant, testacé, sommet des élytres brièvement noir, membres noirs, cuisses, sauf les genoux et base des tibiaux un peu testacés. Tête à ponctuation forte et plus ou moins écartée, plus large que le thorax, celui-ci étroit, rétréci en avant, assez finement et irrégulièrement ponctué, ayant un faible sillon sur le disque; élytres longs, parallèles, peu élargis vers le sommet, densément ponctués, sans traces de côtes. L. 11 m. Sierra-Leone. — A placer près de *eborina* Fah., qui est plus pâle avec les élytres dépourvus de macule apicale noire.

Z. Dolléi v. n. *atroapicalis* miki. Tonkin. Testacé avec le sommet des élytres noir, les antennes noires à base testacée. Parfois la macule apicale des élytres s'oblitére, c'est alors la var. *inapicalis*, originaire de Cochinchine.

Z. seminigra v. n. *subfasciata*. Allongé, thorax très long, dessous (sauf abdomen roux), antennes et pattes en majeure partie noirs, dessus testacé, élytres ayant, en dessous du milieu, une bande d'un noir de poix oblique commune sur la suture, éloignée des bords. Congo.

Kuilua reducta n. sp. [Phyt.]. Petit, allongé, peu brillant, hirsute, noir, hanches, partie des cuisses et de l'abdomen testacées, dessus du corps orange, marqué de noir de la façon suivante : une large bande sur la tête, une macule discale au thorax, une macule réduite apicale triangulaire aux élytres qui sont fortement et peu densément ponctués. L. 6 m. Congo. — Voisin de *brevior* Pic, avec la forme plus étroite, le dessin apical noir des élytres réduit.

Miopristis multisignatus n. sp. [Phytophage]. Allongé, postérieurement faiblement atténué, jaune roussâtre, tête antérieurement, thorax en partie et élytres plus pâles ; thorax latéralement et postérieurement à signes noirs, qui forment presque un X transversal, à ponctuation forte, non dense ; écusson noir, roux au sommet ; élytres peu allongés, à ponctuation fine et en partie irrégulière, ayant chacun, vers les épaules, deux macules noires, ces macules jointes en arrière et avant le sommet, obliquement bimaculés de noir, les macules un peu jointes ; pattes antérieures peu allongées. L. 6 m. Kenya : Turkana (Mus. Paris). — Plus allongé que *subrugosa* Jac., avec les dessins noirs différents, les pattes antérieures plus courtes.

Peploptera quinquesignata n. sp. [Phytop.]. Petit, allongé, roux, tête et poitrine noires, élytres flaves, d'un roux-jaunâtre au sommet, avec, sur chacun, une macule humérale large, une autre externe anteapicale noires, en surplus une macule suturale commune anteapicale. Thorax peu transversal, à ponctuation forte et inégale ; élytres peu plus larges que le thorax antérieurement largement lobés, assez fortement ponctués en rangées. L. 4 m. Turkana (Mus. Paris). — Espèce très caractérisée par ses élytres ayant deux couleurs foncières avec des dessins noirs au nombre de cinq

Microeurydemus gabonicus n. sp. [Phytop.]. Subovale, court, brillant, roux, élytres ayant sur chacun, et sur le disque. 2 macules noires, l'une près de la base, l'autre avant le milieu. Thorax non transversal, bien plus étroit que les élytres, un peu rétréci sur les côtés postérieurement, à ponctuation peu visible, espacée ; élytres courts et larges, atténués à l'extrémité, à calus huméral très marqué, antérieurement avec des stries-ponctuées nettes ainsi qu'une faible et étroite dépression transversale ; pattes longues, cuisses dentées. L. 4,5 m. Gabon. — Voisin de *4-maculatus* Jac., mais intervalles des élytres non costés.

M. Bingeri n. sp. Oblong-suboval, brillant, roux, élytres avec une macule humérale, une partie de la suture et épipleurs noirs, thorax en partie bordé de foncé, large, presque lisse, indistinctement ponctué ; élytres courts et larges, atténués postérieurement, à impression transversale antérieure et nettement striés avec les intervalles convexes antérieurement. L. 5 m. Bingerville. — Espèce caractérisée par sa particulière coloration.

M. immaculatus n. sp. Oblong, brillant, testacé, yeux gris, avant-corps presque lisse, indistinctement ponctué ; thorax un peu rétréci en arrière sur les côtés de sa base ; élytres bien plus larges que le thorax, assez courts, brièvement atténués à l'extrémité, à peine striés en avant avec des rangées de points espacés de diverses grosseurs, sans stries latérales ni dépression transversale antérieure ; pattes longues, cuisses dentées. L. 5 m. Congo. — Très distinct de *unimaculatus* Pic par les élytres sans macule noire médiane.

M. instriatus n. sp. Voisin du précédent, plus petit, plus pâle, thorax à ponctuation fine, mais distincte, très écartée, élytres sans aucune trace de stries latérales plus pâles que le reste du corps, poitrine rembrunie au milieu. L. 4 m. Abyssinie.

Pagriá minuta n. sp. [Phyto]. Oblong, brillant, foncé, un peu verdâtre sur l'avant-corps, élytres d'un fauve rougeâtre avec les côtés marqués de vert et la suture verte, membres roux. Tête inégalement ponctuée; thorax à ponctuation forte, écartée, peu angulé latéralement; élytres à rangées de points assez forts, s'effaçant postérieurement, sans dépression antérieure nette. L. 2,5 m. Côte-d'Ivoire. — Espèce caractérisée par sa petite taille et sa coloration.

P. ruficeps mihi, de Sierra-Leone, voisin du précédent, encore plus petit, plus trapu, avec la coloration foncière teintée de roussâtre sur le dessous et le thorax, celui-ci régulier sur les côtés; la tête est nettement plus claire, rougeâtre, les élytres sont jaunes avec la suture foncée, les côtés un peu rembrunis. L. 2 m.

Syagrus Laurenti n. sp. [Phyto]. Oblong, roux-testacé, brillant, dessous du corps en partie noir, élytres à dessins noirs comprenant: une longue ligne antérieure suturale commune de forme triangulaire avec la suture postérieurement, sommet excepté, noire et une bordure latérale foncée, oblitérée aux extrémités, membres testacés, quatre avant-derniers articles des antennes noirs. L. 4 m. Sénégal: Tamba (ex D^r Laurent). — A placer près de *pallidicolor* Pic, caractérisé par son dessin foncé sutural particulier, en partie triangulaire.

S. reticulollis n. sp. Oblong, brillant, coloration analogue à celle de *stricollis* Pic, avec le dessous et le thorax verdâtres-métalliques, la tête rousse, les élytres testacés, les membres bicolores, mais thorax à ponctuation moins fine, droit sur les côtés postérieurs, élytres rétrécis en avant, à épaules effacées, à stries-ponctuées bien marquées sur la partie antérieure; pattes foncées avec la base des cuisses rouge. L. 4 m. Tanganyka.

S. atricollis Pic varie un peu. Elytres à suture et bordure latérale, sauf le sommet verdâtres, en surplus, une macule discalé antémédiane, sur chacun, également verdâtre (*v. vindexignatus*), de l'Ethiopie. Ou à bordure effacée avec seulement une macule externe antémédiane et une petite macule discalé verdâtres (*v. reductus*), du Tanganyka.

Tenerus Conradsi n. sp. [Cleride]. Allongé-parallèle, opaque, à pubescence claire, noir, avec l'avant-corps orangé, à dessins noirs; ligne médiane sur la tête, trois bandes noires longitudinales au thorax, la médiane étant large et non parallèle; écusson foncé, élytres nettement multicostés, orangés, brièvement noirs au sommet avec une bordure latérale de poix. Long. 10 m. Tanganyka. — Voisin de *vittaticollis* Pic, mais la bande médiane du thorax est complète et large, la partie apicale noire remonte un peu sur les côtés des élytres et se prolonge en bordure, les antennes sont courtes, larges, non rétrécies au sommet.

(A suivre.)

M. Pic.

Le Cérant - E. RÉVÉRET