



# L'Échange, Revue Linnéenne

## Coléoptères du globe (suite)

**Epania Barbieri** n. sp. [Longicorne]. Assez robuste, opaque, noir, à pubescence dense blanche sur le bord postérieur du thorax, la base des élytres et sur certaines parties du dessous du corps ; tête et thorax finement, densément, ruguleusement ponctués, ce dernier non étroit, ni très long, plus large sur sa partie médiane ; élytres très raccourcis et un peu déhiscents, modérément ponctués, déprimés vers la base avec, sur chacun, une faible carène aplatie en dessous des épaules et une autre arquée sur le disque ; pattes assez robustes, avec les cuisses fortes, les tibias un peu arqués. L. 8 à 10 m. Saïgon et environs (Barbier). — Très distinct par son aspect mat et sa structure élytrale. Par son thorax non étroit-allongé, la structure élytrale particulière, doit se classer dans un s. g. nouveau auquel je donne le nom de **Molorchoepania**.

**Heteromerotylus angustatus** n. sp. [Hétéér.]. Assez étroit, subparallèle, noir, élytres olivâtres et brillants, avant-corps subopaque, cuisses en partie rousses. L. 12 m. Laos. — Diffère de *Vitalisi* Pic v. *geniculatus* mihi par la forme plus allongée des élytres, le thorax plus étroit, presque droit sur les côtés.

**Eucyrtus joloensis** n. sp. [Hétéér.]. Oblong-allongé, brillant, noir en dessous, pattes comprises, verdâtre en dessus, peu ponctué, irrégulièrement sur les élytres. L. 15 m. Ile Jolo. — Groupe de *pretiosus* Lac., se distingue de cette espèce par la coloration différente, le thorax presque droit sur les côtés vers la base.

**E. laosensis** n. sp. Grand, élytres un peu allongés, subparallèles en avant, brillant, noir, dessus à reflets bronzés et élytres avec de faibles lignes pourprées qui avoisinent des stries fines. L. 20 m. Laos. — Espèce de coloration particulière et de grande taille, dans le voisinage de *nigripes* Kr.

**E. curtus** n. sp. Assez petit, large, brillant, noir ; thorax court et large, à angles postérieurs droits, non saillants ; élytres courts et larges, faiblement striés, les stries ponctuées de petits points. L. 12 m. Bornéo. — Caractérisé par sa forme trapue avec une coloration générale noire.

**Lydus (Alosimus) robustus** v. n. *Theryi* [Hétéér.]. La coloration générale est bleue (elle est verte, parfois dorée ou pourprée par places chez la forme typique). Maroc : Azrou (Théry). Chez la var. nov. *lateau ita*, aussi du Maroc et des chasses de Théry, la coloration du dessus est largement dorée.

**Alosimus tenuicornis** v. n. *Kocheri*. Coloration analogue à la var. *Theryi* mihi, c'est-à-dire bleue, parfois teintée de violacé. Maroc : Taquelft (Kocher). Trois exemplaires communiqués par Kocher, dont j'en ai gardé un pour ma collection.

(1) Sauf indications spéciales, les types font partie de ma collection.

**Coryna particularenotata** n. sp. [Hétér.]. Oblong, un peu brillant, à pubescence dressée foncée, noir, élytres jaunes, ayant des dessins noirs particuliers, ainsi faits sur chacun : une bordure scutellaire, antérieurement trois macules transversalement disposées, l'interne petite, les autres prolongées antérieurement par un trait noir, les traits se joignant sur la base ; en dessous du milieu ayant 2 macules, l'interne suturale commune, l'externe un peu élargie en arrière sur le côté ; avant le sommet, une fascie arquée et éloignée de la suture, plus large extérieurement. Antennes courtes, à dernier article long et épais ; thorax assez large, irrégulièrement ponctué, orné postérieurement de plusieurs impressions ; élytres plus larges que le thorax, peu longs, faiblement élargis après le milieu et un peu atténués à l'extrémité, à ponctuation fine, rapprochée. L. 5,5 m. Grand-Atlas, à Talda (Institut scientifique chéri-fien). — Espèce très caractérisée par les dessins noirs particuliers des élytres, notamment par les deux macules antérieures externes se prolongeant en avant jusqu'à la base.

**C. distincta** v. n. **sexnotata**. Robuste, noir, élytres jaunes ayant chacun 6 macules noires disposées en 3 rangées (3, 2, 1). Algérie. — La forme typique possède une deuxième macule antéapicale.

**C. distincta** v. n. **Theresæ**. Possède, sur chaque élytre, 3 macules antérieures noires, 2 prémédianes, l'externe étant subfasciée et 2 anteapicales. La massue des antennes est roussâtre, le thorax peu robuste et peu densément ponctué. L. 7 m. Algérie.

**Eucymatodera rufescens** n. sp. [Cleride]. Allongé, brillant, hirsute, d'un testacé roussâtre avec les élytres ornés d'une bande postmédiane transversale jaune pas très distincte avec les membres en partie foncés. Avant-corps finement et éparsement ponctué, le thorax étant long, sinué. Antennes noires à base rousse, à articles 5-10 larges et à peu près égaux, dernier peu long ; élytres à rangées de stries ponctuées prolongées presque jusqu'au sommet et plus faibles postérieurement, avec l'apex irrégulièrement et fortement ponctué ; pattes assez courtes et un peu robustes, noires avec la base des cuisses largement rousse. L. 10 m. Afr. Or. — A placer près de *Blumfontaina* Kuw., avec une coloration bien moins foncée, sans macule apicale jaune plus claire aux élytres.

**Stratocera subnigra** n. sp. [Cleride]. Oblong-allongé, brillant, noir, élytres rouges sur la base, avec une fascie postmédiane arquée flave. Antennes grêles, pectinées à partir du 3<sup>e</sup> article. Tête et thorax éparsement ponctués ; élytres à ponctuation en rangées prolongées en s'affaiblissant au-delà de la bande. L. 10 m. Tanganyka. — Diffère de *Kuwerti* Hintz par la poitrine noire, les antennes non flabellées.

La s.-esp. *vicina* mihi, du Congo, est dans son ensemble analogue au précédent, s'en distingue par la présence d'une fascie jaunâtre étroite, peu courbée en dehors, la partie rougeâtre de la base des élytres plus étendue avec ces organes un peu plus allongés.

*Eburiphora* v. *Vadoni* Pic (1949), préoccupé par *Vadoni* Pic (1936), devra prendre le nom de *v. vadoniana*.

**Placoceris apicalis** v. n. **gabonicus** [Cleride]. La suture est noire, sauf sur la

partie antérieure, celle-ci, en avant de la macule apicale, noire assez large et obliquement disposée en avant, dernier article des antennes largement clair. Gabon.

**P. reductus** n. sp. Plus ou moins allongé, noir, membres compris avec la tête et le thorax brièvement marqués d'orangé, la coloration foncée étant plus ou moins largement étendue sur le disque du thorax, élytres orangés avec à peu près le tiers apical noir. Chez la var. nouv. *prolongatus*, la partie apicale noire plus étendue remonte extérieurement jusqu'au milieu de chaque étui, tandis que le thorax est plus largement orangé, ayant une bande médiane noire modérément large. L. 9-13 m. Congo français, Katanga. — Par ses antennes toutes noires, se rapproche de *dimidiatus* Kl., mais la forme est plus allongée et le dessin noir plus étendu sur l'avant-corps.

**Cladiscopallenis** n. g. (voisin de *Pseudopallenis* Kl., établi pour mon *Cladiscus Seyrigi*, de Madagascar) est caractérisé par les yeux très grands et saillants, débordant le thorax, les antennes à articles allongés, sans massue, le thorax très long, fortement étranglé devant la base, les élytres ayant une forme régulière, étroite et allongée, avec des stries-punctuées très largement prolongées postérieurement, les pattes plutôt courtes.

**Carinatophilus** n. g. [Hylophilidæ] (1). Thorax et élytres à structure spéciale, le premier étant impressionné et largement déprimé sur les côtés, avec les angles postérieurs un peu saillants, tandis que les élytres larges sur la base sont dilatés au milieu, puis atténués postérieurement, ayant sur chacun une impression basale discale allongée bordée d'un pli surélevé interne et d'une carène humérale qui se prolonge en se bifurquant postérieurement, la partie externe étant sinuée. Pattes postérieures (peu visibles) grosses, avec les tibias larges, plus étroits à la base. Genre établi pour l'espèce nouvelle suivante.

**C. multiimpressus** n. sp. Oblong, brillant, courtement pubescent de gris, noir, avec une macule humérale orangée à chaque élytre, les antennes et la base des cuisses, postérieures exceptées, testacées. Tête large, tronquée postérieurement, yeux écartés, grands; antennes grêles, filiformes, pubescentes, à articles intermédiaires longs, dernier pyriforme; thorax court et large, finement ponctué; élytres inégaux en dessus, à ponctuation rapprochée, moins fine antérieurement. L. 4 m. Congo, réserve du parc Albert (au Musée de Bruxelles).

**Hylophilus** ou **Aderus atromarginatus** n. sp. [Hétér.]. Allongé, brillant, orné de poils gris longs et couchés, noir, avec les élytres jaunes bordés de noir, moins étroitement sur les côtés que sur la suture, pattes (en partie manquantes) foncées. Tête tronquée postérieurement, yeux grands, un peu écartés; antennes noires, grêles, à articles plus courts vers l'extrémité, dernier subpyriforme; thorax peu large, un peu rétréci en avant, fortement ponctué; élytres plus larges que le thorax, à impression discale antérieure longue sur chacun, médiocrement et assez densément ponctués. L. 3 m. Congo: Kivu. — Espèce de coloration élytrale et impressions longitudinales particulières, se rapprochant des *nigrocinctus* Pic et *tavetanus* Pic.

**Lema rufoapicalis** n. sp. [Phytophage]. Grand, large, roux avec les élytres d'un

(1) Ou *Aderidæ* selon Baguena Corella.

bleu d'acier, brièvement roux au sommet, pattes foncées avec la base des cuisses rouge, antennes testacées. Thorax assez court, large, étranglé sur le milieu, faiblement ponctué sur le disque; élytres larges et assez courts, sinués sur la base avec des impressions basales: une en dedans de chaque épaule et une transversale près de la base avec quelques rangées internes de points de différentes, mais faibles, grosseurs, qui s'effacent postérieurement. L. 9 m. Java. — A placer près de *Semperi* Jac.

**L. spinotibialis** n. sp. Oblong-allongé, roux, devant de la tête foncé, élytres verdâtres-métalliques, antennes foncées, à base rousse, pattes rousses, sommet des tibias et tarses largement foncés. Thorax court et large, transversalement sillonné-étranglé en dessous du milieu, un peu angulé sur les côtés antérieurs, très faiblement ponctué; élytres peu larges et assez longs, à faibles stries plus marquées vers le sommet et rangées de points s'affaiblissant postérieurement; tibias intermédiaires munis d'une dent interne avant le sommet. L. 7 m. Saïgon ou environs (Reçu de Barbier avec les 2 espèces qui suivent). — Cette espèce et la suivante sont à placer près de *coromandeliana* F.

**L. Barbieri** n. sp. Assez large et court, testacé avec les élytres d'un noir métallique, marqués de roux à l'apex, membres testacés avec les antennes en partie rembrunies au sommet. Thorax court et large, étranglé avec un sillon transversal près de la base, à peine ponctué; élytres assez larges et courts, atténués en arrière, un peu impressionnés antérieurement, à rangées de points divers et quelques stries postérieures externes. L. 5 m. Saïgon. — Ressemble à *cyaneopectoralis* Pic par sa coloration, celle du dessous et des pattes étant plus claire, tandis que les élytres sont autrement sculptés, très nettement atténués en arrière.

**L. nigrofasciata** n. sp. Large et assez court, atténué postérieurement, roux-testacé avec les élytres largement noirs à la base et postérieurement ornés d'une bande transversale antéapicale noire. L. 5 m. Saïgon. — Se rapproche du précédent par sa forme avec une coloration particulière qui le distingue au premier abord.

**L. mediofasciata** n. sp. Petit, oblong, noir, élytres avec une large fascie médiane rougeâtre, avant-corps roux avec les parties buccales foncées, antennes (cassées) marquées de roux à la base, quatre pattes postérieures foncées avec les cuisses en dessous un peu marquées de roux, antérieures testacées. Thorax court, subarrondi en avant, étranglé avec un sillon transversal près de la base; élytres peu larges et assez courts, peu rétrécis au sommet, à faible impression vers chaque épaule et rangées de points médiocres. L. 4 m. Java. — Par sa coloration élytrale, ressemble à *unicincta* Lac., avec une coloration particulière des pattes, etc.

**L. bicoloripes** n. sp. Assez large, avant-corps et antennes testacés, élytres bicolores, noirs antérieurement, avec sur chacun une macule basale testacée, testacés sur le reste sauf une fascie antéapicale noire, laissant la suture et le bord roux; dessous du corps noir; pattes noires avec la base ou le dessous des cuisses diversement marqués de roux. L. 7 m. Java. — Espèce caractérisée par la présence d'une macule testacée sur la partie basale noire des élytres.

M. Pic.

(A suivre.)

Le Cérant : E. REVERET