

L'ÉCHANGE

Revue Linnéenne

FONDÉE PAR LE DOCTEUR JACQUET

Organe mensuel des Naturalistes de la Région Lyonnaise et du Centre

CONTENANT LES DEMANDES D'ÉCHANGE

D'ACHAT OU DE VENTE DE LIVRES ET DE TOUT AUTRE OBJET D'HISTOIRE NATURELLE

M. PIC (G. I. P., O. S.), Directeur

Membre correspondant du Muséum de Paris

COMITÉ DE RÉDACTION OU COMITÉ D'ÉTUDES

J. Clermont, 162, rue Jeanne-d'Arc prolongée, PARIS (13^e). — *Aphodius palæarcticus*, *Histérius français*.

L. Falcoz, 5, Place de l'Eperon, VIENNE (Isère). — *Cryptophagides*, *Nitidulides*, *Cucujides*, *Evoxytides*, *Phalacridés*, *Lathridiides*.

Maurice Pic, DIGOIN (Saône-et-Loire). — *Coléoptères d'Europe*, *Melyridæ*, *Ptilinidæ*, *Nanophyes*, *Anthicidæ*, *Pedilidæ*, *Crioceridæ*, etc du globe. — *Cerambycidés* de la Chine, du Japon, etc. *Cryptocephalides palæarctiques*, *Malucodermes* du globe.

A. Méquignon, 7, rue Chasseloup-Laubat, PARIS (15^e)
Coléoptères de France (*Circulionides* exceptés.)

Adresser toutes Communications

Concernant la Rédaction, les Échanges, les Abonnements et les Annonces

A M. M. PIC, à DIGOIN

(20 Août 1926)

SOMMAIRE

Notes diverses, descriptions et diagnoses, par M. Pic (*suite*).
Hyménoptères nouveaux, II, par M. Pic.
Malacodermes exotiques, par M. Pic (*suite du hors-texte*).
Coléoptères exotiques en partie nouveaux, par M. Pic (*suite*).

PRIX D'ABONNEMENT: UN AN, A PARTIR DU 1^{er} JANVIER

France: 7 francs. | Étranger 12 francs.

MOULINS

LES IMPRIMERIES RÉUNIES

15, RUE D'ENGHEN, 15

ANNONCES

La page	32 fr.	Le 1/4 de page	10 fr.
La 1/2 page	18 fr.	Le 1/8 de page	6 fr.

Réduction de 25 % pour les insertions plusieurs fois répétées

TARIF SPECIAL POUR LES ANNONCES ANNUELLES

PRIX DES SEPARATA

En raison des difficultés actuelles (papiers, matières premières, main-d'œuvre, etc.), les auteurs désirant des « Separata » de leurs articles, voudront bien s'entendre directement avec l'imprimeur.

EN VENTE

Chez l'auteur : Maurice Pic, à Digoin (Saône-et-Loire) : 1° **Matériaux pour servir à l'étude des Longicornes**, ouvrage ayant obtenu, en 1911, le prix Dollfus.

Cet ouvrage, commencé en 1891, comprend une série de fascicules ou cahiers dont les premiers sont presque épuisés. Le prix varie suivant les fascicules, celui des anciens étant plus élevé ; les plus récents peuvent être cédés à divers prix par fascicule, port non compris. L'avant-dernier cahier paru, c'est-à-dire la deuxième partie du 9° cahier, a été distribué aux souscripteurs dans le courant de février 1915, depuis a paru (en 1916) la première partie, et (en 1917) la deuxième partie du 10° cahier.

On peut céder quelques collections, avec le 1° cahier réimprimé, à des prix modérés. Envoi de l'ouvrage contre remboursement, ou après réception de son prix.

2° **Mélanges Exotico-Entomologiques** comprenant 14 fascicules anciens au prix de 2 francs : deux autres au prix de 2 fr. 50, enfin 7 autres plus récemment édités, au prix de 3 fr. 50 pièce, port non compris. (Les autres à 4 francs (24 à 27.) Les suivants à des prix divers. Réduction de prix pour la collection complète. Petite majoration pour l'étranger. Le dernier fascicule paru est le 46.

"Miscellanea Entomologica"

Revue entomologique internationale

Abonnement annuel, édition complète (avec ouvrages)	20 fr.
Edition réduite	10 fr.
Annonces seules	5 fr.

Direction et Rédaction : E. BARTHE
Professeur honoraire à CASTANET-TOLOSAN
(Haute-Garonne).

Pour les déterminations

Tous les frais de retour des insectes, envoyés en étude, sont à la charge de l'envoyeur.

Que les intéressés s'en souviennent à l'occasion, et fassent le nécessaire !

L'Échange, Revue Linnéenne

Notes diverses, descriptions et diagnoses

(Suite.)

Geotrupes sylvaticus. Varie. Dessus verdâtre à reflets un peu bronzés ou faiblement cuivreux (v. nov. *Viturati*), de Nantes, ou entièrement vert en dessus (v. nov. *Fauconneti*), d'Autun (coll. Pic).

Rhyzotrogus æstivus v. nov. *castaneipennis*. Thorace testaceo, elytris castaneis, Les Guerreaux (Pic). — Cette variété se distingue, à première vue, par la coloration générale, et à peu près uniforme, foncée des élytres qui tranche sur celle du prothorax nettement claire.

Cantharis livida v. nov. *mostarensis*. Capite rufo-testaceo, postice breve nigro notato, pedibus rufo-testaceis, tibiis posticis, pro parte nigris. Mostar (coll. Pic).

Idolus picipennis v. nov. *Moreli*. Elytris nigris, apice rufescentibus? Italie (Morel, in coll. Pic).

Corymbites cupreus v. nov. *brevelineatus*. Purpureus, pro parte viridescens, elytris in disco breve luteo lineatis. Suisse (coll. Pic).

Gonodera luperus v. nov. *obscuriceps*. Supra rufus, capite late nigro. Royat (Pic). — Intermédiaire entre les var. *ferruginea* F. et *castanea* Marh.

Rhynchites præustus v. nov. *brevenotatus*. — Elytris late piceis, humeris testaceis, thorace pro parte piceo. Italie : environs de Gênes (Pic). — Variété intermédiaire entre les variétés *semiruber* Boh. et *nigrinus* Mill.

Rhynchites auratus Scop. v. nov. *Theressæ*. Corpore supra late cupreo aut purpureo. Autun (Fauconnet), Les Guerreaux (Pic). — C'est une sous-variété de coloration, plus répandue que la nuance typique présentant une coloration générale verdâtre (et dont je ne possède qu'un exemplaire originaire d'Autun), suivant la description de Scopoli : « Totus viridi-auratus, antennis rostrisque apice dilatato nigris. »

Rhynchites bacchus v. nov. *semiviolaceus*. Supra purpureo, distincte violaceo tinctus. Hongrie (coll. Pic).

Rhynchites lenaeus v. nov. *subviolaceus*. Pourpré avec des reflets violets qui voilent la coloration foncière. Olympia, en Morée (Pic). — Analogue à la variété précédente.

Rhynchites germanicus v. nov. *Fauconneti*. Avant-corps presque noir, élytres franchement bleus. Autun (Fauconnet).

Rhynchites parallelus s.-esp. *flectirostris*. Nigro-caeruleus, parum nitidus, rostro sat elongato, supra medio in angulum flecto, infra arcuato ; thorace late et dense

punctato ; elytris latis et brevibus, fere instriatis, irregulariter diverse et dense punctatis. — Long. 5 mill. (sine rostro), Hautes-Alpes : Abriès (Pic). Diffère de *parellinus* Gylh. = *pubescens* F. par la structure du rostre, les élytres à ponctuation plus confuse.

Rhynchites angorensis n. sp. ♂. Sat latus et brevis, nitidus, viridi-metallicus, pro parte aureo tinctus, thorace, capite et rostro late cupreis ; thorace antice longe dentato ; elytris pro parte substriatis, sparse parum longe et regulariter hirsutis. Long. 7 mill. (sine rostro) Angora (coll. Pic). — Voisin de *auratus* Scop., en diffère par le prothorax plus étroit, les élytres en partie substriées, à pubescence dressée plus régulière et un peu moins longue.

Leptura (Vadonia) bipunctata v. nov. *rufonotata*. Elytris nigris, lateraliter rufonotatis, humeris nigris. Hongrie (coll. Pic).

Brachyta variabilis v. nov. *subfasciata*. Elytris nigris, ad basin interne uni et externe tri luteo maculatis, ante apicem luteo fasciatis, membris pro majore parte nigris. Sibérie (coll. Pic).

Brachyta Solskyi v. nov. *brevelineata*. Elytris nigris, infra humeros et in disco ad basin luteo maculatis, medio breve luteo lineatis, epipleuris pro parte luteis. Baikal (coll. Pic).

Brachyta Solskyi v. nov. *subjuncta*. Macules postérieures internes flaves jointes sur chaque élytre. Sibérie (coll. Pic).

Brachyta Solskyi v. nov. *Heyrovskiyi*. Elytres à macule présuturale médiane jaune oblitérée. Lac Baïkal (coll. Heyrovsky et Pic).

Brachyta punctata Fald. var. nouvelles, de Sibérie (coll. Pic). Elytres avec l'apex toujours foncé, ces organes étant noirs avec la suture et le repli huméral plus ou moins longuement jaunes (var. nov. *suturalis*), ou ayant en plus, soit une (var. nov. *externereducta*), soit deux (var. nov. *reducta*), macules jaunes supplémentaires externes.

Cryptocephalus pusillus F. A ajouter aux variétés nommées les suivantes de ma collection. v. *Ernesti*, de l'Allier : elytris in disco late nigris et breve testaceo notatis ; elytris nigris, testaceo marginatis, ad scutellum testaceo marginatis (v. *parisiensis*), aut pre basin luteo fasciatis (v. *arcuatetestaceus*), de France ; v. *multinigrinotatus*, de France : elytris testaceis, multi nigro notatis ; v. *Planchezi*, du Morvan : elytris nigris, testaceo cinctis, thorace medio pro parte brunnescente.

Falsoexosoma n. gen. Etabli pour l'ancien *Exosoma cyanipennis* Reitt., avec *diversipennis* Pic (sp. voisine plutôt que simple variété) et caractérisé par les angles des tarsi bifides alors qu'ils sont appendiculés chez les *Exosoma* Jac. Je suis en cela d'accord avec Laboissière, suivant la note qu'il a publiée à ce sujet (*Coléoptères*, I, 1925, p. 50, note 3).

(A suivre.)

M. Pic.

Attalus impectoralis n. sp. Elongatus, subparallelus, hirsutus, nitidus, niger, labro, thorace, antennis ad basin et pedibus pro parte rufis. Long. 3 mill. Tonkin. — Voisin de *binhanus* Pic, en diffère par la poitrine foncée, la forme plus parallèle, etc.

Le **A. luteoapicalis** mihi, du Tonkin, très voisin du précédent, est un peu plus grand avec les membres foncés, les élytres marquées de testacé-jaunâtre au sommet.

A. apiciventris n. sp. Subparallelus, parum nitidus, holosericeo pubescens, fere inhirsutus, nigro-plumbeus, labro flavo, antennis ad basin infra et abdomine apice testaceis, elytris apice luteo notatis. Long. 3 mill. Tonkin. — Voisin du précédent, en diffère par le sommet de l'abdomen testacé, le prothorax foncé, etc.

Colotes Phungi n. sp. Oblongus, postice late dilatatus, subconvexus, nitidus, parum pubescens, nigro-metallicus, antennis ad basin, tibiis anticis geniculisque testaceis; capite robusto, fere impunctato; thorace breve et lato, postice attenuato-strangulato, sparse punctato; elytris thorace sat latioribus, postice valde dilatatis, distincte et sparse punctatis. Long. 2 mill. Tonkin. — Peut se placer près de *punctatus* Gorb.; moins fortement ponctué, plus bombé et de coloration uniforme.

C. lateflavus n. sp. Oblongus, postice paulo dilatatus, parum convexus, nitidus, fere glaber, niger, membris thoraceque testaceis, illo postice pallidiore, elytris flavo-testaceis, ad basin triangulariter nigris et apice nigro marginatis, minute sat dense punctatis. Long. 2 mill. Tonkin. -- Espèce très distincte par sa coloration.

Il n'y a pas lieu de muter **Cantharis Kasmirensis** Pic (1916), étant donné que **Kasmirensis** Pic (1909) se classe parmi les **Themus** Mots. et étant donné que **Themus** Mots. peut être adopté comme genre.

Cantharis rufohumeralis n. sp. Parum elongatus, nitidus, pubescens, rufus, antennis, apice pedibusque pro parte piceis, elytris rufis, ad basin et apice cyaneo notatis. Long. 12 mill. Indes. — Très voisin de *ceruleomaculata* K. R., en diffère par les épaules rousses, le 2^e article des antennes relativement long.

Absidia sannenensis n. sp. Elongatus, nitidus, pubescens, niger, capite antice et post oculos thoraceque rufis, illo antice et postice nigro marginato, parum elongato, medio et lateraliter impresso; elytris rugulosis, medio costulatis. Long. 7 mill. Chine. — Voisin de *tonkinea* Pic, en diffère par les élytres plus longues, le prothorax moins droit sur les côtés, la tête bicolore.

Podabrus flavofacialis n. sp. Angustatus, nitidus, niger, capite antice, coxis, antennis infra femoribusque ad basin flavis, thorace testaceo, illo elongato et angustato; capite lato; articulis mediis antennarum deplanatis et apice intus dentatis. Long. 8 mill. Chine. — Voisin de *exophthalmus* Frm. caractérisé par sa structure antennaire, sa tête flave en avant, etc.

P. particularicornis n. sp. Angustatus, nitidus, niger, capite antice breve, antennis pro parte, coxis, femoribus ad basin thoraceque rufis, illo medio minute piceo notato; elytris violaceis; articulis mediis antennarum subsinuatis, apice dilatatis, ultimis elongatis. Long. 8 mill. Chine. — Voisin de *crassicornis* Pic, antennes de structure différente, cuisses largement foncées, etc.

Falsoenylus n. gen. Capite breve, rostro breve, fere nullo; antennis depressis, sat brevibus; thorace breve, trapezoidale, medio areolato; elytris thorace sat latioribus. ad suturam antice reducte costatis, in disco longe tricostatis, intervallis bilineato

punctato-fenestratis. — Très distinct, à première vue, de *Enylus* Wat. par les côtes des élytres différentes, dont la première raccourcie, le prothorax plus étroit que les élytres, très rétréci en avant.

Falsoenylys basipennis n. sp. Elongatus, nitidus, niger, thorace circa scutelloque rufis, elytris ad basin late aurantiacis. Long. 8 mill. Luzon.

Trichalus latesuturalis n. sp. Elongatus, fere opacus, flavus, antennis elytrisque lateraliter late nigro-fuliginosis; thorace parum elongato, lateraliter fere recto. Long. 9 mill. Nouvelle Guinée. — Espèce reconnaissable, à première vue, par sa particulière coloration.

Leptotrichalus pomeraniensis n. sp. Elongatus, fere opacus, rufo-aurantiacus, membris, femoribus ad basin exceptis, abdomineque nigro-piceis, elytris nigris, infra humeros vage aurantiacis; antennis sat gracilibus; thorace parum elongato, lateraliter subsinuato. Long. 10 mill. N^{le} Poméranie. — A le prothorax moins allongé que les espèces du groupe.

Lycomorphon nitidum n. sp. Paulo nitidus, niger, articulis 2 ultimis antennarum testaceis, elytris postice et externe testaceo notatis. Long. 6-7 mill. Colombie. — Très distincte par sa coloration des espèces déjà décrites.

L. opacum n. sp. Opacus, niger, elytris postice et externe testaceo notatis. Long. 8 mill. Colombie. — Distinct, à première vue, du précédent par les élytres plus noires et opaques.

Cephalolycus n. gen. Capite robusto, valde excerpte, oculis magnis, antennis elongatis, depressis et latis, pro parte pectinatis, articulis 2-3 reductis; thorace trapeziiforme, antice valde attenuato, medio postice depresso, antice carinato; elytris postice dilatatis, tricarinatis, intervallis irregulariter et multi plicatis; pedibus deplanatis. — Voisin de *Callanganum* Pic. tête plus robuste, yeux plus gros, antennes et sculpture des élytres différentes, les trochanters longs et minces.

Cephalolycus major n. sp. Elongatus, elytris postice dilatatis, subopacus, niger, elytris postice et externe aurantiaco notatis. Long. 8 mill. Colombie.

Cavoplateros sinuatidens n. sp. Nigro-piceus, thorace lateraliter luteo, spina femorum longissima, sinuata, tibiis posticis intus dilatatis. Long. 6 mill. Bolivie. — Espèce caractérisée conjointement par la structure des pattes postérieures et le prothorax largement jaune sur les côtés.

T. plicaticollis n. sp. ♀ Niger, articulo 1^o antennarum parum elongato et robusto; thorace subquadrato, postice arcuate plicato. Long. 8 mill. Colombie. — Espèce très distincte, à première vue, par la structure particulière du prothorax.

Conderis notatipennis Pic. Varie par les élytres largement noires sur leur milieu et plus ou moins pourprées sur le reste (v. nov. *lateniger*), ou par les élytres noires avec une macule humérale allongée rousse (v. nov. *humeralis*) Tonkin.

Calochromus Coomani n. sp. Elongatus, nitidus, subparallelus, niger, thorace elytrisque aurantiacis, antennis vage cyanescentibus, parum crassis; thorace subquadrato, medio longe sulcato; elytris subcostulatis. Long. 7-8 mill. Tonkin. — Voisin de *simplicicornis* Pic et s'en distinguant, à première vue, par le prothorax moins large, à côtés plus droits.

Lycostomus binhanus n. sp. Parum elongatus, subnitidus, breve pubescens, rufotestaceus, capite postice, antennis pedibusque pro majore parte nigris; rostro sat elongato, gracile; antennis parum depressis, nigris, ad basin rufis; thorace antice sinuato, lateraliter oblique subrecto, angulis posticis sat prominulis et latis; elytris subparallelis, sat brevibus, fortiter costatis, intervallis indistincte sculpturatis; pedibus nigris, femoribus ad basin late rufis; abdomine pro parte nigro. Long. 8 mill. Tonkin. — A placer près de *Anceyi* Pic, coloration tout autre et élytres à côtes plus nombreuses.

Le **L. atrimembris** mihi, de Chapa, voisin du précédent, s'en distingue par le prothorax foncé, un peu plus robuste, à angles postérieurs plus larges, les élytres plus longues, l'écusson noir, le dessous du corps et les membres noirs, le rostre noir et moins étroit.

L. brevebilineatus n. sp. Oblongo-elongatus, postice dilatatus, nitidus, niger, elytris thoraceque aurantiacis, illo medio reducte nigro bilineato; rostro sat robusto, parum elongato; antennis nigris, articulo 1° infra testaceo; thorace fere subquadrato, antice valde sinuato, lateraliter fere recto, angulis posticis postice longe prominulis; elytris ad humeros arcuate costatis, postice dilatatis, fortiter costatis, intervallis rugulosis; pedibus nigris, femoribus anticis ad basin brunnescentibus. Long. 12 mill. Indochine. — Espèce caractérisée par sa forme jointe à sa coloration. Peut se placer pres de *præustus* F.

L. madurensis n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, parum aurantiacus, antennis apice, tibiis tarsisque nigris. Long. 10 mill. Indes MÉR. — Voisin du précédent, prothorax moins long à angles postérieurs presque droits et non prolongés en arrière, membres moins foncés, écusson clair, élytres à côtes moins nettes et marquées de noir au sommet. — A placer près de *analisis* Dalm.

L. curtithorax n. sp. Sat elongatus, subparallelus, parum nitidus, niger, thorace, scutello elytrisque purpureis, articulo 1° antennarum infra, femoribus ad basin et infra breve rufis, infra corpore rufo, nigro-notato; rostro parum elongato; antennis deplanatis, articulis 3 et sequentibus apice angulatis; thorace breve et lato, antice sinuato, angulis posticis valde prominulis; elytris distincte costatis, intervallis rugulosis et paulo plicatis, post humeros paulo dilatatis. Long. 15 mill. Tonkin. — Espèce voisine de *similis* Hope, caractérisée par son prothorax court et large, concolore.

Plateros curtelineatus n. sp. Angustatus, subparallelus, nitidus, niger, thorace circa elytrisque aurantiacis, his ad basin breve nigrolineatis. Long. 6 mill. Chine. — Espèce très distincte par sa particulière coloration. A placer près de *peguensis* Pic.

P. tonkinensis n. sp. Angustatus, subparallelus, nitidus, niger, capite rufescente, scutello thoraceque testaceis, illo medio purpureo, elytris purpureis, longissimis; thorace elongato, antice subarcuato. Long. 9 mill. Tonkin. — Diffère du précédent, en outre de la coloration, par le prothorax plus long et nettement prolongé en arc en avant.

Ditoneces limbatus n. sp. Angustatus, subparallelus, parum nitidus, niger, elytris rufo marginatis, antennis parum crassis, sat elongatis, pilosis; thorace breve et lato, circa vage rufescente. Long. 5 mill. Tonkin. — Espèce très distincte par sa coloration.

D. atripennis n. sp. Angustatus, subparallelus, nitidus, niger, thorace testaceo, medio late piceo, illo breve et lato; antennis elongatis, parum crassis, pilosis. Long. 9 mill. Tonkin. — Distinct du précédent, en outre de la coloration, par le prothorax non un peu plus étroit que les élytres et ces derniers organes plus fortement ponctués.

D. hoanus n. sp. Angustatus, subparallelus, nitidus, niger, thorace, scutello elytrisque aurantiacis; antennis validis, pilosis; thorace sat breve et lato, antice medio arcuato prolongato. Long. 7-7, 5 mill. Tonkin. — Voisin de *insicollis* Pic, en diffère par la tête franchement noire, le sillon prothoracique large et moins régulier.

D. disconiger n. sp. ♂ Elongatus, niger, nitidus, thorace elytrisque rufis, medio nigris; antennis sat gracilibus, pilosis; thorace parum breve et lato, antice sinuato; elytris, thorace non latioribus, medio nigris, circa et ad humeros rufis. Long. 6 mill. Tonkin. — Voisin de *bifoveiceps* Pic avec une coloration particulière, se rapprochant de celle de *limbatipennis* Pic, mais en différant par la structure du prothorax, la forme moins allongée.

D. suturalis n. sp. ♀ Elongatus, subparallelus, parum nitidus, elytris opacis, niger, capite brunnescente, thorace elytrisque aurantiacis, his ad suturam antice nigro marginatis; antennis parum validis, pilosis; thorace breve et lato, antice subarcuato, medio fortiter sulcato; elytris thorace paulo latioribus. Long. 8 mill. Java. — Espèce très distincte par sa coloration et son fort sillon prothoracique.

Cladophorus binhanus n. sp. ♂ Angustatus, subparallelus, subopacus, niger, thorace, scutello elytrisque rufis, his apice late nigris; antennis flabellatis; thorace parum breve, lateraliter fere recto, antice sinuato, 5 areolato. Long. 8 mill. Tonkin. — Voisin de *Laboissieri* Pic et s'en distinguant, à première vue, par la structure et la coloration du prothorax.

C. hoanus n. sp. ♂ Angustatus, parallelus, subopacus, niger, thorace scutello elytrisque aurantiacis; antennis parum gracilibus, flabellatis; thorace fere quadrato, antice sinuato, 5 areolato. Long. 7 mill. Tonkin. — Voisin de *Laboissieri* Pic, en diffère, à première vue, par les élytres concolores.

C. inapicalis n. sp. ♂ Angustatus, subparallelus, fere opacus, niger, thorace, scutelloque testaceis, elytris aurantiacis; antennis parum gracilibus, flabellatis; thorace sat breve, antice sinuato-arcuato, lateraliter postice fere recto. 7 areolato. Long. 11 mill. Tonkin. — Très distinct du précédent par le prothorax de structure différente et plus pâle que les élytres.

Le **C. laticollis** mihi, du Laos, dont le type est une ♀, à antennes déprimées et subpectinées, diffère du précédent par la coloration générale orangée du dessus du corps, le prothorax court et très large, nettement prolongé sur son milieu antérieur et les élytres moins longues.

C. particularis n. sp. ♀ Angustatus, subparallelus, fere opacus, niger, elytris thoraceque aurantiacis, his medio nigro-notatis; antennis depressis et dentatis; thorace sat transverso, antice medio valde prolongato, 5 areolato, angulis posticis posticè paulo prominulis; elytris diverse costatis, intervallis distincte et irregulariter punctato-foveolatis aut punctato-fenestratis. Long. 10 mill. Tonkin. — Espèce caractérisée par la structure élytrale jointe à la forme du prothorax.

Hyménoptères nouveaux. II ⁽¹⁾

PAR M. PIC (suite).

Platylabus atricornis n. sp. Parum elongatus, paulo nitidus, fortiter punctatus, niger, orbitis internis capitis luteis; pedibus pro parte rufis; antennis longissimis, nigris; capite breve, postice sat lato, fortiter et dense punctato; spiraculis parum distinctis, subrotundatis; postpetiole ruguloso-punctato, abdomine parum lato, pro parte fortiter et dense punctato, gastroscelis impressis; pedibus anticis rufis et luteo notatis, femoribus intermediis tibiisque apice et tibiis posticis pro parte rufis. Long. 8 mill. Royat. — Peut se placer près de *rubellus* Grav en diffère par le front fortement ponctué, les gastrocèles grands, les pattes plus foncées.

Ichneumon quæstorius L. ♀, var. nov. Segmentarum abdominis 3 et sequentibus (v. *Bargoini*), aut 4 et sequentibus (v. *Gravenoirei*) albo notatis. Royat.

Ichneumon 4 albatu v. *colinensis* ♀. Segmentibus 2-3 abdominis late rufis. Les Guerreaux.

Ichneumon atricornis n. sp. ♂. Minutus, niger, pedibus pro parte, et segmentibus abdominis 2 et 3 rufis, illo nigro notato, antennis nigris, parum gracilibus; capite inter oculos albo marginato; thorace nigro, infra aliis albo notato, fortiter punctato; postpetiole fortiter et dense punctato; pedibus anticis pro majeure parte, geniculis tibiisque intermediis et tibiis posticis ad basin rufis. Long. 8 mill. Royat. — Voisin de *basyglyptus* Kriech et s'en distinguant, à première vue, par le vertex non maculé de blanc, les ailes plus foncées, un peu noirâtres, les gastrocèles à peine marqués, à intervalle large.

Ichneumon nigritariu v. nov. *charadensis* ♀. Niger, antennis albo annulatis, tibiis externe albo notatis. Royat.

Ichneumon castaneu v. nov. *royatensis* ♀. Thorace, postpetiole abdomineque apice late nigris, pedibus pro parte nigris. Royat.

Ichneumon castaneu v. n. *fieschensis* ♀. Abdomine nigro, segmente 2° et postpetiole apice rufis. Suisse.

Allantus Kœhleri Kl. : v. *subinterruptus* ♂, bande du 5° segment de l'abdomen interrompue; v. *multiplicatus* ♀, bande du 6° segment interrompue et 4° maculé de blanc sur les côtés. Royat.

Allantus scrophulariæ L. Variétés nouvelles v. *Joannis* ♂, de la Motte, Segmento 4° abdominis interrupte fasciato; v. *repartitus* ♂, du Morvan et Saint-Agnan, segmente 2° nigro, 3° luteo notato; v. *morvandicus* ♂, de Planchez, segmentibus 2° abdominis nigro, luteo trinotato; v. *branensis* ♂ ♀, des Guerreaux, segmente 2° abdominis lateraliter luteo maculato et 3° luteo marginato.

Allantus meridianu v. *Gravenoirei* ♀. Corpus satis elongatus, articulo 1° antennarum late nigro, segmento 2° abdominis multi luteo notato. Royat.

(1) Voir 1^{er} article in « L'Echange » 1925, p. 12 et 14. Tous les types sont dans ma collection et proviennent pour la plupart de mes chasses.

Tenthredo pallicornis F. (1). Varie par le 2^e segment abdominal (v. *separatus*) maculé sur les côtés ; où, chez ♂, par les segments abdominaux postérieurs fasciés, les antérieurs étant largement jaunes, soit avec le 2^e seul (v. *immaculatus*), soit avec 2^e et 3^e (v. *bimaculiventris*) maculés de noir au milieu, 4^e toujours jaune sauf un trait indistinct basal. Royat.

Tenthredo maculata Geof. ♂ de Royat (v. *mediobinotata* à 3^e segment de l'abdomen jaune et maculé de noir ou v. *atroapicalis* à 7^e segment de l'abdomen entièrement noir en dessus et 3^e jaune ainsi que les suivants ; ♀ v. *Quittardi* à 3^e et 6^e segments maculés de jaune, 4^e et 5^e jaunes, les autres noirs. Royat et Riom.

(A suivre.)

M. Pic.

Coléoptères exotiques en partie nouveaux

(Suite.)

Falsobrium n. gen. Capite valido, oculis maximis, approximatis, antennis corpore longioribus, infra ad basin sparse hirsutis, articulis 3-5 apice longe et filiforme spinulosis, thorace antice et postice strangulato, medio tuberculato ; elytris latis et brevibus, supra impressis ; coxis anticis subglobulosis, femoribus subclavatis ; segmento 1^o abdominis elongato. — Ressemble à *Obrium* Serv. et caractérisé par ses longues antennes munies d'épines piliformes, ses élytres impressionnées, etc.

Falsobrium apicale n. sp. Parum elongatus, nitidus, sparse pubescens et pro parte hirsutus, rufus, capite, articulis 1-3 antennarum, pedibus (femoribus ad basin testaceis), elytrisque apice nigris. Long. 9 mill. Tonkin. Hoa Binh. (R. P. de Cooman — ainsi que les suivantes, au Tonkin, moins *melegena* — in coll. Pic). — Les élytres chez cette espèce offrent une petite impression postscutellaire, une longue oblique pré-humérale, une 3^e allongée et discale antéapicale, celle-ci presque lisse.

Melegena simplicicollis n. sp. Angustatus, parum nitidus, hirsutus, cyaneus, antennis ad basin late testaceis, medio obscuris et ante apicem albo notatis, his longissimis, infra corpore pedibusque nigris, femoribus ad basin et tibiis anticis pro parte testaceis, thorace elongato, lateraliter medio tuberculato, supra medio fortiter et irregulariter punctato ; elytris lineato-punctatis, apice parum et sparse punctatis. Long. 10 mill. Tonkin (coll. Pic). — Très distinct de *cyanea* Pasc., soit par la coloration de ses antennes, soit par la sculpture de son prothorax.

Nemostira binhana n. sp. Plus ♂, minuscule ♀, elongatus, nitidus, pro parte brevis et sparse luteo pubescens, rufo-testaceus, pedibus, femoribus ad basin exceptis, capite, palpis antennisque nigris, elytris cyaneis ; thorace brevis et lato, postice marginato, ad basin strangulato, parum et diverse punctato, testaceo, late nigro bimaculato ; elytris dense et sat fortiter punctatis aut plicatis. Long. 15-17 mill. Hoa-Binh. — Peut se placer près de *semiviridis* Pic. coloration et sculpture des élytres très différentes.

(A suivre.)

M. Pic.

(1) *Allantus Thoresæ* Pic. (*Ech.* 1925, p. 15) doit être rapporté à cette espèce comme variété.

AVIS DIVERS

Des entomologistes, anciens abonnés de l'*Echange*, nous écrivent quelquefois, soit pour demander des numéros du journal égarés, soit pour obtenir l'envoi des dernières années qui leur manquent, et cela sans s'inquiéter du paiement qui en découle. Nous rappelons que le journal est régulièrement envoyé à tous ceux qui ayant, en temps voulu, payé ce qu'ils doivent, sont en règle. Ceux qui ne reçoivent pas régulièrement l'*Echange* doivent s'en prendre à leur négligence, et non pas à la rédaction. La rédaction ne tient compte des réclamations qu'autant qu'elles sont fondées et n'a rien à procurer à ceux qui, en retard, n'auront pas, au préalable, acquitté ce qu'ils doivent en envoyant le montant des abonnements en retard. Le Directeur de l'*Echange* rappelle qu'il ne répond plus aux demandes diverses, lorsqu'il n'est pas mis par l'intéressé un timbre pour la réponse.

Il est bien entendu que l'*Echange*, qui paraît toujours, mais en numéros espacés, est régulièrement envoyé à tous ceux ayant payé leur abonnement de l'année en cours; en conséquence, ceux qui ne reçoivent rien doivent s'inquiéter, s'ils l'ignorent, de la raison *toujours motivée* qui les prive du journal.

Cette année, il ne sera pas envoyé de traite, mais le journal non plus (ce numéro compris) ne sera plus adressé à ceux qui n'ont pas encore réglé leur abonnement pour l'année courante. Prière aux abonnés en règle de faire connaître aux autres, à l'occasion, les paragraphes divers imprimés ci-dessus.

Si quelques rares abonnés semblent oublier ce qu'ils reçoivent, par compensation, d'autres, fort aimables, nous envoient un surplus de leur abonnement; que ces généreux soient, une fois pour toutes, remerciés de leur geste serviable et désintéressé.

Le Directeur de l'*Echange* prie ses correspondants de vouloir bien lui faire parvenir d'avance les frais nécessaires pour le retour des envois communiqués. Dorénavant, si les frais ne lui sont pas remboursés, celui-ci n'étudiera plus rien, et il ne sera répondu qu'aux lettres avec timbre pour réponse. Etant donné les nombreux envois reçus en étude, M. Pic prie ses correspondants de ne pas être trop pressés pour le retour de leurs envois. Il est matériellement impossible pour lui d'aller vite, sauf quand les envois sont petits, et les insectes propres et bien préparés.

Ont payé leur abonnement à l'*Echange* pour 1926, depuis le 1^{er} mai jusqu'au 31 juillet : MM. Briel, Bureau, Hardy, Dr Hollande, Institut Chérifien, Institut de l'Indo-Chine, Méquignon Roger, Seyrig, Testout, Dr Vaillant, Vitale Francesco.

M. R. Cordier, à Beautiran (Gironde), demande des *Lépidoptères*, en échange de *Coléoptères* de sa région, tels que *Cicindèles*, *Chlawnius velutinus*, etc. Il recherche également l'ouvrage de Joannis sur les *Lépidoptères*, avec planches en couleurs.

M. Pigeot, professeur, 3, rue Saint-Vivien, à Saintes (Charente-Inférieure), se met à la disposition des jeunes entomologistes désirant commencer l'étude des *Hyménoptères*, ordre le plus intéressant de toute la classe des Insectes.

CARABIDÆ

Je cherche des relations d'échange et offre : *Carabus cal. v. procerus* Reitt.; *viol. v. rilvensis* Kolbe; *cancell. v. balcanicus* et *v. lionensis*; *scabrius, v. bulgarus*, etc.

Paul Preiss, Boppard-sur-Rhin, Sauerlingstrasse, 29, (Allemagne).

NOTES DE CHASSES

Mme Maurice Pic a capturé, sur des arbres divers abattus, dans une scierie près de Royat (Puy-de-Dôme), en juin dernier: *Thanasimus formicarius* Payk.; *Anthaxia manca* F.; *Elater sanguineus* L.; *Pityophagus ferrugineus* L. var.; *Asemum striatum v. agreste* F.; *Tetropium luridum* L. et var. *aulicum* F. Elle a capturé aussi à Royat, du côté du « Paradis », *Dorcadion fuliginator v. monticola* Muls.

M. Maurice Pic a capturé à Fontanas (Puy-de-Dôme), au commencement de juin 1926: *Pterostichus madidus* F. var.; *Carabus monilis* F. et var.; *Necrophorus vespillo* L., *Selatosomus æneus* L. et var., *Elater pomorum* Herbst., *Melanotus rufipes* Herbst., *Corymbites sjeelandicus v. micans* Germ., *Agriotes obscurus* L., *Cardiophorus (Platynychus) cinereus* Heer., *Anthaxia semicuprea* Kust., *Priobium tricolor* Ol., *Cantharis violacea v. innotaticeps* Pic, et *v. notaticeps* Pic, *pellucida* F. et *v. Rauterbergi* Reitt., *Danacæa pallipes* Panz., *Rhagium mordax* Deg., *Anoplodera rufipes* Sch., *Cortodera humeralis* var. *suturalis* F., *Grammoptera ustulata* Schr., *Anaglyptus mysticus* et *v. hieroglyphicus* Herbst., *Hypera punctata* F., *Phytonomus pedestris*-Payk., *Crioceris merdigera* L.