

RTP Taphonomie

Table Ronde
TAPHONOMIE DES PETITS VERTEBRES :
REFERENTIELS ET TRANSFERTS AUX FOSSILES

20 et 21 octobre 2009

Organisée par
V. Laroulandie, J.-B. Mallye et C. Denys

Campus de Talence, Université de Bordeaux 1
(Domaine du Haut-Carré, salle Badiane)

Programme et résumés



***IMPACTS TAPHONOMIQUES SUR LES ASSEMBLAGES FAUNIQUES LIES AUX PETITS VERTEBRES,
A PARTIR DE DEUX EXEMPLES ISEROIS : PRELETANG (PALEOLITHIQUE MOYEN) ET L'AULP DU
SEUIL 2 (MESOLITHIQUE)***

Christophe GRIGGO

LAMPEA - UMR 6636, Université Joseph Fourier - Grenoble I, Institut Dolomieu, 15 rue Maurice Gignoux,
38 031 GRENOBLE cedex, France
cgriggo@ujf-grenoble.fr

Les petits Vertébrés, par leurs comportements éthologiques liés à la recherche de nourriture ou d'un hébergement, peuvent être à l'origine de modifications ou de contaminations des assemblages archéologiques originels. Nous allons vous présenter deux exemples :

- La grotte de Prélétang, située sur le plateau du Vercors, présente au niveau de son porche un site archéologique datant du Paléolithique moyen. Ce site, fouillé par T. Tillet, entre 1994 et 1999, a livré une faune peu abondante se rapportant à une dizaine d'espèces différentes : dont la Marmotte. T. Tillet et A. Argant ont pensé que ce gros Rongeur avait été chassé par les Néandertaliens, au même titre que les différents Ongulés. De plus, en raison de la relative abondance de cette espèce, la grotte de Prélétang pouvait correspondre à un site de chasse spécialisée à la Marmotte, tout comme cela a été mis en évidence, également dans le Vercors mais pour le Paléolithique supérieur final. Une révision taphonomique a montré qu'il s'agissait d'animaux morts au fond de leurs terriers, contaminant ainsi les niveaux archéologiques.

- L'Aulp du Seuil 2 correspond à un abri sous bloc situé à 1700 m d'altitude. La faune mésolithique recueillie, par P. Bintz, (fouilles 1999-2000) est constituée essentiellement de Chamois et Bouquetin. Il s'agit d'une faune chassée. Cependant, une grande proportion des ossements a été grignotée par des petits Rongeurs. Selon les secteurs, ces traces sont observables sur plus de 45 % du matériel osseux et donnent un aspect crénelé aux bords des cassures des fragments de diaphyses d'os longs. Ces Rongeurs ont fortement modifié l'assemblage osseux d'origine anthropique, ce qui limite considérablement les analyses archéozoologiques.
