

УГАМ-ЧАТКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК И ЧАТКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БИОСФЕРНЫЙ
ЗАПОВЕДНИК



ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
5 МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО
СУРКАМ

ТАШКЕНТ, УЗБЕКИСТАН

31 августа-2 сентября 2005

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ПО ИЗУЧЕНИЮ СУРКОВ

ТАШКЕНТ, 2005

5 Международная конференция по Суркам. Тезисы докладов. Ташкент, Узбекистан, 31 августа-2 сентября 2005 г. – Ташкент, 2005. 134 с.

В сборник вошли тезисы докладов по различным направлениям исследований, отражающих современные тенденции в изучении рода *Marmota*. Представленные работы посвящены исследованиям в области экологии, систематики, филогении, палеоэкологии, этологии, морфологии, физиологии, паразитологии, эпидемиологии, акклиматизации и разведения сурков в неволе, а так же охраны и управления природными популяциями сурков.

Сборник предназначен для широкого круга специалистов - зоологов и экологов, сотрудников природоохранных организаций, студентов и др.

Редакционная коллегия:

Быкова Е.А.

Есипов А.В.

Вашетко Э.В.

Экологическая Издательская Компания
«Чинор ЭНК»

Подписано в печать 26.08.2005

Объем 9 печатных листов

Заказ №98 от 09.08.05

Формат 60x84 1/16

Печать офсетная, тираж 100 шт.

Отпечатано в типографии ЧП «Федоренко»

Ул.Фархадская 10А тел.: 50-03-80

ОБ ИНТРОДУКЦИИ СУРКА-БАЙБАКА В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ

Князев М.Н.¹, Лаврова О.В.¹, Дмитриев А.В.²

¹Государственный природный заповедник «Большая Кокшага», Йошкар-Ола, Россия;

²Государственный природный заповедник "Присурский", Чебоксары, Россия

В лесостепную часть Горномарийского района Республики Марий Эл 18.08.93 г. в искусственные норы было выпущено 50 сурков, отловленных в урочище Чатыр-Тау Азнакаевского района Татарстана. На первое время было занято 9 нор, на зиму звери залегли в 7 норах. В следующий год первые выходы сурков на поверхность отмечены в начале апреля. Численность перезимовавших зверей соответствовала предзимней. В первую весну не было и ни одного выводка молодняка. Созданный для охраны колонии байбака государственный заказник «Емешевский» республиканского значения на площади 3,4 тыс. га способствовал ограничению антропогенного воздействия. Положением о заказнике был ограничен выпас скота в пределах непосредственной близости от колонии. По истечении 10 лет пастба скота разрешена, но видимого отрицательного воздействия на активность зверей она не оказывает, сурки подпускают коров и даже пастухов на расстояние 15-30 м, проявляя пугливость по отношению к собакам. Рост численности байбака в этом поселении начался с появлением первых выводков молодняка - через два года после выпуска, т.е. в 1995 году. Дальнейший рост поголовья и изменение его структуры отражены в таблице.

Таблица

Динамика численности сурка-байбака в Республике Марий Эл

Год	Численность				Расселено				
	всего	взрослые	годовалые звери	сеголетки	всего	взрослые самки	взрослые самцы	самки-сеголетки	самцы-сеголетки
1993	-	-	-	-	50	10	10	15	15
1994	27	7	20	-					
1995	26	26	-	-	30	8	8	8	6
1996	53	27	14	12					
1997	91	43	12	36					
1998	105	37	36	32					
1999	130	70	30	30	* 7	1	2	2	2
2000	137	76	26	35					
2001	161	84	35	42	* 6	2	1	1	2
2002	177	99	40	38					
2003	193	116	30	47					
2004	203	107	45	51					

* - внутриреспубликанское расселение