

УГАМ-ЧАТКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК И ЧАТКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БИОСФЕРНЫЙ
ЗАПОВЕДНИК



ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
5 МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО
СУРКАМ

ТАШКЕНТ, УЗБЕКИСТАН

31 августа-2 сентября 2005

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ПО ИЗУЧЕНИЮ СУРКОВ

ТАШКЕНТ, 2005

5 Международная конференция по Суркам. Тезисы докладов. Ташкент, Узбекистан, 31 августа-2 сентября 2005 г. – Ташкент, 2005. 134 с.

В сборник вошли тезисы докладов по различным направлениям исследований, отражающих современные тенденции в изучении рода *Marmota*. Представленные работы посвящены исследованиям в области экологии, систематики, филогении, палеоэкологии, этологии, морфологии, физиологии, паразитологии, эпидемиологии, акклиматизации и разведения сурков в неволе, а так же охраны и управления природными популяциями сурков.

Сборник предназначен для широкого круга специалистов - зоологов и экологов, сотрудников природоохранных организаций, студентов и др.

Редакционная коллегия:

Быкова Е.А.

Есипов А.В.

Вашетко Э.В.

Экологическая Издательская Компания
«Чинор ЭНК»

Подписано в печать 26.08.2005

Объем 9 печатных листов

Заказ №98 от 09.08.05

Формат 60x84 1/16

Печать офсетная, тираж 100 шт.

Отпечатано в типографии ЧП «Федоренко»

Ул.Фархадская 10А тел.: 50-03-80

ЛЕСОСТЕПНОЙ СУРОК В КУЗБАССЕ

Поляков А.Д.

Кемеровский сельскохозяйственный институт, Кемерово, Россия, a.polyakov@ksai.ru

В настоящее время статус лесостепного сурка Кащенко предлагается повысить до уровня вида (Брандлер, 2003). Это в корне меняет подход в вопросах его охраны, так как его численность в Кузбассе около 3 тыс. голов. Этот зверек хорошо уживается с человеком при отсутствии прямого преследования. Основная масса колоний сосредоточена в трех районах области. Сурок встречается только в лесостепи Кузнецкой котловины. Биология и вопрос его изъятия практически не изучены. Типичные места обитания сурка - южные склоны логов с тремя типами нор: зимних, летних, кормовых, или защитных. Вход в нору ориентирован на юг или юго-восток. Зимние норы располагаются чаще на вершине склона. Они хорошо заметны издали по бутанам (сурчинам) со многими тропами (3-5). В местах с выпасом скота, и на сенокосах, на бутанах нет растительности. Основной вход имеет площадку (пост наблюдения) до 1 м в диаметре. Склоны сплошь изрезаны продольными тропами. Тропы почти прямые, их ширина - 8-12 см. Летние норы недалеко от зимних нор (5-10 м). У них бутан может и отсутствовать. В летних норах мы часто наблюдаем самок с детенышами. Защитные норы располагаются в 100 м от зимних нор, в местах кормежки. У одной семьи до 10 таких нор, без бутанов с одним входом и отличной маскировкой. Эти норы предпочитает молодняк в случае опасности. Сурок охраняется в Кузбассе (включен в приложение Красной Книги Кузбасса только серый сурок). Но этот зверек должен рассматриваться и как природный резервуар опасных инфекций. Антропогенная трансформация будет способствовать взаимообмену эктопаразитами сурков и домашних животных. Контакт его с клещами *Ixodes persulcatus* и *Ixodes crenulatus* может вызвать вспышки природно-очаговых заболеваний. Значительные различия в биологии сурков двух популяций (Топкинский и Крапивинский районы) подтверждают наличие двух видов сурков в Кузбассе (Поляков, 2002-2005). Для более детального уточнения границ их распространения необходимы комплексные исследования с привлечением многих специалистов России и Зарубежья.