

УГАМ-ЧАТКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК И ЧАТКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БИОСФЕРНЫЙ
ЗАПОВЕДНИК



ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
5 МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО
СУРКАМ

ТАШКЕНТ, УЗБЕКИСТАН

31 августа-2 сентября 2005

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ПО ИЗУЧЕНИЮ СУРКОВ

ТАШКЕНТ, 2005

5 Международная конференция по Суркам. Тезисы докладов. Ташкент, Узбекистан, 31 августа-2 сентября 2005 г. – Ташкент, 2005. 134 с.

В сборник вошли тезисы докладов по различным направлениям исследований, отражающих современные тенденции в изучении рода *Marmota*. Представленные работы посвящены исследованиям в области экологии, систематики, филогении, палеоэкологии, этологии, морфологии, физиологии, паразитологии, эпидемиологии, акклиматизации и разведения сурков в неволе, а так же охраны и управления природными популяциями сурков.

Сборник предназначен для широкого круга специалистов - зоологов и экологов, сотрудников природоохранных организаций, студентов и др.

Редакционная коллегия:

Быкова Е.А.

Есипов А.В.

Вашетко Э.В.

Экологическая Издательская Компания
«Чинор ЭНК»

Подписано в печать 26.08.2005

Объем 9 печатных листов

Заказ №98 от 09.08.05

Формат 60x84 1/16

Печать офсетная, тираж 100 шт.

Отпечатано в типографии ЧП «Федоренко»

Ул.Фархадская 10А тел.: 50-03-80

БЛОХИ (*SIPHONAPTERA*) ТАРБАГАНА (*MARMOTA BOBAK RADDE*) ИЗ МОНГОЛИИ

Пунтсагдулам Дж., Ехнасан Д., Алтанчимег Д.

Институт Биологии, Академия Наук Монголии, puntsagdulam_j@yahoo.com,
dav_enkh@yahoo.com, altanchimeg_d@yahoo.com

Блохи Монголии описаны в работах Zhovtyi I.F., Jordan K., Ioff F. G., Scalon O. I., Smith F. G. и Bavaasan A.

Фауна блох Монголии включает 12 подвигов 101 вида, представляющих 37 родов найденных в настоящее время на 67 видах домашних животных (53 видах млекопитающих, 14 видах птиц). Из них 15 видов Hystrichopsyllidae, Ceratophyllidae, Leptopsyllidae, Vermipsyllidae и Pulicidae паразитирует на тарбагане.

Список блох тарбагана из Монголии

Hystrichopsyllidae	Leptopsyllidae
<i>Neopsylla abagaitai</i> Ioff, 1946	<i>Ctenophyllus hirticrus</i> (Jordan & Rothschild, 1923)
<i>Neopsylla mana</i> Wagner, 1927	<i>Frontopsylla hetera</i> Wagner, 1928
<i>Rhadinopsylla li transbaikalica</i> Ioff & Tiflov, 1947	<i>Frontopsylla wagneri</i> Ioff, 1928
	<i>Frontopsylla luculenta parilis</i> Jordan, 1929
	<i>Paradoxopsyllus dashidorzhii</i> Scalon, 1953
Ceratophyllidae	Vermipsyllidae
<i>Ceratophyllus borealis</i> Rothschild, 1907	<i>Chaetopsylla homoea</i> Rothschild, 1906
<i>Citellophilus tesquorum altaicus</i> (Ioff, 1936)	Pulicidae
<i>Citellophilus tesquorum sungaris</i> (Jordan, 1929)	<i>Pulex irritans</i> Linnaeus, 1758
<i>Oropsylla alaskensis</i> (Baker, 1904)	
<i>Oropsylla silantiewi</i> (Wagner, 1898)	
<i>Paramonopsyllus scalonae</i> (Vovchinskaya, 1950)	

Переносчиками чумы в Монголии являются *Oropsylla silantiewi* W., *Ceratophyllus tesquorum sungaris* Jord., *Neopsylla pleskei orientalis* Ioff & Arg., *Neopsylla mana* W., *Amphipsylla primaris mitis* Jord. & Rothschild. *Frontopsylla luculenta* Jord. & Rotsch., *Paradoxopsyllus daschidorzhi* Scal., *Paradoxopsyllus scorodumovi* Scal. (Zhovtyi I.F., 1959).