

УГАМ-ЧАТКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК И ЧАТКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БИОСФЕРНЫЙ
ЗАПОВЕДНИК



ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
5 МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО
СУРКАМ

ТАШКЕНТ, УЗБЕКИСТАН

31 августа-2 сентября 2005

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ПО ИЗУЧЕНИЮ СУРКОВ

ТАШКЕНТ, 2005

5 Международная конференция по Суркам. Тезисы докладов. Ташкент, Узбекистан, 31 августа-2 сентября 2005 г. – Ташкент, 2005. 134 с.

В сборник вошли тезисы докладов по различным направлениям исследований, отражающих современные тенденции в изучении рода *Marmota*. Представленные работы посвящены исследованиям в области экологии, систематики, филогении, палеоэкологии, этологии, морфологии, физиологии, паразитологии, эпидемиологии, акклиматизации и разведения сурков в неволе, а так же охраны и управления природными популяциями сурков.

Сборник предназначен для широкого круга специалистов - зоологов и экологов, сотрудников природоохранных организаций, студентов и др.

Редакционная коллегия:

Быкова Е.А.

Есипов А.В.

Вашетко Э.В.

Экологическая Издательская Компания
«Чинор ЭНК»

Подписано в печать 26.08.2005

Объем 9 печатных листов

Заказ №98 от 09.08.05

Формат 60x84 1/16

Печать офсетная, тираж 100 шт.

Отпечатано в типографии ЧП «Федоренко»

Ул.Фархадская 10А тел.: 50-03-80

РОЛЬ КРАСНОГО СУРКА (*MARMOTA CAUDATA* GEOFFROY) В ПИТАНИИ ХИЩНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ И ПТИЦ ПАМИРА

Саидов А.С.¹, Абдулназаров А.Г.²

¹Институт зоологии и паразитологии Академии наук Республики Таджикистан,
Душанбе, Таджикистан, abdusattor.s@mail.ru; ²Таджикский национальный парк, Хорог,
Таджикистан, abdu_70@mail.ru

Красный сурок на Памире входит в рацион питания 5 видов хищных млекопитающих (*Canis lupus*, *Vulpes vulpes*, *Felis lynx*, *Uncia uncia*, *Ursus arctos*) и 7 видов пернатых хищных (*Aquila chrisaetos*, *Haliaeetus leucoruphus*, *Haliaeetus albicilla*, *Accipiter gentilis*, *Gyps fulvus*, *Aegypius monachus*, *Circus barbatus*). Главнейшими врагами вида являются волк и лисица. Остатки красного сурка были обнаружены нами в 55 % (n=38) экскрементов волка. Летние местообитания снежного барса на Памире охватывают верхний предел распространения красного сурка, последний, для барса служит дополнительным кормом. В районе перевала Харгуш и Южно-Аличурском хребте (заповедник «Зоркуль») нами отмечены 3 случая раскопки нор сурков тьянь-шаньским бурым медведем. Однако численность медведя на Памире незначительная и не наносит существенный урон запасам красного сурка. Большое влияние на популяции сурков оказывают пастушьи собаки. На Памире в пределах ареала красного сурка для охраны скота содержится около 1200 собак. По утверждению пастухов после пробуждения сурков со спячки каждая собака ежедневно ловит по 1-2 сурка. Пастушьи собаки и волки наносят заметный ущерб популяции красного сурка в первые дни после выхода сурков из спячки, когда зверьки ослаблены и ведут себя неосторожно. В период 1996-2004 гг. нами зарегистрировано 44 случаев нападения хищных птиц на красного сурка, в том числе беркут - 22, орлан-белохвост - 8, орлан-долгохвост - 12, тетеревиный - 2. Наибольшее число случаев нападения хищных птиц на сурков отмечено в мае-июне, что совпадает с периодом наибольшей активности зверьков. В конце лета (конец августа) жертвами хищных птиц в основном становятся молодые сурчата. Остатки красного сурка обнаружены вблизи 3 гнезд беркута, 2 гнезд бородача и 2 гнезд белоголового сипа. Встречаемость остатков красного сурка в погадках хищных птиц составляла 62,3 %. Таким образом, красный сурок как фоновый вид высокогорий Памира является существенным компонентом трофической цепи хищных млекопитающих и птиц.