

BULLETIN DES SCIENCES NATURELLES ET DE GÉOLOGIE,

RÉDIGÉ PAR MM. DELAFOSSE, RASPAIL,
DESMAREST ET LESSON.

DEUXIÈME SECTION
DU
BULLETIN UNIVERSEL DES SCIENCES
ET DE L'INDUSTRIE,

PUBLIÉ
SOUS LA DIRECTION DE M. LE B^{on}. DE FÉRUSAC,
OFFICIER SUPÉRIEUR AU CORPS ROYAL D'ÉTAT-MAJOR,
CHEVALIER DE SAINT-LOUIS ET DE LA LÉGION-D'HONNEUR,
MEMBRE DE PLUSIEURS SOCIÉTÉS SAVANTES NATIONALES ET ÉTRANGÈRES.

TOME SEPTIÈME.

A PARIS,

AU BUREAU DU BULLETIN, rue de l'Abbaye, n^o. 3;
Chez MM. DUFOUR et D'OCAGNE, quai Voltaire, n^o. 13; et même
maison de commerce, à Amsterdam;
Chez MM. TREUTTEL et WÜRTZ, rue de Bourbon, n^o. 17; et
même maison de commerce, à Strasbourg, rue des Serruriers;
à Londres, 30, Soho-Square;
Et chez M. LEVRAULT, rue de la Harpe, n^o. 81.

1826.

pèce, qui paraît être le *Mus Rattus* Linn., a six pouces de longueur, le corps noirâtre en dessus et gris en dessous ; la queue noire et plus longue que le corps.

20. *Gerbillus labradoricus* Sabine (*App. au voy. de Franklin*, page 661.) Cette espèce a 4 po. de longueur totale pour la tête et le corps ; ses jambes de derrière ont 1 po. $\frac{1}{2}$, et sa queue a 2 po. $\frac{1}{2}$; son front est arqué ; son nez dirigé en dessous ; sa bouche très en arrière et petite ; son dos brun, son ventre blanc sans ligne de séparation tranchée entre les deux couleurs ; sa queue velue, noire en dessus, blanche en dessous ; ses moustaches fournies, longues et noires. On trouve cet animal dans le pays de Labrador.

21. *Arctomys ludoviciana* Ord. Say, *Arctomys missouriensis* Warden, *Prairie Dog* Lewis et Clarke. Cet animal, long de seize pouces, avec une queue de 2 po. $\frac{3}{4}$ sans les poils, et de 3 po. $\frac{1}{2}$ avec ceux-ci, est d'un brun roussâtre sale et pâle, entremêlé de quelques poils gris et de poils noirs ; les poils les plus nombreux étant d'un gris de plomb foncé près de la peau, puis d'un blanc bleuâtre, puis roussâtres clairs, et terminés de gris.

22. *Arctomys tridecemlineata*; *Sciurus tridecemlineatus*. Mitchell, *Medical reposit.*, n^o. 2, janv. 1821. C'est notre écureuil de la fédération (*Mamm.*, n^o. 548), probablement un spermophile pour M. Frédéric Cuvier.

Les diverses espèces de ce dernier genre, décrites par M. Richardson et par M. Sabine, sous les noms de *Richardsoni*, *Franklinii*, *Parryi*, sont indiquées comme espèces du genre *Arctomys*.

23. *Sciurus magnicaudatus* Say, *Long's. Exped.*, vol. 1, p. 115. Il est long en totalité de 1 p. 7 po. $\frac{1}{4}$, sur quoi la queue prend 9 po. $\frac{1}{10}$; ses oreilles sont longues de $\frac{5}{4}$ de pouce. Il a le corps mêlé de gris et de noir sur les parties supérieures et latérales ; les côtés de la tête et les orbites d'un ferrugineux pâle ; les joues sous l'œil et les oreilles d'un brun obscur. On le trouve aux États-Unis : c'est l'espèce la plus commune sur les rives du Missouri.

24. *Sciurus quadrivittatus* Say, *Long's. Exp.*, vol. 2, p. 45. Cette espèce a la tête brunâtre, entremêlée de fauve, et marquée de quatre lignes blanches ; les côtés du corps fauves et le dessous blanchâtre. Sa longueur est de 4 po. $\frac{1}{4}$ sans la