

Комиссия по изучению сурков при Териологическом обществе РАН
Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт
Администрация Кемеровской области
Центр трансфера технологий СФО



СУРКИ В АНТРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТАХ ЕВРАЗИИ

Тезисы докладов
IX Международного Совещания по суркам стран СНГ

Россия, г. Кемерово, 31 августа – 3 сентября 2006 г.

Кемерово
2006

К ВОПРОСУ О СОХРАНЕНИИ ПОПУЛЯЦИИ СУРКА МЕНЗБИРА В УЗБЕКИСТАНЕ

To a question of conservation of Menzbir marmot in Uzbekistan

А.В. Есипов, Е.А. Быкова

A.V. Esipov, E.A. Bykova

Институт зоологии АН РУз, esip@tkt.uz

На протяжении двух последних десятилетий состояние популяции сурка Мензбира в Узбекистане неуклонно ухудшается. На территории республики находится более половины мирового поголовья этого зверька, что накладывает известную ответственность за его сохранение.

Места обитания сурка Мензбира охватывают следующие урочища в горах Ташкентской и Наманганской областей: Акбулак, Кызылнура, Актахта, Коктахта, Мынжилки, Пулатхан, Курганташ, верховья р. Ахангаран, Ангренское плато, верховья р. Гавасай и р. Сансалак и территорию Чаткальского заповедника.

Ареал этого вида на протяжении последних десятилетий становится более фрагментированным. Сурок исчез в районе высот Такали, Ховли, Чимган, где встречался в недавнем прошлом. Резко сократилась его численность на Ангренском плато.

Ориентировочно общее поголовье сурка в Узбекистане составляет 5-7 тысяч особей.

Одной из основных причин сокращения численности сурка Мензбира является истребление чабанскими собаками. За исключением территории Чаткальского заповедника, местообитания сурка представляют собой высокогорные летние пастбища, которые используются в течение трех летних месяцев. Согласно сложившимся местным традициям, чабаны практически не кормят своих собак, и те вынуждены сами добывать пищу. Сурки часто становятся их добычей.

Ущерб, наносимый собаками поголовью сурка, превышает таковой со стороны естественных врагов (лисица, волк, беркут, снежный барс). Хотя на протяжении последних десятилетий размер выпасаемых стад сократился (сейчас в среднем 400-500 голов овец против 1000 ранее), их количество, а также число пастухов и сопровождающих их собак остались на прежнем уровне.

Необходимо ввести в местах обитания сурка Мензбира регламент использования чабанских собак, а именно: держать их на привязи в дневное время суток. В этот период сурки активны, в то время, как в собаках нет необходимости, поскольку они используются для охраны от хищников ночью. Таким образом, и отары будут защищены, и ущерб сурку значительно сократится. Также необходимо ограничивать количество собак при одной отаре (не свыше 2), поскольку в большинстве отар это количество реально превышает в 2 – 3 раза.