

BULLETIN
DE LA
SOCIÉTÉ IMPÉRIALE
DES NATURALISTES
DE MOSCOU

PUBLIÉ

SOUS LA RÉDACTION DU DOCTEUR RENARD

ANNÉE 1859.

TOME XXXII.

PREMIÈRE PARTIE.

(Avec 8 planches.)

Moscou.

IMPRIMERIE DE L'UNIVERSITÉ IMPÉRIALE.
1859.

ESQUISSE

DE

L'HISTOIRE NATURELLE DE KAMIENIETZ - PODOLSKI,

PRÉCÉDÉE

D'UN COUP-D'OEIL SUR LES TRAVAUX DES NATURALISTES DES
PROVINCES OCCIDENTALES DE LA RUSSIE ET DU ROYAUME DE
POLOGNE AU XIX SIÈCLE.

PAR

GUSTAVE BELKE.

(Continuat. Voy. Bulletin 1838. N° 3. pag. 97).

Nous passons maintenant au Règne Animal qui, à Kamienietz et dans ses environs, possède des représentants assez nombreux. Il est vrai, que l'embranchement des Vertébrés contient à peine 180 espèces, dont la majorité tombe sur la classe des oiseaux et la moindre partie sur les Reptiles. Parmi les oiseaux il y a très peu d'espèces aquatiques, une dizaine d'Échassiers rodent au bord du Dniester et du Smotrytsch. Quant aux poissons, outre ceux qui se trouvent communément dans les rivières et les étangs de Podolie, le Dniester et le Smotrytsch nourrissent quelques-uns qui leur sont propres et au printemps on y pêche quelques espèces marines. Les

Articulés, étant en général beaucoup plus nombreux que les Vertébrés, composent par conséquent la plus grande partie de la Faune de Kamienietz, toutefois le sol aride et élevé et les chaleurs précoces accompagnés des vents violents du printemps qui arrêtent la végétation, ont une influence préjudiciable sur la propagation des Insectes, dont le nombre est respectivement moindre chez nous qu'aux environs. On doit attribuer à la même cause le nombre très restreint des Myriapodes et des Mollusques, vu que ces animaux aiment par préférence les localités humides et ombragées.

Il ne nous reste à présent qu'à énumérer en ordre systématique, tout ce que nous avons observé de chaque classe d'animaux, dans la contrée dont l'investigation nous occupe. Nous commençons par l'embranchement des Vertébrés.

I. MAMMIFÈRES.

Vesperugo noctula D. Dans les fissures des rochers aux bords du Smotrytsch.

V. serotinus Daub. dans les vieux bâtiments.

V. pipistrellus Daub. la plus petite de nos espèces; je l'ai trouvée ordinairement cachée sous l'écorce des chênes dans le bois de Dloujek.

V. discolor Natt. trouvée une fois sous le toit du cloître des PP. Trinitaires, à Kamienietz.

Plecotus auritus L. Très rare à Kamienietz, — il n'a été trouvé qu'une fois dans une vieille maison.

Talpa europaea L. commune partout dans les jardins et les prairies.

Sorex fodiens Pall., *S. leucodon* Herm. Quelquefois elle demeure en compagnie des souris dans les maisons de campagne.

Erinaceus europaeus L. demeure dans la ville même parmi les broussailles et les tas des pierres aux jardins et aux cours.

Meles taxus Schreb. Assez rare, on le rencontre dans les bois de Dtonjek, de Nagorzany, de Kniahinine etc.

Mustela foina L.

Foetorius putorius L. *F. vulgaris* Briss. Communes à Kamienietz près des maisons dans les tas des pierres, dans les caves etc.

Foetorius lutreola L. très rare, elle a été vue une seule fois parmi les ronces d'un petit vivier à Dtonjek.

Canis Lupus L.

C. vulpes L. les renards se trouvent en abondance dans les broussailles des rochers de Nihine, de Zalutscbé, de Wroubloftzé etc.

Sciurus vulgaris L.

Spermophilus guttatus Tem. Sur les steppes d'Orynine, quelquefois en grande quantité.

Myoxus avellanarius Desm. Assez commune dans les bois près de Kamienietz. Je n'ai pas rencontré dans nos environs les deux autres espèces indigènes de ce genre.

Mus decumanus Pall. Ce fléau de nos garde-mangers, est très commun.

M. rattus L. très rare. — *M. musculus* L.

M. sylvaticus L. — *M. agrarius* Pall.

M. messorius Shaw. Cette jolie petite espèce est assez rare.

Arvicola arvalis Pall. Ce campagnol se multiplie, comme on le sait, quelquefois très prodigieusement; cela a eu lieu aux environs de Kamienietz en 1850.

Cricetus vulgaris L.

Spalax typhlus *Pall.* on le rencontre très rarement.

Lepus timidus *L.* Les lièvres, comme partout, sont très nombreux chez nous.

A nos plus rares Mammifères appartiennent les Chevreuils (*Cervus capreolus* *L.*) et les Sangliers (*Sus scrofa* *aper* *L.*) qui se trouvent dans les bois de Łańtowitz et de Nagórzany.

II. OISEAUX.

Falco subbuteo *L.* — *F. aesalon* *Temm.* assez rare. — *F. vespertinus* *L.* — *F. tinunculus* *L.* Celui-ci arrive vers la fin de Février; on dit que les faucons (*F. lanarius* *Pall.*) se trouvaient jadis aux environs de Kamienietz; il y a même une colline, nommée la montagne des faucons (*Sokola góra*) près de Smotrytsch, la plus ancienne ville de Podolie, à 35 werstes de Kamienietz, qui semble confirmer cette assertion. Maintenant on ne trouve plus ces nobles oiseaux de chasse dans nos contrées.

Astur palumbarius *L.*

Buteo vulgaris *L.* — *B. apivorus* *L.*

Circus cyaneus *L.* — *C. rufus* *L.* J'ai rencontré ces deux espèces plusieurs fois aux prairies appartenantes à la ville, au de-là du faubourg de polskie folwarki. *Milvus ater* arrive à la fin de Février. Parmi les Chouettes, les plus communes sont: *Strix aluco* *Mey.* — *S. bubo* *L.* — *S. otus* *L.* — *S. flammea* *L.* très rare, fut une seule fois prise dans une des tours de l'ancienne forteresse de Kamienietz.

Le Corbeau (*Corvus corax* *L.*) et la Corneille corbine (*C. corone* *L.*) sont assez rares. Quant aux Freux (*C. frugilegus* *L.*), les corneilles mantelées (*C. cornix* *L.*) et