

MÉMOIRES
DE LA
SOCIÉTÉ LINNÉENNE
DE PARIS.

PRÉCÉDÉS DE SON HISTOIRE.

DEPUIS 1788, ÉPOQUE DE SA FONDATION, JUSQU'À
ET COMPRIS L'ANNÉE 1822.

.....
TOME PREMIER.
.....

PARIS,

AU SECÉTARIAT DE LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE,
Rue des Saints-Pères, n° 46, en face la rue Taranne.

CHEZ ~~DEBROUX~~ (libraires) Rue Maçon-Sorbonne, n° 11.
ET de la
DEBEAUSSEAUX, Société, Quai Malaquai, n° 15.

.....
1822.



ENUMERATIO

*Plantarum quas in insulis Archipelagi aut littoribus
Ponti-Euxini, annis 1819 et 1820, collegit atque
detexit J. DUMONT D'URVILLE.*

ARDUIS maris laboribus jamdudum deditus, otiosas portus horas Botanices grato studio à duobus annis dulcè impendebam. Jàm peragraveram montes, valles, campos, littora Telonis vicina : mille et quingentas species phanerogamas collegeram floramque Telonensem suscipere mihi mens erat. Sed 3 aprili 1819 navim regis *la Chevrete* conscendere jussus, imperanteque claro *H. Gauttier* vela fecimus in Archipelagum. Hic ab aprilis fine usque medium octobrem invisimus et emensi sumus multas celebres insulas, quædam inclyta littora, nempè; Melitam, Melum, Cimolum, Theram, Astypalæam, Coum, Lerum, Samum, sinum Smyrnæum, Psyram, Scyrum, Lesbum, Tenedum, Thasum, Singiticum sinum, littus Thessalonicum, Scopelum, sinum Pelasgum, Myconum, littus Atticum, ipsas Athenas, iterum Melum. Medio novembri sequente propè Lazaret Telonensem anchoram demisimus.

3 Aprili 1820 rursus eâdem navi vecti, in Orientem tendimus, oras Ponti-Euxini perlustravimus et appulimus ad diversos locos, scilicet : ad insulam Melum,

Byzantium, Theodosiam, Panticapæam, Soukoum in Colchide, Trapezum, iterum Theodosiam, Sévastopolem, Odessam, Sisopolim et Ineadam in Bulgariâ, iterum Byzantium, Naupliam in Argolide, denique rursus ad Melum, undè in Galliam medio octobri regressi sumus.

Muneribus nauticis atque observationibus astronomicis sæpius impeditus sum. Attamen, favente duce juvantibus que comitibus, dulcia studia non omisi amœnamque scientiam colere interdum licuit. Ex utroque itinere locupletem plantarum segetem reportavi, nonagintas circitèr species; plures equidem descriptas, multas adhuc rariores, nonnullas denique omninò novas.

Pro scientiâ nonnullius fore momenti mihi videbatur, si plantarum cognitarum novas adderem habitationes, si novarum stirpium darem phrasim descriptivam; cœptumque suadebant amici scientiæ. Sed muneribus alienis incumbere coactus jureque viribus diffusus hærebam semper. Tum clariss. D. D. DESFONTAINES et DE JUSSEU, præstantes in scientiâ viri, sua immensa herbaria evolvenda permiserunt summâ cum benevolentîâ consiliaque suppeditaverunt.

Insuper attenda autopsia herbariorum Musæi et TOURNEFORTII iconumque pictoris AUBRIET ad species determinandas synonymiasque statuendas mihi non parum juvit. His incitamentis motus, his auxiliis auctus illud opus aggredi ausus sum. Utinàm feliciter exequi mihi datum fuisset.

Dabam Lutetiæ Parisiorum, 31 decembri: 1821.

I. MONANDRIA.

MONOGYNIA.

1. SALICORNIA herbacea. Linn. Sp. pl. 5. Sibth.
 2. 1. (1) In salsis insulæ Meli. ☉

II. DIANDRIA.

MONOGYNIA.

2. PHYLLIREA media. Sp. pl. 10. Sibth. n. 9 —
 In archipelagi insulis, imprimis in Lesbo. 5.
 3. LIGUSTRUM vulgare. Sp. pl. 10. Sibth. n. 8.
 — In nemoribus Colchidis, circa Soukoum. 5.
 4. OLEA europæa. Sp. pl. 11. Sibth. n. 11. —
 Spontaneus frutex diffusus, spinosus, crescit in collibus

(1) Auctores sæpius in hoc Opere citati.

Sp. pl. — Linnæi. Species plantarum. 1764. = Willd. Sp. — Willdenow. Species plantarum Linnæi. vol. 5. 1797-1810. = Sibth. — Sibthorp et Smith. Floræ græcæ prodromus. vol. 2. 1806-1816. = Marsch. Fl. taur. — Marschall de Bieberstein. Flora taurico-caucasica. tom 5. 1808-1819. = D. C. Fl. fr. — Lamarck et De Candolle. Flore française. vol. 5. 1805-1815. = D. C. Syst. nat. — D. C. Candolle. Regni vegetabilis Systema naturale. vol. 2. 1818-1821. = Loisel. Fl. gal. — Loiseleur Deslongchamps. Flora gallica. vol. 2. 1806-1810. = Desf. Fl. atl. — Desfontaines. Flora atlantica. vol. 2. 1798. et 1799. = Desf. Cor. — Id. choix de plantes du corollaire des instituts de Tournefort. 1808. = Herb. Tourn. — Phrasis ex ipsâ manu Tournefortii in ejus Herbario. = Gundersheimer in Her. Tourn. — Phrasis ex manu Gundersheimer in Herbario Tournefortiano. = Icon. Aubriet. — Icones pictoris Aubriet in bibliothecâ Jussicæ servatæ.

totius Græciæ. In insulâ Lesbo culturâ ad altitudinem 10-15 hexapodum assurgit. ♀.

5. *CIRCÆA Lutetiana*. *Sp. pl.* 12. *Sibth. n.* 13. — Circa Byzantium, in collibus umbrosis ad pagum *Therapia*. ♀.

6 *VERONICA chamædryos*. *Sp. pl.* 17. *Sibth. n.* 26 — propè Byzantium, in nemoribus. ♀.

7. *V. Austriaca*. *Sp. pl.* 17. *Sibth. n.* 28. *Marsch. Fl. Taur. n.* 33.

— *V. Austriaca*, foliis tenuissimè laciniatis. *Tourn. Inst. Herb. Tourn.* — In Tauriæ pascuis, in Lazaret Odessæ, in insulâ Berezen. floret junio. ♀.

8. *V. spuria*. *Sp. pl.* 13. *Marsch. Fl. taur. n.* 13. *suppl. p.* 8. — In Lazaret Odessæ, in insulâ Berezen frequens, maio, junio. ♀ Quandoque variat spicis ad caulis apicem multis paniculatis.

9. *V. cymbalaria*. *Sibth. n.* 34. *D. C. Fl. fr. suppl. p.* 389. *V. cymbalariae-folia*. *Vahl. Enum. 1 p.* 81.

V. Chia, *Cymbalariae folio*, verna flore albo umbilico virescente. *Tour. Cor. 7. Buxbaum. c. 1 t.* 39. *f.* 2.

V. Cymbalariae folio verna. *Herb. Tourn.* — In arvis Asiæ minoris, propè Byzantium. ☉.

10. *V. Buxbaumii*. *Marsch. Fl. taur. n.* 35.

V. agrestis. b. *Sibth. n.* 51.

V. Flosculis oblongis pediculis insidentibus, chamædryos folio, major. *Buxb. c. 1. 40. f.* 2. In sepibus Colchidis hanc speciem collegi junio florentem. ☉.

11. *V. serpylli-folia*. *Sp. pl.* 15. *Sibth. n.* 20. — Ad sepes Asiæ minoris, propè Byzantium. ☉.

12. *V. verna*. *Sp. pl.* 19. — In pascuis Tauriæ, propè Kerch. ☉.

13. LYCOPUS *Europæus*. *Sp. pl.* 30. *Sibth.* n. 42.
— In sylvis Bulgariae, ad torrentes. π .
14. SALVIA *baccifera*. *Etling. Salvia*. n. 4. — *Salvia baccifera*. *Tourn. inst.* 180. *Herb. Tourn.* — In apricis Græciæ copiosè crescit dumetis densis rotundatis. Aprili floret. \mathfrak{H} .
15. *S. triloba*. *Linn. supp.* 88. *Sibth.* n. 49.
S. Cretica pomifera Clusii, flore albo. *Tourn. Cor.* 10. *Icon. Aubriet.* — Forsàn cum præcedente jungenda: differre tamen videtur ramis sparsis, virgatis; floribus majoribus et albidis, tandem calyce multò minùs viscoso. Frequens in collibus aridis insularum Archipelagi. Maio floret. \mathfrak{H} .
16. *S. sylvestris*. *Sp. pl.* 34. *Sibth.* n. 53. *S. nemorosa*. *Marsch. Fl. taur.* n. 53 — In Tauriæ pascuis, circà Theodosiam, Sevastopolem et Odessam. Junio floret. π .
17. *S. campestris*. *Marsch. Fl. taur.* n. 54.
S. foliis cordatis oblongis duplicatò crenatis subrepandis hirsutis, racemis virgatis, bracteis calyce brevioribus, pedicellis tomentosis.
- S. pratensis*, foliis serratis, flore minimo cæruleo. *Herb. Tourn.* — Circà Sevastopolem abundat in collibus. Floret junio. π .
18. *S. Sibthorpii*. *Sibth.* n. 56.
S. Foliis cordatis sinuatis rugosis, caule subaphyllo ramoso verticillis numerosissimis sex-floris, calycibus glandulosis; floribus parvis dilutè violaceis. Ubique in insulâ Scyro occurrit, in sylvis Bulgariae, propè Sisopolim et Ineada. Floret junio, julio. π .
19. *S. verbenaca*. *Sp. pl.* 35. *Sibth.* n. 16. Ad sepes, circà Byzantium. π .

20. *S. napi-folia* Wild. *Sp. pl.* 1. p. 143. *Sibth.* n. 17. *S. verticillata*. Marsch. *Fl. taur.* n. 57. *Horminum sylvestre latifolium verticillatum.* C. B. *Herb. Tourn.* Ubique ad littora Ponti Euxini, in Colchide circa Soukoum, in Ponto propè Trapezum, propè Sevastopolem in Tauriâ, denique in vicinis Odessæ. Junio florens. ☉. In arvis Coi crescit varietas insignis foliis longioribus nunquam lyratis magisque rugosis, floribus duplè majoribus atque calycibus saturè violaceis.

21. *S. calycina.* *Sibth.* n. 48.

S. orientalis, frutescens, foliis circinnatis, acetabulis moluccæ. *Tourn. Cor.* 10. formosa species et odore gratissimo. Hanc collegi in collibus apricis et maritimis insulæ Sami ad urbem *Vathi*, nec postea vidi. Maio floret. ♀.

22. *S. sclarea.* *Sp. pl.* 38. *Sibth.* n. 63. In arvis insulæ Coi; maio floret. ♂.

23. *S. Æthiopis.* *Sp. pl.* 59. *Marsch. Fl. taur.* n. 61. Ad ruinas veteris Chersonesi, in Tauriæ collibus. ♂.

III. TRIANDRIA.

I. MONOGINIA

24. VALERIANA *sisymbrii-folia.* *Vahl. Sp.* 2. p. 17. *Desf. Cor.* p. 53. f. 41. *Poiret. Ency.* n. 19. *V. dioscoridis.* *Sibth.* n. 74.

V. orientalis, *sisymbrii mathioli folio.* *Tourn. Cor.* 6. *Herb. Tourn. Icon. Aubriet.*

Similis *V. dioicæ*; sed distincta foliis radicalibus pinnatis, pinnis ovatis dentatis. — In montibus insulæ Coi; maio floret. ♀.

25. *V. orbiculata*. *Sibth. n. 74.*

V. calcitrapæ affinis, sed folia inferiora integra tantum dentata. — Cum præcedente crescit, maio florens. ☉

26. *V. tuberosa*. *Sp. pl. 46. Marsch. Fl. taur. n. 66.* — In Tauriæ pascuis, propè Kerch. ☿

27. *FEDIA cornu-copiæ*. *Gærtner. Fruct. p. 36. Valeriana cornu-copiæ. Sp. pl. 44. Sibth. n. 75.* — In Melitâ secus vias, ad sepes. ☉

28. *VALERIANELLA coronata*. *D. C. Fl. fr. n. 3333. Valeriana coronata. Wild. Sp. 1. p. 184. Sibth. n. 79.* — Crescit in segetibus insulæ Meli, in pascuis Tauriæ. ☉

29. *V. discoïdea*. *Loisel. not. 148. Fedia discoïdea. Vahl. en. 2. p. 21. Valeriana discoïdea. Wild. Sp. 1. p. 184. Sibth. n. 80.* — In montibus celsis insulæ Coi. ☉

30. *V. uncinata*. *Marsch. Fl. taur. n. 72.*

V. floribus triandris, caule dichotomo, foliis pinnatifidis, fructu lineari sexdentato : dentibus uncinatis. — Ad promontorium *Ack Bouroun*, in Tauriâ propè Kerch. ☉

31. *V. auricula*. *D. C. Fl. fr. sup. n. 3330. (b).* — In arvis Meli, in lazaret Theodosiæ. ☉

32. *GROCUS odoros*. *Bivona. Bernardi. Stirp. rar. Sicil. Man. 3. p. 8. f. 2.*

G. biflorus : foliis linearibus, canaliculatis, margine revolutis ; stigmato trifido incluso, segmentis apice multifidis. *Cup. pan. 1. f. 7.*

33. *IRIS pumila*. *Sp. pl. 56. Sibth. n. 90.* — In summo monte *Bougourlou*, propè Byzantium ad littus Asiaticum. ☿

34. *I. pseudoacorus*. *Sp. pl.* 56. *Sibth. n.* 91. — In Colchide frequens, ad rivulos. ☞.

35. *I. sisyrinchium*. *Sp. pl.* 59. *Sibth. n.* 95. — In collibus apricis insularum Melitæ, Meli et Cimoli. Marte, aprili florens. ☞.

36. *I. ochroleuca*. *Wild. Sp. 1, p.* 223. *Marsch. Fl. taur. n.* 86. — In pratis Colchidis, ad arcem Soukoum-Kale. ☞.

37. *SCHOENUS mucronatus*. *Sp. pl.* 63. *Sibth. n.* 97. — In arenis maritimis insulæ Scyri. ☞.

38. *CYPERUS longus*. *Sp. pl.* 67. *Sibth. n.* 99. — A specie vulgari planta nostra differt umbellâ polyphyllâ, multifariam decompositâ, spicis numerosis, minimis, linearibus. — Uberrime in paludosis Lernæ. ☞.

39. *SCIRPUS holoschaenus*. *Sp. pl.* 72. *Sibth. n.* 112. — In arenosis maritimis frequens; in insulis Melo, Samo, Scyro, etc. ☞.

40. *S. lacustris*. *Sp. pl.* 71. *Sibth. n.* 111. — In palustribus Colchidis, circà Soukoum. ☞.

41. *ECHINARIA capitata*. *Desf. atl. 2, p.* 385. — *Cenchrus capitatus* *Sp. pl.* 1488. *Sibth. n.* 263. — In collibus aridis insulæ Meli, aprili floret. ☉.

42. *NARDUS aristata*. *Sp. pl.* 78. *Marsch. Fl. taur. n.* 108. — In collibus Tauriæ, propè Sevastopolem. ☉.

II. DIGYNIA.

43. *AGROSTIS miliacea*. *Sp. pl.* 91. *Milium arundinaceum*. *Sibth. n.* 152. — Frequens in udis insulæ Meli, ubi sæpè ad altitudinem 5-6 pedum assurgit. ☞.

44. *A. alba*. *Sp. pl.* 93. *Sibth. n.* 155. *Marsch. Fl. taur. n.* 140. — Circà Odessam, in pascuis ☞.

45. AIRA *caryophyllea*. *Sp. pl.* 7. *Sibth. n.* 168.
— In collibus Meli ubique occurrit.

46. A. *canescens*. *Sp. pl.* 97. *Sibth. n.* 167. — In
ericetis insulæ Leri ☉.

47. MELICA *ramosa*. *D. C. Fl. fr. n.* 1540. *M. pyramidalis*. *Lam. Ency.* 4. p. 72. *M. aspera*. *Desf. atl.* 1. p. 71. *M. saxatilis*. *Sibth. n.* 171. In collibus aridis insulæ Astypalææ ꝛ.

48. *M. caricina*. foliis longis strictis scabris acutiusculis, supernâ vaginante paniculam elongatam cærulescentem, glumis calycinis glabris acutis, sed inermibus.

Hæc planta quodammodo habitu sesleriam refert, at propter flores non verè spicatos involucrumque nullum eam cum melicis cœjungo. — In pascuis Tauriæ frequens, ad littora Bosphorii Cimmeriani. ꝛ.

49. PHALARIS *arenaria*. *Smit. Fl. Br.* 62. *Sibth. n.* 128. *Phleum arenarium*. *Sp. pl.* 88. — In arenosis maritimis Meli. ☉.

50. *P. phleoides*. *Sp. pl.* 80. *Sibth. n.* 129. — Circà Trapezum, in declivis. ꝛ.

50. (a) *P. cylindrica*. *D. C. Fl. fr. n.* 1493. *Loisel. Fl. Gall.* 1. p. 36. *P. Bulbosa*. *Bell. act. Tur.* 5. p. 213. — In collibus aridis Tauriæ, circà Sevastopolem ☉.

51. *P. crypsoides*.

Caule suberecto nodoso minimo basi ramoso, foliis glabris amplè vaginantibus, in discum latum abeuntibus, supernâ spicam ferè involucrate, spicâ ovatâ subrotundâ, glumis acutis carinatis compressis glaberrimis.

Valdè affinis *crypsi schœnoidi*: differt folio superno obtuso plerumque 2-3 lineas remoto à spicâ, glumis ferè planis non acuminatis. Planta vix triuncialis; spicæ sæpiùs solitaires

73. *F. serotina*. *Sp. pl.* 111. *D. C. Fl. fr. n.* 1574.
— In colibus propè Thessalonicam. π
74. *F. ciliata*. *D. C. Fl. fr. n.* 1595. — In maritimis
Meli. \circ
75. *F. myurus*. *Sp. pl.* 109. *Sibth. n.* 211. — In pratis
Colchidis. \circ
76. *BROMUS mollis*. *Sp. pl.* 112. *Sibth. n.* 216. —
Reperitur in Tauriæ atque Colchidis graminosis. δ
77. *B. rubens*. *Sp. pl.* 114. *Sibth. n.* 220. — Fre-
quens in arvis Insulæ Meli. δ
78. *B. tectorum*. *Sp. pl.* 114. *Sibth. n.* 219. — Ubique
in pascuis Tauriæ. δ
79. *B. asper*. *Lin. Sup.* 111. *Sibth. n.* 217. — In um-
brosis Colchidis. δ
80. *B. erectus*. *Huds. Angl.* 49. *D. C. Fl. fr. n.* 1633.
B. angusti-folius. *Marsch. Fl. taur. n.* 184. *B. peren-
nis*. *Villars. 1. Dauph. 2. p.* 122. — In pascuis Tau-
riæ. \circ
81. *KOEHLERIA cristata*. *Persoon. Syn.* 1. p. 97.
Aira cristata. *Sp. pl.* 94. *Sibth. n.* 163. *Dactylis cris-
tata*. *Marsch. Fl. taur. n.* 169.
82. *K. phleoïdes*. *Persoon. Syn.* 1. p. 97. *Festuca
phleoïdes*. *Villars. 1. Dauph. 2. p.* 95. *Desf. atl.* 1.
p. 90. — In insulâ novâ Camini, ad latus Vulcani. \circ
83. *LAGURUS ovatus*. *Sp. pl.* 119. *Sibth. n.* 239.
— In littoribus Meli haud rara. \circ
84. *STIPA tortilis*. *Desf. atl.* 1. p. 99. *Stipa palea-
cea*. *Wild. Sp.* 1. p. 441. *Sibth. n.* 231. Gramen ave-
naceum, supinum, minus, spicâ densissimâ, cum longis-
simis aristis lanuginosis, fertilibus. *Herb. Tourn.* — In col-
libus apricis Melitæ, Meli etc. aprili. \circ

85. *S. aristella*. *Lin. Syst.* 3. p. 229. *Sibth. n.* 232.
—In declivis insulæ Scyri. π
86. *S. pennata*. *Sp. pl.* 115. *Sibth. n.* 227.—In pas-
cuis Tauriæ frequens, propè urbem Kerch. π
87. *S. juncea*. *Sp. pl.* 116. *Sibth. n.* 229.—Circà
Odessam frequens. δ
88. AVENA *sterilis*. *Sp. pl.* 118. *Sibth. n.* 234.—In
agris insulæ Meli. \odot
89. *A. pratensis*. *Sp. pl.* 119. *Sibth. n.* 257.—Circà
Kerch, in Tauriæ collibus. π
90. *A. fragilis*. *Sp. pl.* 119. *Sibth. n.* 256.—Circà
Byzantium, in agris Asiæ minoris. \odot
91. *A. pumila*. *Desf. atl.* 1. p. 103. *Persoon.*
Syn. 1. p. 101.—Ad margines viarum insulæ Melitæ. \odot
92. CALAMAGRÖSTIS *epigeios*. *Roth. germ.* 2. p. 1
D. C. Fl. fr. 1529 (a). *Arundo epigeios*. *Sp. pl.* 120.
Marsch. Fl. taur. n. 200.—Circà Soukoum in Colchi-
dis nemoribus, in collibus propè Odessam. π
93. SACCHARUM *cylindricum*. *Sibth. n.* 124. *La-
gurus cylindricus*. *Sp. pl.* 120.—In arenosis Colchidis,
circà arcem Soukoum-kale. π
94. ROTTBOLLA *incurvata*. *Lin. Sup.* 114. *Sibth.*
n. 248.—In collibus apricis insulæ Astypalææ. \odot
95. ÆGYLOPS *cylindrica*. *Sibth.* 252. *Æ. caudata*.
Lam. Ency. 2. p. 346. *non Linnæi*.—Gramen Creticum,
spicâ gracili, in duas aristas longissimas et asperas
abeunte. *Tourn. Cor.* 39. *Gundelsheimer in Herb.*
Tourn.—In agris aridis insulæ Leri, nec aliorsùm reperi.
Maio. \odot
96. *Æ. comosa*. *Sibth.* 251? *Æ. cylindrica*. *Lam.*
Ency.?—Ad sepes insulæ Leri. \odot

97. *ELYMUS sabulosus*. *Marsch. Fl. Taur. n. 207.*
Ab *E. arenario* differt spicis foliisque latioribus, rachi calycibusque glabris. — Ad littora Ponti-Euxini, propè lazaret Kerch; maio. ☞

98. *HORDEUM bulbosum*. *Sp. pl. 125. Sibth. n. 256.*
H. strictum. *Desf. atl. 1. p. 115.* — Gramen Creticum, spicatum, secalinum, altissimum, radice tuberosâ. *Herb. Tourn.* — In summis montibus insulæ Coi copiosè, ad sepes agrorum circâ Byzantium. Maio. ☞

99. *H. jubatum*. *Sp. pl. 126. H. crinitum*. *Desf. atl. 1. p. 115. Elymus crinitus*. *Schreb. Gram. 2. p. 15. Sibth. n. 254. Buxb. Cent. 1. t. 52. f. 1.* — In collibus insulæ Meli, at infrequens. ☉

100. *H. murinum*. *Sp. pl. 126. Sibth. 257.* — In pascuis Theodosiæ. ☉

101. *SECALE glaucum*. Culmis foliosis, foliis striatis glaberrimis, superno spicam vaginante, spicâ clongatâ compressâ, calycibus bifloris appressis, squamis calycinis setaceis floribus saltem triplò longioribus, glumis glabris nitidis, exteriore basi ciliatâ abeunte in aristam longissimam sæpius 3-4 uncialem.

Planta in hoc genere spectabilis. Ex eâdem radice plurimi nascuntur culmi 1-2 pedales, omninò glabri glauci atque foliosi. Spicæ 3-4 unciales serè hordeum bulbosum referunt, sed squamæ calycinæ tantùm binæ reperiuntur. Corollæ gluma exterior producitur in aristam longissimam sensim ciliatam. Hoc secale in littore maris Nigri reperi, propè lazaret urbis Kerch ad fretum Cimmerianum. Maio floret. ☞

102. *S. Orientale*. *Sp. pl. 124. Triticum orientale*. *Marsch. Fl. taur. n. 218.* — Gramen Armenum, secalinum, spicâ brevi et latâ. *Herb. Tourn.* — In Tauriæ pascuis frequentissimum, propè urbem Kerch. Maio. ☉

103. *S. villosum*. *Sp. pl.* 124. *Sibth. n.* 255.—*Triticum villosum*. *Marsch. Fl. taur. n.* 216.—In lazaret Theodosiæ, ad sepes circa Byzantium. ☉

104. TRITICUM *cristatum*. *Persoon. Syn. 1. p.* 109. *Marsch. Fl. taur. n.* 220.—In Tauriæ pascuis copiosè, ad promontorium Ack-Bouroun ; circa Sevastopolem. ☉

105. *T. imbricatum*. *Marsch. Fl. taur. n.* 222.—Præcedentis, ut puto, mera varietas.—Circà Sevastopolem crescit. ☉

106. *T. ciliatum*. *D. C. Fl. fr. n.* 1666. *Bromus distachyos*. *Sp. pl.* 115. *Sibth. n.* 226. *Marsch. Fl. taur. n.* 190.—In Tauriæ collibus. ☉

107. *T. repens*. *Sp. pl.* 128. *Sibth. n.* 260. *Marsch. Fl. taur. n.* 224.—In lazaret Theodosiæ et Odèssæ frequens. x

108. *T. junceum*. *Sp. pl.* 128. *Sibth. n.* 259. *Marsch. Fl. taur. n.* 225.—Circà Odessam, in declivis. x

III. TRIGYNIA.

109. HOLOSTEUM *umbellatum*. *Sp. pl.* 130. *Sibth. n.* 267.—Ad muros propè Theodosiam. ☉

110. POLYCARPON *tetraphyllum*. *Sp. pl.* 131. *Sibth. n.* 268.—In agris Meli, in cratere vulcani Novæ Camini propè Theram. ☉

IV. TETRANDRIA.

I. MONANDRIA.

111. SCABIOSA *Transylvanica*. *Sp. pl.* 141. *Sibth. n.* 275. *Marsch. Fl. taur. n.* 238.—In sepibus Lesbi, in arvis Bulgariæ frequens. ☉

112. *S. decurrens*. *Sibth. n.* 274. *S. uralensis*?
Marsch. Fl. taur. n. 255.

S. orientalis, foliis centaurei majoris glabris et rigidis.
Tourn. Cor. 34. *Herb. Tourn.*—Propè Odessam, in pas-
cuis. Julio. ☿

113. *S. integri-folia*. *Sp. pl.* 142. *Sibth. n.* 280.—
In umbrosis summæ insulæ Coi. ☉

114. *S. micrantha*. *Desf. Ann. mus. n.* 11. *p.* 168.
t. 25.

S. orientalis, villosa, flore suavè rubente, fructu pul-
chro oblongo. *Cor. Inst.* 35.—Habitat in pascuis Tau-
riæ. ☉

115. *S. columbaria*. *Sp. pl.* 143. *Sibth. n.* 283.—
Planta nostra infernè pilis griseis tota tegitur.—In arvis
Bulgarïæ, propè Ineada. Junio. ☿

116. *S. gramuntia*. *Sp. pl.* 143.—In collibus apricis
circà Sevastopolem frequens. Junio floret. ☿

117. *S. Ukranica*. *Sp. pl.* 144. *Marsch. Fl. taur.*
n. 245.—Planta tota candicans.—Copiosè crescit in
apricis Tauriæ; circà Sevastopolem. Junio floret. ☿

118. *S. argentea*. *Sp. pl.* 145. *Sibth. n.* 288. *Desf.*
Cor. p. 52. *t.* 39.

S. orientalis argentea, foliis inferioribus incis. *Tourn.*
Cor. 34. Circà Thessalonicam, in collibus, haud rara. ☿

119. *KNAUTIA Orientalis*. *Sp. pl.* 146. *Sibth.*
n. 298.—In nemoribus Bulgarïæ, in agris incultis insulæ
Leri. Maio, junio. ☉

120. *K. plumosa*. *mant.* 319. *Scabiosa plumosa*.
Sibth. n. 293.—Scabiosa Cretica, capitulo pappos men-

tiante. *Tourn. Cor.* 34. *Herb. Tourn.* — In insulâ Samo reperitur : maio floret. ☉

121. *SHERARDIA arvensis. Sp. pl.* 149. *Sibth. n.* 299. — Ad sepes, in arvis insulæ Meli. ☿

122. *S. muralis. Sp. pl.* 149. *Sibth. n.* 300. propè Trapezum suprâ veteres muros. ☉

123. *ASPERULA cynanchica. Sp. pl.* 151. *Sibth. n.* 309. — In pascuis Odessæa bundat julio. ☿

124. *A. longi-flora. Waldst et Kitaib. pl. Rar. Hon.* 2. p. 162. t. 150. *Bertoloni. Amæn. Ital.* p. 337. — Caulis alior, corollæ tubus duplè longior quàm in præcedente. — In lazaret Odessæ. Julio. ☿

125. *A. littoralis. Sibth. n.* 311.

A. foliis linearibus quaternis margine cauleque scabris ferè incanis, floribus quadrifidis pilosis, fructu hispido. — Circâ Sevastopolem, in collibus maritimis copiosè crescit. Floret junio. ☿

126. *A. humifusa. Marsch. Fl. taur. sup. n.* 256.

A. foliis senis linearibus reflexo-patentibus cauleque ramosissimo prostrato villosis, corollæ subcampanulatæ tubo brevi.

Tubi longitudine tam vicina Galiorum quàm *Asperularum*. — Circâ Theodosiam, in ruderatis valdè frequens. Junio floret. ☿

127. *GALIUM glaucum. Sp. pl.* 156. *Sibth. n.* 326. *Lam. Ency.* 2. p. 579. *G. campanulatum. Villars. Daup.* 2. p. 326. *Asperula galioides. Marsch. Fl. taur. n.* 256. — In pascuis Odessæ. Julio florens. ☿

128. *G. incurvum. Sibth. n.* 323?

G. caule basi ramoso nitido, geniculis tumidis, foliis octonis linearibus glabris aristatis deflexis incurvis, flori-

bus paniculats, corollâ obtusâ muticâ. — In collibus petrosis insulæ Sami, ad ruinas veteris urbis floret maio. ¶

129. *G. Græcum*. *Lin. mant.* 38. *Sibth. n.* 334. — Aparine Cretica, saxatilis, incana, tenuifolia. *Herb. Tourn.* — In fissuris rupium insulæ Coi. Maio floret. ¶

130. *G. floribundum*. *Sibth. n.* 331. *an. G. setaceum?* *Desf. atl.* 1. p. 129. — Ut *Sibth.* variat fructu piloso et glaberrimo, nostrum glaberrimum. Cæterum omninò facies et habitus *G. setacei*. *Desf.* — In aridis insulæ Astypalææ. Maio floret. ○

131. *G. verum*. *Sp. pl.* 155. *Sibth. n.* 324. Planta nostra exactè media inter. *G. verum*. L. et *G. Tunetanum*. *Desf.* hujus habitum et inflorescentiam habet; sed cum glabra sit in cunctis partibus, eam ad primam speciem refero. — In arenis maritimis insulæ Sami, haud procùl fani Junonis. Junio floret ¶

132. *G. palustre*. *Sp. pl.* 155. *G. satureiæ folium?* *Marsch. Fl. Taur. Sup. n.* 260. — Ad rivulos Colchidis, propè Soukoum. ¶

133. *G. micranthum*. Caule procumbente debili ramoso glabro; foliis subsenis ovatis oblongis basi angustatis, pedunculis axillaribus hirsutis deflexis trifloris, fructu minimo hispido.

An Galii seu Valantiæ species? — Ad marginem Vulcani insulæ novæ Camini propè Theram. ○

134. *G. microcarpon*. *Wahl. Symb.* 2. p. 30. ?

G. caule lævi herbaceo, foliis subsenis, inferioribus oblongis, superioribus setaceis, pedunculis trifidis, fructibus hispidis. — In summis montibus insulæ Coi. ○

135. *G. rubrum*. *Sp. pl.* 156? — Nostrum recedit à specie L. foliis duplò longioribus, pediculis paululum lon-

gioribus sæpè dichotomis atque fructibus duplò minoribus. — In sylvis Bulgariæ frequens, propè Ineada.

136. *VALANTIA Chersonensis*. *Marsch. Fl. taur. n. 1977.* — Ad sepes, circà Byzantium frequens. Maio. π

137. *V. hispida*. *Sp. pl. 1490. Sibth. n. 336.* — In apricis insularum Meli, Leri, etc. Maio. \odot

138. *V. Taurica*. *var. hirsuta*. *Marsch. Fl. taur. n. 1976.* — Propè lazaret Sevastopoles frequentissima. π

139. *CRUCIANELLA aspera*. *Marsch. Fl. taur. n. 271.* — Circà Thessalonicam, in collibus aridis. π

140. *C. lati-folia*. *Sp. pl. 158. Sibth. n. 338.* — In summis montibus insulæ Coi. \odot

141. *RUBIA lucida*. *Lin. Syst. 2. p. 732. Sibth. n. 342.* — In insulâ Lesbo ad sepes nascitur. Junio. π

142. *R. tenuifolia*. Caule basi fruticoso humifuso, angulis tantum asperis minimè spinosis, foliis lævibus ovalis subsenis apice mucronatis, pedunculis axillaribus ramosis.

Facilè distinguitur caule frutescente, foliis floribusque duplò minoribus quàm in præcedente.

R. Cretica frutescens, *tenuifolia*. *Tourn. Cor. 4. Herb. Tour.* — Habitat in summis montibus insulæ Coi, ad altitudinem 400 hexapodum. Maio ineunte. \mathfrak{b}

143. *PLANTAGO media*. *Sp. pl. 163. Sibth. n. 346. Marsch. Fl. taur. n. 275.* — Varietas notanda foliis lanceolatis erectis, scapis pubescentibus sub spicâ ferè incanis. Forsàn species distincta? — Habitat in pascuis Tauriæ, propè Kerch. π

144. *P. lanceolata*. *Sp. pl. 164. Sibth. n. 347.* — In Colchide frequens, ad arcem Soukoum-Kale. π

145. *P. amplexicaulis*. *Cav. ic. tab. 125. Wild. Sp.*

1. *p.* 650. — In insulâ Astypalæâ, ad fossas frequens. Floret maio. ☉

146. *P. albicans. Sp. pl.* 165. *Sibth. n.* 349. — In insulis Archipelagi haud rara crescit. ☿

147. *P. maritima. Sp. pl.* 165. *Sibth. n.* 355. — In maritimis insulæ Meli. ☿

148. *P. serraria. Sp. pl.* 166. *Sibth. n.* 356. — *P. angustifolia serrata hispalensis. C. B. Herb. Tour.* — Ad margines viarum in insulâ Melitâ nec alibi reperi. ☿

149. **EPIMEDIUM** *Alpinum. Sp. pl.* 171. *Sibth. n.* 364. *E. alpinum. Var. pubigerum. D. C. Syst. un. t. 2. p.* 29. — Abundat in nemoribus circa Byzantium, ad pagum Therapia. ☿

150. **CORNUS** *mascula. Sp. pl.* 171 *Sibth. n.* 365. Circâ Byzantium frequens, necnon in sylvis Colchidis. ♀

151. *C. sanguinea. Sp. pl.* 171. *Sibth. n.* 366. — In lazaret Kerch, ad Bosphorum Cimmerianum. ♀

152. **ELÆAGNUS** *angustifolia. Sp. pl.* 176. *Sibth. n.* 369. — In arvis Athenarum frequens, in insulâ Melo. ♀

II. DIGYNIA.

153. **HYPECOM** *procumbens. Sp. pl.* 181. *Sibth. n.* 377. — In maritimis insulæ Meli; maio florens. ☉

III. TETRAGYNIA.

154. **SAGINA** *procumbens. Sp. pl.* 185. *Sibth. n.* 388. — Ad margines viarum, in insulâ Melitâ communis. ☉

V. PENTANDRIA.

I. MONOGYNIA.

155. **HELIOTROPIMUM** *supinum. Sp. pl.* 187. *Sibth. n.* 391.

H. minus, supinum. C. B. *Herb. Tourn.*—In arvis insulæ Leri collegi. Junio floret. ☉

156. MYOSOTIS *perennis*. M. *scorpioides* Var. b. *Sp. pl.* 188. *Sibth. n.* 392. M. *perennis*. Var. a. *palustris*. D. C. *Fl. fr.* 2725. — Ad rivulos in Colchide frequens. ☿

157. M. *arvensis*. M. *scorpioides*. Var. a. *Sp. pl.* 188. *Sibth. n.* 392. M. *arvensis*. Var. b. *collina*. D. C. *Fl. fr. n.* 2724. — In collibus aridis insulæ Meli. ☉

158. M. *lappula*. *Sp. pl.* 189. *Sibth. n.* 294. *Marsch. Fl. taur. n.* 305. — In pascuis Tauriæ, propè Theodosiam et Kerch, copiosissimè. ☉

159. LITHOSPERMUM *apulum*. *Sibth. n.* 395. *myosotis apula*. *Sp. pl.* 189. — In collibus incultis insulæ Meli non rarum occurrit. Maio floret. ☉

160. L. *arvense*. *Sp. pl.* 190. *Sibth. n.* 398. — Comune in pascuis Tauriæ.

161. L. *officinale*. *Sp. pl.* 189. *Sibth. n.* 397. — Cum præcedente, nec rariùs. ☿

162. L. *fruticosum*. *Sp. pl.* 190. *Sibth. n.* 400. — Abundat in collibus apricis insulæ Sami: ☿

163. L. *dispermum*. *Lin. dec. 1. t. 7. Marsch. Fl. taur. n.* 312. — In pascuis Tauriæ, circà Kerch frequens. ☉

164. ANCHUSA *angusti-folia*. *Sibth. n.* 405. *Wild. Sp. 1. p.* 757. *non. D. C. Fl. fr. n.* 2730. — In arvis insulæ Meli vulgaris. ☿

165. A. *undulata*. *Sp. pl.* 191. *Sibth. n.* 406. *Buglossum Lusitanicum*, cchii folio undulato. *Herb. Tourn.* — Copiosè crescit in arenis maritimis insularum Meli, Coi, Sami, Lesbi etc. Floret maio. ☿

166. *A. linearifolia*: *A. angustifolia*? *D. C. Fl. fr.*
n. 273.

A. foliis angustis ferè linearibus callosis hispidis, floribus racemosis approximatis fauce squamosis, calycibus quinque costatis usque medium divisis, bracteis ovalis acuminatis.

Flores amœnè cœrulei. — In pascuis Odessæ nascitur frequens. Julio florens. x

167. *A. tinctoria*. *Sibth. n.* 408. *Desf. Atl.* 1. p. 156. *Lithospermum tinctorium*. *D. C. Fl. fr.* n. 2716. — In summis montibus insulæ Coi. Floret maio. x

168. **CYNOGLOSSUM** *pictum*. *Wild. Sp.* 1. p. 761. *D. C. Fl. fr.* n. 2738. *March. Fl. taur.* n. 324. — In Tauriæ pascuis, propè Kerch. ☉

169. **SYMPHYTUM** *Oriente*. *Sp. pl.* 195. *Symphytum Constantinopolitanum*, borraginis facie et folio, flore albo. *Tourn. Cor.* 7. *Buxb. C.* 5. p. 36. t. 68. *Herb. Tourn.* — Circà Byzantium, in locis humidis nimum frequens. Aprili floret. x

170. *S. asperrimum*. *March. Fl. taur.* n. 328. *Symphytum Ibericum*, folio subrotundo aspero, flore cœruleo. *Tourn. Cor.* 7. *Gundelsheimer in Herb. Tourn.* — Occurrit frequens in umbrosis summæ insulæ Coi. Maio florens. x

171. **CERINTHE** *aspera*. *Sibth. n.* 418. *C. major*. *b. Sp. pl.* 196. — Ad margines agrorum, in insulâ Samo. ☉

172. **ONOSMA** *erecta*. *Sibth. n.* 424?

O. foliis linearibus, pilis basi stellatis longis rigidis intertextis, caulibus ramosis floribusque erectis.

Symphytum creticum, echii folio angustiore, longissimis villis horrido, radice rubrâ, flore croceo. *Tourn. Cor.*

6. *Herb. Tourn. Icon. Aubriet.*—In collibus elatis insulæ Meli. Aprili floret. ☞

173. *O. rupestris. Marsch. Fl. taur. n. 332.*—Symphytum armenium, echiifolio, flore albo tenuissimo. *Tourn. Cor. 6. Herb. Tourn.*—Copiosè crescit in collibus circà Trapezum. Floret junio. ☞

174. *O. echioides. Sp. pl. 197. Sibth. n. 423.*—In montibus elatis insulæ Coi, ad altitudinem 300 hexapodum. Floret maio. ☞

175. *O. tinctoria. Marsch. Fl. taur. n. 331.*—Præcedenti similis, sed folia longiora et angustiora. Flores minores, planta integra obscurè virens.—In Tauriæ pascuis propè urbem Kerch. ☞

176. *O. stellulata. Marsch. Fl. taur. n. 333.*—Symphytum ponticum, oleæfolio cinereo et hirsuto. *Herb. Tourn.*—In collibus apicis Tauriæ, ad ruinas veteris Chersonesi. ☞

177. **BORRAGO** *Orientalis. Sp. pl. 197. Sibth. n. 427. Buæb. C. 5. f. 30.*—In nemoribus circà Byzantium copiosissimè reperitur. Florens maio. ☞

178. **B. Cretica. Desf. Cor. 5. t. 30. Sibth. n. 428.**
B. cretica, flore reflexo elegantissimo suavè rubente. *Tourn. Cor. 6. Herb. Tourn.*—In fissuris rupium insulæ Astypalææ nec alibi mihi occurrit in Oriente. Floret maio. ☞

179. **ASPERUGO** *procumbens. Sp. pl. 198. Sibth. n. 429.* Frequens in pascuis Tauriæ, propè Kerch ☉

180. **LYCOPSIS** *variegata. Sp. pl. 198. Sibth. n. 430.*—In rudicibus insulæ Astypalææ, nec alibi reperi. Maio floret. ☉

181. *L. glomerata*. Foliis et caule strigosis, foliis angustis sessilibus integris, caule patulo ramoso, floribus minimis confertis serè capitatis, calycibus quinque partitis undique tectis pilis longis stricis et incanis.

Flores amœni violacei seu purpurei. — Ad litus arenosum insulæ Coi nec rursus inveni. Maio floret. x

182. *L. erecta*. *Anchusa stylosa?* Marsch. *Fl. taur.* n. 315. *A. annua*. Pallas. — Buglossum orientale erectum, foliis undulatis, flore amœnè cœruleo. *Tourn. Cor.* 6. Ex descriptione.

L. floribus æqualibus, calycibus quinque partitis, corollæ tubo brevioribus, fructiferis erectis, foliis undulato-dentatis hispidis. — In pascuis Theodosiæ. Maio. ○

183. *ECHIUM Creticum*. *Sp. pl.* 200. *Sibth. n.* 438.

E. creticum angustifolium rubrum. *Tourn. Inst.* 136. *Herb. Tourn.* — Cum priori in arenis maritimis insulæ Coi, nec alibi. x

184. *E. Pyrenæicum*. *Lin. Mant.* 334. *Desf. Fl. atl.* 1. p. 165. *D. C. Fl. fr. n.* 2708. — Circà Trapezum copiosissimè. Junio. x

185. *E. flavum*. *Desf. Fl. atl.* 1. p. 165 — Frequens in nemoribus Bulgariæ, ad pagum Ineada. Floret julio. x

186. *E. plantagineum*. *Lin. Mant.* 102. *Sibth. n.* 432. — Circà Byzantium in agris. ○

187. *E. vulgare*. *Sp. pl.* 200. *Sibth. n.* 434. — In Colchide vulgaris, circà arcem Soukoum-Kale. ♂

188. *E. violaceum*. *Lin. Mant.* 42. *D. C. Fl. fr. n.* 2709. — In arenosis insulæ Meli haud rarum. Floret aprili. ○

189. *E. calycinum*. *Loisel. not.* 38. *D. C. Fl. fr.*

n. 2711 (a). *E. prostratum*. Tenore. *Fl.* 1. p. 50. f. 12.
E. Lusitanicum. Allion. *ped.* n. 182. — Frequentissimè occurrit in arenosis littoribus insularum Melitæ et Meli. ♂

190. *ANDROSACE maxima*. *Sp. pl.* 203. *Marsch. Fl. taur.* n. 342. — In collibus Theodosiæ frequentissima. Maio. ☉

191. *CYCLAMEN hederi-folium*. Aiton. *Hort. Kew.* 1. p. 196. *Sibth. n.* 444. In montibus insulæ Scopeli copiosè : septembri. ☞

192. *LYSIMACHIA verticillata*. *Marsch. Fl. taur.* n. 355.

L. pontica, lutea, canescens et villosa. *Gundelsheimer in Herb. Tourn.* — Ad margines sylvarum abundat in Colchide, circà Soukoum. Junio florens. ☞

193. *L. linum stellatum*. *Sp. pl.* 211. *Sibth. n.* 451. — In apricis insulæ Meli. Aprili. ☉

194. *CONVOLVULUS scammonia*. *Sp. pl.* 218. *Sibth. n.* 459. *Marsch. Fl. taur.* n. 365. — Suprà sepes scandens, in insulâ Coo : maio floret. ☞

195. *C. hirsutus*. *Marsch. Fl. taur. Suppl. n.* 365. *C. sagittifolius*. *Sibth. n.* 461.

C. foliis cordato-hastatis pilosis basi angulatis, pedunculatis elongatis uni seu bifloris, bracteis binis remotis filiformibus, calyce brevi hirsuto, flore albo amplo.

In ruderatis Sami, florens junio. ☞

196. *C. althæoides*. *Sp. pl.* 222. *Sibth. n.* 462. *Var. nana*. Insignis quia ferè acaulis, vix 3-4 uncialis, foliis tenuè dissectis, pedunculis semper unifloris. — In arenosis maritimis insulæ Meli. Aprili, maio. ☞

197. *C. olecefolius*. Lamarch. *Ency.* 3. p. 552. *C. lineatus*. Sibth. n. 467.

C. argenteus angustifolius umbellatus, partim erectus, partim supinus. *Tourn. Cor.* 1. *Herb. Tourn.* — Prope Cimolum in scopulo St.—Istad copiosissimus suffrutex. Floret aprilis fine. 5

198. *C. Cantabrica*. *Sp. pl.* 225. *Sibth. n.* 469. — Frequens in collibus Bulgariae, necnon circa Trapezum. 12

199. *C. soldanella*. *Sp. pl.* 226. *Sibth. n.* 474. Vulgaris in littoribus arenosis Colchidis. Junio. 12

200. *C. arvensis*. *Sp. pl.* 218. *Sibth. n.* 457. — Ad sepes Colchidis, in pascuis Odessæ communis. 12

201. *CAMPANULA stricta*. *Sp. pl.* 238. *Sibth. n.* 488. — In montibus elatis insulæ Coi. Maio floret. —

202. *C. Sibirica*. *Sp. pl.* 236. *D. C. Fl. fr. n.* 2855*. *C. iberica*, foliis incis, flore minimo et multiplici. *Gundelsheimer in Herb. Tourn.* — In herbidis prope Odessam. 3

203. *C. dichotoma*. *Sp. pl.* 237. *Sibth. n.* 492. — In summis rupibus insulæ Coi. Maio floret. 0

204. *C. speculum*. *Sp. pl.* 238. *Sibth. n.* 493. — In insulâ Coi ubique frequens. 0

Varietatem legi notandam; caulibus et foliis scabris, caule plerumque simplici, vix 3-4 unciali ascendente, foliis oblongis sessilibus sinuatis crispis numerosis ferè imbricatis, corollâ albâ calyce saltem duplò longiore. An species distincta? — In arenis maritimis ejusdem insulæ. Floret maio. 0

205. *THESIUM ramosum*. *Marsch. Fl. taur. n.* 439. *T. linophyllum*. *Sp. pl.* 301. — In herbidis Tauriæ frequentissimè, circa Kerch. 12

206. *T. humile*. *Vahl. Symb.* 3. p. 43.

T. foliis linearibus glaucis subcarnosis, floribus axillaribus sessilibus, nucibus globosis rugosis, caule basi ramoso.—In arvis maritimis insulæ Meli; aprili floret. ☉

207. *AZALEA Pontica*. *Marsch. Fl. taur.* n. 361. *Chamærhododendros pontica maxima*, mespili folio, flore luteo. *Tourn. Cor.* 42. *Buxb. c.* 5. p. 36. f. 69. *Icon. Aubriet.*—Cum *Rhododendro pontico* et *Vaccinio arcto-staphylo* nemora densa efficit circà Trapezum. Maio floret. ♀

208. *VERBASCUM phlomoïdes*. *Sp. pl.* 253. *Sibth.* n. 522. Frequens in collibus aridis insulæ Sami. ♂

209. *V. pulverulentum*. *D. C. Fl. fr.* n. 2673. — In incultis insulæ Leri copiosè crescit. ♂

210. *V. gnaphalodes*. *Marsch. Fl. taur.* n. 399.** —Planta 5-6 pedalis, foliis amplissimis dentatis utrinque tomentosis, ramis patentibus, floribus luteis in spicis densis cano-tomentosis.—In arenis maritimis Colchidis, ad arcem Soukoum-Kale. ♂

211. *V. lychnitis*. *Sp. pl.* 253.—Vulgaris in campis circà Trapezum. ♂

212. *V. pinnatifidum*. *Vahl. Symb.* 2. p. 39. *Sibth.* n. 526. — In littoribus arenosis insulæ Scyri. Julio floret. ♀

213. *DATURA stramonium*. *Sp. pl.* 255. *Sibth.* n. 550. *Marsch. Fl. taur.* n. 407.—In Colchide, circà Soukoum. ☉

214. *HYOSCIAMUS niger*. *Sp. pl.* 257. *Sibth.* n. 551.—Propè Byzantium frequens, circà Soukoum Colchidis, Theodosiam et Kerch Tauriæ, in lazaret Odessæ. ♂

215. *ATROPA mandragora*. *Sp. pl.* 259. *Sibth.* n. 534. *Astypalææ campos infestat.* π

216. *PHYSALIS alkekengi*. *Sp. pl.* 262. *Sibth.* n. 537.—*In sylvis Bulgariæ, ad pagum Ineada.* π

217. *RHAMNUS oleoides*. *Sp. pl.* 279. *Sibth.* n. 548.
R. hispanicus, oleæfolius. *Tourn. Inst.* 593. *Herb. Tourn.*—*In insulis Melo et Cimolo copiosè.* ν

218. *R. frangula*. *Sp. pl.* 280. *Sibth.* n. 553. *Marsch. Fl. Taur.* n. 420.—*In sylvis Colchidis frequentissimè, propè Soukoum.* ν

219. *PALIURUS aculeatus*. *D. C. Fl. fr.* n. 4081. *Rhamnus paliurus.* *Sp. pl.* 281. *Ziziphus paliurus.* *Sibth.* n. 555.—*Copiosissimus circa Trapezum, in insulâ Thaso, in peninsulâ Montis Athonis. Junio floret.* ν

220. *LAGOECIA cuminoïdes*. *Sp. pl.* 294. *Sibth.* n. 563.—*In insulis Melo et Cimolo ubique reperitur. Maio florens.* \circ

221. *VIOLA canina*. *Sp. pl.* 1324. *Sibth.* n. 509.—*In collibus insulæ Meli haud rara.* π

222. *V. arvensis*. *D. C. Fl. fr.* n. 4469. *V. tricolor.* a. *Sp. pl.* 1326. *Sibth.* n. 510. *Marsch. Fl. taur.* n. 433. *In lazaret Theodosiæ communis.* \circ

223. *PARONYCHIA echinata*. *D. C. Fl. fr.* n. 2285. *Illecebrum echinatum.* *Desf. atl.* 1. p. 204.—*In insulâ Melo, circa Theatrum vetus. Aprili floret.* \circ

224. *P. argentea*. *D. C. Fl. fr.* n. 2290. *Illecebrum paronychia.* *Sp. pl.* 299. *Sibth.* n. 566.—*In collibus siccis Melitæ et Meli frequens.* π

225. *VINCA pubescens*. *Undiquè pubescens, pedicellis hirtis, foliis ovatis obtusis mollibus, floribus brevius pedunculatis, segmentis calycinis filiformibus ciliatis.*

Affinis *V. majori* et *minori*, huic accedit formâ calycis; ab utrâque differt foliis et pedunculis hirtis foliisque minoribus. — In Colchide frequens, ad sepes. Junio floret. 5

226. *NERIUM oleander*. *Sp. pl.* 305. *Sibth. n.* 570. — In cunctis serè insulis Archipelagi, nusquam ad littora Ponti-Euxini vidi. 5

227. *PERIPLOCA Græca*. *Sp. pl.* 309. *Sibth. n.* 571. *Marsch. Fl. taur. n.* 441. — Vulgata in Colchide, suprâ sepes scandens. 5

228. *CYNANCHUM erectum*. *Sp. pl.* 311. *Sibth. n.* 574. — Apocynum folio subrotando ex viridi et flavescente variegato. *Gundelsheimer in Herb. Tourn.* — Circâ Neria volubilis, in insulâ Scyro copiosissimè julio floret. 7

229. *C. Monspeliacum*. *Sp. pl.* 311. *Sibth. n.* 573. — Scammonea Monspeliaca, foliis rotundioribus. *Herb. Tourn.* — Ad sepes vulgare, in insulis Lesbo, Samo, etc. in lazaret Odessæ. 7

230. *C. acutum*. *Sp. pl.* 310. *Sibth. n.* 572. — Scammoneæ Monspeliacæ affinis foliis acutioribus. *Herb. Tourn.* — Nonnè præcedentis mera varietas? — In insulâ Melo commune. 7

231. *CHIRONIA centaurium*. *Sibth. n.* 545. *Gentiana centaurium*. *Sp. pl.* 332. — Variat interdum flore purpureo et flore prorsus albo. — In collibus Sami haud rara reperitur. 0

II. DIGYNIA.

252. *GRESSA Cretica*. *Sp. pl.* 325. *Sibth. n.* 598. — Quamoclit minima humifusa palustris, herniaricæ folio.

Tourn. Cor. 4. Herb. Tourn.—In arenis Sami, in Macedonia propè canalem Xerxis non rara. ☉

233. *CUSCUTA epithymum. Syst. veg. p. 140. Sibth. n. 602.*—In diversis plantis parasitica, tum in Anagyri foetidâ. π

234. *VELEZIA clavata. V. quadridentata? Sibth. n. 954. V. caule patulo glabro stricto parcè ramoso, ramis paucifloris, foliis brevibus linearibus, pedunculis incrassatis, calycibus glaberrimis clavatis quadrangulis, floribus minimis amcenè rubellis.*—In arvis maritimis insulæ Astypalææ. Maio floret. ☉

235. *V. rigida Sp. pl. 474. Sibth. n. 953.*—In arvis nemorosis Bùlgariæ. ☉

236. *HERNIARIA hirsuta. Sp. pl. 317. Sibth. n. 578.*—In herbidis Odessæ. π

237. *H. cinerea. D. C. Fl. fr. n. 2293 (a).*—Ad margines viarum insulæ Melitæ. ☉

238. *ATRIPLEX halimus. Sp. pl. 1492. Sibth. n. 2329.*—Frequens in insulâ Melo, in littoribus Atticis. π

239. *A. recurva.*

A. maritima laciniata. G. B. Tourn. Inst. 505. Icon. Aubriet. Optimè.

A. caule patulo ramoso, foliis longius petiolatis, utrinque argenteis laciniatis apice recurvis crassis ferè carnosis, spicis nudis terminalibus.

Planta totâ pulvere denso incano obsita, folia ramorum sterilium multò magis recurva quàm in ramis fructiferis. Fructus non vidi.—Ad littus Atticum, propè insulam Helenam legi. Ineunte octobri floret. ♀

240. *BETA maritima*. *Sp. pl.* 322. *Sibth. n.* 590.
— Ad littora salsa insulæ Melitæ. Aprili. x

241. *SALSOLA soda*. *Sp. pl.* 323. — Ad littus Pyræi,
propè Athenas. ○

242. *S. prostrata*. *Sp. pl.* 323. *Marsch. Fl. taur.*
n. 472. — *Chenopodium Armenium*, fruticosum, inca-
num, psyllii folio. *Gundelsheimer in Herb. Tourn.* —
In maritimis Tauriæ, circà Sevastopolem haud rara.
Junio floret. 5

243. *S. brevi-folia*. *Desf. atl.* 1. p. 218. — In rupi-
bus maritimis insulæ Meli, circà tumulos et theatrum
copiosissimè. Septembri florens. 5

244. *ERYNGIUM Creticum*. *Lam. Ency.* 4. p. 754.
E. multifidum. *Sibth. n.* 611.

E. creticum, erectum, folio multifido, caule et ramis
amethystinis. *Herb. Tourn.* — In arvis Sami nimum
frequens. Junio floret. x

245. *E. glomeratum*. *Lam. Ency.* 4. p. 755. *E. par-
vi-florum*. *Sibth. n.* 612.

E. foliis laciniatis, capitulis florum exiguis et densè
congestis. *Tourn. Cor.* 23. *Icon. Aubriet.* Optimè. —
Frequens in summis montibus insulæ Coi, ad altitu-
dinem 400 hexapodum. Maii sine flores non conspi-
cui. x

246. *ECHINOPHORA tenui-folia*. *Sp. pl.* 344. *Sibth.*
n. 627. — In vinctis insulæ Tenedi ubique reperitur. Julio
floret. x

247. *BUPLEVRUM rotundifolium*. *Sp. pl.* 340.
Sibth. n. 615. — In collibus Theodosiæ vulgaris. ○

Var. *B. intermedium*. *Loisel. not.* 45. Insignis caule

ramoso patulo, supernè flavicante, umbellis bifidis vel trifidis tantùm, quandòque bractea ovata instructis, involuclis ovatis latis floribus saltèm duplò longioribus. — In segetibus insularum Melitæ et Meli copiosè crescit. ☉

248. *B. semi-compositum*. *Sp. pl.* 342. *Sibth. n.* 619. — In insulâ Melo; aprili floret. ☉

249. *B. glaucum*. *D. C. Fl. fr. n.* 3543 (a). — Præcedentis, ut credo, mera varietas. — In scopulo St-Istad, propè Cimolum: Aprili. ☉

250. *B. gracile*. Caule ramoso dichotomo gracili, foliis angustissimis ferè setaceis, involuacro triphylo, pediculis inæqualibus, involuclis scariosis subdiaphanis lanceolatis trinerviis fructibus duplò longioribus.

Planta gracilis vix 3-4 uncialis erecta, multoties dichotoma; involuclis ferè diaphanis lanceolatis longè acuminatis.

B. annuum minimum, angustifolium. *Herb. Tourn.* — In sterilibus Astypalææ vulgaris. Maio florens. ☉

251. *B. junceum*. *Sp. pl.* 343. *Sibth. n.* 623. — In nemoribus Bulgariæ, propè pagum Ineada. ☉

252. *B. odontites*. *Sp. pl.* 342. *Sibth. n.* 616. — Propè Smyrnam, in arvis maritimis. ☉

253. CAUCALIS *maritima*. *D. C. Fl. fr. n.* 3507. *Daucus maritimus*. *Gærtn. fr. 1. p.* 80. *Caucalis pumila*. *Wild. Sp. 1. p.* 1385. *Sibth. n.* 637. — In arenis maritimis insulæ Meli. Aprili floret. ☉

254. *C. daucoides*. *Sp. pl.* 546. *Sibth. n.* 635. — Circa Trapezum, in arvis.

255. *C. scandinavica*. *D. C. Fl. fr. n.* 3513. *Scandix anthriscus*. *Sp. pl.* 368. *Sibth. n.* 688. *Anthriscus*

caucalis. *Marsch. Fl. taur. n.* 574. — In Tauriâ circa Theodosiam frequens. ☉

256. *C. arvensis*. *D. C. Fl. fr. n.* 3510. *C. aspera*. *b. Lam. Ency. 1. p.* 656. — Propè Byzantium, ad sepes. ☉

257. *DAUCUS hispidus*. *Desf. atl. 1. p.* 243. — Ad littora maritima insulæ Sami. ✕

258. *D. muricatus*. *Sp. pl.* 349. — In maritimis Archipelagi. Julio. ☉

259. *AMMI visnaga*. *Desf. atl. 1. p.* 245. *Sibth. n.* 650. *Daucus visnaga*. *Sp. pl.* 348. — Valdè frequens in insulâ Samo, in sinu Smyrnæo, in peninsulâ Athonis etc. Julio floret, ☉

260. *BUNIUM Creticum*. Caule dichotomo ferè nudo; foliis glabris, caulinis in laciniis linearibus dissectis, radicalium foliolis ovatis incisisque, radice tuberosâ.

Bulbocastanum creticum, radice napiformi. *Herb. Vailtant. Herb. Tour.* — In insulâ Coo, ad sepes. Maio floret. ✕

261. *BUNIUM ferulæ-folium*. *Desf. Ann. Mus. t. 11. tab. 30. B. ferulaceum*. *Sibth. n.* 651. — Bulbocastanum Creticum, ferulæ-folio, semine oblongo. *Tourn. Cor. 21. Herb. Tourn.* — In insulâ Samo, in arvis hyeme submersis. Medio junio jam floruerat. ✕

262. *CICUTA major*. *Tourn. Inst. 306. D. C. Fl. fr. n.* 3494. *Conium maculatum*. *Sp. pl.* 349. *Sibth. n.* 653. — In ruderatis circa Trapezum frequens. ♂

263. *CACHRYIS Sicula*. *Sp. pl.* 355. *Sibth. n.* 661. — Copiosè in agris Sami, propè ruinas veteris urbis. Maio floret. ✕

264. *THAPSIA Garganica*. *Mant. 57. Sibth. n.* 703.

Gouan. Illust. 18. tab. 10. Frequentissima in insulis Melo, Cimolo, et Astypalæâ etc. Maio floret. π

265. *T. præalta.* Foliis radicalibus amplis lucidis quadrifariam decompositis, foliolis oblongis incisive ferè pinnatifidis, caule 6-8 pedali supernè ramoso, umbellis numerosis, centrali multò brevioribus; lateralium pedunculis basi binâ bracteâ lanceolatâ instructis.

Fructus non vidi maturos. — In rupibus præruptis insulæ Coi, ad altitudinem 300 hexapodum. Floret siniente maio. π

266. *FERULA meoides.* *Sp. pl.* 356. — Laserpitium orientale, folio mei, flore luteo. *Tourn. Cor.* 23. *Herb. Tourn. Vaillant.*

267. *TORDYLIUM humile.* *Desf. atl.* 1. p. 235. Frequens in apricis Melitæ atque Meli. Aprili. \odot

268. *T. apulum.* *Sp. pl.* 345. *Sibth. n.* 631. — In collibus Meli cum præcedente reperitur. \odot

269. *T. officinale.* *Sp. pl.* 345. *Sibth. n.* 630. — In campis Asiæ minoris, propè Byzantium

270. *SIUM Siculum.* *Sp. pl.* 362. — Daucus pastinacæfolio siculus. *Zan. hist.* 78. t. 30. Myrrhis sicula foliis pastinacæ lætè virentibus. *Tourn. Cor.* 22. *Herb. Tourn.* — In collibus Meli sæpiùs acaule aprili floret. π

271. *S. falcaria.* *Sp. pl.* 362. *Sibth. n.* 276. *Bunium falcaria.* *Marsch. Fl. taur.* n. 530. — In insulâ Berezen ad Borysthenem copiosissimè. π

272. *CUMINUM minutum.* Caule gracili ramoso, foliis decompositis, laciniis linearibus obtusis, involucellis setaceis fructibus subæqualibus, fructibus parvis oblongis.

A C. cymino differt caulibus minoribus vix 2-3 uncialibus, foliis et involucellis fructibusque triplè minoribus, præsertim his longè et inæqualitèr pedicu-

latis. — frequens in cacumine umbroso insulæ Coi, ad altitudinem 450 hexapodum. Maio floret. ☉

273. OENANTHE *pimpinelloïdes*. *Sp. pl.* 566. *Sibth.* n. 680. — In Colchidis paludosis, circa Soukoum.

274. SCANDIX *australis*. *Sp. pl.* 369. *Sibth.* n. 687. — In arvis insulæ Coi nascitur. ☉

275. SESELI *tortuosum*. *Sp. pl.* 275. *Sibth.* n. 697. — In lazaret Odessæ, in arenosis Macedoniæ ad Canalem Xerxis. Julio floret. ☿

276. PASTINACA *opopanax*. *Sp. pl.* 576. *Sibth.* n. 705. — In insulâ Samo parcè reperitur. Julio floret. ☿

277. P. *sativa*. *Sp. pl.* 576. *Sibth.* n. 704. *Marsch. Fl. taur.* n. 589. — In lazaret Odessæ, julio floret. ☿

278. SMYRNIUM *ramosum*. Caule glabro tereti ramosissimo, foliis infernis amplè veginatis decompositis, foliolis ovatis crenatis, foliis supernis simplicibus, umbellis confertis numerosissimis, fructibus minimis.

AS. *perfoliato* facilè dignoscitur caulibus basi supernèque ramosis teretibus nullatenus alatis, umbellis majoribus et magis ramosis, imprimis ramis et bracteis supernè frequenter oppositis. — Copiosissime crescit in summo culmine insulæ Coi. Maio florens. ☿

279. ANETHUM *segetum*. *L. Mant.* 219. *Sibth.* n. 709. Anethum segetum viride. *Herb. Tour.* — In agris et hortis insulæ Sami, circa Byzantium etiam legi. ☉

280. PIMPINELLA *nodosa*. Caule ramoso dichotomo glaberrimo, foliis multipartitis, laciniis linearibus, umbellis numerosis, fructibus minimis ovatis pilis raris adpersis.

In loco involucri caulis sæpius in nodum crassum et turbinatum auctus. — Frequens in saxosis Sami, ad ruinas veteris urbis. Floret junio. ☿

281. *P. hispida* Loisel. Not. 48. D. C. Fl. fr. n. 3414 (b). Frequentèr occurrit ad sepes insulæ Scyri. ♂

282. *P. dioica* L. Mant. 357. Sibth. n. 712. Marsch. Fl. taur. n. 602. — Communis in pascuis Tauriæ, propè Kerch. ♀

283. **CHEROPHYLLUM aromaticum.** Sp. pl. 371. Sibth. n. 671. — Circà Byzantium, in sepibus. Julio floret. ♀

III. TRAGYNA.

284. **RHUS cotinus.** Sp. pl. 383. Sibth. n. 717. Marsch. Fl. taur. n. 607. — Frequens in nemoribus insulæ Thasi atque propè montem Athenem. Julio floret. ♀

285. **STAPHYLEA pinnata.** Sp. pl. 386. Sibth. n. 723. Marsch. Fl. taur. n. 613. — In sylvis Colchidis copiosa: propè Soukoum. ♀

286. **TAMARIX Africana.** Desf. Fl. atl. 1. p. 269. — Ad ripas fluviorum copiosa, circà Trapezum. ♂

287. *T. Germanica.* Wild. Sp. 1. p. 1499. Marsch. Fl. taur. n. 616. — In torrentibus circà Trapezum: junio floret. ♀

288. **PHARNACIUM cerviana.** Sp. pl. 588. — In arenosis insulæ Scyri haud rarum. Floret junio. ♂

IV. PENTAGYNIA.

289. **STATICE Gmelini.** Wild. Sp. 1. p. 1524. Marsch. Fl. taur. n. 622. — In Bulgariâ, ad littora Ponti-Euxini. Floret junio. ♀

290. *S. scoparia.* Wild. Sp. 1. p. 1424. Marsch.

Fl. taur. n. 621. — Circà Odessam frequens occurrit.
Julio florens. π

291. *S. ocymi-folia. Poiret. Ency. sup. 5. p. 238.*
S. spathulata. Wild. Hort. Kew. non Desf. — Limonium græcum, minus, ocymi-folio. *Herb. Tourn.* — In scopulo Raphthi, ad littus Atticum, copiosissimè π

292. *S. prolifera.* Caule suffruticoso ramoso reticulato, foliis oblongis spathulatis rugosis fasciculatim dispositis in dichotomiâ ramorum, racemis strictis erectis, floribus remotis.

Limonium fruticosum, bellidis folio, proliferum, insularum Cycladum. *Herb. Tourn. Icon. Aubriet.* — Propè Theram frequens in novis insulis Ferasiâ et Camini. Maio floret. ν

293. *S. bellidi-folia. Sibth. n. 733. D. C. Fl. fr. n. 2323.* — Limonium, bellidis folio, in insulâ Melo. *Herb. Tour.* — Ad littora maris, in insulâ Melo, in Argolide propè Lernæ paludem. Æstate floret. π

294. *S. dichotoma. Sibth. n. 736?*

S. scapo ramosissimo paniculato; ramis punctato-scabris: inferioribus sterilibus, foliis obovatis brevioribus.

Limonium maritimum, minus oleafolio. *Herb. Tourn.* — In littoribus Meli copiosissimè. Floret septembri. π

295. *S. incana. Vahl. Symb. 1. p. 25. Marsch. Fl. taur. n. 625.* — In plantâ nostrâ folia glauca sed nequaquam incana. — Ad littora Ponti Euxini in Bulgariâ frequens. Floret julio. π

296. *S. tatarica. Sp. pl. 395. Marsch. Fl. taur. n. 624.*

Var. *angustifolia.* — In lazaret Sevastopoles et Odessæ copiosè floret julio. σ

297. *S. sinuata*. *Sp. pl.* 396. *Sibth. n.* 741. — In insulis Melo, Astypalæa, Coe, Samo, Lesbo, etc. Floret maio. π

298. *S. globulariæ-folia*. *Desf. atl.* 1. p. 274. *Sibth. n.* 734. — A plantâ *Cl. Desf.* nostra differre videtur foliis obtusis et angustioribus, caulibus altioribus magis strictis et dichotomis, ramis denique patentibus. — In arenosis insulæ Leri parùm frequens. Floret maio. π

299. *LINUM Austriacum*. *Sp. pl.* 399. *Marsch. Fl. taur.* n. 633. — In Tauriæ pascuis valdè vulgare, propè oppidum Kerch. δ

300. *L. angustifolium*. *Fl. Br.* 344. *Sibth. n.* 745. In insulâ Melo. π

301. *CRASSULA rubens*. *Sibth. n.* 753. *Sedum rubens*. *Sp. pl.* 619. — In saxosis insulæ Meli. Floret maio. \odot

VI. HEXANDRIA.

I. MONOGYNIA.

302. *NARCISSUS serotinus*. *Desf. atl.* 1. p. 283.

N. albus autumnalis minimus Clusii. *Inst.* 355. *Icon. Aubriet.* Rarissimè spatham bifloram vidi, sæpius unifloram. — In ericetis insulæ Meli frequens. Octobri floret. π

303. *PANCRATIUM maritimum*. *Sp. pl.* 418. *Sibth. n.* 760. — Ad littora arenosa, in insulâ Lemno frequens, frequentius in peninsulâ Athonis. Julio, augusto.

304. *AMARYLLIS lutea*. *Sp. pl.* 420. *Sibth. n.* 761. Ad littus Phioticum, etiàm circà Athenas reperitur in colle Musæo. π

305. *ALLIUM subhirsutum*. *Sp. pl.* 424. *Sibth.*

n. 767. *Desf. Fl. atl.* 1. p. — In insulis Melitâ et Melohaud rarum. Aprili. π

306. *A. Græcum.* Foliis planis hirsutis cauli subæqualibus, umbellâ capsuliferâ fastigiatâ, spathâ unifoliâ amplâ ovatâ, pedicellis filiformibus, petalis longis acuminatis.

Simillimum præcedenti, differt tamen spathâ ampliori, pedicellis multò gracilioribus, petalis acutis et floribus sæpius roseis. — In insulâ Melo frequens. Aprili floret. π

307. *A. nigrum.* *Sp. pl.* 430. *Sibth. n.* 779. — In arvis Insulæ Melitæ rariùs. Aprili floret. π

308. *A. album.* *Lois. not.* 56. *D. C. Fl. fr. sup.* n. 1956 (a). *A. lacteum?* *Sibth. n.* 781. — In torrentibus insulæ Astypalææ. Aprili floret. π

309. *A. ursinum.* *Sp. pl.* 431. *Marsch. Fl. taur.* n. 659. — In sylvis Colchidis copiosè nascitur. Maio. π

310. *A. sphærocephalon.* *Sp. pl.* 426. *D. C. Fl. fr.* n. 1975. — In arenosis Colchidis, in pascuis Odessæ. Junio, julio. π

311. *A. moschatum.* *Sp. pl.* 427. *D. C. Fl. fr.* n. 1969. — Frequens in collibus apricis insulæ Astypalææ. Maio floret. π

312. *A. pilosum.* *Sibth. n.* 777?

A. caule tereti humili umbellifero, foliis subteretibus longissimis villosis, spathâ bicorni umbellæ subæquali, segmentis obtusis, staminibus simplicibus.

Planta vix 5-4 uncialis, foliis patulis longissimis, caule flexuoso, spathâ mediocri, floribus intensè purpureis in umbellâ inæquali dispositis, staminibus corollâ vix longioribus. — In apricis insulæ Astypalææ non infrequens. Maio floret. π

513. *A. guttatum*. Steven. in *Herb. Musæi*.

A. caule folioso umbellifero, foliis semi-teretibus tenuibus, vaginis longis, pediculis exterioribus brevioribus, staminibus corollâ longioribus, alternis tricuspidatis, floribus minimis dense congestis pallidis, segmentis linearibus acutis dorso amænè rubro-guttatis.

Haud rarum occurrit in collibus Scyri, in pascuis Odessæ; julio florens. ☞

514. *A. flexuosum*. *A. statici-forme*? Sibth. n. 776.

A. caule semper flexuoso folioso rigido glaberrimo, foliis infernis semi-teretibus, supernis, ad vaginam transversim truncatam reductis, spathâ bicorni umbellæ subæquali, umbellâ capsuliferâ rotundatâ, segmentis purpureis obtusis, staminibus simplicibus corollâ vix longioribus, germine tricocco.

In arenosis insularum Astypalææ et Leri copiosè crescit. Maio florens. ☞

515. *A. paniculatum*. *Sp. pl.* 428. Sibth. n. 774. *Marsch. Fl. taur.* n. 655.—In lazaret Odessæ copiosissimè julio floret. ☞

516. *A. flavum*. *Sp. pl.* 428. Sibth. n. 772. *Marsch. Fl. taur.* n. 652.—In collibus siccis insulæ Leri, in lazaret Odessæ floret julio. ☞

517. FRITILLARIA *Pyrenaïca*. *Sp. pl. ed. 1. p.* 304. Sibth. n. 788.

F. flore minore. *Tourn. Inst.* 377. *Herb. Vaillant*. — In nemoribus circà Byzantium copiosa. Aprili floret. ☞

518. ORNITHOGALUM *Pyrenaïcum*. *D. C. Fl. fr.* n. 1945. Sibth. n. 796.—Vulgare in rupibus celsis insularum Coi et Astypalææ. Maio florens. ☞

319. *O. Arabicum*. *Sp. pl.* 441. *D.C. Fl. fr.* n. 1947.
— In saxosis insulæ Melitæ : aprili floret. ☞

320. *SCILLA maritima*. *Sp. pl.* 442. *Sibth.* n. 797.
— In insulis Archipelagi ; in campis Argolicis nimium
frequens. Septembri floret. ☞

321. *ASPHODELUS ramosus*. *Sp. pl.* 444. *Sibth.*
n. 803. — In insulâ Melo haud rarè. Aprili. ☞

322. *A. fistulosus*. *Sp. pl.* 444. *Sibth.* n. 804. — In
collibus insulæ Leri rariùs occurrit. Junio. ☞

323. *ANTHERICUM Græcum*. *Sp. pl.* 444. *Sibth.*
n. 805. — Bulbocodium myosotidis flore. *Ins. Cycl.*
Herb. Tourn. — In montibus celsioribus insulæ Coi ad
altitudinem 400 hexapodum, deindè in planitie insulæ
Meli copiosissimè reperi. Aprili floret. ☞

324. *ASPARAGUS officinalis*. *Sp. pl.* 448. *Marsch.*
Fl. taur. n. 691. — In arenosis Colchidis, propè arcem
Soukoum-Kale. Junio florens. ☞

325. *A. verticillatus*. *Sp. pl.* 450. *Sibth.* n. 811.
Marsch. Fl. taur. n. 692. *Buxb. C.* 5. *app.* n. 47.
t. 37.

A. Ibericus, foliis galii. *Tourn. Cor.* 21. *Herb. Tourn.*
— In collibus Tauriæ, circà Sevastopolem. ☞

326. *A. aphyllus*. *Sp. pl.* 450. *Sibth.* n. 809.

A. Creticus, fruticosus, crassioribus aculeis, magno
fructu. *Herb. Tourn.* — In insulâ novâ Camini propè
Theram jam copiosè crescit ad latera veteris vulcani.
Maio. ☞

327. *HYACINTHUS ciliatus*. *Marsch. Fl. taur.*
n. 699. — In herbidis Tauriæ, propè Kerch copiosè.
Maio floret. ☞

328. *JUNCUS rigidus*. *Desf. Atl.* 1 p. 312. — Cap-

sula ovata obtusa fusca perigono subæqualis. Frequens in paludosis insulæ Sami. ʒ

329. *J. multiflorus*. Desf. *Atl.* 1 p. 318. — In maritimis insulæ Scyri copiosissimè. Julio. ʒ

330. *J. pygmaeus*. Thuil. *Fl. par.* 1. p. 178. *D. C. Fl. fr.* n. 1845. — Ad torrentes insulæ Meli. Aprili floret. ☉

331. *J. bufonius*. *Sp. pl.* 466. *Sibth. n.* 829. *Marsch. Fl. taur.* n. 704. — In udis Colchidis haud rarè propè Soukoum reperitur. Floret junio. ☉

332. *LUZULA vernalis*. *D. C. Fl. fr.* n. 1825. *Juncus pilosus*. *Sp. pl.* 468. *Sibth. n.* 830. *Marsch. Fl. taur.* n. 705. — In sepibus Colchidis : maio floret. ʒ

333. *L. campestris*. *D. C. Fl. fr.* n. 1827. *Juncus campestris*. *Sp. pl.* 468. *Sibth. n.* 831. — Circa Byzantium, in nemoribus copiosè maio floret. ʒ

334. *LEONTICE leontopetalum*. *Sp. pl.* 448. *Sibth. n.* 807. — In arvis Astypalææ ineunte maio jam floruerat. ʒ

335. *BERBERIS vulgaris*. *Sp. pl.* 472. *Sibth. n.* 832. *Marsch. Fl. taur.* n. 707. — In sylvis Colchidis vulgatissima. ʒ

336. *FRANKENIA laevis*. *Sp. pl.* 473. *Sibth. n.* 835. *Alsine maritima supina*, vermiculato folio. *Herb. Tourn.* — In maritimis insulæ Astypalææ. Maio floret. ʒ

337. *F. pulverulenta*. *Sp. pl.* 474. *Sibth. n.* 837. Ad margines viarum communis, in insulâ Melitâ. Floret aprili. ☉

338. *F. hirsuta*. *Sp. pl.* 473. *Sibth. n.* 836. *Alsine Cretica maritima*, supina, caule hirsuto, foliis quasi vermiculatis. *Herb. Tourn.*

F. caule suffruticoso hispido ramosissimo suberecto , foliis linearibus fasciculatis , floribus densè confertis in summitate ramorum.

Affinis præcedenti à quâ tamen facilè distinguitur , caule suffruticoso , floribus majoribus per caulem nunquàm sparsis , semper in extremis ramis densè congestis , tandem calycibus nullomodo pilis albidis tectis. — Ad littus Atticum in scopulo Raphthi copiosissimè crescit. ☞

II. TRIGYNIA.

339. RUMEX *scutatus*. *Sp. pl.* 480. *D. C. Fl. fr.* n. 2234. — In saxosis insulæ Meli, propè Monasterium. ☞

340. R. *spinosus*. *Sp. pl.* 481. *Sibth. n.* 851. — In arvis insulæ Meli copiosissimè aprili floret. ○

341. R. *nemolapathum*. *Linn. Sup.* 212. *Marsch. Fl. taur.* n. 713. — Ad rivulos et fossas Colchidis hæud rarus. ☞

342. COLCHICUM *montanum*. *Sp. pl.* 485. *Sibth. n.* 859.

C. *montanum*, angustifolium. *C. B. Inst.* 350. *Icon. Aubriet.* — In ericetis Insulæ Meli vulgatissimum. Octobri floret. ☞

343. C. *variegatum*. *Sp. pl.* 485. *Sibth. n.* 861.

C. flore fritillariæ instar tessulato. *C. B. Icon. Aubriet.* — In montibu insulæ Scopeli vulgare, ad altitudinem 3-400 hexapodum ; septembri floret. ☞

VII. HEPTANDRIA.

I. MONOGYNIA.

344. ÆSCULUS *hippocastanum*. *Sp. pl.* 488. *Sibth. n.* 863. — Circà Byzantium cultum. ☞

VIII. OCTANDRIA.

I. MONOGYNIA.

545. *VACCINIUM arcto-staphylos*. *Sp. pl.* 500. *Marsch. Fl. taur. n.* 735. — *Vitis idæa* Cappadocica maxima, mespilifolio, flore variegato. *Tourn. Cor.* 42. *Herb. Juss.* — Circà Trapezum, in nemoribus crescit cum *Azaleâ Ponticâ* et *Rhododendro Pontico*. Junio incunte floret. ♪

546. *ACER Creticum*. *Sp. pl.* 1497. *Sibth. n.* 897. *A. Cretica*. *Cor.* 43. *Icon. Aubriet.* — In montibus insulæ Scyri arbor vulgaris. ♪

547. *ERICA multiflora*. *Sp. pl.* 503. *Sibth. n.* 876. — *Erica foliis corios, multiflora*. *Tour. I.* 602. *Herb. Vaillant.*

548. *E. Mediterranea*. *Wild. Sp. pl. 2. p.* 410. ?
E. orientalis, coris folio, floribus globosis. *Tourn. Cor.* 42. *Herb. Vaillant.* — In apricis Sami, ad urbem Vathi communis. Junio florens. ♪

549. *E. arborea*. *Sp. pl.* 502. *Sibth. n.* 875. — In collibus circà Byzantium haud rara. ♪

550. *DAPHNE tarton-raira*. *Sp. pl.* 510. *Sibth. n.* 882.

Var. Angusti-folia. Foliis angustis et sericeis caulibusque elatis ad *D. argenteam*. *Sibth.* accedit. Exactè media inter utramque speciem. — *Thymelæa foliis candicantibus, serici instar molibus, angustioribus*. *Ins. M. Ægei. Herb. Tourn.* — In cacumine Insulæ Scopeli, ad altitudinem 400 hexapodum crescit. ♪

551. *D. Pontica*. *Sp. pl.* 511. *Sibth. n.* 885. *Thymelæa Pontica*, citrei foliis. *Tourn. Cor.* 41. *Herb.*

Tourn. — Circà Byzantium frequens, in nemoribus.
Maio floret. ♪

352. *D. oleoides*. *Mant.* 66. *Sibth. n.* 888. Thymelæa Cretica, oleafolio utrinque glabro. *Tourn. Cor.* 41. *Herb. Tourn.* Parcè crescit ad ruinas veteris Sami. Junio florens. ♪

353. *D. collina*. *Wild. Sp. 2. p.* 425. *Sibth. n.* 892. *D. oleifolia*. *Lamarck. Ency. 5. p.* 440. — Folia subtùs vix pubescentia. — In summo cacumine montis Athonis crescit, ad altitudinem 1100 hexapodum. Augusto florens. ♪

354 POLYGONUM *aviculare*. *Sp. pl.* 519. *Sibth. n.* 908. — In aridis insulæ Tenedi copiosè. ☉

IX. ENNEANDRIA.

I. MONOGYNIA.

355. LAURUS *nobilis*. *Sp. pl.* 529. *Sibth. n.* 912. — In cunctis insulis Archipelagi ubique reperitur. ♪

X. DECANDRIA.

I. MONOGYNIA.

356. ANAGYRIS *fætida*. *Sp. pl.* 534. *Sibth. n.* 915. — Frequens ad torrentes insulæ Astypaleæ. ♪

357. CERCIS *siliquastrum*. *Sp. pl.* 534. *Sibth. n.* 916. — In insulis Coo et Samo haud rarè occurrit. ♪

358. ZYGOPHYLLUM *fabago*. *Sp. pl.* 551. *Marsch. Fl. taur. n.* 767. — Ad littora maris abundat, circà Theodosiam et Sevastopolem. Junio floret. ♪

359. DICTAMNUS *albus*. *Sp. pl.* 548. *Sibth. n.* 917.

Marsch. Fl. Taur. n. 763.—Copiosissimè crescit in collibus graminosis : circà Trapezum. ☿

360. RUTA *graveolens*. *Sp. pl. 548. Sibth. n. 918.*
Marsch. Fl. taur. n. 764.—In Tauriâ circà ruinas veteris Chersonesi copiosa. Floret junio. ☿

361. R. *chalepensis*. *L. Mant. 69. Sibth. n. 920.*
Circà Trapezum haud rara. ☿

Var. a. tenui-folia. Caule minori, foliolis glaucis et tenuioribus notanda. Media videtur inter R. *chalepensem*. *L.* et R. *angustifoliam*. *Persoon.*—Hæc abundat in scopulo St.-Istad propè Cimolum. Floret maio. ☿

362. RHODODENDRUM *Ponticum*. *Sp. pl. 562.*
—In nemoribus circà Trapezum abundat. Maio florens. ♀

363. ARBUTUS *unedo*. *Sp. pl. 566. Sibth. n. 925.*
—In nemoribus insulæ Scopeli. ♀

364. A. *andrachne*. *Sp. pl. 566. Sibth. n. 926.*—In sylvis insularum Coi, Sami, Scopeli, etc. Copiosè crescit. ♀

II. DIGYNIA.

365. SAXIFRAGA *Orientalis*. *Wild. Sp. 2. p. 658.*
S. hederacea? *Marsch. Fl. taur. n. 785. S. cymbalaria?* *Sibth. n. 936.*—Geum cappadocicum rotundifolium supinum, flore aureo. *Herb. Tourn. Icon. Aubriet.*—Circà Trapezum, tegens rupem ferè nudam amplius ducenta pedes longam vigintique pedes latam, ad ripas fluvii Pyxitis. Junio floret. ☿

366. SCLERANTHUS *perennis*. *Sp. pl. 580.*—Circà Byzantium, in monte Bougourlou. Maio. ☿

367. GYPSOPHYLE *perfoliata*. *Sp. pl.* 585. *Marsch. Fl. taur. n.* 792. — *Lychnis orientalis*, saponariæ folio et facie, flore parvo et multiplici. *Herb. Tourn.* — In lazaret Odessæ haud rarè. Julio florèt. π

368. *G. compressa*. *Desf. Fl. atl. 1. p.* 345. Frequens in summis montibus insulæ Scopeli, ad altitudinem 400 hexapodum. π

369. *G. saxifraga*. *Sp. pl.* 584. *Marsch. Fl. taur. n.* 796. — In aridis circà Trapezum abundat. Junio. π

370. DIANTHUS *pomeridianus*. *Smith. Act. Soc. Linn. 2. p.* 300. *Marsch. Fl. taur. n.* 814.

D. floribus solitariis, caule debili procumbente, squamis calycinis ovatis acutis tubo triplò brevioribus, tubo apice striato, petalis brevibus emarginatis.

Caryophyllus sylvestris et saxatilis flore magno lacteo, subtùs ad spadiceum colorem vergente. *Cor.* 25. *Herb. Tourn. Herb. Juss.* — Flores intùs lividi, extùs viridi-rubentes. In insulâ Astypalæâ. Maio copiosissimè florèt. π

371. DIANTHUS *atro-rubens*. *Wild. Sp. 2. p.* 672. *Marsch. Fl. taur. n.* 802. — Frequens in collibus apricis circà Sevastopolem. π

372. *D. prolifer*. *Sibth. n.* 958. *Marsch. Fl. taur. n.* 804. *D. diminutus*. *Sp. pl.* 587. — Vulgaris in insulis Græciæ, necnon in Tauriâ. \odot

375. DIANTHUS *giganteus*. Caule basi ramoso suffruticoso, foliis longis linearibus, floribus in capitulis densis congestis basi suffultis bracteis foliaceis, squamis calycinis quaternis acutis tubo duplò brevioribus.

Pulchra species. Ex radice crassâ tortuosâ plurimi exurgunt caules crassitudine pennæ anserinæ 4-5 pedes alti ;

folia glabra lætè viridia 2 lin. lata, 4-6 uncias longa, basi coalita in vaginam longam, flores intensè purpurei saltem quindecim in capitulo denso congesti, calyces rubentes ferè unciales, petala brevia crenata. — Ad littora Bulgariae, in rupibus maritimis. Floret junio. π

374. *D. moschatus*. *Poiret. Ency. 4 p. 521.*

Cæspitibus densis crescit in rupibus præruptis insulæ Coi, ad altitudinem 3-400 hexapodum. Maio floret. π

375. *D. elegans*. *D. crinitus?* *Sibth. n. 967.*

D. floribus solitariis, caule erecto filiformi paucifloro, foliis angustis internodiis subæqualibus, squamis calycinis brevibus ovatis scariosis mucronatis, petalis dentatis.

Flos amœnè albo et purpureo variegatus. In insulâ Coo ubique frequens. Maio floret. π

376. *D. divaricatus*. *D. tripunctatus?* *Sibth. n. 965.*

D. Syriacus ramosissimus, flore pallidè carneo. *Sheerard in Herb. Vaillant.*

D. floribus solitariis, caule patulo ramoso divaricato, ramis strictis unifloris, foliis brevibus subulatis, squamis calycinis quaternis scariosis subulatis, calycibus apice sensim attenuatis ferè conicis, petalis serratis.

Flores pallidè purpurei intus nigro-punctati. — In collibus aridis insulæ Sami. Junio florens. δ

377. *D. pallens*. *Sibth. n. 965.*

D. floribus solitariis, caule procumbente ramoso, squamis ovatis acuminatis tubo duplè brevioribus, foliis brevibus laxis acutis, floribus laciniatis.

A præcedente differt ramis non strictis, floribus magis approximatis, calycibus apice vix coarctatis, petalisque

majoribus et tenuius laciniatis. — In montibus insulæ Cœi, in collibus circà Thessalonicam. Junio floret. ☞

378. *D. armeria*. *Sp. pl.* 586. *Sibth. n.* 959. *Marsch. Fl. taur. n.* 801. — In collibus circà Sevastopolem; in Bulgariâ ad pagum Ineada copiosè. ☞

379. *D. pubescens*. *Sibth. n.* 962.

D. pubescens, floribus subsolitariis, squamis sulcatis mucronatis tubo duplò brevioribus, calyce sulcato mucronato, foliis brevibus laxis striatis.

Planta tota viscida-pubescens, flores parvi, pallidi. — In collibus apricis insulæ Tenedi, haud rara. Julio floret. ☞

380. *D. campestris*. *Marsch. Fl. taur. n.* 808. In herbidis Odessæ. Julio florens. ☞

381. *D. bicolor*. *Marsch. Fl. taur. n.* 815. *D. cinnamomeus*. *Sibth. n.* 966. (Ex Synonimiâ Tournefortii.) — Circà Odessam, in pascuis. Julio floret. ☞

382. *D. guttatus*. *Marsch. Fl. taur. n.* 811. — In pascuis circà Odessam haud rarè. ☞

383. *SILENE gigantea*. *Sp. pl.* 598. *Sibth. n.* 1011. — In rupibus insulæ Sami. Maio florens. ☞

384. *S. sedoïdes*. *Desf. Atl. 2. p.* 449. *D. C. Fl. fr. sup. n.* 4546 (a). — In insulâ Astypalæâ, copiosè ad latera vulcani Camini propè Theram. Maio florens. ☉

385. *S. Italica*. *Sibth. n.* 1006. *Cucubalus italicus*. *Sp. pl.* 595. *Marsch. Fl. taur. n.* 825. — In summis montibus insulæ Cœi, ad littora Ponti-Euxini in Colchide haud rara. Maio, junio. ♂

386. *S. densi-flora*. Caulibus numerosis viscosis pubescentibus, foliis radicalibus spathulatis, supernis linearibus sessilibus, omnibus pubescentibus mollissimis, flo-

ribus minimis numerosissimis in verticillis compactis, infernis distantibus, summis ferè continuis.

Affinis valdè *S. otiti*. Certè tamen differt staturâ altiori, floribus multò magis numerosis, verticillis densis ferè sessilibus, bracteis margine ciliatis, foliis et caule magis pubescentibus.

Abundat in pascuis Tauriæ, propè Kerch. Maio floret. x

387. *S. Urvillii*. *Monagr. inéd. du genre Silene*. Schott.

S. Caule basi suffruticoso ramosissimo glabro, ramis erectis infernè foliosis supernè nudis, foliis brevibus fasciculatis mucronatis pungentibus, floribus terminalibus et lateralibus plerùmque solitaribus, calycibus lævibus striatis, clavatis, petalis semi-bifidis.

Planta spectanda crescens in dumetis densis rotundatis echinatis, foliis lætè virentibus acutissimis, floribus amœnis patentibus extùs purpureo-viridibus intùs pallentibus.

In summo cacumine insulæ Coi, inter rupes ferè nudas ad altitudinem 400 hexapodum. Maio floret. x

388. *S. conica*. *Sp. pl.* 598. *Sibth. n.* 997. *Marsch. Fl. taur. n.* 838.—In pascuis Tauriæ frequens. ☉

In arenis insulæ Meli varietatem legi notandam, caulibus strictis patulis basi ramosis, foliis crassis brevibus obtusis approximatis, calycibus viscidis, floribus intensè purpureis. x ?

389. *S. bipartita*. *Desf. atl.* 1. p. 352. *S. vespertina*. *Sibth. n.* 980.—In maritimis insulæ Melitæ copiosissimè. Aprili floret. ☉

390. *S. ciliata*. *Wild. Sp.* 2. p. 693.

Lychnis sylvestris Cretica, behen albo similis, parvo flore purpurascente, calyce striato. *Gundelsheimer in Herb. Tourn.*

Præcedenti nimis affinis; differre tamen videtur caulibus suberectis strictioribus villosis, foliis latioribus, petalis pallidioribus atque calycibus apice ciliatis. — In arenis insulæ Meli frequens. Aprili. ☉

391. *S. fabaria*. *Sibth. n. 987. Cucubalus fabarius. Sp. pl. 591.*

Lychnis maritima, behen albo similis, anacampserotis folio. *Gundelsheimer in Herb. Tourn.* — Non rara in lazaret Odessæ. ♀

392. *S. behen. Sp. pl. 599. Sibth. n. 988.* — In arvis insulæ Meli. ☉

393. *S. gallica. Sp. pl. 595. Sibth. n. 978.* — Abundat in agris Meli. Aprili. ☉

394. *S. dichotoma. Lin. Wild. 2. p. 699. Sibth. n. 984. Marsch. Fl. taur. n. 826.* — *Lychnis Armenia*, saponariæ folio subhirsuto. *Gundelsheimer in Herb. Tourn.* — In lazaret Odessæ, in scopulo Sto-Joanne propè Sisopolim in Bulgariâ. ♂

395. *S. cretica. Sp. pl. 601. Sibth. n. 996.*

Lychnis Cretica angustifolia, floribus pediculis longissimis insidentibus, capsulâ pyramidatâ. *Herb. Tourn.* — In arvis insulæ Meli frequens, propè monasterium. Aprili floret. ☉

396. *ARENARIA glomerata. Marsch. Fl. taur. n. 865. Q. fasciculata. Pallas. Ind. taur.* — *Vulgaris* in collibus aridis ad ruinas veteris Chersonnesi. Junio florens. ♂

397. *A. trinervia*. *Sp. pl.* 605. *Sibth. n.* 1022. *Marsch. Fl. taur. n.* 847. — In Colchide frequens ad sepes, propè Soukoum. ☉

398. *A. pubescens*. Undique pubescens, caulibus patulis ramosis elongatis, foliis ovatis acutis subpetiolatis, calycibus acutis corollâ brevioribus.

Affinis *A. ciliatæ*, sed differt pube densâ in omnibus partibus sparsâ calycibus villosis non striatis et foliis angustioribus. — In summis montibus insulæ Coi, ad altitudinem 400 hexapodum. Maio floret. ☿

399. *A. serpylli-folia*. *Sp. pl.* 606. *Sibth. n.* 1026. *Marsch. Fl. taur. n.* 848. — Communis in Tauriæ pascu. ☉

IV. PENTAGYNIA.

400. *COTYLEDON umbilicus*. *Sp. pl.* 615. *b.* *Sibth. n.* 1041. — In rupibus vulcani Camini propè Theram maio. ☿

401. *C. parviflora*. *Sibth. n.* 1043.

C. cretica, tuberosâ radice, flore luteo parvo. *Tourn. Cor. 2. Herb. Tourn.* — In rupibus elatis insulæ Coi. Maio floret. ☿

402. *C. Samium*. *Sedum libanoticum*. *Sp. pl.* 617. Non *Cotyledon libanoticum*. *Labillardière*.

C. caule simplici glabro folioso, foliis radicalibus fasciculatis longis carnosis spathulato-lanceolatis, caulinis sessilibus ferè linearibus, floribus racemosis pedicellatis sæpius binis.

A specie quam descripsit *Cl. Labillardière* nostra satis differt foliis radicalibus longis nec retusis, floribus nullo modo paniculatis sed racemosis, racemo longitu-

dine caulis. — In rupibus elatis et nudis insulæ Sami.
 Junio florens. ✕

403. *SEDUM hybridum*. *Sp. pl.* 617.

Anacampseros minor repens, flore purpureo. *Buxbaum. Cent. 1. p. 33. t. 61. f. 2.*

Circà Trapezum frequens, ad sepes. Junio floret. ✕

404. *S. heptapetalum*. *Poiret. Ency. 4. p. 630.*
D. C. Fl. fr. n. 3620. — In rupibus nudis insulæ Melitæ
 haud rarè aprili floret. ○

405. *S. turgidum*. *D. C. Fl. fr. n. 3614?*

S. foliis semi-cylindricis brevibus remotis, floribus albis cymosis, calyce brevissimo, petalis acutis, caule repente glaberrimo supernè tantum ramoso.

In cacumine montis Athonis. Augusto florens. ✕

406. *S. pallidum*. *Marsch. Fl. taur. n. 873?*

S. caule glabro basi repente ramosissimo, foliis obtusis teretiusculis sessilibus ferè amplexicaulibus, cymâ ramosâ, floribus secundis, petalis aristato-acuminatis, capsulis stellatis.

Flores pallidè lutei. Frequens in lazaret Sevastopolis. Julio floruerat. ✕

407. *S. stellatum*. *Sp. pl.* 617. *Sibth. n. 1046.* — In rupibus insulæ Meli ubique reperitur. Aprili. ○

408. *AGROSTEMMA coronaria*. *Sp. pl.* 625. *Sibth. n. 1063.* — In nemoribus Bulgariæ ad pagum Inca-da. ♂

409. *LYCHNIS dioica*. *Sp. pl.* 626. *Sibth. n. 1068.*
L. alba. *Marsch. Fl. taur. n. 880.* — Flores semper albi.
 — In Tauriæ herbidis copiosè occurrit. Propè urbem Kerch. ✕

410. *CERASTIUM pilosum*. *Sibth. n.* 1073.

C. caule ramoso patentissimo, foliis ovatis obtusis, calycibus acutissimis longissimè pilosis.

In collibus insulæ Meli, aprili floruerat. ☉

411. *C. manticum*. *Sp. pl.* 629. *Stellaria mantica*.

D. C. Fl. fr. n. 4436. — Circà Byzantium in summo monte Bougourlou copiosè maio floret. ☉

XI. DODECANDRIA.

I. MONOGYNIA.

412. *PEGANUM harmala*. *Sp. pl.* 638. *Sibth. n.* 1082. *Marsch. Fl. taur.* 896. — In ruderatis frequens, circà Thessalonicam, Athenas, Theodosiam, Sevastopolem, Odessam, etc. Julio floret. ☿

413. *LYTHRUM salicaria*. *Sp. pl.* 640. *Sibth. n.* 1084. — Ad Lernæ paludem in Argolide. ☿

414. *L. hyssopi-folium*. *Sp. pl.* 642. *Sibth. n.* 1086. — Ad rivos in insulâ Coe haud rarè. ☉

II. TRIGYNIA.

415. *RESEDA alba*. *Sp. pl.* 645. *Sibth. n.* 1093.

R. foliis calcitrapæ, flore albo. *Icon. Aubriet.* — Copiosa in arvis insularum Melitæ et Meli. ☉

416. *R. lutea*. *Sp. pl.* 645. *Sibth. n.* 1094. — In arvis insulæ Meli, in herbis Tauriæ. Maio. ☿

417. *R. luteola*. *Sp. pl.* 643. *Sibth. n.* 1090. — In collibus Bulgariæ haud rara. ☉

418. *EUPHORBIA dendroides*. *Sp. pl.* 662. *Sibth. n.* 1118. — In petrosis maritimis circà Naupliam copiosissima. ♀

419. *E. fruticosa*. *Bivona-Bernardi*. *Sic. pl. c.* 1. p. 35. *E. spinosa*. *Sp. pl.* 655. *Sibth. n.* 1106. *Var. A.* *Desf. Atl.* 1. p. 380.

Tithymalus maritimus spinosus, *Herb. Tourn.*

Suffrutex rotundatus densus undique echinatus. — In collibus apricis Astypalææ, Leri, Sami, etc.

420. *E. canescens*. *Sp. pl.* 652. *Marsch. Fl. taur.* n. 908. *E. chamæsyce var. b.* *Sibth. n.* 1098. — *Tithymalus exiguus villosus*, nummulariæ folio. *Tourn. Inst.* 87. *Herb. Tourn.* — In arenosis Sami, in campis Argolicis. Julio florens. ☉

421. *E. acuminata*. *Lamarck. Ency.* 2. p. 427. *Marsch. Fl. taur.* n. 912. — In arvis Argolicis frequentissima. Julio floret. ☉

422. *E. aspera*. *Marsch. Fl. taur.* n. 927. *Poiret. Ency.* n. 136.

Tithymalus Cappadocicus, latissimo folio, villosus, flore aureo, non lunato. *Herb. Tourn.* — In sylvis circa Trapezum. Floret junio. ☿

423. *E. apios*. *Sp. pl.* 656. *Sibth. n.* 1104. — Ad sepes, circa Trapezum. Junio floret. ☿

424. *E. platyphylla*. *Sp. pl.* 660. *Marsch. Fl. taur.* n. 925. — Circa Byzantium frequens ad sepes. ☉

425. *E. micrantha*. *Linn. Ed. Wild.* 2. p. 905. *Marsch. Fl. taur.* n. 924. — In Colchide copiosè, circa Soukoum crescit. ☉

426. *E. pubescens*. *Desf. Atl.* 1. p. 386. *D. C. Fl. fr.* n. 2173. — In insulâ Lero rariùs inveni. Junio floret. ♂

427. *E. tenui-folia*. *Marsch. Fl. taur.* n. 916. *Non D. C. Fl. fr.* n. 2149.

Tithymalus Galaticus, longissimo et angustissimo folio. *Gundelshaimer in Herb. Tourn.*

In lazaret Theodosiæ. Junio florens. π

428. *E. Gerardiana*, *Wild. Sp. 2. p. 920. Sibth. n. 1119. Marsch. Fl. taur. n. 931.*—In arenis insulæ Lemni, in-lazaret Odessæ vulgaris. π

429. *E. myrsinites. Sp. pl. 661. Sibth. n. 1121. Marsch. Fl. taur. n. 925.*—Haud rara in collibus apertis, circa Sevastopolem. π

430. *E. glareosa. Marsch. Fl. taur. n. 918.*

E. umbellâ quinquesidâ, foliis spathulato-lanceolatis mucronatis coriaceis serrulatis, involucris ovatis, involuclis reniformibus, calycinis segmentis submarginatis, capsulis glabris.

Tithymalus orientalis, amygdali folio. *Herb. Tourn.*

In collibus siccis vulgaris propè Sevastopolem, julio ineunte floruerat. π

431. *E. biglandulosa. Desf. Ann. mus. vol. 12. p. 114. E. rigida. Marsch. Fl. taur. n. 922.*

Tithymalus græcus, amygdali folio acutissimo et glauco, caule purpureo. *Tourn. Cor. 1.*

In summis montibus insulæ Coi valdè frequens, ad altitudinem 3-400 hexapodum, Maio floret.

432. *E. valerianæ-folia. Lamarck. Ency. 2 p. 435. Tourn. Cor. 1. Desf. Cor. p. 90. tab. 69.*

Tithymalus græcus annuus, valerianæ rubræ folio. *Icon. Aubriet.*—In arenis maritimis insulæ Coi, maio floret. π

IV. PENTAGYNIA.

433. *GLINUS lotoïdes. Sp. pl. 663. Sibth. n. 1126.*—In arvis Argolicis augusto florens. \odot

XII. ICOSANDRIA.

I. MONOGYNIA.

434. *PRUNUS mahaleb*. *Sp. pl.* 673. *Sibth. n.* 1139. Vulgatissima in sepibus circa Byzantium, ineunte maio floret. ♀

II. PENTAGYNIA.

435. *CRATÆGUS Orientalis*. *Marsch. Fl. taur. n.* 950. *Maspilus tanacetifolia*? *Sibth. n.* 1150. — In sylvis Colchidis communis. Junio florens. ♀

436. *MESPILUS Germanica*. *Sp. pl.* 684. *Sibth. n.* 1145. *Marsch. Fl. taur. n.* 953. — Valde frequens in nemoribus Colchidis, ad arcem Soukoum-Kale. ♀

437. *MESEMBRIANTHEMUM nodiflorum*. *Sp. pl.* 687. *Sibth. n.* 1162. — In arenosis insularum Meli, Leri haud rarum. ☉

III. POLYGYNIA.

438. *RUBUS fruticosus*. *Sp. pl.* 707. *Marsch. Fl. taur. n.* 986. — In sepibus Colchidis haud rare invenitur. ♀

439. *ROSA canina*. *Sp. pl.* 704. *Marsch. Fl. taur. n.* 982. — In dumetis Colchidis frequens. ♀

440. *POTENTILLA reptans*. *Sp. pl.* 714. *Marsch. Fl. taur. n.* 1005. — Ad sepes in Colchide communis. ♂

441. *P. argentea*. *Sp. pl.* 712. *Marsch. Fl. taur. n.* 1000. — In pascuis Odessæ, ad sepes Colchidis, in collibus propè Trapezum haud infrequens. ♂

442. *P. laciniosa*. *Kitaibel* ?

Calyces nunquam pinnatifidos vidi ; cæterum planta nostra omninò similis speciei quam descripsit *Kitaibel*.

Ad sepes in Colchide copiosè , ad pagum Soukoum. Junio floret. π

445. *P. obscura*. *Lin. Ed. Wild.* 2. p. 1100. *Marsch. Fl. taur.* n. 997.—In pascuis Odessæ ubique reperitur. Junio. π

XIII. POLYANDRIA.

I. MONOGYNIA.

444. *CAPPARIS rupestris*. *Sibth.* n. 1190.—C. non spinosa , fructu majore. C. B. *Icon. Aubriet.*

C. inermis , pedunculis unifloris solitariis folio longioribus , foliis subrotundatis carnosis deciduis , capsulis ovalibus.

Frequens in rupibus insulæ Scyri , ad *Carcera Alcibiadis* circà Athenas copiosissimè. Julio floret. \mathfrak{J}

445. *CHELIDONIUM glaucium*. *Sp. pl.* 724. *Marsch. Fl. taur.* n. 1026. *Glaucium luteum*. *Sibth.* n. 1193.—In Colchidis arenosis , circà Soukoum. π

446. *C. corniculatum*. *Sp. pl.* 724. *Marsch. Fl. taur.* n. 1027. *Glaucium Phæniceum*. *Sibth.* n. 1195.—In herbidis Tauriæ , propè Kerch. \odot

447. *PAPAVER hybridum*. *Sp. pl.* 725. *Sibth.* n. 1197. *Marsch. Fl. taur.* n. 1029.—Circà Theodosiam haud rarè reperitur. \odot

448. *GISTUS Creticus*. *Sp. pl.* 738. *Sibth.* n. 1211. C. iadanifera Cretica , flore purpureo. *Tourn. Cor.* 19,

Herb. Tourn.—Copiosè crescit in insulâ Melo; aprili florens. 5

449. *HELIANTHEMUM guttatum*. *Sp. pl.* 741. *C. guttatus*. *Sibth. n.* 1219. —Valdè commune in insulâ Melo. ○

450. *H. arabicum*. *Cistus arabicus*. *Wild. Sp.* 2. p. 1210. *Desf. atl.* 1. p. 419.

H. creticum, linariæ folio, flore croceo. *Herb. Tourn.* — In apricis insulæ Meli, valdè frequens. Maio floret. 5

II. PENTAGYNIA.

451. *DELPHINIUM consolida*. *Sp. pl.* 748. *Sibth. n.* 1255. *Marsch. Fl. taur. n.* 1046. — In herbis copiosum circâ Theodosiam et Odessam. Maio floret. ○

452. *D. staphysagria*. *Sp. pl.* 750. *Sibth. n.* 1257. — Ad muros in insulâ Lero vulgare. Junio floret. 3

453. *D. cardiopetalum*. *D. C. Syst. univ.* 1. p. 547? *D. peregrinum*. *Lam. Ency.* 2. p. 264.

C. lati-folium, parvo flore. *Tourn. Inst.* 426. *Herb. Vaillant.*

Planta nostra pubescens in omnibus partibus, capsulas usque, floresque pallidè cœrulei. Quasi media inter *D. cardiopetalum* et *D. junceum*. *D. C.*

Frequens in campis arenosis insulæ Scyri. Junio florens. ○

454. *D. junceum* *D. C. Syst. univ.* 1. p. 548. *D. peregrinum*. *Sp. pl.* 749. *Sibth. n.* 1255.

D. græcum, foliis inferioribus fumariam, superioribus linariam referentibus. *Tourn. Cor.* 30. *Herb. Jussieu. Herb. Vaillant.*

In arvis insulæ Sami, in peninsulâ montis Athonis copiosè. Julio floret. ☉

455. *NIGELLA arvensis*. *Sp. pl.* 753. *Sibth. n.* 1243. *Marsch. Fl. taur. n.* 1057. — In pascuis Odessæ minimè rara. ☉

456. *N. aristata*. *Sibth. n.* 1241.

N. floribus foliis supernis sæpius cinctis, nectariis antherisque aristatis, capsulis turbinatis muricatis subseptenis, petalis stipitatis cordiformibus apice acuminatis.

Flos non verè involucratuſ sed foliis extremis plerumque cinctus; folia glauca stricta, rami rigidi divaricati, nectaria hispida. — In insulis Astypalæâ et Tenedo frequens. Junio floret. ☉

457. *HYPERICUM tomentosum*. *Sp. pl.* 1106. *D. C. Fl. fr. n.* 4580. — In udis insulæ Melitæ reperitur. Aprili floret. ☿

458. *H. origani-folium*. *Wild. Sp. 3. p.* 1467. *Sibth. n.* 1862.

H. armenum saxatile, majoranæ folio. *Tourn. Cor.* 18. *Gundelsheimer in Herb. Tourn.*

In calycibus puncta glandulosa non vidi, sed numerosa sunt in petalorum margine. — Copiosè circa Byzantium, in monte Bougourlou. Floret maio. ☿

459. *H. lanuginosum*. *Lamarck. Ency. 4. p.* 171. *Sibth. n.* 1861.

Puncta glandulosa non tantum in margine foliorum sed etiam in disco supernorum sæpè videas.

In insulâ Samo, propè urbem Vathi, junio florens legi. ☿

460. *H. crispum*. *Lin. Mant.* 106. *Sibth. n.* 1856.

H. crispum fruticosum maximè ramosum, foliis caulem ambientibus. *Herb. Tourn.*

In cunctis insulis Archipelagi, necnon in Græciâ frequens in dumetis 2-3 pedes latis et longis. Maio floret. z

461. *H. empetri-folium*. *Wild. Sp. 3. p. 1452. Sibth. n. 1852.*

H. Syriacum et Alexandrinum. *Herb. Tourn. Icon. Aubriet.*

H. caule fruticoso erecto ramoso, floribus trigynis corymbosis terminalibus, foliis vertici latis ternis, linearibus, margine revolutis, calycibus brevissimis obtusis punctato-glandulosis.

Frutex elegans sæpius 2-3 pedalis quandòque 6-7 pedalis, ramis erectis foliosis, foliis perforatis subimbricatis, calycibus corollâ saltèm triplò brevioribus et margine evidenter glandulosis.

In collibus insulæ Coi nemora efficit. Maio floret. v

462. *H. inodorum*. *Wild. Sp. 3. p. 1449.*

H. cappadocicum, frutescens, sætido simile sed inoderum. *Herb. Tourn.* — In Colchide ubique reperitur. Ad sepes, junio floret. v

463. *H. ciliatum*. *Lamarck. Ency. 4. p. 170. Wild. Sp. 3. p. 1463. Desf. Cor. p. 70. t. 53.* — Propè Byzantium, in monte Bougourlou. Floret maio. z

464. *H. perforatum*. *Lin. Ed. Wild. 3. p. 1470. Marsch. Fl. taur. n. 1561.* — In collibus herbidis, circà Odessam, Julio florens. v

465. *H. perforatum*. *Sp. pl. 1105. Sibth. n. 1855. Marsch. Fl. taur. n. 1557.* In Colchide ad pagum

Soukoum , circa Trapezum , Sevastopolem , Odessam
 planta vulgaris. ☞

III. POLYGYNIA

466. *THALICTRUM minus*. *Sp. pl.* 969. *Sibth.*
n. 1257. *Marsch. Fl. taur. n.* 1072.—Circà Odessam ;
 julio floret. ☞

467. *ADONIS dentata*. *D. C. Syst. univ.* 1. p. 224.
Ranunculus arvensis, foliis chamæmeli, flore citrino.
Herb. Tourn.

A. caule striato duro ramoso, petalis planis oblongis
 calyce paulò longioribus, fructibus basi tuberculatis in
 spicam elongatam dispositis.

Calyces violacei basi pubescentes; flores parvi flavi,
 unguibus nigricantibus.—In arvis maritimis insulæ Meli.
 Aprili floret. ☉

468. *A. micrantha*. *D. C. Syst. univ.* 1. p. 222 ?
Marsch. Fl. taur. n. 1073. * *Var.*

A. caule filiformi subsimplici, floribus minimis longè
 pedunculatis, petalis angustissimis fere linearibus calyce
 duplò longioribus, carpellis subreticulatis in caput ova-
 tum aggregatis.

Caulis spithamæus : corolla vix magnitudine *Ranun-*
culi arvensis : petala subseptena flammea.—In lazaret
 Odessæ copiosè floret maio. ☉

469. *RANUNCULUS Illyricus*. *Sp. pl.* 776. *Sibth.*
n. 1270. *Marsch. Fl. taur. n.* 1081. *R. sericeus*. *Wild.*
En. 589.

R. lanuginosus, angustifolius, grumosâ radice, ma-
 jor. C. B. *Herb. Tourn.*

Frequenter in Tauriæ pascuis, ad oppidum Kerch.
Maio floret. ℥

470. *R. oxyspermus*. *Wild. Sp. 2. p. 1528. Marsch. Fl. taur. n. 1088. D. C. Syst. univ. 1. p. 258.* — In pascuis Tauriæ, circà Theodosiam et Kerch nequaquam rarus. Floret maio. ℥

471. *R. muricatus*. *Sp. pl. 780. Sibth. n. 1280.* — In paludosis insulæ Meli. ○

472. *R. flabellatus*. *Desf. atl. 1. p. 438. Sibth. n. 1277. R. chærophyllus. Var. g. D. C. Syst. un. 1. p. 255.* — Copiosè crescit in montosis insulæ Meli, necnon in monte Bougourlou circà Byzantium. Floret aprili, maio. ℥

473. *R. chærophyllus*. *Sp. pl. 780. D. C. Syst. univ. 1. p. 254. R. millefoliatus? Sibth. n. 1278.* — Abundat in monte Bougourlou circà Byzantium, maio florens. ℥

474. *R. tripartitus*. *D. C. Syst. univ. 1. p. 254?*

R. caule natante, foliis submersis capillaceo multifidis, emersis tripartitis, lobis cuneatis obtusis apice crenatis, carpellis glabris tenuissimè transversim striatis.

Ad torrentes in insulâ Melo. ℥

475. *R. sceleratus* *Sp. pl. 776. Sibth. n. 1269. Marsch. Fl. taur. n. 1079.* — In Colchidis paludosis frequens. ○

476. *R. Constantinopolitanus. R. lanuginosus. Var. y. D. C. Syst. univ. 1. p. 281.*

R. Constantinopolitanus, latifolius, villosissimus. *Icon. Aubriet.*

R. caule elato lanuginoso multifloro, foliis radicalibus

amplissimis longissimè petiolatis trifidis, lobis latis sub-incisis, supernis laciniatis laciniis linearibus, cunctis sericeo-lanuginosis, calyce reflexo, carpellis planis suborbiculatis stylo uncinatis.

Planta speciosa affinis *R. lanuginoso*. A me tamen satis differt caulibus 3-4 pedalibus, foliorum radicalium disco 3 uncias longo latoque 5 uncias, atque calycibus reflexis.

Circà Byzantium ad sepes vulgatissima. Maio floret π

477. *R. bulbosus*. *D. C. Syst. univ.* 1. p. 295?

R. caule procumbente ramoso subvillosa, foliis radicalibus petiolatis trisectis, segmentis trifidis inciso-dentatis, medio petiolulato, sinibus obtusis, calyce reflexo.

A specie vulgari discedit caulibus procumbentibus multifloris folisque subhirsutis, radicum fibris longissimis, necnon segmentorum sinibus valdè obtusis, undè segmenta ipsa basi miro modo attenuata videntur. Forsitàn species distincta?

In pratoris Colchidis haud rarus, circà Soukoum. Junio floret. π

478. *R. repens*. *Sp. pl.* 779. *Sibth. n.* 1275. *Marsch. Fl. taur. n.* 1083.—In nemoribus Colchidis, in collibus circà Trapezum minimè rarus. Junio. π

479. *R. marginatus*. Radice fibrosâ, caule basi ramoso patulo subhirsuto; foliis inferioribus petiolatis trisectis, segmentis crenatis obtusis, caulinarum laciniis linearibus, cunctis margine callosâ cinctis, floribus parvis, carpellis rotundatis planis marginatis stylo subuncinatis, calyce reflexo.

Species vix spithamæa valdè distincta margine semi-

num et foliorum atque parvitate florum. Petala flava.—
In collibus circà Trapezum. Junio floret. π

XIV. DIDYNAMIA.

I. GYMNOSPERMIA.

480. *AJUGA Orientalis*. *Sp. pl.* 785. *Sibth.*
n. 1289. *Marsch. Fl. taur. n.* 1038.—In collibus Sa-
mi, in pascuis Tauriæ propè Kerch. Maio. π

481. *A. chia*. *Wild. Sp. 3. p.* 11. *Sibth. n.* 1293.
Chamæpitys chia folio hispido, magno flore. *Herb.*
Tourn.

Cùm plantâ *Tourn.* nostra convenit pilis densis et
magnitudine floris, tantulùm differt foliorum laciniis mi-
nùs latis minùsque crassis.—Frequens in collibus apricis
Tauriæ, propè Theodosiam, Kerch et Sevastopolem. Junio
floret. \odot

482. *A. pseudo-iva*. *D. C. Fl. fr. Supp. n.* 2496(a).
Chamæpitys montana, foliis serratis, Lusitanicâ, flore
luteo. *Herb. Tourn.* — In aridis insulæ Levi. Maio flo-
rens. π ?

483. *TEUCRIUM fruticans*. *Sp. pl.* 787. *Sibth.*
n. 1297.

Abundat in Melitâ, sed nec in Archipelago nec in
Græciâ unquàm reperi. Aprili floret. ν

484. *T. brevi-folium*. *Wild. Sp. 3. p.* 17. *Sibth.*
n. 1291.

T. frutescens, stæchadis arabicæ folio et facie. *Herb.*
Tourn. — In saxosis insularum Meli et Astypalææ, maio
florens.

485. *T. flavum*. *Var. b. Wild. Sp. 3. p.* 31. *Schre.*

ber. Unil. p. 34. n. 23. T. chamædrys major. Desf. Cat. H. P. p. 69.

Teucrium Creticum, odoratum, flore purpureo. H. R. Par. *Herb. Tourn. Herb. Vaillant.*

Chamædrys fruticosa Cretica, purpureo flore. *Tourn. Inst. 205. Herb. Tourn.*

T. caule fruticoso erecto, foliis arctè ovatis leviter pubescentibus anticè dentatis, floralibus integerrimis sessilibus, verticillis ramosis.

Gaules numerosi pedales sesquipedalesve; flores amœnè purpurei. Nonne species distincta? Copiosissimè crescit in scopulo St.-Istad propè Cimolum. Maio florens. 5

486. *T. chamædrys. Sp. pl. 790. Sibth. n. 1305. Marsch. Fl. taur. n. 1109.*—Circà Sevastopolem haud rarum, necnon propè Trapezum. π

487. *T. polium. Sp. pl. 792. Sibth. n. 1309. Marsch. Fl. taur. n. 1111.*—In apricis propè Sevastopolem minimè rarum. Junio π

488. *T. capitatum. Sp. pl. 792. Sibth. n. 1310.*—In collibus insulæ Leri. Maio florens. π

489. *T. lamii-folium.* Caule herbaceo basi ramoso villosa, foliis petiolatis subcordatis obtusis crenatis, spicâ terminali nudâ densâ; bracteis subulatis, calycis lobo superiori squamiformi.

Caulis pedalis seu sesquipedalis undique hirsutus, folia longè petiolata obtusè dentata, spica cylindrica 2-3 uncialis densissima, flores pallidi parvi, calyces deflexi lobo superiori lato squamiformi, undè primo intuitu planta *Scutellariam* refert.

Cassida orientalis, Lamii villosa folio, flore purpurascete. *Sherard in Herb. Vaillant.*

Habitat in nemoribus Bulgariae, ad pagum Incada.
Junio floret. ♂

490. *SATUREIA nervosa*. Desf. Atl. 2. p. 9. Sibth. n. 1315.

Clinopodium Creticum, foliis lanceolatis, perenne, fortè hyssopus Græcorum. P. Alp. Herb. Tourn.—In petrosis insulæ Meli ubique occurrit. Aprili florens. ♀

491. *S. thymbra*. Sp. pl. 794. Sibth. n. 1316. *Thymbra legitima*. Tourn. Inst. 797. *Gundelshcimer in Herb. Tourn.*—In insulis Archipelagi copiosissimè. Maio, junio floret. ♀

492. *S. Græca*. Sp. pl. 794. Sibth. n. 1317. — In rupibus elatis insularum Coi et Sami raritas. Florens junio. ♂

493. *S. juliana*. Sp. pl. 793. Sibth. n. 1314.

Thymbra Sancti-Juliani, sive *satureia vera*. Lobel. Herb. Tourn.—In saxosis insularum Coi et Leri; sed infrequens. Junio. ♂

494. *S. capitata*. Sp. pl. 795. n. 1319.

Frutex elegans humilis, gratè odorus, in dumetis densissimis rotundatis et undiquè floribus coronatis. — In cunctis Archipelagi insulis copiosissimè. Æstate floret. ♀

495. *THYMBRA spicata*. Sp. pl. 795. Sibth. n. 1321. — In ericetis. Sami propè urbem Metelinous semel reperi. Junio floret. ♀

496. *NEPETA cataria*. Sp. pl. 796. Sibth. n. 1322. Marsch. Fl. taur. n. 1115. — In apricis, ad ruinas veteris Chersonnesi. ♂

497. *N. melissæ-folia*. Desf. Cor. p. 19. t. 12.

Nepeta Cretica, melissæ-folio, asphodeli radice. *Herb. Tourn. Icon. Aubriet.* — In collibus aridis insulæ Meli, circa monasterium et propè tumulos. Aprili floret. ☿

498. *N. Ukranica*. *Sp. pl.* 797. *Marsch. Fl. taur.* n. 1121. — In lazaret Odessæ, julio florens. ☿

499. *SIDERITIS Taurica*. *Marsch. Fl. taur.* n. 1124. *S. Syriaca*. *Pallas. Ind. Taur.* — In apricis Tauriæ, circa Sevastopolem minimè rara. Julio floret. ☿

500. *S. montana*. *Sp. pl.* 802. *Sibth. n.* 1331. *Marsch. Fl. taur.* n. 1123. — In aridis Tauriæ frequens, circa Sevastopolem. Floret julio. ○

501. *S. remota*. Herbacea ebracteata; calycibus corollâ majoribus spinosis, tomento denso et incano tectis; ramis patulis rigidis divaricatis, verticillis remotissimis.

Præcedenti affinis; sed dignoscitur verticillis internodiis saltèm triplò brevioribus, calycibusque cano-tomentosis. Culta characteres servat. — In collibus insulæ Sami. Junio floret. ○

502. *S. elegans*. *Murr. amæn. Goett. p.* 92. *Wild. Sp. 3. p.* 64. *S. nigricans*. *Persoon. Syn. 2. p.* 117. — In arvis insulæ Leri; maio florens. ○

503. *S. Romana*. *Sp. pl.* 802. *Sibth. n.* 1332. — Ad margines viarum in insulâ Melitâ, in arvis Leri. Maio. ○

504. *MENTHA pulegium*. *Sp. pl.* 805. *Sibth. n.* 1343. *Marsch. Fl. taur.* n. 1129. — In inundatis Bulgariæ, ad pagum Sisipoli. ☿

505. *M. sylvestris*. *Sp. pl.* 804. *Sibth. n.* 1337. — In Bulgariâ frequens ad radices montis Hæmi. ☿

506. *M. viridis*. *Sp. pl.* 804. *D. C. Fl. fr. n.* 2536.
— Cum præcedente reperitur. π

507. *M. tomentosa*. Caule ascendente tomentoso
supernè ramosissimo, foliis tomentosis sessilibus crispis
lanceolato-linearibus grossè dentatis, suprâ obscuris sub-
tus incanis, calycibus minimis villosis, staminibus co-
rollâ longioribus, spicis numerosissimis longis basi inter-
ruptis.

Affinis *M. niliaca*. *Vahl.*, sed differt foliis crispis et
longioribus. Caulis etiam magis ramosus. — Ad fontes
insulæ Scyri; julio floret. π

508. *LAMIUM calycinum*. Caule suberecto ramoso
glaberrimo fistuloso, foliis cordatis rugosis lanatis pubes-
centibus, summis etiam subpetiolatis, calycibus lævibus
reticulatis flori subæqualibus, dentibus calycinis longis-
simis arcuatis subulatis vix ciliatis, floribus confertis ses-
silibus, verticillis numerosis internè remotis.

Flores albidæ, corolla extus villosa.

In ruderatis insulæ Sami propè columnam veteris He-
ræi. Junio florens. π

509. *STACHYS sylvatica*. *Sp. pl.* 811. *Sibth.*
n. 1354. *Marsch. Fl. taur. n.* 1138. — In nemoribus
Colchidis, ad pagum Soukoum. π

510. *S. Germanica*. *Sp. pl.* 812. *Sibth. n.* 1357.
Marsch. Fl. taur. n. 1140. — In sylvis Bulgaricæ, ad
pagum Ineada. π

511. *S. Orientalis*. *Sp. pl.* 813? *Sibth. n.* 1362? —
In collibus insulæ Coi, necnon circâ Trapezum frequens.
Junio floret. π

512. *S. lanata*. *Wild. Sp. 3. p.* 100. *Sibth.*

n. 1358. *Marsch. Fl. taur. n.* 1141. — In apricis Tauriæ, circà Sevastopolem copiosè. Junio, julio. π

513. *S. maritima. Lin. Mant. 82. Sibth. n.* 1364. — Ad littora maris, in Colchidè propè arcem Soukoum-Kale. Junio floret. π

514. *S. annua. Sp. pl. 813. Sibth. n.* 1366. *Marsch. Fl. taur. n.* 1144. — Circà Trapezum, ad fluvium Pyxitim. Junio florens. \odot

515. *S. recta. Lin. Mant. 82. Sibth. n.* 1365. *Marsch. Fl. taur. n.* 1142.

In plantâ nostrâ, folia omnia angusta ferè linearia, bracteæ subulatae, dentesque calycis spinosæ. — Haud infrequens in herbis Odessæ. Julio floret. π

516. *S. betonica-folia. Desf. Cor. p. 22. t. 14. S. spinulosa? Sibth. n.* 1368.

Galeopsis Cretica, betonicaefolio, flore flavescente. *Herb. Vaillant.*

S. caule erecto stricto quadrangulo, angulis spinuloso-asperrimis, foliis petiolatis cordatis venosis crenatis, verticillis subspicatis plerumque sexfloris, calycibus pilosis spinulosis, floribus magnis calyce duplò longioribus.

Corolla pallidè flavescens sublanata. Circà Byzantium frequens ad sepes, in littore Asiatico. Maio floret. δ

517. *S. arenaria. Vahl. Symb. 2. p. 64.* — Circà Trapezum, in incultis communis. Junio floret. π

518. *S. congesta.* Caule basi ramoso prostrato tomentoso, foliis oblongo-ovatis crenulatis incanis, floribus congestis in spicâ densâ breviori, corollâ extûs pilosâ.

S. crenariæ nimum affinis; discedit tamen pube densâ tomentosâ, foliis brevioribus ovatis, caule crassiori quamvis

breviori, spicâ florum congestâ densâ abbreviatâ nunquam basi interruptâ.

Betonica Orientalis, sideritidis facie, flore purpureo. *Tourn. Cor. 13. Herb. Vaillant.*—Circâ Trapezum ad ripas fluvii Pyxitis. Junio floret. π

519. MARRUBIUM *peregrinum*. *Sp. pl.* 815. *Sibth. n.* 1370. *Marsch. Fl. taur. n.* 1150.—In apricis circâ Sevastopolem copiosum. Julio floret. π

520. *M. creticum*. *Wild. Sp. 3. p.* 110. *Sibth. n.* 1371. *M. peregrinum. b. Sp. pl.* 816.

Fortasse præcedentis mera varietas. Differt tantum scilicet angustioribus utrinque canis, dentibus calycinis paulò longioribus, spicis florum minimis interruptis. Ad sepes in insulâ Lesbo frequens. Junio floret. π

521. *M. acetabulosum*. *Sp. pl.* 817. *Sibth. n.* 1375. Pseudodictamnus acetabulis moluccæ, *Tourn. Inst.* 188. *Herb. Tourn.*—In insulis Melo, Therâ, Astypalæâ, Samo etc. minimè rarum. Maio, junio florens. β

522. *M. vulgare*. *Sp. pl.* 816. *Sibth. n.* 1373.—In insulâ Coo, ad sepes. π

523. BALLOTA *nigra*. *Sp. pl.* 814. *Marsch. Fl. taur. n.* 1147.

Planta nostra differt à specie Gallicâ foliis amplissimis calycibus glabris acuminato-spinulosis, floribusque duplò majoribus.—Circâ Theodosiam, in ruderatis copiosa. Junio floret. π

524. LEONURUS *villosus*. *Desf. Cat. H. P. p.* 73.

L. caule erecto villosa, foliis utrinque pubescentibus cunei-formi-ovatis trilobis, lobis longis acutis dentato-lacinatis, calycibus confertis floribusque cano-tomentosis.

Cum *L. cardiaca* confundi non potest. Caulis elatus saltem 5-6 pedalis, planta undique pubescens, flores duplò majores et multò magis numerosi.

Cum præcedente in ruderatis Theodosiæ copiosissimè. Floret junio. π

525. *PHLOMIS pungens*. *Wild. Sp. 3. p. 121. Marsch. Fl. taur. n. 1155.*

Phlomis orientalis, hormini-folio, flore minore, calyce glabro. *Tourn. Cor. Herb. Juss.*

Omnino similis *P. herba-venti*. Differt tantum foliis angustioribus, caule calycibus foliisque minus tomentosis. — Circà Theodosiam. Junio π

526. *P. fruticosa*. *Sp. pl. 818. Sibth. n. 1577.* — In collibus insularum Meli et Scyri vulgaris. Maio florens. b

527. *P. Samia*. *Sp. pl. 819. Sibth. n. 1578.* — Communis in collibus circà Trapezum. Junio floret. π

528. *CLINOPODIUM vulgare*. *Sp. pl. 821. Sibth. n. 1384.* — In collibus propè Trapezum, circà Byzantium ad sepes. π

529. *ORIGANUM Smyrnæum*. *Sp. pl. 825. O. onites. Sibth. n. 1389.*

Majorana Cretica, organi-folio, villosa, satuireæ odore, corymbis majoribus albis. *Tourn. Cor. 13. Herb. Tourn.*

In collibus petrosis Astypalææ, Leri, Sami, etc. Junio, julio florens. π

530. *O. Creticum*. *Sp. pl. 825. Sibth. n. 1388.*

O. Creticum, C. B. *Herb. Tourn.* — In montibus insulæ Scyri rariùs. Julio floret. f

531. *O. vulgare*. *Sp. pl.* 824. *Sibth. n.* 1391. — In nemoribus Bulgariae, ad radices montis Haemi. π

532. *O. parvi-florum*. Caule hirsuto erecto superne ramoso, foliis oblongis subpetiolatis utrinque villosis, floribus minimis, calyce colorato tubo corollae subaequali, spicis brevibus paniculatis.

Simillimum praecedenti; distinguitur hirsutiae partium omnium, foliis longioribus internodiis, floribus duplo minoribus, praesertim brevitate tubi corollae. — Circa Odesam minime rarum. Julio florens. π

533. *THYMUS microphyllus*. Caule basi ramoso prostrato, ramis filiformibus pubescentibus, foliis minimis ovatis nervosis, pedicellis subtrifloris axillaribus, verticillis remotis, floribus calyce duplo longioribus.

Calamintha minima, annua, thymi-folia. *Herb. Tourn.* *Herb. Vaill.* — In collibus aridis insulae Melitae copiosissime, aprili floret. π

534. *T. angustifolius*. *Marsch. Fl. taur. n.* 1162. *Persoon. Syn. 2. p.* 130. *T. Zygis. Poiret. Ency. t. 7. p.* 644. non *Linnaei*. — Circa Byzantium, in monte Bougourlou. π

535. *T. Zygis*. *Sp. pl.* 826? *Sibth. n.* 1398? Folia calycesque punctis aureis adspersa. — In collibus siccis, circa Thessalonicam frequens. π

536. *T. graveolens*. *Marsch. Fl. taur. n.* 1165. *T. patavinus. Pallas. Ind. taur.* *T. rotundifolius. Persoon. Syn. 2. p.* 131.

Clinopodium Armenum, origani folio, flore minimo. *Gundelsheimer in Herb. Tourn.* — In Tauriae herbidis, circa Kerch. \odot

537. *T. suaveolens*. *Sibth. n.* 1400?

T. caule basi suffruticoso procumbente ramoso, floribus verticillatis majoribus; foliis lanceolato-ellipticis, mucronatis subserratis hirtis, verticillis laxis paucifloris axillaribus foliis subæqualibus.

Planta etiamsi siccata ex omnibus partibus gratum odorem pulegii emittit. — Propè Thessalonicam in collibus apricis. π

538. T. *acinos*. *Sp. pl.* 826. *Sibth. n.* 1599. *Marsch. Fl. taur. n.* 1164. — In collibus Tauriæ, circà Sevastopolem. \odot

539. MELISSA *altissima*. *Sibth. n.* 1411.

M. verticillis dimidiatis pedunculatis, bracteis petiolatis, foliis cordatis acutè crenatis. — In insulâ Samo, circà Byzantium ad sepes communis. π

540. MELITTIS *melissophyllum*. *Sp. pl.* 852. *Sibth. n.* 1415. — In umbrosis montis Athonis copiosissimè. π

541. SCUTELLARIA *Orientalis*. *Sp. pl.* 854. *Sibth. n.* 1414. *Marsch. Fl. taur. n.* 1174.

Cassida Iberica, chamædryos folio, flore luteo. *Herb. Tourn.* — In apricis Tauriæ circà Sevastopolem nequaquam rara. Junio floret. π

542. S. *albida*. *Lin. Mant.* 248. *Sibth. n.* 1415. — Circà Byzantium ad pagum Therapia. π

543. PRUNELLA *vulgaris*. *Sp. pl.* 857. *Sibth. n.* 1419. — In graminosis circà Trapezum copiosè. π

544. PRASIUM *majus*. *Sp. pl.* 858. *Sibth. n.* 1422. — In saxosis insularum Melitæ Melique valdè frequens. Aprili floret. \mathfrak{b}

II. ANGIOSPERMIA.

545. *VITEX agnus - castus*. *Sp. pl.* 890. *Sibth.* n. 1470.

Flores modò purpurei, modò violacei quandòque prorsus albi.

In humidis insularum Archipelagi; copiosissimè crescit ad ripas Imbrasi propè insigne Hercæum Sami. Junio, julio floret. ♀

546. *EUPHRASIA lati-folia*. *Sp. pl.* 841. *Bartsia lati-folia*. *Sibth.* n. 1425. — In collibus insule Meli, circà Byzantium in monte Bougourlou, etiam ad pagum Therapia. Maio floret. ☉

547. *BARTSIA viscosa*. *Sp. pl.* 859. *Sibth.* n. 1424. — Abundat in collibus, circà Trapezum. ☉

548. *B. versicolor*. *D. C. Fl. fr.* 2429. *Rhinanthus versicolor*. *Desf. atl.* 2. p. 33. *B. trixago*. *Sibth.* n. 1425.

Pedicularis Cretica, maritima, amplioribus foliis et floribus. *Tourn. Cor.* 9. *Herb. Juss. et Icon. Aubriet.*

Abundat in maritimis Melitæ et Meli. Aprili florens. ☉

549. *ANTIRRHINUM angusti-folium*. *A. tortuosum?* *Lam. Ency.* 4. p. 365.

Antirrhinum hispanicum, altissimum, angustissimo folio. *Tourn. Inst.* 168. *Herb. Vaillant.*

Antirrhinum majus, angusti-folium, amplo flore, purpureum Romanum. *Bocconi. Herb. Vaillant.*

Antirrhinum satureiæ-folio. *Herb. Vaillant.*

A. Caule ramoso divaricato, foliis angustissimis linearibus, floribus ecaudatis magnis racemosis, calycis segmentis

glanduloso - pilosis brevibus lanceolatis acutiusculis.

Corolla purpureo-lutea magnitudine *L. majoris*. —
Suprà mænia urbis Melitæ vulgatum. Aprili florens. π

550. *LINARIA triphylla*. *Desf. atl. 2. p. 40. D. C. Fl. fr. n. 2639. Antirrhinum triphyllum. Sp. pl. 852.*

Abundat in segetibus insulæ Meli, aprili florens. \odot

551. *S. cymbalaria. Sp. pl. 851. Sibth. n. 1431.*

Var. crassi-folia accedit ad *L. hepatici-foliam. Poir. Ency. foliis glaucis crassis ferè integris, differt floribus parvis et pedunculis brevioribus.*

In rupibus maritimis Astypalææ, ad muros insulæ Leri. Maio floret. π

552. *L. pelisseriana. Sp. pl. 855. Sibth. n. 1441.*
— In collibus Meli sat frequens. \odot

553. *L. elatines. Antirrhinum elatines. Sp. pl. 851. Sibth. n. 1453.*

Linaria segetum nummulariæ folio aurito et villosa, flore luteo. Tourn. 165. Herb. Tourn. — In campis incultis insulæ Leri. Maio floret. \odot

554. *L. vulgaris. D. C. Fl. fr. n. 2654. Antirrhinum linaria. Sp. pl. 858. Sibth. n. 1447. Marsch. Fl. taur. n. 1201. — Circà Odessam minimè rara.*

555. *L. lini-folia. Antirrhinum lini-folium. Sp. pl. 858. Antirrhinum genisti-folium. var. b. Marsch. Fl. taur. n. 1200.*

L. Constantinopolitana, folio lini sativi, flore luteo. Gundelsheimer in Herb. Tourn. Buxbaum. Cent. 1. p. 16. t. 25. — In Bulgariâ ad pagos Sisopoli et Ineâda. Julio floret. π

556. *L. genisti-folia. Antirrhinum genisti-folium.*

Sp. pl. 858. *Sibth. n.* 1446. *Marsch. Fl. taur. n.* 1200.
—Abundat in lazaret Odessæ. Julio florens. π

557. *SCROPHULARIA lucida. Sp. pl.* 865. *Sibth. n.* 1455.

S. folio glauco, in amplas lacinias diviso. Tourn. Cor. 9. Herb. Tourn. Icon. Aubriet. — In insulâ Melo propè tumulos, ad vulcanum novæ Camini propè Theram. Aprili floret. π

558. *S. ramosissima. D. C. Fl. Sup. n.* 2628 (a). *Loisel. Fl. Gall. 2. p.* 381. — In collibus maritimis insulæ Scyri. Julio floruerat. π

559. *S. micrantha.* Caule basi ramoso glabro ascendente, ramis debilibus, foliis petiolatis oblongis obtusis basi auriculatis grossè dentatis, floribus minimis racemosis, racemo terminali composito, calycibus obtusis fructu triplò brevioribus.

Caulis pedalis sesquipedalisve, pedunculi multiflori, flores minimi saturè purpurei. — In rupibus maritimis insulæ Ferasiæ propè Theram; maio florens. π

560. *S. heterophylla. Wild. Sp. 3. p.* 274.

S. Cretica, frutescens; folio vario et carnoso. Herb. Tourn. Icon. Aubriet. — In rupibus insularum Meli et Ferasiæ propè Theram. Maio. π

561. *S. aquatica. Sp. pl.* 864. *Sibth. n.* 1451. — In humidis propè Byzantium. π

562. *S. melissæ-folia.* Caule erecto quadrangulari glaberrimo, foliis caulinis petiolatis ovato-lanceolatis argutè serratis, bracteis lanceolatis subserratis, pedunculis pubescentibus multifloris, paniculâ elongatâ.

S. Galatica minor, melissæ-folio. Herb. Tourn. flores parvi purpurei. Pedunculi tèr quatèrve dichotomi. Folia

inferna mihi non notâ.—Circâ Trapezum, in collibus.
Junio floret. z

563. *DIGITALIS leucophaea*. *Sibth. n.* 1465? *D. lanata?* *Wild. Sp. 3. p.* 187.

D. foliis oblongis lanceolatis integerrimis, cauleque glabris, spicâ terminali cylindraceâ densissimâ sublanatâ, bracteis calyce longioribus, capsulis ovatis reticulatis.

Flores non vidi. — In nemoribus Bulgariæ, ad pagum Ineada. z

564. *SESAMUM Indicum*. *Sp. pl.* 884. — In arvis insulæ Tenodi, in agro Argolico colitur. Julio florens. o

565. *ACANTHUS mollis*. *Sp. pl.* 891. *Sibth. n.* 1471. — Frequentissimè in saxosis circâ Trapezum. Ab incolis ut vulnerarium potens habetur. z

566. *OROBANCHE ramosa*. *Sp. pl.* 882. *Sibth. n.* 1469. — Vulgaris in collibus Meli. Aprili floret. z

567. *O. pubescens*.

O. caule erecto simplice subvillosa, bracteis lanceolatis acutis flore longioribus, corollâ fimbriato-crispâ, calyce diphylo laciniis subbifidis, spicâ longissimâ, densissimâ, staminibus basi hirsutis.

Planta integra pilis albidis crispis conspersa, flores numerosissimi saturè violacei. — Vulgaris in collibus siccis insulæ Meli. Aprili floret. z

568. *O. caryophyllacea*. *Wild. sp. 3. p.* 348. *Sibth. n.* 1467.

O. major, caryophyllum olens. *Herb. Tourn.* — In inculis Meli. Aprili. z

XV. TETRADYNAMIA.

I. SILICULOSA.

569. MYAGRUM *perenne*. *Sp. pl.* 893. *Bunias perennis*. *Sibth. n.* 1478. *Rapistrum perenne*. *D. C. Syst. univ.* 2. p. 451. — In collibus aridis insulæ Astypalææ. Maio floret. π

570. *M. Ægyptium*. *Sp. pl.* 895. *Bunias virgata*. *Sibth. n.* 1479. *Didesmus Ægyptius*. *b. D. C. Syst. univ.* 2. p. 658.

Flores pallidi, caulis ramosissimus procumbens. — In ruderalis insulæ Astypalææ. Maio floret. \odot

571. ERUCARIA *Aleppica*. *D. C. Syst. univ.* 2. p. 674. *Bunias myagroïdes*. *Mant.* 96. *Cordylocarpus lævigatus*. *Wild. Sp.* 3. p. 653. *Sibth. n.* 1583.

Sinapi maritimum, tenuissimè laciniatum, flore purpurascente. *Ins. Cycl. Herb. Tourn.* — Vulgatissima in arvis maritimis insulæ Meli. Maio floret. \odot

572. BUNIAS *cochlearioides*. *Wild. Sp.* 3. p. 413. *Marsch. Fl. taur.* n. 1229. — Circà Byzantium et Theodosiam non rara occurrit. \odot

573. CRAMBE *maritima*. *Sp. pl.* 937. *Marsch. Fl. taur.* n. 1252. *D. C. Syst. univ.* 2. 651. — Ad littora Ponti-Euxini, versùs Bosphorum Cimmericum. Maio florens. π

574. COCHLEARIA *draba*. *Sp. pl.* 904. *Lepidium draba*. *Marsch. Fl. taur.* n. 1255. *D. C. Syst. un.* 2. p. 529. — Communis in herbis Tauriæ, circà Theodosiam. π

575. IBERIS *ciliata*. *Wild. Sp.* 3. p. 455. *Marsch.*

Fl. taur. n. 1266. D. C. Syst. univ. 2. p. 402.—In colibus apricis, circà Sevastopolem vulgaris. ♂

576. *LEPIDIUM perfoliatum. Sp. pl. 897. Marsch. Fl. taur. n. 1248. D. C. Syst. univ. 2. p. 541.*—Abundat in pascuis Tauriæ, circà Theodosiam et Kerch. Maio floret. ☉

577. *L. cornutum. Sibth. n. 1491. Buxbaum. Cent. 1. p. 5. t. 9. f. 1. Notoceras cardamine folium. D. C. Syst. un. 2. p. 205.*—In Asiâ minore circà Byzantium, ad sepes. Maio floret. ☉

578. *L. angulosum.* Caule glaberrimo flexuoso angulato sulcato stricto parcè ramoso, foliis longis glabris sessilibus cunctis pinatifidis, laciniis inciso-dentatis floribus minimis deciduis, siliculâ ovatâ subemarginatâ.

Omninò simile *L. vesicario*, sed nunquàm genicula tumida vidi. Lacinia foliorum etiàm latiora. — Abundat in ruderatis urbis Theodosiæ. Maio floret. ☉

579. *L. ruderale. Sp. pl. 900. Marsch. Fl. taur. n. 1257.*—Passim in incultis Colchidis, ad arcem Soukoum-Kale. ☉

580. *L. Iberis. Sp. pl. 900. D. C. Syst. univ. 2. p. 550. L. gramini-folium. Sibth. n. 1493. Marsch. Fl. taur. n. 1255.*—In Bulgariâ frequens, ad pagum Ineada. ☉

581. *THLASPI saxatile. Sp. pl. 901. Sibth. n. 1496. Æthionema saxatile. Syst. univ. 2. p. 553.*—In summis montibus insulæ Coi; maio floruerat. ☉

582. *CAMELINA dentatâ. Persoon. Syn. 2. p. 191. D. C. Syst. univ. 2. p. 516. Myagrurn dentatum.*

Wild. Sp. 3. p. 408. — Abundat in herbis circa Theodosiam et Odessam. Junio floret. ☉

583. *ALYSSUM Orientale. D. C. Syst. univ. 2. p. 303. Sibth. n. 1512. Clypeola tomentosa. Lin. Mant. 92.*

A. Creticum, saxatile, foliis undulatis incanis. *Tourn. Cor. 15. Herb. Tourn.* — In summis rupibus insulæ Coi. Maio floruerat. ☉

584. *A. hirsutum. Marsch. Fl. taur. n. 1275. D. C. Syst. univ. 2. p. 314?* — Abundat in campis herbis Tauriæ, propè Theodosiam atque Kerch. Maio floret. ☉

585. *A. rostratum. Marsch. Fl. taur. Sup. n. 1272.* D. C. Syst. univ. 2. p. 313.* — Copiosum in lazaret Odessæ. Julio florens. ☉

586. *A. incanum. Sp. pl. 908. Marsch. Fl. taur. n. 1271. Berteroa incana. D. C. Syst. un. 2. p. 291.* — Circà Theodosiam in collibus herbis. ♂

587. *A. obliquum. Sibth. n. 1509. Berteroa obliqua. D. C. Syst. univ. 2. p. 292.*

Lunaria leucoid-folio, siliquâ oblongâ minori. *Tourn. Inst. 218. Herb. Vaillant.* — In nemoribus Bulgariæ copiosè; julio floret. ☉

588. *A. orbiculatum. Berteroa orbiculata. D. C. Syst. univ. 2. p. 293.*

A. caule basi suffruticoso ramoso diffuso, foliis radicalibus oblongis subsinuatis, caulinis sessilibus lanceolatis integris, cunctis subincanis; floribus minimis, siliculis compressis ferè orbiculatis stylo filiformi superatis.

In arenosis sinûs Singitici, ad canalem Xerxis hanc inveni speciem. Augusto floruerat. ☉

589. *BISCUTELLA Columnæ*. *D. C. Syst. univ.* 2. p. 412. *B. didyma* b. *Sp. pl.* 911. *B. apula*. *Sibth.* n. 1522.

Thlaspidium apulum spicatum. *Tourn. Inst.* 215. *Herb. Tourn.*—In aridis insularum Melitæ et Meli copiosè; aprili floret. ☉

590. *ISATIS tinctoria*. *Sp. pl.* 956. *Marsch. Fl. taur.* n. 1237.—In lazaret Odessæ. Julio florens. ♂

II. SILIQUOSA.

591. *SISYMBRIUM Orientale*. *Sp. pl.* 921. *Sibth.* n. 1540. *S. Columnæ*. *Var. c.* *D. C. Syst. univ.* 2. p. 469.

Erysinum angusti-folium majus procerius et minus hirsutum. Ex insulâ Therâ. *Herb. Tourn.*

Folia angustissima basi pinnatifida, caulis supernè glaber, flores parvi pallidè sulphurei, siliquæ saltèm 3 pollicares patentès incurvæ, pedunculi breves crassi.

In petrosis maritimis insularum Cimoli et Meli frequenter. Aprili floret. ☉

592. *S. Loeselii*. *Marsch. Fl. taur.* n. 1294.

S. caule erecto supernè ramoso, retrorsum hispido, foliis runcinatis acutis hirtis, siliquis patentibus.

Flores intensè lutei.—In herbidis Theodosiæ minimè rarum. Maio florens. ☉

593. *S. Columnæ*. *Wild. Sp.* 3. p. 503. *Marsch. Fl. taur.* n. 1293. *D. C. Syst. univ.* p. 469.

Huic herbæ pars inferior villosa-tomentosa, superior glabrata; flores magni pallidè sulphurei.—In collibus Tauriæ cum præcedente passim reperitur. ☉

594. *S. Pannonicum*. *Wild. Sp.* 3. p. 502. *Marsch.*

Fl. taur. n. 1291. D. C. Syst. univ. 2. p. 470.—In pascuis Tauriæ copiosè, circà oppidum Kerch. Maio florens. ☉

595. *S. sophia. Sp. pl. 920. Marsch. Fl. taur. n. 1290.* Circà Theodosiam frequentissimè. ☉

596. *S. juncoum. Wild. Sp. 3. p. 513. Marsch. Fl. taur. n. 1295. D. C. Syst. univ. 2. p. 462.*—Pàs-sim in herbidis Tauriæ, in insulà Berezen, circà Kerch et Odessam. Junio floret. ☉

597. *S. sylvestre. Sp. pl. 916. Sibth. n. 1532. Marsch. Fl. taur. n. 1284.*—In ruderatis circà Trapezum. ☿

598. *ERYSIMUM alliaria. Sp. pl. 922. Sibth. n. 1545. Alliaria officinalis. D. C. Syst. un. 2. p. 489.*—Ad sepes, propè Byzantium copiosè. ♂

599. *E. hieraci-folium. Sp. pl. 923. Sibth. n. 1547. D. C. Syst. un. 2. p. 497. var. b.*

Caulis ramosissimus, folia ferè crispa, siliquæ patentes.

In summis montibus insulæ Coi, ad altitudinem 3-400 hexapodum; maio florens ♂

600. *E. diffusum. Wild. sp. 3. p. 512. Marsch. Fl. taur. n. 1501.*—In insulà Berezen ad Borysthenem copiosè crescit. Julio. ♂

601. *CHEIRANTHUS cuspidatus, Wild. Sp. 3. p. 525. Marsch. Fl. taur. n. 1508. Erysimum cuspidatum. D. C. Syst. un. 2. p. 493.*—In collibus herbidis, circà Kerch et Sevastopolem. Maio florens. ♂

602. *C. tricuspидatus. Sp. pl. 926. Sibth. n. 1562.*—Ad littora arenosa maris, in insulis Melo et Cimolo. ☉

603. *C. sinuatus*. *Sp. pl.* 926. *Sibth. n.* 1563.—In rupibus maritimis scopuli St.-Istad, propè Cimolum. Maio floret. ♂

604. *C. cheiri*. *Sp. pl.* 924. *Sibth. n.* 1549.

Flos magnus intensè luteus, caulis foliaque glaberrima.—In scopulo Raphithi copiosè, ad littus Atticum. ♀

605. **HESPERIS** *incrassata*. *Malcomia incrassata*. *D. C. Syst. univ.* 2. p. 441.

H. caule basi ramoso suberecto, foliis ovalibus petiolatis, superioribus oblongis, pube adpressâ bipartitâ vix conspicuâ, pedicellis calyce brevioribus post anthesin valde incrassatis, siliquis subpubescentibus, stylo acutissimo superante.

Folia subcarnosa, siliquæ crassæ strictæ, flos pallidè violaceus.—Frequens in rupibus maritimis insulæ Cimoli. Maio floret. ○

606. *H. tristis*. *Sp. pl.* 927. *Marsch. Fl. taur.* n. 1314. *D. C. Syst. un.* 2. p. 447.—In herbidis Tauriæ, circâ Kerch. Maio floret. ♂

607. **ARABIS** *recta*. *Wild. Sp.* 3. p. 536. *Marsch. Fl. taur.* n. 1321. *Arabis auriculata* var. *b.* *D. C. Syst. univ.* 2. p. 220.—In lazaret Theodosiæ. Maio florens. ○

608. **BRASSICA** *elongata*. *Wild. Sp.* 3. p. 552. *Marsch. Fl. taur.* n. 1327. *D. C. Syst. un.* 2. p. 604.—In collibus circâ Odessam. Julio florens. ♂

609. **SINAPIS** *arvensis*. *Sp. pl.* 933. *Sibth. n.* 1577. *D. C. Syst. un.* 2. p. 615.—In arvis insulæ Scyri ○

609. (bis) **RAPHANUS** *maritimus*: *D. C. Fl. fr. Sup.* n. 588. *Syst. un.* 2. p. 668.—In arenosis Colchidis, ad arcem Soukoum-Kale. Junio floret.

XVI. MONADELPHIA.

I. PENTANDRIA.

610. *ERODIUM cicutarium*. *Marsch. Fl. taur.* n. 1337. *Geranium cicutarium*. *Sp. pl.* 951.—In incultis commune, circa Theodosiam.

II. DECANDRIA.

611. *GERANIUM radicum*. *Wild. Sp. 3. p.* 698. *Marsch. Fl. taur.* n. 1341. *D. C. Fl. fr. Sup.* n. 4542 (a).—Crescit in pascuis Tauriæ, circa Kerch valde copiosum. Maio floret. ♀

612. *G. asphodeloides*. *Wild. Sp. 3. p.* 704 *Sibth.* n. 1605.

G. Constantinopolitanum, columbinum, flore maximo, asphodeli radice. Herb. Tourn. — Frequens ad sepes Asiæ minoris, propè Byzantium. Aprili floret. ♀

III. POLYANDRIA.

613. *ALTHÆA cannabina*. *Sp. pl.* 966. *Sibth.* n. 1614. — In campis incultis Bulgariæ. ♀

614. *A. rosea*. *Wild. Sp. 3. p.* 775. *Alcea rosea. Sp. pl.* 966. *Sibth. n.* 1616. — Passim in nemoribus Bulgariæ, ad pagum Incada. ♀

615. *A. fici-folia*. *Sp. pl.* 967. *Sibth. n.* 1617. *Marsch. Fl. taur.* n. 1362. — In plantâ nostrâ folia tantum lobata nequaquam palmata. — In collibus circa Trapezum rariùs. Junio floret. ♂

616. *LAVATERA Thuringiaca*. *Sp. pl.* 975. *Sibth.*

n. 1628. *Marsch. Fl. taur. n. 1566.*—Haud rarè reperitur in collibus , propè Odessam. Julio florens. ☞

617. *L. punctata. Wild. Sp. 3. p. 797. Sibth. n. 1650.*—Copiosissimè ad sepes , in insulis Coo , Samo, Lesbo , etc. Maio , junio floret. ☉

618. *L. unguiculata. Hort. Par. Poirct. Ency. Sup. t. 3. p. 309.*

Althæa bryoniæ-folio. C. B. Herb. Tourn.—In collibus Sami ; junio floret. ☽

619. *HIBISCUS vesicarius. Wild. Sp. 3. p. 832.*

Ketmia vesicaria , vulgaris. Herb. Tourn.—In insulâ Lesbo inter Gossypia. Junio florens. ☉

XVII. DIADELPHIA.

I. OCTANDRIA.

620. *POLYGALA major. Wild. Sp. 3. p. 874. Sibth. n. 1040. Buxb. Cent. 5. p. 40. t. 70. f. 1.*

P. Pontica , lini-folia , magno flore purpureo vel albo. Gundelsheimer in Herb. Tourn.—In collibus herbidis , circâ Trapezum minimè rara. Junio floret. ☞

621. *P. vulgaris. Sp. pl. 986. Sibth. n. 1659.*—In umbrosis insulæ Meli , propè monasteria. ☞

622. *P. amara. Sp. pl. 987. D. C. Fl. fr. n. 2385.*—Propè Byzantium , in monte Bougourlou. Maio floret. ☞

II. DECANDRIA.

623. *SPARTIUM villosum. Wild. Sp. 3. p. 935. Sibth. n. 1646. S. lanigerum. Desf. Atl. 2. p. 155. Cytisus lanigerus. D. C. Fl. fr. n. 3825.*

Cytisus spinosus Creticus, siliquâ villis longissimis et incanis obductâ. *Herb. Tourn.* — Frequens in collibus siccis insulæ Meli. Aprili florens. 5

624 *GENISTA Lobelii*. *D. C. Fl. fr.* 3816.

Genista spartium spinosum alterum, aphyllum, tribus aculeis semper junctis, floribus luteis. C. B. *Herb. Tourn.*

Caulis 2-3 pedalis ramosissimus intricatus diffusus; calyces corollæque pilis sericeis obducta. — Cum præcedente ubique reperitur in apricis insulæ Meli. Maio floret. 5

625. *ONONIS altissima*. *Lam. Ency.* 1. p. 506. *O. hircina*. *Marsch. Fl. taur. n.* 1380. *Wild. Sp.* 3. p. 989. — Circa Odessam nequaquam rara, in udis. Julio floret. x

626. *O. serrata*. *Vahl. Symb.* 1. p. 52. *Persoon. Syn.* 2. p. 290.

Multò minùs villosa quàm *O. villosissima*. *Desf.* cui omninò affinis.

In arenis maritimis insulæ Meli copiosissima. Aprili florens. x

627. *O. ramosissima*. *Desf. Fl. atl.* 2. p. 142. *Persoon. Syn.* 2. p. 291. — In insulâ Lero ad margines viarum, passim reperitur. Maio floret. x

628. *O. viscosa*. *Sp. pl.* 1009. *Sibth. n.* 1659. In arenosis insulæ Meli. ○

629. *O. mitissima*. *Sp. pl.* 1007. *Sibth. n.* 1655. Frequens in collibus insulæ Coi. Maio floret. ○

630. *O. variegata*. *Sp. pl.* 1008. *D. C. Fl. fr.* n. 3840. *O. aphylla*. *Lam. Ency.* 2. p. 509. — In arenosis insulæ Coi vulgaris. Maio floret. ○

651. LUPINUS *angusti-folius*. *Sp. pl.* 1005. *Sibth.* n. 1669. Abundat in insulâ Melo propè veterem urbem, necnon in scopulo novo Camini, ad latera vulcani. Aprili floret. π

652. L. *albus*. *Sp. pl.* 1015. *D. C. Fl. fr.* n. 3829. Frequens in nemoribus, circâ Byzantium. Florens maio. \odot

653. L. *varius*. *Sp. pl.* 1015. L. *semi-verticillatus*. *Lam. Ency.* 4. p. 625. — Crescit in nemorosis insulæ Meli, propè monasterium. \odot

654. ANTHYLLIS *Hermanniaë*. *Sp. pl.* 1014. *Sibth.* n. 1666.

Barba-jovis Cretica, linariæ folio, flore luteo parva. *Herb. Tourn.*

In collibus siccis insulæ Leri atque versùs montem Athonem copiosissimè. Junio floret. π

655. OROBUS *croceus*. *Desf. Cor. p.* 85. t. 63.

O. Cappadocicus, latifolius villosus, flore croceo. *Gundelsheimer in Herb. Tourn.*

Caulis ramosus, 4-5 pedalis, fructus lati plani breviter mucronati. — In nemoribus cum *Azaleâ*, propè Trapezum. Junio medio floruerat. π

656. O. *hirsutus*. *Sp. pl.* 1027. *Sibth.* n. 1676. *Marsch. Fl. taur.* n. 1385. O. *Laxiflorus*. *Desf. Cor. p.* 83. t. 63. *Buxb. Cent.* 5. p. 22. t. 51.

O. Creticus, latifolius, incanus. *Tour. Cor.* 26. *Herb. Tourn.* — Propè Byzantium in monte Bougourlou copiosè nascitur. Maio florens. π

657. O. *digitatus*. *Marsch. Fl. taur.* n. 1589. O. *sessili-folius* *Sibth.* n. 1680. O. *Pyrenaicus*. *Pallas Ind. taur.*

O. Ponticus, foliis angustissimis, costæ brevissimæ in-
nascentibus. *Herb. Tourn.*—Cum præcedente in monte
Bougourlou nec rarius. ☞

638. LATHYRUS *tenui-folius*. *Desf. atl. 2. p. 160.*
Wild. Sp. 3. p. 1085. L. *alatus?* *Sibth. n. 1689.*—
Inter segetes Meli non infrequens. Maio floret.

639. L. *rotundi-folius*. *Marsch. Fl. taur. n. 1397.*
L. Armenius, rotundifolius, flore rubro. *Gundel-
heimer. in Herb. Tourn.*—Propè Byzantium in nemo-
ribus haud rarus. Maio floret. ☞

640. L. *sphæricus*. *D. C. Fl. fr. n. 3988.* L. *angu-
latus*. *Sibth. n. 1688.* L. *coccineus*. *Allioni. Ped. 1.*
p. 330.—In arvis insulæ Meli passim invenitur. ☉

641. L. *cicera*. *Sp. pl. 1030.* *Sibth. n. 1685.*—Inter
segetes insulæ Meli, etiàm circà Byzantium. ☉

642. L. *tuberosus*. *Sp. pl. n. 1033.* *Marsch. Fl.*
taur. n. 1396.—In collibus herbidis circà Odeasam.
Julio florens. ☞

643. PISUM *sativum* *Sp. pl. 1026.* *Sibth. n. 1671.*
—In arvis Byzantinis ubique reperitur. ☉

644. VICIA *Bythynica*. *Sp. pl. 1038.* *Sibth.*
n. 1714.—In incultis insulæ Meli. Maio floret. ☉

645. V. *microphylla*. Caule debili basi ramoso diffuso,
foliolis 8-10 ovatis subpetiolatis minimis mucronatis, pe-
dunculis strictis foliis duplò triplòve longioribus 4-6 flo-
res gestantibus, floribus majusculis pallidis, leguminibus
compressis glabris 5-7. spermis.

Stipulæ minimæ semi-sagittatæ : pedunculi rigidi;
flores pallidè violacèi seu albi. calyce saltem triplò longio-
res, foliola lineam lata duoque lineas longa. Caulis 2-3
pedalis suprà *poteria spinosa* seu *genistas* scandens.

In collibus apricis Meli, circa monasterium copiosè.
Aprili floret. ♀

646. *V. repens*. Caule diffuso basi ramoso humifuso, foliolis subsenis alternis angustissimis acutis, floribus axillaribus solitariis ferè sessilibus, stipulis vix conspicuis, leguminibus compressis glabris tetraspermis.

Pedunculi vix sesquilineam longi stipula brevissimâ sub flore donati; flores pallidi pallidè pupurei calyce duplè triplève longiores. Semina proeminentia. — In siccis insulæ Meli, aprili floret. ♂

647. *V. tenuifolia*. *D. C. Fl. fr. Sup. n. 4013 (a). Marsch. Fl. taur. n. 1406.* — In collibus circa Trapezum et Odessam frequens. Julio floret. ♀

648. *V. cracca*. *Sp. pl. 1055. Marsch. Fl. taur. n. 1405. Sibth. n. 1702.* — Propè Byzantium et Trapezum minimè rara. Junio floret. ♀

649. *V. onobrychioides*. *Sp. pl. 1056. Sibth. n. 1703.*

Stipulas tantùm semi-sagittatas nunquàm basi dentatas vidi. — In udis insulæ Meli rarius. Aprili floret. ♀

650. *V. cassubica*. *Sp. pl. 1055. Marsch. Fl. taur. n. 1403.* — In nemoribus circa Trapezum. Junio floret. ♀

651. *V. Pannonica*. *Wild. Sp. 3. p. 1107. Marsch. Fl. taur. n. 1412.* — In herbidis Tauriæ copiosè, circa Theodosiam. Maio floret. ♂

652. *V. Biebersteinii*. *Marsch. Fl. taur. Sup. n. 1411.* — Propè Theodosiam, in pascuis frequens. Maio floret. ♀

653. *V. sepium*. *Sp. pl. 1058. Marsch. Fl. taur.*

n. 1414. — In umbrosis Colchidis passim invenitur, ad arcem Soukoum. ☞

654. *ERVUM hirsutum*. *Sp. pl.* 1039. *Marsch. Fl. taur.* n. 1418. — In collibus herbidis, circa Kerch. ☉

655. *CYTISUS totoïdes*. *Wild. Sp. 3. p.* 1127.

C. pauciflorus. *Marsch. Fl. taur.* n. 1425.

C. Orientalis humifusus, facie trifolii pratensis. *Tourn. Cor.* 44. *Icon. Aubriet. Herb. Tourn.*

Propè Byzantium in monte Bougourlou, in collibus circa Trapezum ubique crescit. Maio, Junio floret. ☞

656. *C. Ponticus*. *Wild. Sp. 3. p.* 1120. *Poiret. Ency. Sup. n.* 22.

C. Ponticus humifusus, magno flore ex luteo purpurascente. *Tourn. Cor.* 44. *Herb. Tourn.* — Frequens in monte Bougourlou. Maio florens. ☞

657. *COLUTEA arborescens*. *Sp. pl.* 1045. *Sibth. n.* 1727. — In montosis insulæ Scopeli copiosè. ☽

658. *GLYCYRRHIZA glabra*. *Sp. pl.* 1046. *Sibth. n.* 1729. — Abundat ad ripas Imbrasi, ad columnam veteris Heræi. Junio florens. ☽

659. *CORONILLA Cappadocica*. *Wild. Sp. 3. p.* 1154. *C. Iberica*. *Marsch. Fl. taur. Sup. n.* 1433. *Buxb. C. 2. t.* 40. *f.* 1.

C. Orientalis herbacea flore magno luteo. *Tourn. Cor.* 44. *Herb. Tourn. Icon. Aubriet.* — Circa Trapezum in collibus graminosis minimè rara. Junio floret. ☞

660. *C. varia*. *Sp. pl.* 1048. *Sibth. n.* 1734.

Hic fortè *C. globosam* cum *C. varia* confundo sed valdè dubium an duo species sint distinctæ.

Planta in Oriente communis tum in Colchide ad Soukoum, tum in Tauria ad Sevastopolem, etiam circa Trapezum et Odessam. Maio, junio floret. ☉

661. *C. Cretica*. *Sp. pl.* 1048. *Sibth. n.* 1755. — In nostrâ plantâ legumina incurva videntur. — In collibus elatis insulæ Coi. Maio floret. ☉

662. *C. securidaca*. *Sp. pl.* 1048. *Sibth. n.* 1755. — Ad sepes, in insulâ Samo. Floret maio. ☉

663. ORNITHOPUS *ebracteatus*. *D. C., Fl. fr. Sup. n.* 4039. *Lois. Fl. gall. p.* 467. — Ad sepes insulæ Meli, aprili floret. ☉

664. *O. scorpioides*. *Sp. pl.* 1049. *Sibth. n.* 1758. — Frequens in arvis Meli. ☉

665. HIPPOCREPIS *dicarpa*. *Marsch. Fl. taur. Sup. n.* 1440.*

H. leguminibus sæpius geminis; isthmis barbatis dorso ciliatis, pedunculis folio brevioribus.

Passim in apricis insulæ Meli. ☉

666. SCORPIURUS *levigata*. *Sibth. n.* 1745.

S. pedunculis subtrifloris, leguminibus sulcatis contortuplicatis undique inermibus.

In arvis insulæ Astypalææ. Maio fructus gerit. ☉

667. *S. subvillosa*. *Sp. pl.* 1050. *D. C. Fl. fr. n.* 4036. — Cum præcedente in segetibus reperitur. ☉

668. HEDYSARUM *spiniosissimum*. *Sp. pl.* 1058. *Sibth. n.* 1746.

Onobrychis clypeata aspera minor. *C. B., Herb. Tourn.* In arvis maritimis insulæ Meli copiosissimè. Aprili floret. ☉

669. ONOBRYCHIS *æquidentata*. *Hedysarum æquidentatum*. *Sibth. n.* 1752.

O. Cretica , fructu cristato et aculeato , foliis vicinæ
Herb. Tourn.

O. *crista-galli* valdè affinis. Nostra differt pedunculis folio duplò vel triplò longioribus, aculeis dorsalibus latis uniformibus integris nunquàm dentatis, foliolis latioribus ferè ovatis; dentibus calycinis corollæ subæqualibus. — In collibus insulæ Meli copiosè. Aprili floret. ☉

670. O. *sativa*. D. C. *Fl. fr. n.* 4055. *Hedysarum onobrychis*. Sp. pl. 1059. *Marsch. Fl. taur. n.* 1451. — Frequens in collibus herbidis, propè Odessam. ☿

671. GALEGA *officinalis*. Sp. pl. 1062. *Marsch. Fl. taur. n.* 1455. — Abundat in pratis Colchidis, ad arcem Soukoum-Kale; junio floret. ☿

672. ASTRAGALUS *pilosus*. Sp. pl. 1065. *Marsch. Fl. taur. n.* 1462. — In herbidis Tauriæ passim reperitur, circà Kerch. Maio floret. ☿

673. A. *cicer*. Sp. pl. 1067. *Marsch. Fl. taur. n.* 1470.

A. *hirsuta reticaulis*. J. B. *Herb. Tourn.* — In lazaretto Odessæ; julio floret. ☿

674. A. *onobrychis*. Sp. pl. 1070. *Marsch. Fl. taur. n.* 1482. *Var. angustifolius*. D. C. *Astrag. p.* 124. n. 24.

In plantâ nostrâ folia angustissima acuta, caules erecti, pedunculi longissimi stricti, legumina cana villosa. — In herbidis Odessæ copiosissimè; julio floret.

675. A. *Bæticus*. Sp. pl. 1068. *Sibth. n.* 1762. — In arvis Meli, propè vetus theatrum, aprili floret. ☉

676. A. *asper*. Wild. Sp. 3. p. 1271. *Marsch. Fl. taur. n.* 1466. — In herbidis Tauriæ, propè oppidum Kerch. Maio florens. ☿

677. *A. striatellus*. *Marsch. Fl. taur. n. 1472.*

A. caulescens diffusus glaber, foliis cuneiformibus subemarginatis, pedunculis subtrifloris folio brevioribus, leguminibus ovato-oblongis tumidis deflexis glabris.

In pascuis Tauriæ, ad urbem Kerch. Maio floret. π

678. *A. diffusus*. *Wild. Sp. 3. p. 1521. Marsch. Fl. taur. n. 1496.*

Flores pallidè flavi.—In graminosis Tauriæ; ad oppidum Kerch. Maio floret. π

679. *A. pseudo-tragacantha*. *Marsch. Fl. taur. n. 1499**. *A. aristatus*. *Sibth. n. 1775.*

A plantâ quam descripsit Cl. *Marschall* nostra differt foliis ferè glabris acutis subspinosis, ab *A. aristato* *Lam.* magis tamen differt corollis ochroleucis confertis sessilibus et calycibus lanâ longâ et incanâ tectis.—Frequens in collibus circâ Thessalonicam. ν

680. *A. rotundifolius*. *Wild. Sp. 3. p. 1517. A. nummularius*. *Desf. atl. 2. p. 182. A. nummularioides*. *D. C. astrag. p. 255. Buxb. cent. 3. t. 38. f. 1.*—In apricis insulæ Meli ubique crescit. Aprili floret. π

681. *A. pentaglottis*. *L. mant. 274. D. C. astrag. 92. D. C. Fl. fr. n. 3965.*—In collibus nemorosis insulæ Meli copiosè, aprili floret.

682. *A. nummularius*. *Wild. Sp. 3. p. 1521? Marsch. Fl. taur. n. 1499?*

A. subacaulis, foliis ovatis decem-jugis vix pubescentibus apice emarginatis, scapis brevissimis paucifloris, bracteis minimis.

Flores magni ochroleuci; calyces subpilosi albidi. Legumina non cognosco.—In graminosis; circâ Trapezum. Junio florens. π

683. MELILOTUS *cærulea*. *Trifolium. m. cærulea*. *Sp. pl.* 1077. *T. cæruleum*. *Marsch. Fl. taur.* n. 1505. — In herbidis, circa Odessam. Julio florens. ☉

684. *M. Messanensis*. *D. C. Fl. fr. n.* 3898. *Trifolium messanense*. *L. mant.* 275. *Sibth. n.* 1781. — In paludosis maritimis insularum Melitæ et Seyri. Aprili jam fructus gerit.

685. *M. leucantha*. *D. C. Fl. fr. sup. n.* 3894 (a). *Merat. Fl. Par. 2. p.* 411. *Trifolium album*. *Loisel. Fl. gall.* 479. — In Lazaret Odessæ haud rara. Junio florens. ♂

686. *M. officinalis*. *D. C. Fl. fr. n.* 3894. *Trifolium. M. officinalis. Sp. pl.* 1078. *Marsch. Fl. taur.* n. 1506. — In umbrosis Colchidis, ad arcem Soukoun-Kale. Junio floret.

687. *M. sulcata*. *Desf. atl. 2. p.* 193. *Trifolium mauritanicum*. *Wild. Sp. pl. p.* 1354. *Sibth. n.* 1782. — In arvis insulæ Meli frequens. Aprili floret. ☉

688. *M. Italica*. *D. C. Fl. fr. n.* 3895. *Desf. atl. 2. p.* 192. *T. melilotus Italica. Sp, pl.* 1078.

Planta nostra à definitione discrepat foliolis apice serratis.

Vulgaris ad latera vulcani novæ Camini, propè Theram. Maio floret. ☉

689. *M. Cretica*. *Desf. atl. 2. p.* 193. *Trifolium. M. Cretica. Sp. pl.* 1078. *Sibth. n.* 1786. — Communis in arvis maritimis insulæ Leri. Junio ineunte, fructus maturos gerebat. ☉

690. TRIFOLIUM *purpureum*. *Loisel. Fl. gall.* 484. *tab. 14. D. C. Fl. fr. sup. n.* 3878 (a). — Fre-

quens ad sepes insularum Sami et Scyri, etiàm in nemoribus Bulgaricæ, propè Ineada. Junio floret. ☉

691. *T. formosum*. Caule erecto villosò supernè ramoso, foliolis ovato-oblongis mucronatis, stipulis amplis strictis longè subulatis, spicis ovatis densis multifloris, calycibus cano-villosis, dentibus subæqualibus longissimis post anthesin subpatentibus.

Pulcherrima species. Caulis pedalis sesquipedalis-ve 4-6 spicas gerens. Foliola pubescentia unciam et ampliùs longà, 4 lineas lata. Spicæ nudæ densæ solitaires terminales. Calyces villis albidis induti, dentes ciliati acuti 6 lineas saltèm longi. Flores calyce breviores pallidè incarnati.

In incultis insulæ Meli frequens, aprili floret. ☉

692. *T. angustifolium*. *Sp. pl.* 1083. *Sibth. n.* 1802.—In collibus circà Trapezum, junio floret. ☉

693. *T. diffusum*. *Wild. Sp. 3. p.* 1365; *Marsch. Fl. taur. n.* 1513.—In herbis propè Odessam, julio florens. ☉

694. *T. vesiculosum*. *Loisel. Fl. gall. 2. p.* 485. *t. 15. D. C. Fl. fr. Sup. n.* 3886 (a). *T. turgidum*. *Marsch. Fl. taur. n.* 1527. *T. recurvum*. *Waldst. et Kit. rar. hung. 2. t.* 165. — In nemoribus Bulgaricæ, propè pagum Ineada, junio floret. ☉

695. *T. pauciflorum*. Caule humifuso villosò basi ramosissimo, petiolis longissimis, foliolis cuneatis apice valdè dilatatis sæpiùs emarginatis integris, spicis solitaribus seu geminis breviter pedicellatis paucifloris, calycibus villosis, dentibus setaceis corollâ brevioribus.

Caulis basi crassus ramosissimus, rami humifusi pedales, folia longè petiolata, stipulæ striatæ ciliatæ apice

subulatae. Spicae subquinque-florae basi interdum folio superno vaginatae. Flores intense purpurei calyce duplo longiores.

Abundat in campis Asiae minoris prope Byzantium. Maio floret. ♂

Confer cum *T. rotundifolio*. *Sibth. n.* 1796.

696. *T. spumosum*. *Sp. pl.* 1085. *Sibth. n.* 1808. — Commune in arvis insulae Meli. Aprili florens. ○

697. *T. ochroleucum*. *Wild. Sp. 3. p.* 1372. *Sibth. n.* 1800. — Passim in pratis circa Byzantium, necnon in collibus prope Trapezum. Floret maio, junio. ♀

698. *T. elegans*. *D. C. Fl. fr. Sup. n.* 3859. (a). *Loisel. not. p.* 108. *T. hybridum*. *Desf. atl. 2. p.* 295. *T. Vaillantii*. *Poiret. Ency. 8. p.* 2. *Sibth. n.* 1789. *T. ambiguum?* *Marsch. Fl. taur. n.* 1510. — In herbis minimè rarum, circa Trapezum. Junio florens. ♀

699. *T. Michelianum*. *D. C. Fl. fr. Sup. n.* 3859 (a). *Loisel. not. p.* 109. *T. hybridum*. *Sp. pl.* 1079. *Sibth. n.* 1788.

T. Cappadocicum, altissimum, caule fistuloso, flore albo. *Herb. Tourn.* — Abundat inter segetes, circa Trapezum. Junio florens. ○

700. *T. tomentosum*. *Sp. pl.* 1086. *Sibth. n.* 1810. — Passim in incultis insulae Meli. ○

701. *T. fragiferum*. *Sp. pl.* 1086. *Sibth. n.* 1811. — Cum praecedente, nec rarius. z

702. *T. resupinatum*. *Sp. pl.* 1086. *Sibth. n.* 1809. — Circa Byzantium, copiosum ad sepes. Maio floret. ♂

703. *T. arvense*. *Sp. pl.* 1083. *Sibth. n.* 1803. — In cinerosis vulcani novae Camini, prope Theram. Aprili floret. ○

704. *T. campestre*. *Smith. Fl. Brit.* 792. *D. C. Fl. fr. sup. n.* 3891. (a). *T. erectum*. *Poiret. Ency.* 8. p. 28. — In collibus propè Trapezum. Floret junio. ☉

705. *T. Bocconii*. *D. C. Fl. fr. Sup. n.* 5885. (a). — Passim in apricis insulæ Meli. Aprili floret. ☉

706. *T. scabrum*. *Sp. pl.* 1084. *Sibth. n.* 1806. — In collibus insulæ Meli haud rarum. Florens aprili. ☉

707. *T. uniflorum*. *Sp. pl.* 1085. *Sibth. n.* 1807. Melilotus Cretica, humillima humifusa, flore albo magno. *Tourn. Cor.* 28. *Icon. Aubriet.*

Frequens in arenosis insularum Archipelagi, necnon in monte Bougourlou propè Byzantium. Maio floret. ☉

708. LOTUS *cytisoides*. *Sp. pl.* 1092. *D. C. Fl. fr. n.* 3935. — In arenis maritimis insulæ Meli. Aprili floret. ☉

709. *L. corniculatus*. *Var. tenuifolius*. *Sp. pl.* 1092. *D. C. Fl. fr. n.* 3936. — In herbidis circà Odessam. ☉

710. *L. Creticus*. *Sp. pl.* 1091. *Sibth. n.* 1822. — In arenosis insulæ Coi, propè urbem. Floret maio ☉

711. *L. tetragonolobus*. *Sp. pl.* 1089. *Sibth. n.* 1816. — Abundat intèr segetes insularum Melitæ et Meli. Floret aprili. ☉

712. *L. aristatus*. *D. C. Fl. fr. Sup. n.* 3935 (a). *L. Coimbrensis*. *Loisel. Fl. gall.* 488. — Passim in arvis insulæ Meli. Floret aprili. ☉

713. *L. ornithopodioides*. *Sp. pl.* 1091. *Sibth. n.* 1821. — In collibus insulæ Meli. Aprili floret ☉

714. DORYCNIUM *latifolium*. *Wild. Sp.* 3. p. 1397. *Sibth. n.* 1828.

D. Ponticum, *latifolium villosum*. *Herb. Tourn.*

Passim crescit in nemoribus, circa Trapezum. Junio floret. 5

715. *TRIGONELLA monspeliaca*. *Sp. pl.* 1095. *Sibth. n.* 1833. — In collibus incultis Meli. Floret aprili. ☉

716. *T. corniculata*. *Sp. pl.* 1094. *Sibth. n.* 1829. Fænum-græcum sylvestre; meliloti facie. *Tourn. Cor.* 28. *Gundelsheimer. in Herb. Tourn.*

In graminosis insularum Meli et Astypalææ. Florens maio. ☉

717. *MEDICAGO glutinosa*. *Wild. Sp.* 3. p. 1406. *Marsch. Fl. taur. n.* 1545. — In collibus circa Theodosiam et Odessam. Junio floret. 7

718. *M. circinnata*. *Sp. pl.* 1096. *Sibth. n.* 1837. *M. vulnerariæ* facie, Cretica. *Herb. Tourn.*

Passim in montosis insulæ Meli, propè Monasterium. Aprili floret. ☉

719. *M. coronata*. *Wild. Sp.* 3. p. 1413. *Sibth. n.* 1844. — In petrosis insulæ Astypalææ; maio ineunte fructus gerens. ☉

720. *M. intertexta*. *Wild. Sp.* 3. p. 1411. *D. C. Fl. fr. n.* 3915. — In arenosis insulæ Sami. Junio ineunte fructus jam maturi sunt. ☉

721. *M. tuberculata*. *Wild. Sp.* 3. p. 1410. *D. C. Fl. fr. n.* 3910. — In collibus insulæ Meli: aprili floret. ☉

722. *M. tribuloïdes*. *Lam. Ency.* 3. p. 635. *Wild. Sp.* 3. p. 1416.

M. Cretica, parvo fructu, aculeis sursum et deorsum tendentibus. *Tourn. Cor.* 28. *Herb. Vaillant.* — Passim in arvis insulæ Meli. Aprili floret. ☉

723. *M. rugosa*. *Lam. Ency.* 3. p. 632. *D. C. Fl. fr. Sup.* n. 3907. (a) *M. elegans*. *Wild. Sp.* 3. p. 1408.
— In arvis insulæ Meli haud rara. Aprili floret. ○
724. *M. maculata*. *Wild. Sp.* 3. p. 1412. *Sibth.* n. 1843. — Propè Byzantium, ad sepes. ○
725. *M. marina*. *Sp. pl.* 1097. *Sibth.* n. 1846. — Ad littora maris in insulâ Melo, haud rarè.

XVIII. SYNGENESIA.

I. POLYGAMIA ÆQUALIS.

726. **GEROPOGON** *hirsutum*. *Sp. pl.* 1109. *Sibth.* n. 1867. *Tragopogon hirsutum*. *D. C. Fl. fr.* n. 2990.
— In apricis insulæ Meli, propè tumulos. Aprili floret. ♂
727. **TRAGOPOGON** *pratense*. *Sp. pl.* 1109. *Marsch. Fl. taur.* n. 1562. — Circà Theodosiam, in herbis minimè rarum. ♂
728. **UROSPERMUM** *picroïdes*. *Desf. Cat.* 90. *D. C. Fl. fr.* n. 2986. *Tragopogon picroïdes*. *Sp. pl.* 1110. *Arnopogon picroïdes*. *Sibth.* n. 1874. — In incultis insulæ Astypalææ. ○
729. **SCORZONERA** *araneosa*. *Sibth.* n. 1880 ? *S. lanata* ? *Marsch. Fl. taur.* n. 1574.
S. caule unifloro basi folioso seu nudo, foliis linearibus recurvis caule longioribus calyceque basi piloso-canis, radice tuberosâ maximâ.
Affinis *S. tuberosæ*. *Pallas*, sed distinguitur flore duplò majore, foliis longioribus basi cano-tomentosis calyceque.
- Passim in saxosis insulæ Meli, necnon in monte Bougourlou circà Byzantium. Aprili florens. x

730. *S. calcitrapifolia*. *Vahl. Symb.* 2. p. 87.
Wild. Sp. 3. p. 1505. *Sibth. n.* 1884.

S. Orientalis, foliis calcitrapæ, flore flavescente.
Tourn. Cor. 36. *Icon. Aubriet.*

Valdè frequens in collibus aridis insulæ Meli. Aprili
flore. ☞

731. *S. laciniata*. *Sp. pl.* 114. *Marsch. Fl. taur.*
n. 1576.—In pascuis Tauriæ, propè Theodosiam. Maio
flore. ☞

732. *S. gramini-folia*. *Sp. pl.* 1112. *Sibth. n.* 1879.
Buxbaum. Cent. 2. p. 26. *t.* 21.—Ad rivulos in insulâ
Samo. Junio florens. ☞

733. *S. elongata*. *Wild. Sp.* 3. p. 1508. *Sibth.*
n. 1886. *Catananche Græca*. *Sp. pl.* 1142. *S. aspera?*
Desf. Annal. Mus. v. 1. p. 153. *t.* 9.

Scorzonera saxatilis et maritima, foliis variè laciniatis.
Insularum Cycladum. Gundelsheimer in Herb. Tourn.

In arenosis insulæ Meli frequentissimè. Vere flo-
ret. ☞

734. *SONCHUS tataricus*. *Wild. Sp.* 3. p. 1522.
Marsch. Fl. taur. n. 1582.

Var. a. foliis runcinatis, floribus paniculatis sparsis ;
crescit in lazaret Theodosiæ et junio flore. ☞

Var. b. foliis ferè integris tantùm sinuatis, floribus
numerosis confertis subcorymbosis ad *S. Sibiricum L.*
accedit.—Hæc passim reperitur in herbis, circà Odes-
sam. Julio florens. ☞

735. *LACTUGA Cretica*. *Desf. Cor. Tourn.* p. 48.
t. 37.

Lactuca Cretica, sonchifolio, laciniato, pulchro flo-

re. *Tourn. Cor.* 55. *Gundelsheimer in Herb. Tourn. Icon. Aubriet.*

In aridis insularum Meli, Theræ, Astypalææ, copiosè crescit. Aprili floret.

756. *CHONDRILLA ramosissima. Sibth. n. 1900?*
non Prenanthes ramosissima. Allioni.

C. caule ramosissimo patulo ramis divaricatis strictis ferè nudis sulcatis, angulis spinosis, foliis omnibus dentato-spinosis, floribus minimis cylindricis, calycibus pubescentibus aculeis flavis adpersis.

Flores lutei, pappi pilosi albid.

A *P. hispidâ. Pallas.* cui proxima differt: caule patulo, ramis profundè sulcatis ferè angulatis hispidis crassioribus, calycibusque aculeis flavis instructis.

Passim in arvis circà Athenas. π

757. *LEONTODON lævigatus. Wild. Sp. 3. p. 1546.*
Taraxacum lævigatum. D.C. Fl. fr. Supp. n. 2952. (a)
In pratis Colchidis, ad arcem Soukoum-Kale. π

758. *HYOSERIS scabra. Sp. pl. 1158. Sibth. n. 1947.* — In siccis insulæ Melitæ. Aprili floret. \odot

759. *H. hedyphnoïs. Sp. pl. 1158. Hedyphnoïs Mons-peliensis. Sibth. n. 1948.* — In incultis Melitæ. Aprili. \odot

740. *H. Cretica. Sp. pl. 1159? Sibth. n. 1950?*

In plantâ nostrâ calyces verò glabri. In arvis insulæ Meli. Aprili. \odot

741. *PICRIS hieracioides. Sp. pl. 1115. Marsch. Fl. taur. n. 1602.* — In parvâ insulâ Berezen, propè Borysthenem. π

742. *HIERACIUM echioïdes. Wild. Sp. 3. p. 1587.*
Marsch. Fl. taur. n. 1611. — Frequens in lazaret Odes-sæ. Julio floret. π

743. *H. collinum*. *D. C. Fl. fr. Sup. n.* 2915. (a)
H. cymosum. *Wild. Sp. 3. p.* 1566. *H. auricula*. *Var. b.*
Marsch. Fl. taur. Sup. n. 1607. — In collibus graminosis, circa Trapezum. Junio florens. ☞

744. *H. foliosum*. *Wild. Sp. 3. p.* 1589. *Marsch. Fl. taur. n.* 1614. — Passim in lazaret Odessæ. Florens julio. ☞

745. *CREPIS nemausensis*. *Wild. Sp. 3. p.* 1592. *Sibth. n.* 1615. *Hieracium sanctum*. *Sp. pl.* 1127. — In herbidis Tauriæ, circa Theodosiam haud rarè. ☉

746. *C. montana*. Caule erecto basi folioso supernè ferè nudo multifloro, foliis radicalibus longissimis pinnatifidis, lobis ovalis latis integris, extimo subcordato apice rotundato, floribus magnis paucis, squamis calycinis pubescentibus margine membranaceis.

Affinis præcedenti, satis tamen differt radice perenni, foliis radicalibus amplis pinnatifidis, floribus quadruplè majoribus. — Frequens in montibus insulæ Coi. Maio floret. ☞

747. *C. hispida*. *Wild. Sp. 3. p.* 1601. *Marsch. Fl. taur. n.* 1624. *Barbcausia setosa*. *D. C. Fl. fr. n.* 2951. — In pascuis Odessæ haud rara. Floret maio. ☞

748. *C. vesicaria*. *Sp. pl.* 1152. (a) *Wild. Sp. 3. p.* 1594. *Sibth. n.* 1928.

Hieracium Creticum, endiviæ-folio. *Tourn. Cor.* 55. *Gundelsheimer in Herb. Tourn.*

Circa Byzantium ad sepes copiosè. Maio floret. ☞

749. *C. angustifolia*. Caule erecto scabro sulcato supernè ramoso, foliis inferioribus sinuatis seu pinnatifidis, caulinis amplexicaulibus longè et acutè sagittatis dentatis angustissimis, summis linearibus integris, floribus nu-

merosis paniculatis, pedunculis calycibusque nigricantibus hispidis, pappo piloso sessili.

Passim in pascuis Tauriæ, circà urbem Kerch. Floret maio. ○

750. *C. Dioscoridis*. *Sp. pl.* 1153. *Sibth. n.* 1959. Ad latus vulcani novæ Camini, propè Theram. Floret maio. ○

751. *C. parvi-flora*. *Desf. Cat. p.* 88. *Persoon. Syn.* 2. p. 376. — In arvis insulæ Astypalææ; florens maio. ○

752. *C. ramosissima*. Caule erecto scabro supernè ramosissimo, foliis caulinis scabris auriculatis linearibus longis, pedunculis multoties dichotomis sub flore vix pubescentibus, floribus minimis numerosissimis, squamis calycinis dorso ciliatis, pappo piloso sessili.

C. angustifolia proxima; sed discernitur floribus multò magis numerosis et duplò minoribus, foliis angustioribus, necnon pedunculis calycibusque tantum hirtis nequaquam nigricantibus.

In pascuis insulæ Berezen, antè fluvium Borysthenem. Julio florens. ⊙

753. *C. fuliginosa*. *Sibth. n.* 1947?

C. caule patulo hispido basi ramoso, ramis dichotomis paucifloris, floribus parvis plerumque solitaribus, foliis pilosis infernis lyratis seu acutè dentatis, summis amplexicaulibus basi sagittatis subintegris, calycibus atratis villosis vix calyculatis.

Planta interdum caule erecto simplici atque glabriusculo. Tum folia caulina dentata seu pinnatifida.

Ad sepes insulæ Meli ubique reperitur. Aprili floret. ○

754. *C. foetida*. *Sp. pl.* 1153. *Sibth. n.* 1951. *Barc-*

kausia foetida. D. C. Fl. fr. n. 2948. — Tum in summis montibus insulæ Coi, tum in arvis Astypalææ copiosè. Florens maio. ☉

755. *C. ambigua*. D. C. Fl. fr. n. 2945. *C. altissima*. Balbis. Cat. Hort. taur. p. 15. — In incultis insulæ Coi nequaquam rara. Floret maio. ♂

756. *ANDRYALA integri-folia*. Sp. pl. 1136. D. C. Fl. fr. n. 2958. *A. dentata*. Sibth. n. 1944. — In summo vulcano novæ Camini, propè Theram. ♂

757. *SERIOLA urens*. Sp. pl. 1139. Sibth. n. 1953. *S. Cretensis*. Bivon. Bernard. St. rar. Sic. man. 4. p. 15. *S. Cretensis*. Sp. pl. 1139. — Ad margines viarum in insulâ Melitâ. Aprili floret. ☉

758. *LAPSANA grandiflora*. Marsch. Fl. taur. Sup. n. 1629.

Plantæ nostræ flores equidem duplè majores quàm in *L. vulgari*, pedunculi autem calycesque glaberrimi.

Ad sepes circa Trapezum copiosissimè. Junio floret. ☉

759. *CICHORIUM spinosum*. Sp. pl. 1143. Sibth. n. 1965.

C. spinosum Creticum. Tourn. Inst. 479. Herb. Tourn. — Ubique in arenosis insulæ Astypalææ. Maio floret. ♂

760. *SCOLYMUS maculatus*. Sp. pl. 1143. Sibth. n. 1966. — In saxosis insulæ Sami. ☉

761. *CARTHAMUS Tingitanus*. Sp. pl. 1163.

Cnicus perennis, cæruleus, Tingitanus. Ex Gretâ. *Gundelshaimer in Herb. Tourn.* — In segetibus insulæ Astypalææ. Maio floret. z

762. *C. corymbosus*. Sp. pl. 1164. Sibth. n. 2015.

Brotera corymbosa. *Wild. Sp. 3. p. 2599.*—Frequens in arvis Sami, Cõi, Lesbi etc. Julio, augusto floret. π

763. *C. dentatus*. *Wild. Sp. 3. p. 1707. Sibth. n. 2009.*

Cnicus atractylidis folio et facie, incanus patulus, flore purpurascente. *Tourn. Cor. 33. Herb. Tourn. Icon. Aubriet.*

In incultis insulæ Scyri copiosè crescit. Julio floret. \odot

764. *C. leucocaulos*. *Sibth. n. 2011.*

C. caule nitido glaberrimo simplici supernè ramoso, squamis calycinis glabris longis dentato-spinosis, foliis uniformibus semi-amplexicaulibus pinnatifido-dentatis spinosis recurvis.

Flores pallidè violacei. Cum præcedente in insulâ Scyro. Julio floret. π

765. *CARLINA lanata*. *Sp. pl. 1160. Sibth. n. 2004.*—In apricis insulæ Astypalææ copiosè reperitur. \odot

766. *ATRACTYLIS cancellata*. *Sp. pl. 1162. Sibth. n. 2008.*

Cnicus exiguus, capite cancellato, semine tomentoso. *C. B. Herb. Tourn.*

In aridis insulæ Astypalææ passim crescit. Maio floret.

767. *A. gummifera*. *Sp. pl. 1161. Sibth. n. 2007.* Cnicus carlinæfolio acaulos gummifer aculeatus. *Tourn. Cor. 33. Icon. Aubriet.*—In collibus insulæ Scyri minimè rara. Julio florens. π

768. *LAPPA tomentosa*. *Lam. Ency. 1. p. 377.* *Arctium bardana*. *Wild. 3. p. 1632. Marsch. Fl.*

taur. n. 1655. — Circà Odessam frequens, ad muros. ♂

769. *ONOPORDUM acanthium.* *Sp. pl.* 1158. *Marsch. Fl. taur.* n. 1672. — Circà Theodosiam frequens in incultis. ♂

770. *O. Illyricum.* *Sp. pl.* 1158. *Sibth. n.* 1995. — In collibus *Astypalææ* copiosum. ♂

771. *O. macrocanthum.* *Wild. Sp.* 3. p. 1687. *Sibth. n.* 1994. — In arvis incultis insulæ *Psyrae*, copiosissimè julio floret. ♂

772. *O. Græcum.* *Wild. Sp.* 3. p. 1688. *Sibth. n.* 1996. *Herb. Tourn.* — In campis maritimis insulæ *Meli.* Maio floret ☉

773. *O. Tauricum.* *Wild. Sp.* 3. p. 1687. *Marsch. Fl. taur.* n. 1675. *O. elatum.* *Sibth. n.* 1998.

Carduus Creticus, acanthi folio viridi et glutinoso, flore purpurascente. *Tour. Cor.* 51. *Herb. Tourn.*

Valdè frequens in agris et cultis, circà *Trapezum.* Floret junio. ☉

774. *O. caulescens.* Caule erecto abbreviato folioso unifloro, foliis radicalibus amplissimis caule longioribus patentibus suprâ viridibus subtus cano-tomentosis, ad costam pinnatifidis, lobis approximatis laciniato-spinosis, squamis calycinis subglabris longè subulatis.

Omninò habitus *Cynaræ*, sed pappi simplices et decidui ad *Onopordum* referunt. Flores pupurei magni ferè ut in *O. Taurico.* Folia radicalia caule circitèr duplè longiora. Caulis tantum pedalis, sæpè brevior.

In collibus saxosis insulæ *Meli*, copiosè circà *Monasterium.* Aprili floret ☉?

775. *CARDUUS acanthoides.* *Sp. pl.* 1150. *Sibth. n.* 1975:

Caulis 3-4 pedalis supernè ramosissimus. Flores magni longè pedunculati. Calyces glaberrimi, squamis canaliculatis latis apice spinosis, exterioribus reflexis. Forsitàn species distincta?

In ruderatis circà Theodosiam omninò frequens. Junio floret. ☉

776. *C. Arabicus*. *Wild. Sp. 3. p. 1646.*—Passim in cultis insulæ Melitæ. Aprili floret. ☉

777. *C. uncinatus*. *Marsch. Fl. taur. Sup. n. 1645.**
C. foliis decurrentibus sinuatis spinosis crispis, calycibus globosis arachnoideo-villosis, squamis subulatis reflexo-uncinatis, pedunculis tomentosis sub flore inermibus.

In herbidis copiosè, ad oppidum Kerch. Maio floret. ♂

778. *C. hamulosus*. *Wild. Sp. 3. p. 1650. Marsch. Fl. taur. n. 1645.*—Cum præcedente passim occurrit in Tauriâ. ♂

779. *C. mollis*. *Sp. pl. 1156. Wild. Sp. 3. p. 1661. Sibth. n. 1978. Marsch. Fl. taur. n. 1655.*—Frequens in summis montibus insulæ Coi, etiàm in pascuis Tauriæ, circà oppidum Kerch. Floret maio. ☿

780. *CIRSIUM setosum*. *Marsch. Fl. taur. Sup. n. 1671.** Serratula setosa. Wild. Sp. 3. p. 1645.*—In cultis, ad vias frequens, propè Odessam. Julio floret. ♂

781. *C. incanum*. *Marsch. Fl. taur. Sup. n. 1671.*** Serratula ciliata. Wild. Sp. 3. p. 1645.*

irsium orientale, foliis laciniatis. *Tourn. Inst. 445,*
 Vulgare tam in herbidis Tauriæ, quàm in collibus circà Trapezum. Floret junio. ☿

782. *C. giganteum*. Desf. *Atl.* 2. p. 345. t. 221.
Persoon. Syn. 2. p. 388. *Carduus ciliatus*. Murray,
Com. Goet. p. 35. t. 5. — In sylvis Bulgariae copiosissime,
 ad pagum Ineada. Florens julio. π

783. *C. Syriacum*. *Carduus Syriacus*. *Sp. pl.*
 1153. *Cnicus Syriacus*. *Sibth. n.* 1992. — Inter segetes
 insulae Meli passim reperitur. Floret aprili. \odot

784. *C. Creticum*. *Carduus Creticus*. *Lam. Ency.*
 n. 20. *Cnicus leucocephalus*. *Wild. Sp.* 3. p. 1668.

C. foliis decurrentibus pinnatifidis supernè glabris; laciniis divaricatis spinosis; floribus parvis glomeratis, calycum squamis minutis subspinosis.

C. Creticum, altissimum; cardui lanceolati folio. *Tourn. Cor.* 31. *Herb. Tourn.*

Gaulis 6-8 pedalis, rami erecti, aculei longi flavescentes. Flores purpurei. — Frequens in arenosis maritimis insulae Sami, inter Heræum et ruinas veteris urbis. Junio florens. π

785. *C. polyanthos*. Caule erecto ramoso, foliis decurrentibus pinnatifidis subvillosis; laciniis divaricatis spinosis; floribus parvis numerosissimis confertis, calycum squamis minutis vix acutis.

Proximum præcedenti: sed differt caule ramosissimo, ramis patentibus, spinis foliorum et calycum brevioribus, floribus minoribus confertis non tantum 2-3 sed etiam 6-10 et amplius simul.

Ad paludem Lernæ copiosissime. Augusto floret. δ

786. *SERRATULA linearifolia*. *D. C. Ann. mus.*
 2. t. 9. n. 10. *S. multiflora*. *Wild. Sp.* 3. p. 1643. *Marsch. Fl. taur.* n. 1659. — Frequens in graminosis insulae Bezezen, propè Borysthenem. Fleret julio. π

787. *S. xeranthemoïdes*. Marsch. *Fl. taur.* n. 1638.
Centaurea radiata. Wild. *Sp.* 3. p. 2525. *Xeranthemum cruci-folium*. *Sp. pl.* 1201. — In pascuis Tauriæ ubique occurrit. Floret junio. ☞

788. *STHÆHELINA chamaepeuce*. Sibth. n. 2017.
Serratula chamaepeuce. *Sp. pl.* 1147.

Jacea Gretica frutescens, elychrisi folio, flore magno purpurascens. *Tourn. Cor.* 32. *Icon. Aubriet.*

Erumpit è rupibus elatis insularum Coi, Leri, Sami, etc. Junio floret. 5

789. *CHRYSOCOMA villosa*. *Sp. pl.* 1178. *Wild.*
Sp. 3. p. 1792. *Marsch. Fl. taur.* n. 1686.

Conyza Armena pumila incana, oleæ folio. *Herb. Tourn.* — In herbidis Tauriæ ubique occurrit. Floret augusto. ☞

II. POLYGAMIA SUPERFLUA.

790. *TANACETUM vulgare*. *Sp. pl.* 1184. *Marsch.*
Fl. taur. n. 1687. — Frequens circà Odessam. ☞

791. *ARTEMISIA absinthium*. *Sp. pl.* 1188. *Marsch.*
Fl. taur. n. 1699. — Ad littora Bulgariæ, in scopulo Sto-Joanne propè Sisopoli. ☞

792. *A. arborescens*. *Sp. pl.* 1188. *Sibth.* n. 2050.
 — Ad latera vulcani novæ Camini copiosè; propè Theram. Florens maio. ☞

793. *XERANTHEMUM annuum*. *Sp. pl.* 1201.
Marsch. Fl. taur. n. 1711. — In collibus apricis copiosissimè, circà Sevastopolem et Odessam. Julio floret. ☉

794. *X. inapertum*. *Wild. Sp.* 3. p. 1902. *Marsch.*
Fl. taur. n. 1712. — In arvis, circà Trapezum. ○

795. *GNAPHALIUM stachas*. *Sp. Pl.* 1195. *Sibth.*

n. 2055. — In collibus insularum Archipelagi frequens. ☞

796. *G. Orientale*. *Sp. pl.* 1195. *Sibth. n.* 2056.

Elychrysum Orientale. C. B. *Herb. Tourn.*

E. Orientale, foliis amplioribus subrotundis. *Cor.* 37. *Icon. Aubriet.* — In summis montibus insulæ Coi passim occurrit. Florens maio. ☞

797. *G. arenarium*. *Sp. pl.* 1195. *Marsch. Fl. taur.* n. 1702. — Communis in apricis, propè Sevastopolem et Odessam. Junio floret. ☞

798. **FILAGO Germanica**. *Sp. pl.* 1311. *Gnaphalium Germanicum*. *Sibth. n.* 2044. *Marsch. Fl. taur.* n. 1708. — In cultis-circà Trapezum. Junio florens. ☉

799. *F. Gallica*. *Sp. pl.* 1312. *Gnaphalium Gallicum*. *Sibth. n.* 2043. — In apricis insulæ Meli haud rarè. ☉

800. **MICROPUS erectus**. *Sp. pl.* 1313. *Sibth. n.* 2171.

Gnaphalium minus repens. C. B. *Herb. Tourn.* — Ad margines viarum, in insulâ Melitâ. ☉

801. *M. pygmaeus*. *Desf. atl.* 2. p. 307. *Filago pygmaea*. *Sp. pl.* 1311. *Sibth. n.* 2169. Inter segetes insulæ Meli, propè Monasterium. Aprili floret. ☉

802. *M. exiguus*. *Filago exigua*. ? *Sibth. n.* 2170.

M. caule exiguo dichotomo, floribus axillaribus terminalibusque involucrentibus, foliis ovato lanceolatis obtusis supernè glabriusculis subtús tomentosus, calycibus exterioribus villosis, interioribus glabris nitidis.

Gaulis vix bipollicaris. — In summo vulcano novæ Camini, propè Theram. Maio. ☉

803. *CONYZA limonifolia*. Sibth. n. 2051. *C. candida*. Wild. Sp. 3. p. 1923.

C. Cretica fruticosa, folio molli candidissimo et tomentosissimo. Tourn. Cor. 33. Herb. Tourn. — In rupibus insularum Coi, Leri et Sani. Junio floret. ♀

804. *SENECIO lividus*. Sp. pl. 1216. Sibth. n. 2061. — In summo vulcano insulæ novæ Camini propè Theram. Maio floret. ○

805. *S. squalidus*. Sp. pl. 1218. D. C. Fl. fr. n. 3172. — In incultis insulæ Meli frequens. Floret aprili. ♂

806. *S. vernus*. Bivona Bernardi. Sic. pl. c. 1. p. 73. *S. leucanthemi-folius*. Poiret. Itin. 2. p. 258.

A præcedenti differt staturâ altiore, pube magis copiosâ et foliorum lobis brevioribus et latioribus. — In pascuis Tauriæ. Maio floret. ○

807. *S. aquaticus*. Wild. Sp. 3. p. 1997. Sibth. n. 2065. — In nemorosis Bulgariæ, ad pagum Ineada. ♂

808. *S. erucifolius*. Sp. pl. 1218. Marsch. Fl. taur. n. 1725. — Copiosè occurit in collibus apricis circâ Sevastopolem. Floret junio. ♂

809. *S. tenui-folius*. Persoon. Syn. 2. p. 435? — In maritimis Tauriæ copiosissimè, circâ urbem Kerch. Floret maio. ♂

810. *ASTER amellus*. Sp. pl. 1226. Marsch. Fl. taur. n. 1731. — In herbidis haud rarè, propè Odesam. ♂

811. *INULA ensi-folia*. Sp. pl. 1240. Marsch. Fl. taur. n. 1753.

In plantâ nostrâ caules sæpius 4-5 flores gestant, ca-

lycesque ferè glabri sunt.—In lazaret Odessæ , julio floret. ¶

812. *I. odora*. *Sp. pl.* 1236. *Sibth. n.* 2073.

Aster luteus, radice odorâ. *C. B. Herb. Tourn.*

Occurrit in collibus siccis, circâ Sevastopolem. Junio floret. ¶

813. *I. Britannica*. *Sp. pl.* 1237. *Marsch. Fl. taur. n.* 1745.—Passim in nemorosis Bulgariæ, ad pagum Sisopoli. Floret julio. x

814 *I. Germanica*. *Wild. Sp. 3. p.* 2100. *I. media*. *Marsch. Fl. taur. Sup. n.* 576.

Flores corymbosi conferti. Pedicelli floribus æquales aut breviores.

Haud rara in nemorosis Bulgariæ, ad pagum Ineada, floret julio. x

815. *I. Orientalis*. *Wild. Sp. 3. p.* 1201. *I. Germanica*. *Marsch. Fl. taur. n.* 1752. *I. micranthos*. *Poiret. Ency. Sup. n.* 37.

Aster Armenius, salicis folio, flore luteo, minimo, umbellato. *Tour. Cor. 36. Gundelsheimer in Herb. Tourn.*

Differt à præcedente foliis minus rigidis, squamis apice reflexis, floribus duplò minoribus.—Reperitur in collibus Bulgariæ, circâ Sisopoli, Floret julio. x

816. *I. pulicaria*. *Sp. pl.* 1238. *Sibth. n.* 2077.—Ad rivos, in insulâ Thaso, augusto floret. ©

817. **DORONICUM** *Oriente*. *Wild. Sp. 3. p. D. Caucasicum*. *Marsch. Fl. taur. n.* 1755.—Valdè frequens in collibus nemorosis circâ Byzantium, ad pagum Therapia, maio ineunte floret. ¶

818. **TUSSILAGO** *farfara*. *Sp. pl.* 1215. *Sibth.*

n. 2058. — Circà Byzantium in umbrosis hand infrequens maio floret. π

819. *BELLIS annua*. *Sp. pl.* 1249. *Sibth. n.* 2087. — In graminosis circà Melitam omninò frequens, floret maio. \odot

820. *BELLIUM bellidioides*. *Lin. Mant.* 285. *Sibth. n.* 2088. — In fissuris rupium insulæ Ferasiæ, propè Theram, maio floret. \odot

821. *CHRYSANTHEMUM coronarium*. *Sp. pl.* 1254. *Sibth. n.* 2092.

Var. concolor radio discoque luteis sola reperitur inter segetes insulæ Melitæ.

Var. discolor radio albo discoque luteo copiosè occurrit in insulis Archipelagi. — Utraque floret aprili, maio. \odot

822. *PYRETHRUM Caucasicum*. *Wild. Sp. 3 pl.* 2156. *Marsch. Fl. taur. Sup. n.* 1757.

Chamæmelum Cappadocicum, foliis pinnatis. *Gundelsheimer in Herb. Tourn.*

Affine *P. alpino*. Sed distinguitur foliis magis compositis etiam caulinis, pinnulis longioribus et tenuioribus, calycis squamis carinâ nigricantibus. — In collibus elatis, propè Trapezum, floret junio. π

823, *P. partheni-folium*. *Wild. Sp. 3. p.* 2156. *Marsch. Fl. taur. n.* 1764

A *P. parthenio* dignoscitur, pedunculis paucioribus longioribus et florum radio duplò longiore. — Ad muros et sepes copiosissimè, circà Trapezum, junio floret. π

824. *A. mille-foliatum*. *Wild. Sp. 3. p.* 2160. *Marsch. Fl. taur. n.* 1765.

Facie et habitu simile *Achilleæ aureæ*, sed faciliè discernitur paleis nullis et seminibus pappo scarioso marginatis. — Abundat in graminosis circa Odessam ; julio floret. x

825. *MATRICARIA chamomilla*. *Sp. pl.* 1236. *Marsch. Fl. taur. n.* 1767. — In lazaret Odessæ minimè rara, julio. ○

826. *ANACYCLUS Creticus*. *Sp. pl.* 1258. *Sibth. n.* 2099. *Desf. an. Mus. v.* 11. *tab.* 22.

Cotula Cretica, maritima, minima, chamæmeli folio, capitulo inflexo. *Herb. Tourn.*

Copiosissimè occurrit in maritimis insularum Meli, Cimoli, Theræ, etc. Varietatem omninò flosculosam et tomentosam inveni in arenis Astypalææ ; floret maio. ○

827. *ANTHEMIS cotula*. *Sp. pl.* 1261. *Marsch. Fl. taur. n.* 1773. — Ad sepes Colchidis, junio florens. ○

828. *A. tomentosa*. *Sp. pl.* 1260. *Sibth. n.* 2103. — In arenis maritimis insulæ Sami, julio floret.

829. *A. Chia*. *Sp. pl.* 1260. *Sibth. n.* 2105.

Chamæmelum vernum, folio crassiore, magno flore ex insulâ Chio. *Herb. Tourn. Icon. Aubriet.*

Abundat in arvis Asiæ minoris, propè Byzantium ; maio. ○

830. *A. tinctoria*. *Sp. pl.* 1265. *Marsch. Fl. taur. n.* 1775. — Frequens in collibus circa Sevastopólem, necnon in apricis, propè Sisopolim. Floret julio. x

831. *A. montana*. *Sp. pl.* 1261. *Sibth. n.* 2109. *D. C. Fl. fr. n.* 3263. — In cacumine montium in-

sulæ Coi, ad altitudinem 400 hexapodum, maio floret. π

852. *A. altissima*. *Sp. pl.* 1259. *Sibth. n.* 2101. — Ad margines viarum insulæ Coi, in arvis Tenedi haud rara. Florens julio. ○

853. *A. Pontica*. *Wild. Sp. 3. p.* 2184. *Sibth. n.* 2110. — Communis in lazaret Odessæ, floret julio. π

854. *A. Ruthenica*. *Marsch. Fl. taur. n.* 1772. *A. maritima*. *Pallas. Ind. taur.*

A. foliis villosis incanis, pinnulis lanceolatis acutis, ramis floriferis corymbosis, receptaculo conico, paleis lanceolatis mucronatis, seminibus teretiusculis nudis, calyce pubescente, squamis obtusis margine scariosis.

Flores albi, paulò minores quàm in *A. altissimâ*.

In collibus graminosis copiosè circà Theodosiam maio floret. ○

855. *A. Austriaca*. *Wild. Sp. 3. p.* 2181. *Sibth. n.* 2108. — Abundat in collibus Colchidis ad arcem Soukoum Kale, etiàm propè Trapezum, florens junio.

856. *A. maritima*. *Sp. pl.* 1259. *Sibth. n.* 2102. — Ad littora maris vulgaris, in insulâ Melitâ, florens aprili. ○

857. *A. arvensis*. *Sp. pl.* 1261. *Sibth. n.* 2106. — In arvis maritimis insularum Melitæ Melique ubique occurrit. ○

858. *ACHILLEA compacta*. *Lam. Ency. 1. p.* 27. *A. distans*. *Wild. Sp. 3. p.* 2207. — Copiosissimè crescit in ruderatis; circà Theodosiam in Tauriâ. Florens julio. π

839. *A. nobilis*. *Sp. pl.* 1268. *Marsch. Fl. taur.* n. 1790. — Abundat in apricis Tauriæ, circà Sevastopolém, atque propè Odessam. Julio floret. τ

III. POLYGAMIA FRUSTRANEA.

* *Squamis calycinis lanceolato-acuminatis.*

840. *CENTAUREA erupina*. *Sp. pl.* 1285. *Sibth.* n. 2152. *Marsch. Fl. taur.* n. 1794.

Var. a. Pinnis integris vix ciliatis occurrit in graminosis Tauriæ, ad oppidum Kerch.

Var. b. Pinnis serratis serè pinnatifidis vulgaris est in apricis insulæ Meli, propè tumulos. — Utraque maio floret. \odot

841. *C. arenaria*. *Wild. Sp. 5. p.* 2278. *Marsch. Fl. taur.* n. 1806.

Squamæ calycis simplices subacutæ. — Valdè frequens in collibus aridis insulæ Tenedi. Floret junio. τ

** *Squamis ciliatis.*

842. *C. cyanus*. *Sp. pl.* 1289. *Sibth. n.* 2157. — In summis montibus insulæ Coi, ad altitudinem 400 hexapodum. Maio floret. \odot

843. *C. spinosa*. *Sp. pl.* 1290. *Sibth. n.* 2140.

Jacea Cretica, aculéata, incana. *Tourn. Inst.* 445. *Herb. Tourn.*

Copiosissima in collibus incultis insularum Meli, Sami, Leri, Tenedi, Lesbi, etc. Æstâte floret. \mathcal{B}

844. *C. cineraria*. *Wild. Sp. 5. p.* 2294. *C. candidissima*. *Lam. Ency.* 1. p. 669.

Flores purpurei, duplò minores quàm in *C. scabiosa*.
—In rupibus maritimis Bulgariæ, ad pagum Incada. Floret junio. π

845. *C. cinerea*. *Lam. Ency.* 1. p. 669. *Wild. Sp.* 3. p. 2294.

Variat foliis modò tomentosus modò ferè glabris.—In arenis maritimis et ad margines canalis Xerxis in peninsulâ montis Athonis. Floret junio. π

846. *C. ovina*. *Wild. Sp.* 3. p. 2292. *Marsch. Fl. taur.* n. 1826.—In collibus Tauriæ frequens, circà Sevastopolem. Florens junio. σ

847. *C. Orientalis*. *Sp. pl.* 1291. *Marsch. Fl. taur.* n. 1814.—Vulgata in lazaret Odessæ. Floret julio. π

848. *C. scabiosa*. *Sp. pl.* 1291. *Marsch. Fl. taur.* n. 1810.—In graminosis circà Odessam copiosa. Floret julio. π

*** *Squamis ciliatis apice spinosis.*

849. *C. diffusa*. *Lam. Ency.* 1. p. 675. *C. parviflora*. *Marsch. Fl. taur.* n. 1825. *Sibth. n.* 2157.—Abundat in arvis propè canalem Xerxis, necnon in lazaret Odessæ. Julio floret. σ

850. *C. eryngioïdes*. *Wild. Sp.* 3. p. 2321. *Lam. Ency.* 1. p. 675. *Sibth. n.* 2158.

Carduus eryngioïdes, capite spinoso. *Tourn.*—Frequens in collibus aridis insulæ Meli; propè monasterium. Maio floret. π

851. *C. raphanina*. *Sibth. n.* 2164.

C. caulescens, foliis longis subtomentosis pinnatis, pinnis ovatis coriaceis remotis utrinque valdè attenuatis,

flore maximo terminali solitario, squamis calycinis glabris ciliatis spinâ crassâ longissimâ terminatis.

Jacea Cretica, acaulos, cichoriifolio. *Tourn. Cor.* 32. *Icon. Aubriet.*

Caulis vix semi-pedalis interdum subnullus, basi ramosus. Pinni foliorum subpetiolati, quandoque pinnuli minores interjecti; spinæ calycis flavescens. Flos purpureus duplè vel triplè major quàm in *C. scabiosâ*. — In collibus elatis insulæ Sami, rariùs. Junio floret. z

**** *Calycinis spinis compositis.*

852. *C. Adami*. *Wild. Sp.* 3. p. 2310. *Marsch. Fl. taur.* n. 2310. *C. solsticialis*. *Pallas. Ind. taur.*

Squamæ potiùs ciliatæ quàm spinosæ, apice vix aculeatæ. — Communis in herbis, propè Odessam. Floret julio. ☉

853. *C. Sicula*. *Sp. pl.* 1298. *Sibth. n.* 2153. — In cultis insulæ Melitæ haud rara. Aprili florens. ☉

854. *C. exscapa*. *C. acicularis*? *Sibth. n.* 2155.

C. acaulis, foliis radicalibus humifusis tomentosissimis pinnatis, pinnis subincanis decurrentibus, floribus 4-8 confertis sessilibus è radice prolatis, calycibus glabris basi tomentosissimis, squamis ciliatis, spinâ elongatâ ramosâ terminatis.

Jacea Armena, incana, acaulos et multiflora, foliis laciniatis. *Gundelsheimer in Herb. Tourn. Icon Aubriet.*

Flores lutei, paulò majores quàm in præcedente. Frequentissimè reperitur in montibus insulæ Cei. In petrosis Leri. Florens maio, junio. z?

***** *Calycinis spinis simplicibus.*855. *C. pumila. Sp. pl. 1300. Sibth. n. 2166.*

In plantâ nostrâ flores purpurei, caulis subnullus, folia ferè glabra, squamæ calycis glaberrimæ, apice subciliatæ spinâ gracili patente elongatâ terminatæ.—Ad sepes insulæ Meli copiosissimè occurrit. Maio florens. π

856. GALACTITES *tomentosa. D. C. Fl. fr. n. 3071.*

Centaurea galactites. Sp. pl. 1300. Sibth. n. 2167.—In incultis insulæ Melitæ valdè communis. Aprili floret. π

IV. POLYGAMIA SEGREGATA.

857. ECHINOPS *spinus. Lin. Mant. 119. Desf. Atl. 2. p. 310. Sibth. n. 2175.*

E. Creticus, capite magno, aculeato. Tourn. Cor. 54. Icon. Aubriet.

In incultis insularum Goï, Sami, Tenedi, etc. Junio floret. π

858. *E. lanuginosus. Lam. Ency. 2. p. 336. Wild. Sp. 3. p. 2398. Sibth. n. 2175.*

Echinops parvus, tenuissimè divisus et lanuginosus, capite minori ex insulis M. Egei. Herb. Tourn. Icon. Aubriet.

Copiosè occurrit in arvis maritimis insulæ Meli. Maio floret. π

859. *E. microcephalus. Sibth. n. 2174.*

E. caule ramoso lanuginoso, foliis pinnatifidis utrinque subternatis planis, ramis foliosis, capitulis minoribus subsessilibus.

Ab *E. ritro* distinguitur foliis utrinque obscure viren-

tibus minimè canis, caulibus ramosis, floribus minoribus et ferè sessilibus. — In arvis Sami, ad canalem Xerxis, in umbrosis Bulgariae. Junio, julio florens. z

XIX. GYNANDRIA.

I. MONANDRIA.

860. *ORCHIS bifolia*. *Sp. pl.* 1531. *Marsch. Fl. taur.* n. 1852. — In sylvis Colchidis minimè rara. Junio florens. z

861. *O. saccata*. Labello obcordato trilobò, laciniâ media minore, petalis patentibus, spicâ laxâ, cornu germine paulò breviorè basi inflatâ, bracteis flore sublongioribus.

Proxima *O. laxiflora*; sed dignoscitur foliis latioribus, bracteis longioribus, prasertim calcari basi saccato nunquam apice emarginato. — Cum præcedente in umbrosis Colchidis. Junio florens. z

862. *O. pyramidalis*, *Sp. pl.* 1532. *Sibth. n.* 2177. — In collibus apricis insulae Melitæ haud infrequens; floret aprili. z

863. *O. condensata*. *Desf. atl.* 2. p. 516. *Persoon. Syn.* 2. p. 565. — In aridis insulae Melitæ. Aprili floret. z

864. *O. coriophora*. *Sp. pl.* 1552. *Sibth. n.* 2178. — In apricis insulae Meli copiosa aprili florens. z

865. *O. cassidea*. *Marsch. Fl. taur. Sup.* 1835.

O. coriophora. b. inodora. D. C. Fl. fr. Sup. n. 2608.

O. labello tripartito; laciniis inaequalibus dependenti-

bus, petalis in cucullo connatis, denticulis tantum apicis liberis longè acuminateis, cornu conico recurvo germine paulum brev' ore.

Præcedenti affinis; attamen differt floribus majoribus laxioribus amœnè variegatis, cucullo lanceolato longè acuminateo, bracteis acutis scariosis albidis; præsertim odore nullo. Ad sequentem accedit habitu formæque spicæ et cuculli, sed statim distinguitur floribus duplè minoribus, et labelli lobis integris. — In ericetis scopuli St-Istad, propè Cimolum. Maio florens. π

866. *O. sancta*. *Sp. pl.* 1330.

O. bulbis indivisis, caule folioso, labello dilatato trilobo, laciniâ mediâ integrâ lineari subulatâ multò longiore, lateralibus striatis dentatis serò laciniatis, petalis connatis in cucullo incurvo apice tantum triaristato. Calcare recurvo germine brevior.

Species formosissima. Caulis sesquipedalis bipedalisve foliosus, folia radicalia oblongo-lanceolata basi attenuata, superna subimbricata latè vaginata in discum brevem acutum abeuntia, flores elegantissimi magni albo purpureoque variegati in spicam 4-6 uncialem dispositi; bracteæ scariosæ acuminatæ germine subæquales. Floris labellum cum cucullo anticè recurvo longèque acuminateo rostrum avis sæpè ludunt.

Ad sepes insulæ Coi communis. Maio florentem legi. π

867. *O. mascula*. *Sp. pl.* 1555. *Sibth. n.* 2180. — Circà Byzantium, in nemorosis. Maio floret. π

868. *O. morio*. *Sp. pl.* 1353. *Sibth. n.* 2179. *Marsch. Fl. taur. n.* 1837. — In collibus Meli, in pascuis Tauriæ propè Kerch' atque Theodosiam frequens. Floret maio. π

869. *O. provincialis*. *D. C. Fl. fr. Sup. n.* 2008 (a).
Loisel. Fl. gall. 2. p. 603. *O. pallens*. *Savi. Fl.*
Pis. 2. p. 300.

Orchidis species ex nemorosis Carthusiæ Laverno.
Herb. Tourn.

In nemoribus circà Byzantium frequens. Floret
 maio. ☞

870. *O. Brachystachys*. Foliis linearibus acutis, labello
 trilobato, laciniâ mediâ integrâ lateralibus subæquali, petalis
 lanceolatis striatis acuminatis conniventibus, cornu gra-
 cili descendente germine longiore; bracteis lanceolatis
 longissimè aristatis: spicâ longissimâ.

Flores albidis parvi; spica vix pollicem longa, bractearum
 in longissimas aristas desinent floresque superant. — In
 apricis insulæ Meli. Aprili floret. ☞

871. *O. papilionacea*. *Sp. pl.* 1331. *Sibth. n.*
 2185.

O. Orientalis et *Lusitanica*, flore maximo, papilio-
 nem referente. *Tourn. Cor.* 30. *Icon. Aubriet.*

Frequens in collibus Meli, floret aprili. ☞

872. LIMODORUM *abortivum*. *D. C. Fl. fr. n.*
 2048. *Orchis abortiva*. *Sp. pl.* 1336. — In petrosis in-
 sulæ Meli, aprili florens. ☞

873. SERAPIAS *lancifera*. *St. Amans. Fl. agen.*
 p. 378.

Orchis Gallo-Græca, flore ferrugineo maximo. *Herb.*
Tourn.

S. bracteis maximis lanceolatis flore longioribus;
 labello tripartito; laciniis lateralibus obtusis erectis,
 mediâ lanceolatâ acuminatâ, disco piloso dependente.

Quasi media inter *S. lingam* et *S. cordigeram*; à

primâ differt labelli disco piloso , ab alterâ laciniâ mediâ lanceolatâ minime cordatâ , ab utrâque caule aliore floribus et bracteis majoribus.

Valdè frequens in collibus insulae Meli necnon in graminosis Colchidis , ad arcem Soukoum-Kale , floret maio , junio. π

874. *EPIPACTIS ensi-folia*. *Wild, Sp. 4. p. 85. Sibth. n. 2205.*—Circâ Byzantium copiosa , in nemorosis , maio floret. π

II. HEXANDRIA.

875. *ARISTOLOCHIA clematitis*. *Sp. pl. 1364. Marsch. Fl. taur. n. 1860.*—Ad sepes in Colchide iniquè rara , junio floret. π

XX. MONOECIA.

I. TRIANDRIA.

876. *CAREX schænoïdes*. *Wild. Sp. 4. p. 226. Marsch. Fl. taur. n. 1872. D. C. Fl. fr. n. 1704.*—In arenosis maritimis Tauriæ , propè Sevastopolen π

877. *C. nutans*. *Wild. Sp. 4. p. 299. Marsch. Fl. taur. n. 1892.*—Abundat in pascuis Tauriæ , ad Bosphorum Cimmericum , maio florens. π

878. *C. intermedia*. *Goodenough. tr. Lin. 2. p. 154. C. spicata. Lam. Ency. 5. p. 581. C. disticha. D. C. Fl. fr. n. 1705.*—In herbidis Tauriæ propè Kerch ; etiam in arenosis Colchidis ad arcem Soukoum-Kale , maio floret. π

879. *C. remota*. *Wild. Sp. pl. 1385. Marsch. Fl.*

taur. n. 1877. *Sibth. n.* 2220. — Frequens occurrit in umbrosis Colchidis et Bulgariae, junio florens: z

880. *C. vulpina*. *Sp. pl.* 1382. *Marsch. Fl. taur. n.* 1874. — In pratis Colchidis haud rara, maio florens. z

II. TETRANDRIA.

881. *URTICA dioica*. *Sp. pl.* 1596. *Sibth. n.* 2245. *Marsch. Fl. taur. n.* 1902. — Propè Byzantium et Odessam; in ruderalis ubique reperitur. z

882. *PARIETARIA officinalis*. *Sp. pl.* 1492. *Sibth. n.* 571. — Circà Byzantium, in ruderalis abundat. z

885. *P. Cretica*. *Sp. pl.* 1492. *n.* 575.

P. minor, Cretica, capsulis seminum alatis. *Herb. Tourn.*

In rupibus insularum Meli, Cimoli, Camini novae propè Theram, aprili floret. z

III. POLYANDRIA.

884. *POTERIUM sanguisorba*. *Sp. pl.* 1411. *Marsch. Fl. taur. n.* 1911. — Copiosum in herbidis Tauriae propè Kerch atque ad sepes Colchidis, maio floret. z

885. *P. spinosum*. *Sp. pl.* 1412. *Sibth. n.* 2258.

Pimpinella spinosa seu *sempervirens*. *Herb. Tourn.* — In collibus siccis insularum Archipelagi ubique crescit. Floret maio. y

886. *QUERCUS agrilops*. *Sp. pl.* 1414. *Sibth. n.* 2264.

Q. Orientalis, castaneae folio, glande recondita in

cupulâ crassâ et squamosâ. *Tourn. Cor. 40. Herb. Tourn.*

In insulâ Lero , in littore Attico , in campis Trojanis hæc pulchra species copiosè reperitur.

887. *Q. pseudo-coccifera. Desf. atl. 2. p. 549. Persoon. syn. 2. p. 568.*

Arbos fastigiata 20-25. pedalis. In montibus insulæ Scyri. 5

888. *Q. pubescens. Wild. Sp. 4. p. 450. Marsch. Fl. taur. n. 1915.*—In nemoribus Bulgarix. 5

889. *CARPINUS betulus. Sp. pl. 1416. Marsch. Fl. taur. n. 1919.*—Arbos eximiæ magnitudinis in sylvis Colchidis. 5

890. *PLATANUS Orientalis. Sp. pl. 1417. Sibth. n. 2276.*—Circâ Byzantium vulgaris. 5

891. *ARUM dracunculus. Sp. pl. 1367. Sibth. n. 2277.*—In montibus elatis insulæ Coi copiosè. Maio floret. 7

IV. MONADELPHIA.

892. *CROTON tinctorium. Sp. pl. 1425. Sibth. n. 2287.*—Abundat in arvis Argolidis. Augusto florens. 6

893. *BRYONIA dioïca. Wild. Sp. 4. p. 621. Sibth. n. 2252.*—Ad sepes in insulâ Astypalæâ. Maio floret. 7

894. *B. Cretica. Sp. pl. 1459. Sibth. n. 2253. Desf. Cor. p. 91. t. 70.*

B. cretica, maculata. C. B. Herb. Tourn.—Frequens in ruderatis insulæ Meli. Florens aprili. 7

XXI. DIOECIA.

I. DIANDRIA.

895. HIPPOPHAE *rhamnoïdes*. *Sp. pl.* 1452. *Marsch. Fl. taur. n.* 1943.—In sylvis Colchidis copiosissimè crescit. ♪

II. TRIANDRIA.

896. FIGUS *carica*. *Sp. pl.* 1513. *Sibth. n.* 2335.—In Archipelagi saxosis ubique. ♪

III. PENTANDRIA.

897. PISTACIA *terebinthus*. *Sp. pl.* 1455. *Sibth. n.* 2307.—In nemoribus Archipelagi frequens. Colitur in arvis insulæ Coi; tum fit arbos ramosa fastigiata 30-40 pedalis. ♪

898. *P. lentiscus*. *Sp. pl.* 1455. *Sibth. n.* 2308.—Vulgaris in insulis Archipelagi. ♪

IV. OCTANDRIA.

899. POPULUS *alba*. *Sp. pl.* 1463. *Sibth. n.* 2315.—Ad littora maris in sinu Pelasgo. ♪

900. *P. tremula*. *Sp. pl.* 1464. *Sibth.* 2316.—Circà Byzantium haud rara. ♪

V. MONADELPHIA.

901. JUNIPERUS *oxycedrus*. *Sp. pl.* 1470. *Sibth. n.* 2322.—In insulis Melo, Coo, Samò etc. Ubique reperitur. ♪

902. EPHEDRA *monostachya*. *Sp. pl.* 1472. *Marsch.*

Fl. taur. n. 1962. — In herbidis Tauriæ copiosè, ad oppidum Kerch. Florens maio. ♪

905. *E. distachya. Sp. pl.* 1472. *Sibth. n.* 2528. — In insulâ Melo, in rupibus novæ Camini, propè The-ram, Maio florons. ♪

XXII. CRYPTOGRAMIA.

PILICES.

904. *CHEILANTHES suaveolens. Swartz. Fil.* 127. *Sibth. n.* 2567. *Polypodium fragrans. Desf. atl.* 2. p. 408. t. 257. *Adiantum odorum. D. C. Fl. fr. Sup. n.* 1401. — In rupibus insulæ Astypalææ. ♪

905. *PTERIS aquilina. Sp. pl.* 1535. *Sibth. n.* 2564. In summo vulcânô novæ Camini, propè The-ram. ♪

906. *ASPIDIUM aculeatum. Wild. Sp.* 5. p. 258. *Sibth. n.* 2552. *Polypodium aculeatum. Sp. pl.* 1552. — In sylvis Colchidis ad arcem Soukoum-Kale, necnon propè Trapezum. ♪

907. *ACROSTICHUM leptophyllum. D. C. Fl. fr. n.* 1452. *Polypodium? leptophyllum. Sp. pl.* 1555. *Sibth. n.* 2548. *Grammitis leptophylla. Swartz. fil.* 25. 218.

Adiantum minimum, folio vario. *Herb. Tourn.*

Ad torrentes insulæ Meli, in novâ Camini propè The-ram sub rupibus vulcaniis ferè nudis. ♪

ALGÆ.

Nota. L'article suivant sur les Thalassiphytes appar-tient entièrement à M. Lamouroux professeur d'histoire

naturelle à Caen, correspondant de l'Institut, de la Société Linnéenne de Paris, etc., et que je m'honore de compter au nombre de mes amis. A mon retour de la mer Noire je partageai avec lui toutes les plantes marines que j'avais rapportées de mon second voyage et ce savant naturaliste a bien voulu me communiquer son travail. Je suis trop heureux de pouvoir ajouter à mon faible essai cet intéressant morceau.

« *FUCUS natans. var. spinosa.* Ramis spinosis; foliis brevibus undulatis; fructificationibus ramosis brevissimis. Constantinople.

« (n) Cette variété très-commune dans le canal de Constantinople doit constituer une espèce. Presque tous les botanistes l'ont confondue avec le *fucus natans*.

« *F. linifolius.* Turn. Melos.

« *F. fimbriatus.* Desf. Melos.

« *F. abies.* Bertol. Melos, Caffa, Soukoum, Nicomédie, Trébisonde, Sévastopole.

« *F. selaginoïdes.* Turn. Melos.

« *F. ericoïdes.* Gmel. Melos.

« *F. volubilis.* Linn. Nicomédie.

« (n) Il paraît que les fucacées sont très-rares dans la mer Noire. Le *fucus abies* est le seul que M. d'URVILLE y ait trouvé. Le groupe si nombreux des *fucus* vésiculeux, les grandes laminaires, les éléantes Desmaresties ne paraissent pas y exister.

« *DELESSERIA nervosa.* Lamour. Caffa, Melos, Soukoum, Nicomédie, Sévastopole.

« *D. ocellata*. Lamx. Melos.

« *GELIDIUM corneum*. var. *arbuscula*. Lamx. Melos.

« *G. corneum*. var. *hypnoïdes*. Lamx. Soukoum, Sévastopole.

« *G. corneum*. var. *setacea*. Lamx. ramis longis setaccis. var. *nova*. Trébizonde.

« *LAURENCIA gelatinosa*. Lamx. Sévastopole.

« *L. pistillaris*. Sp. nov. ramis sparsis; ramulis pistilliformibus ad apicem ramorum. Caffa.

« (n) Cette laurencie diffère de l'*obtusà* par sa grandeur beaucoup plus considérable, par le petit nombre de ses rameaux, enfin par la forme des ramuscules semblables à des pistils ou de petites massues très développées aux extrémités.

« *HYPNEA spinulosa*. Lamx. Melos, Nicomédie.

« *GIGARTINA marginalis*. Lamx. Soukoum.

« *G. tristis*. Sp. nov. Pumila, atropurpurea, cespitosa vel dumetosa, ramosissima; ramis rigidis, numerosis, brevibus, apicibus sæpè bifurcatis, tuberculis sparsis. Trébizonde.

« Cette gigartine diffère de l'*acicularis* par sa petitesse, par la roideur de toutes ses parties, par sa couleur d'un pourpre presque noir, enfin par ses rameaux plus nombreux et plus courts.

« *G. Urvillii*. Sp. nov. cespitosa, ramosa, elegantissimè colorata; ramis teretibus sparsis; ramulis fusiformibus ad apicem ramorum numerosissimis, tuberculis sparsis. Constantinople, sur les rochers et sur les coquilles.

« (n) J'ai dédié cette plante à M. D'URVILLE en témoignage de ma sincère amitié ; c'est la plus jolie de toutes les hydrophytes qu'il a rapportées de son voyage. Elle offre les plus brillantes nuances de rouge, de jaune et de vert. Quoique haute à peine de deux pouces, elle a un port très-élégant voisin de celui des *Gig. capillaris* et *clavellosa*.

« *G. confervoïdes*, et var. *Lamx.* Melos.

« *G. uvaria.* *Lamx.* Melos.

« (n) Il est à remarquer que parmi les floridées rapportées par notre voyageur, il ne s'y trouve aucune plocamie, aucun chondrus et une seule delesserie, genres si communs dans l'Océan européen. Cette delesserie habite dans toute l'étendue de la Méditerranée et de la mer Noire.

« *DICTYOPTERIS polipodioides.* *Lamx.* Melos.

« *PADINA pavonia.* *Lamx.* Melos, Nicomédie.

« *P. squamata.* *Lamx.* Nicomédie, Soukoum.

« *FLABELLARIA Desfontainii.* *Lamx.* Melos.

« (n) Les dictyotées assez communes dans la Méditerranée paraissent rares dans la mer Noire ; M. D'URVILLE n'a trouvé que des fragmens du *Padina squamata* et pas un seul *Dyctyota*, genre répandu dans toutes les mers tempérées. J'attribue ce fait au peu de salure des eaux de la mer Noire.

« *ULVA lactuca.* *Linn.* Melos, Nicomédie, Constantinople, Cassa, Soukoum, Trébizonde.

« *U. umbilicalis.* *Linn.* Melos, Constantinople.

« *U. crispa.* *Linn.* Melos, Trébizonde, Constantinople.

- « *U. caulescens*. Lamx. Caffa.
- « *U. linza*. Linn. Nicomédie.
- « *U. compressa*. Lin. Nicomédie, Trébizonde.
- « *U. compressa*. var. Id. Id.
- « *BRYOPSIS setacea*. Sp. nov. Ramulis sparsis numerosissimis, setaceis, separatim vix conspicuis. Constantinople.
- « *CAULERPA prolifera*. Lamx. Melos, Soukoum, Lerne, dans la mer en face du marais; elle y est très-commune.
- « (n) Les Ulvacées paraissent proportionnellement plus nombreuses dans la mer Noire que les autres hydrophytes.
- « *CERAMIUM hirsutum*. Fl. fr. Sevastopole.
- « *C. scoparium*. Fl. fr. Id.
- « *C. rubrum*. Roth. Constantinople, Soukoum, Caffa, Trébizonde.
- « *C. elegans*. Var. Melos, Caffa.
- « *C. atropurpureum*. Var. nov. Tenuissima, elongata, ramis setaceis. Caffa.
- « *C. aspergillosum*. Sp. nov. Vix conspicuum, roseum, ramosum; ramulis ad apicem ramorum fasciculatis. Constantinople.
- « *C. rupestre*. Var. nov. tenuissima. Constantinople.
- « *C. linum et Var.* Constantinople, Trébizonde.
- « *C. rugosum*. Sp. nov. Viride, ramosum; ramis sparsis superficie rugosa. Caffa.
- « *C. sericeum*. Constantinople. Id. Var. splendens, tenuissima. Constantinople.

« D'après cette liste, l'on voit que M. D'URVILLE a rapporté de son voyage plus de 40 espèces ou variétés d'hydrophytes parmi lesquelles il y en a un quart environ de nouvelles. Si l'on considère le peu de temps qu'il a pu donner à la recherche des plantes marines, cette quantité paraîtra plus grande. Telle qu'elle est, elle sert à démontrer, 1°. que les hydrophytes qui aiment les eaux saumâtres, telles que les ulves, y sont proportionnellement plus communes que les autres; 2°. que les fucacées y sont très-rares, ainsi que les delesseries et les dictyotées; 3°. que plusieurs genres nombreux en espèces, répandues dans presque toutes les mers, manquent dans la mer Noire

« De l'examen des hydrophytes, je crois pouvoir encore en tirer cette conséquence : il doit y avoir peu de polypiers flexibles et encore moins de polypiers madréporiques dans le Pont-Euxin. Leur nombre doit augmenter à mesure que l'on se rapproche de la Méditerranée. »