



L'Échange, Revue Linnéenne

Coléoptères du globe (suite) ⁽¹⁾

Ropica nitidomaculata n. sp. [Cerambyc.]. Minutus, elongatus, postice attenuatus, sat dense griseo pubescens, pro parte denudatus, niger, elytris paulo rufescentibus, postice in disco late denudato-maculatis, irregulariter punctatis, membris nigris. L. 3 mill. Chine. — Caractérisé par son dessin élytral.

R. obliquefasciata n. sp. Elongatus, postice attenuatus, nitidus, rufescens, pro parte obscurus, membris rufis; thorace luteo vittato, illo parum breve, sat dense punctato; elytris griseo aut luteo maculatis, ad suturam antice albo notatis, ad medium anguste et oblique albo fasciatis, diverse, pro parte irregulariter, punctatis. L. 5 mill. Java. — Paraît voisin de *obliquefasciata* Br., plus clair, avec une autre disposition des dessins élytraux.

Ægocynus tonkinensis n. sp. [Cerambyc.]. Elongatus, opacus, nigro-piceus, membris pro parte rufis, elytris ad scutellum minute, infra humeros late et longe rufo-griseo maculatis, post medium oblique rufo-griseo fasciatis, apice rufo-griseo notatis. L. 5 mill. Tonkin. — Plus allongé que *inlineatus* Pic, avec les dessins élytraux différents.

Thereselia n. g. [Cerambyc.]. Capite antice breve, oculis valde emarginatis; antennis gracilibus, corpore longioribus, scapo elongato, thorace brevior; thorace breve, lato, supra multi impresso, lateraliter postice gibbuloso; elytris thorace latioribus, elongatis, postice attenuatis; pedibus elongatis, simplicibus, articulo 1° tarsarum posticarum elongato; coxis distantibus. Peut se placer dans le voisinage de *Driopea* Pasc., forme du thorax différente, antennes moins longues. Genre établi pour l'espèce suivante.

Thereselia modesta n. sp. Elongatus, antice et postice attenuatus, parum nitidus, griseo et luteo pubescens, rufus, antennis pro majeure partie, femoribus posticis apice tibiis apice tarsisque pro parte piceis; capite medio sulcato; thorace subtransverso; elytris ad suturam longitudinaliter impressis, sat fortiter, apice minute et irregulariter, punctatis, pro parte albo tessellatis. L. 7 mill. Cochinchine.

Pseudanæsthetis bicoloripes n. sp. [Cerambyc.], du Tonkin, de forme allongée, est peu brillant, noir, en partie teinté de roux en dessus et sur les membres; le dessus du corps présente de nombreuses mouchetures pubescentes jaunes, ou grises, en partie réunies. L. 8 mill. Tonkin.

P. atripes mihi, du Tonkin, est noir avec le dessus du corps roux, la tête, en partie foncée, est plus petite que chez *langana* Pic, avec le thorax moins fortement ponctué et les élytres pubescents.

(1) Toutes les nouveautés décrites sont dans la collection Pic.

Ostodes griseoapicalis n. sp. [Cerambyc.]. Parum elongatus, subopacus, griseo pubescens et brevis fusco hirsutus, rufo-piceus, articulis 3 et sequentibus antennarum tibiisque ad medium albo annulatis; thorace parum elongato, supra multi gibbuloso; elytris parum elongatis, postice attenuatis, apice oblique truncatis, sparse minute griseo maculatis et apice ad suturam griseo notatis. L. 11 mill. Assam. — Voisin de *pauperata* Pasc., moins allongé, revêtement des élytres différent.

O. tonkinea n. sp. Elongatus, nitidus, griseo pubescens, fimbriis pro parte denudatis, niger, pro parte piceus; elytris subparallelis, postice attenuatis, griseo pubescentibus, pro parte denudatis. L. 10 mill. Tonkin. — Plus parallèle que *Coomani* Pic, avec les élytres à pubescence presque uniforme.

O. rufipennis n. sp. Angustatus, nitidus, griseo-luteo pubescens, niger, pro parte piceus, elytris rufis, ad scutellum, lateraliter infra humeros, ad medium, ad apicem nigro fasciatis, membris griseo annulatis; thorace supra intuberculato et paulo granuloso, lateraliter gibbuloso dentato; elytris elongatis, ad basin infasciculatis et parum impressis, paulo granulosis, disperse punctatis. L. 8 mill. Tonkin.

O. basilana mihi, de Basilan, voisin du précédent, est plus allongé, le dessus du corps est en partie roux, les élytres ont un tubercule pileux sur leur base et sont plus longuement atténués, leur apex est largement roux, il n'y a pas de macule scutellaire noire, les dessins latéraux noirs sont plus étendus et forment en arrière deux sortes de fascies noires, en partie jointes.

Falsatimura inermis n. sp. [Cerambyc.]. Elongatus, parallelus, subnitidus, griseo pubescens, sat fortiter et dense punctatus, niger, elytris pro parte reducte griseo lineatis, ante apicem transverse griseo fasciatis, apice inermibus, subrotundatis. L. 7 mill. Tonkin. — Très distinct de *grisescens* Pic par les élytres inermes au sommet, le thorax moins court, etc.

Agelasta (Dissosira) griseonotata n. sp. [Cerambyc.]. Oblongus, postice attenuatus, nitidus, niger, albo pubescens et pro parte denudatus; thorace transverso, multi nigro maculato; elytris diverse albo variegatis aut nigro fasciatis et maculatis, mill. Tonkin. — A placer près de *tonkinea* Pic, élytres plus courts, à revêtement différent.

Apomecyna subuniformis n. sp. [Cerambyc.]. Parum elongatus, subopacus, niger, fere uniformiter sat dense griseo pubescens; capite sulcato; thorace parum lato, fortiter punctato; elytris diverse lineato-punctatis, apice brevis subtruncatis. Long. 9 mill. Tonkin. — Voisin de *excaviceps* Pic, caractérisé par l'absence de macules blanches nettes sur les élytres.

Pseudopsacotha lineata n. sp. [Cerambyc.]. Noir, avec des lignes pubescentes sur l'avant-corps et une bande discale blanche irrégulière sur chaque élytre, en partie oblitérée ou marquée de parties glabres. L. 25 mill. Annam.

Macrochenus tonkineus v. *n. semijunctus* [Cerambyc.]. Les macules blanches des élytres sont en partie et irrégulièrement jointes. Tonkin.

Sybra truncatipennis n. sp. [Cerambyc.]. Elongatus, parum nitidus, paulo griseo aut luteo pubescens, rufescens; oculis distantibus; antennis parum elongatis, scapo, articulis 3°, 4° fere æqualibus, griseo annulatis; thorace parum brevis, lateraliter

sinuato ; elytris parum elongatis, irregulariter punctatis, ad basin inæqualibus, apice deflexis et oblique truncatis, vage albo tessellatis. L. 5 mill. Tonkin. — Très caractérisé par sa structure élytrale.

Zonabris tibialis v. n. Maistrei [Héter.]. Fascies antérieures jaunes des élytres agrandies et se joignant sur la suture, la postmédiane un peu interrompue, avant-corps métallique avec la tête verte. Chari.

Z. atrimembris n. sp. Parum elongatus, paulo nitidus, elytris subopacis, parum pubescens, niger, metallico tinctus, elytris signaturis luteis ornatis, in singulo : maculis duabus basalibus, fascia sinuata mediana, maculis duabus post medium sitis. L. 7 mill. Provenance incertaine. — Espèce caractérisée par sa petite taille jointe à ses dessins élytraux. Peut se placer près de *diversenolata* Pic.

Othnius indicus n. sp. (1) [Hété.]. Oblongo-elongatus, nitidus, longe griseo pubescens et paulo luteo hirsutus, fortiter diverse sparse punctatus, olivaceo metallicus, elytris signaturis luteis pro parte sinuatis, ad basin usque ad apicem ornatis, abdomine et membris testaceis, clava antennarum obscura, parum lata. L. 4 mill. Indes.

Aulexis aureopilosa n. sp. [Phyt.]. Oblongus, dense aureo pubescens, niger, abdomine membrisque rufis ; thorace lateraliter multi dentato ; elytris latis et brevibus, postice attenuatis. L. 5 mill. Luzon. — A placer près de *philippinensis* Jac.

A. rufescens n. sp. Oblongus, minute parum dense luteo pubescens, rufus, thorace lateraliter tridentato. L. 4 mill. Luzon. — Ressemble à *Donckieri* Pic, en diffère par le thorax plus finement et plus densément ponctué, à sillon transversal moins profond.

Leucastea subapicalis n. sp. [Phyt.]. Oblongus, nitidus, rufo-testaceus, elytris ante apicem externe reducte piceo lineatis, membris rufis, pedibus posticis pro parte obscuris. L. 7 mill. Dahomey. — Caractérisé par son dessin élytral particulier.

L. Le Testui n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, rufo-testaceus, elytris in singulo ad medium et in disco minute nigro maculatis, antennis testaceis, tibiis pro majore parte tarsisque nigris ; elytris fortiter et sparse punctatis. L. 7 mill. Gabon. — Diffère de *bimaculata* Jac. par les pattes bicolores et l'avant-corps immaculé.

L. Alluaudi n. sp. Oblongus, sat latus, nitidus, niger, supra et abdomine rufo-testaceis, capite inter oculos nigro maculato et thorace externe minute piceo maculato, membris nigris ; elytris antice distincte impressis, sat minute et sparse punctatis, in singulo et in disco ad medium minute nigro maculatis. L. 8 mill. Kilimandjaro. — Plus robuste que le précédent, avec l'avant-corps maculé, les membres foncés.

Lema Perroudi n. sp. [Phyt.]. Oblongus, niger, thorace rufo-luteo bimaculato, élytris luteis, sutura anguste nigra, apice nigro maculatis, lateraliter sat late et longe nigro vittatis. L. 6 mill. Bogota. — Voisin de *semisepta* Lac., moins allongé et dessins des élytres différents.

(1) Cette espèce peut rentrer dans un s.-genre nouv. (*Lateothnius*), caractérisé par la forme robuste, le thorax sans denticules, subsinué latéralement, un peu plus large avant la base.

L. diamantinana n. sp. Oblongus, rufo-brunneus, elytris lateraliter anguste et in disco late luteo vittatis, vitta apice ad marginem juncta ; thorace breve et lato, postice latiore, ad medium valde strangulato. L. 6 mill. Brésil. — Voisin de *graminica* Lac. par sa coloration, en diffère par le thorax robuste.

Chauliognathus luteicollis n. sp. [Maiaç.]. Elongatus, postice attenuatus, pro parte nitidus, rufus aut luteus, capite pro majore parte nigro, tibiis tarsisque nigris (antennis fractis); elytris elongatis, postice attenuatis et paulo dehiscentibus, minute granulosus, postice subopacis, ad basin nitidis. L. 10 mill. Brésil. — Caractérisé par sa forme allongée et sa coloration.

C. multidentatus n. sp. Parum elongatus, postice attenuatus, subnitidus, elytris ad suturam postice breve multi dentatis, niger, abdomine rufo, membris pro parte nigris. Thorace rufo-testaceo, medio nigro et elytris ad basin et ad medium nigro fasciatis (*forma typica*), aut ad medium nigro maculatis (v. n. *Pagnoni*). Elytris aliquot ad humeros nigro notatis et ad medium nigro maculatis et thorace rufo-testaceo, medio nigro (v. n. *Plucheryi*), aut thorace concolore, rufo-testaceo (v. n. *Lasseli*). L. 9-10 mill. Brésil. — Espèce caractérisée par la présence de petites épines émoussées sur la suture, au moins chez le ♂.

C. ensellatus n. sp. Allongé, atténué postérieurement, à coloration du corps et forme analogues au précédent, avec les élytres non denticulés sur la suture, avec le thorax testacé marqué de noir sur le milieu, les élytres jaunes à macule humérale noire et diversement obscurcis vers l'extrémité (*forme typique*), ou thorax immaculé (v. *innotalithorax*) avec les élytres non obscurcis au sommet. Elytres avec une fascie médiane noire raccourcis (v. *mediofasciata*). L. 8 mill. Brésil.

C. diversipennis n. sp. Parum elongatus, subparallelus, parum nitidus, diverse niger, abdomine testaceo, thorace rufo-testaceo, medio plus minusve nigro, elytris rufis aut testaceis, granulosus ♂, aut punctatis ♀, his ad medium, ad suturam nigro notatis (*forma typica*), aut in singulo nigro bimaculatis (v. n. *Duryi*), aut nigro trisignatis ♂ (v. n. *Turlieri*), aut innotatis ♀ (v. n. *Lacroixi*). L. 10-11 mill. Brésil. — Voisin du précédent, plus parallèle, sculpture élytrale non particulière. On peut encore attribuer à la même espèce, sous le nom de *medioinnotatus*, un ♂ ayant les élytres largement marqués de noir à la base.

C. binotatithorax n. sp. ♂. Parum elongatus, subparallelus, nitidus, luteus, thorace medio rufo et antice nigro bimaculato. capite, infra corpore membrisque pro parte nigris, elytris ad suturam, ad medium et postice nigro trinotatis, granulosus. Long. 12 mill. Brésil. — Espèce très caractérisée par sa particulière coloration thoracique.

C. Baudyi n. sp. Parum elongatus, nitidus, luteus, capite pro majore parte, membris et infra corpore pro parte nigris, thorace medio late nigro, elytris ad medium et in disco minute nigro maculatis, his pro parte granulosus. L. 13 mill. Brésil. — Voisin de *riosus* Pic.

(A suivre.)

M. Pic.

Le Gérant : E. Revéret.

Les Imprimeries Réunies, Moulins - 11-44 - Dépôt légal 1944 4^e trimestre - 49.138