

L'Échange, Revue Linnéenne



Nouvelles variétés de Coléoptères Longicornes

Au commencement de l'année 1945, en travaillant à un important mémoire sur les variétés de Longicornes de la faune franco-algérienne, j'ai été amené à revoir de près mon importante collection de paléarctiques, laissée quelque peu de côté depuis plusieurs années. En outre, j'ai recherché les descriptions primitives, pour vérifier les dénominations publiées dans certains ouvrages récents traitant les insectes de cette famille. Le résultat de ces examens divers m'a conduit à une double constatation :

1° Des modifications nettes signalées, ou figurées, n'ont pas de nom. Ce serait le cas de la *Pachyla 4-maculata* (ayant la macule antérieure noire de chaque élytre seule présente) et que je nommerai *v. Mulsanti*. Planet a figuré dans « Les Longicornes de France » deux dessins qui ne correspondent pas aux formes typiques ou modifications nommées, mais représentent des variétés innommées. Il s'agit de la fig. 37, p. 65, à dessins rouges réduits et particuliers des élytres, qui prendra le nom de *Leptura dubia v. Planeti* ; et de la fig. 284, p. 334, variété différant de la forme typique par les bordures noires du thorax émettant des prolongements noirs sur le disque et qui prendra le nom de *Oberea erythrocephala v. Planeti*.

2° Des variétés nouvelles (certains diraient aberrations) diverses de ma collection, qui sont les suivantes :

Stenochorus insitivus Germ. var. lividipennis ♂, du Caucase, élytres entièrement d'un brun jaune, antennes noires à extrémité rousse, pattes bicolores, abdomen rouge ; **v. brevivittatus** ♂, de Kuban, élytres noirs avec une macule infrahumérale et une bande antérieure discale raccourcie jaunes, corps et membres noirs, sauf partie des cuisses rouge.

Evodinus clathratus F. Plusieurs variétés sont à distinguer dans le groupe à pattes plus ou moins rouges : *v. morginsi*, de Suisse, élytres foncés avec des macules claires, nettes près de l'écusson et quelques rares latérales ou postérieures ; *v. atromultiplicatus*, des Alpes, voisine de *v. atroreductus* Pic, ayant, sur les élytres, une fascie supplémentaire antérieure noire réduite et remontant sur les épaules ; *v. Leprieuri*, Italie, élytres foncés, dépourvus de dessins jaunes sur la base, sauf les épipleures avec une étroite fascie jaune prémédiane et postérieurement des réticulations jaunes ; la *v. gallicus*, Hautes-Alpes, voisine de la *v. atratus* Pic, mais forme plus robuste, avec des macules jaunes sur la base des élytres. Ont les pattes foncées les *var. diversesignatus*, de Hongrie, élytres à coloration foncière noire et nombreux dessins jaunes dont plusieurs bandes longitudinales raccourcies vers la base ; *v. vesubiensis*, des Alpes-Mar., élytres à deux colorations foncières distinctement séparées, noire postérieurement avec réticulations jaunes, testacée sur tout le milieu de la base en avant d'une petite fascie jaune prémédiane.

Evodinus borealis Gylh., var. de Laponie. *V. separatus*, dessins noirs des élytres réduits, sauf première fascie, séparés de la suture ; *v. Schrammi*, coloration générale noire, les élytres ayant des dessins jaunes analogues à ceux de l'*ab. fenestratus* Flav., à l'exception de la fascie antéapicale qui n'atteint pas la suture.

Judolia 6-maculata v. Milliati, Hautes-Alpes, la 1^{re} fascie noire des élytres est réduite sur chacun à 3 macules, une carrée commune à la suture, une petite discale, une grande externe allongée, remontant sur les épaules jusqu'à la base, 2^e éloignée de la suture.

Strangalia 4-fasciata v. benedicta, Allier, à Sept-Fons (Pic). Les fascies noires 2 et 3 des élytres brièvement isolées de la suture, 1^{re} divisée en 5 taches diverses : une commune suturale, 2 sur chaque étui.

Strangalia distigma v. medioconexa, d'Algérie. Elytres rouges avec une macule noire commune sur la suture et un trait sutural apical noir. La var. *Villiersi*, d'Algérie, voisine de la *v. Agresi* Barros, a le thorax noir marqué de rouge de chaque côté.

Leptura semirufula v. Martini, de Madrid, élytres rouges ayant, sur chacun, une macule discale postérieure oblongue noire.

Leptura dubia Scop. ♀, *v. curierensis* ; de l'Isère, élytres rouges, plus ou moins bordés de noir, avec une bande suturale abrégée foncée ; *v. circascutellaris*, du Caucase, élytres noirs, ornés d'une bande latérale rouge se prolongeant par le haut sur la suture, derrière l'écusson.

Penichroa fasciata v. Fagnezi, de Vaucluse, élytres foncés, seulement marqués de jaune aux épaules et sur leur milieu, la fascie médiane étant disjointe de la suture.

Asémum striatum v. Theresæ, Digoin (Pic). Elytres fauves ayant chacun une bande antérieure réduite de poix.

Purpuricenus dalmatinus v. Bonvouloiri, de Syrie. La macule postérieure médiane noire du thorax est oblitérée.

Purpuricenus Koehleri v. Tournieri, de Sicile, élytres largement noirs, étroitement bordés de rouge sur tout le pourtour, base comprise, et bordure redescendant un peu en avant sur la suture.

Calchaenesthes oblongomaculatus v. subjunctus, du Taygetos, les macules noires des élytres très grandes, les postérieures en partie jointes vers la suture.

Callidium æneum v. semitestaceum. Provenance ? Avant-corps vert, avec les élytres testacés, sans reflets brillants, membres testacés.

Phymathodes testaceus v. parnassicus, du Parnasse. Coloration générale du dessus claire, élytres au sommet étroitement bordés de brun noir.

Pœcilium alni v. notaticollis, Les Guerreaux. Thorax marqué de roux sur les côtés.

Pœcilium Pici v. lateniger, du Lenkoran, élytres largement noirs au milieu, à suture non marquée de rouge, basé peu largement rouge.

Clytus lamæ v. maritimus, des Alpes-Mar. La fascie raccourcie prébasale jaune des élytres manque.

Clytus ciliciensis v. Delagrangi, d'Akbès, élytres et membres roussâtres.

Clorophorus pilosus v. uniformis, Les Guerreaux. Elytres à revêtement jaune sans taches marquées noires.

Anaglyptus gibbosus v. rufotinctus, Rome, Alpes-Mar. Elytres avec des parties rouges nettes.

Parmena algerica v. Schrammi, Carthagène. Coloration générale roussâtre, membres compris, première fascie blanche étendus sur presque toute la base des élytres

Dorcadion arenarium v. sabandum ♀, de Savoie. Chaque élytre avec 2 bandes blanches longitudinales, la bande humérale plus large et plus longue, la bande interne raccourcie, les deux jointes à la base.

Dorcadion meridionale v. albidiversum, Fr. MÉR. Bande blanche humérale jointe à la bordure apicale interne assez courte, un trait blanc supplémentaire entre les deux.

Colamobius filon v. decoloripes, Hyères. Antennes en partie et pattes roussâtres.

Oberea erythrocephala v. sinuatesignata, du Caucase. Noir, peu pubescent, tête, pattes et partie de l'abdomen rouges ou testacés, thorax noir, orné, sur le milieu, d'un dessin rouge transversal, irrégulier.

Oberea maculicollis v. semijuncta, d'Algérie. Les macules latérales noires du thorax sont jointes, cuisses marquées de foncé. Chez la *v. medioobliterata*, d'Algérie, la macule postérieure médiane noire du thorax est oblitérée.

Phytoëcia algerica v. rabatensis, du Maroc. Cuisses non, ou peu, obscurcies à la base.

Mon collègue Milliat m'a communiqué autrefois un exemplaire de *Phytoëcia (Musaria) affinis* Kar., de la forme *nigropubescens* Reitt., à thorax foncé, qui peut prendre le nom de *v. Milliati*. Massif Chartreux.

M. PIC.

Coléoptères du globe (suite)

Hypophlæus luteosignatus n. sp. Angustatus, nitidus, minute punctatus, niger, elytris ad medium in disco luteo maculatis, tarsis rufis. L. 4 mill. Madagascar. — Espèce caractérisée par la tache jaune des élytres ne touchant ni la suture, ni le bord externe.

H. Vadoni n. sp. Angustatus, nitidus, minute punctatus, niger, elytris ad medium et ad apicem rufo-luteo notatis, pedibus pro parte rufis. L. 5 mill. Madagascar. — Très distinct par les élytres marqués de roux près de l'extrémité.

H. rufosellatus v. n. laterufus. Elytris rufis, ad basin et ad apicem breve brunneo notatis. Madagascar.

H. Dufau n. sp. Angustatus, subparallelus, nitidus, luteus; capite sparse punctato; antennis parum latis; thorace paulo elongato, subparallelo, angulis anticis nullis, minute non dense punctato; elytris elongatis, distincte lineato punctatis. L. 3 mill. Guadeloupe. — Peut se placer près de *curvithorax* Pic.

H. andamanus n. sp. Elongatus, nitidus, rufus, pedibus pallidioribus, antennis pi-

ceis, his latis ; thorace parum elongato, antice vage attenuato, angulis anticis rectis, subrotundatis, minute et sparse punctato ; elytris parum elongatis, minute lineato-punctatis. L. 5 mill. Iles Andaman. — A placer près de *borneensis* Pic, en diffère par les angles du thorax non marqués.

H. paulostriatus n. sp. Elongatus, sat angustatus, nitidus, castaneus, pedibus rufescentibus ; capite minute non dense punctato ; antennis latis ; thorace longissimo, parallelo, parum fortiter non dense punctato ; elytris elongatis, minute striatis et distincte punctatis. L. 5 mill. Cuba.

H. cornutus v. n. *subcastaneus*. Castaneus, pro parte rufescens, pedibus rufis. I. Andaman. Plus foncé que la forme typique.

Dorcatoma lineatopunctata n. sp. [Anobiide]. Subovatus, nitidus, albo et paulo hirsute pilosus, nigro-metallicus, membris rufis ; duobus antepenultimis articulis antennarum dilatatis ; capite thoraceque minute et irregulariter punctatis ; elytris supra pro parte lineato-punctatis, lateraliter postice bistriatis. L. 1,5 mill. Brésil. — Voisin de *rufimembris* Pic, ponctuation élytrale et stries différentes.

Cænocara latipennis n. sp. [Anobiide]. Fere rotundatus, albo pubescens et hirsutus, nitidus, nigro-metallicus, antennis rufis ; articulis duobus ultimis antennarum valde elongatis, precedente transverso triangulare ; capite thoraceque parum fortiter sat dense punctatis ; elytris sat fortiter et irregulariter punctatis, lateraliter stria reducta et striis duobus integris ornatis. Long. 1,3 mill. Af. Or. — Caractérisé par sa forme courte et large, sa structure antennaire.

Chauliognathus Theresæ n. sp. [Malac.]. Parum elongatus, nitidus, rufo-luteus, capite pro majore parte, antennis, infra corpore pro parte pedibusque diverse nigris ; elytris ad basin nigro fasciatis et post medium interne nigro maculatis, his pro parte granulosis. L. 13 mill. Brésil. — Voisin de *rufipes* Pic.

C. semiruber n. sp. Oblongus, nitidus, pro majore parte ruber aut luteus, elytris apice flavis, pro parte rubro marginatis, antennis pro parte tarsisque nigris ; capite inter oculos nigro fasciato ; thorace medio paulo brunnescente ; elytris ad medium reducte et anguste nigro fasciatis, his antice sulcatis. L. 10 mill. R. Argentine. — Voisin de *maschalostictus* Berg., mais de coloration particulière.

C. maschalostictus v. n. *disconotatus*. Robustus, parum nitidus, rufus et testaceus, membris pro parte nigris, elytris brevibus, antice suleatis, in disco et in singulo post basin et ad medium nigro signatis. Brésil.

C. flavicolor n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, flavo-testaceus, capite pro parte corpore infra pro parte antennisque nigris, geniculis nigro-piceis, elytris post medium in singulo minute nigro bimaculatis. L. 13 mill. Brésil. — A placer près de *4-punctatus* Pic.

C. subpallidior n. sp. Parum elongatus, postice attenuatus, nitidus, luteus, capite pro majore parte, membris et infra corpore pro parte nigris, thorace medio nigro signato, elytris ad scutellum et infra humeros nigro signatis, ad medium in singulo nigro bimaculatis, his luteis, apice paulo flavis. L. 12 mill. Brésil. — A placer près de *ignatiosus* Pic.

M. Pic.

(A suivre:)

Le Gérant : E. REVERET.