

# L'Échange, Revue Linnéenne

## Coléoptères du globe (suite)



**Strangalia maculata v. n. pacifica** [Ceram.] Le dessin noir antérieur des élytres est représenté sur chacun par deux macules discales noires sans macule externe. Les Guerreaux (Pic). Une autre var. nouv., que je nomme **v. discoininterrupta**, se rapproche de la *v. discobiinterrupta* Pic, mais ne possède, sur chaque élytre, qu'une petite macule discale noire antérieure, au lieu de deux rapprochées. La var. **dromensis** mihi, de mes chasses à Luz-Rioufroid, voisine de *v. impunctata* Muls., au lieu d'une macule postmédiane externe, possède une étroite et courte bande noire.

**Clorophorus sartor v. n. Méquignoni** [Ceram.]. La partie postérieure des élytres est teintée de jaunâtre. Tokat. (coll. Pic, ainsi que les formes suivantes).

**Pœcilomorpha flavofasciata** n. sp. [Phyt.]. Oblongus, nitidus, rufus, antennis brunnescentibus, tarsiis nigris, elytris nigro-metallicis, ad scutellum albo notatis, ad medium flavo fasciatis, his diverse, pro parte fortiter punctatis, post scutellum et infra humeralis impressis; capite rufo, inter oculos nigro notato; thorace subrotundato, minute et sparse punctato. L. 8 mill. Afr. Or. — Espèce bien caractérisée par sa fascie flave.

**Pedrillia annulata v. n. Theresæ** [Phyt.]. Capite et thorace medio late nigris. Sibérie Or.

**Parnops Vaillanti** n. sp. [Phyt.]. Oblongus, sat robustus, niger, supra dense griseo-luteo pubescens, capite antice membrisque testaceis, infra corpore albo pubescente; thorace breve, lateraliter subsinuato, minute et dense punctato; elytris postice paulo attenuatis, parum minute sat sparse punctatis, antice infra longitudinaliter impressis. L. 7 mill. Turkestan chinois. — Diffère de *atriceps* Pic par la pubescence plus fournie, la forme plus robuste.

**Lema decempunctata** Gebl. A distinguer chez cette espèce les var. nouv. *Nadari*, ayant la macule humérale absente, du Turkestan chinois; *Nankinea*, à élytres immaculés, de Nankin, en Chine.

**Melittoma Coomani** n. sp. [Lymex]. Parum nitidus, diverse rufescens, antennis tarsisque testaceis; capite thoraceque dense granuloso-punctatis, illo parum elongato, lateraliter supra impresso, antice transverse depresso; elytris minute punctatis, costulatis. L. 15 mill. Tonkin: Hoa Binh. — Diffère de *cribricollis* Frm. par les antennes claires, le thorax non sillonné.

**Evaniocera rufomarginata** n. sp. [Héter.]. Oblongo-elongatus, griseo holosericeo pubescens, niger, thorace lateraliter infra rufo marginato, elytris nigris, lateraliter et apice anguste rufis; articulis 4 et sequentibus antennarum longe flabellatis; thorace obconico, minute et dense rugoloso punctato; elytris sat brevi-

bus, postice attenuatis, minute et dense rugoloso-punctatis. L. 4 mill. Angola. — Caractérisé par sa bordure rousse.

**Trichodes inapicalis** n. sp. [Cleride]. Oblongo-elongatus, nitidus, parum griseo pubescens, viride metallicus, elytris rufis, in singulo ante et post medium in disco transverse maculatis et inter maculis anterioribus ad suturam breve viride lineatis; thorace fortiter non dense punctato; elytris parum elongatis, postice attenuatis, apice subrotundatis; femoribus posticis paulo crassis. L. 10 mill. Perse. — Peut se placer près de *Jubilarii* Corp. Caractérisé par l'absence de macule apicale aux élytres et le dessin antérieur vert fait de 3 parties.

**Trichodes Reichei** v. n. **biinterruptus**. La fascie métallique antérieure des élytres est réduite sur chacun à deux petits traits discaux. Syrie.

**Trichodes umbellatarum** v. n. **Gabilloti**. Fascies antérieure et postérieure métalliques des élytres complètes, médiane éloignée de la suture. Algérie.

**T. umbellatarum** v. n. **bisbidivisus**. La fascie antérieure des élytres est éloignée de la suture et, en outre, divisée, étant composée sur chaque étui d'une grande tache interne et d'une petite externe. Algérie.

**Trichodes Kraatzi** v. **interruptus** Hintz (1904) postérieur à **T. apivorus** v. **interruptus** Lec. (1852) est à muter en v. **Hintzi** mihi.

**Tenerus signaticollis** v. n. **subfasciatus** [Cleride]. Elytris rufis, in disco antice longe et late nigro vittatis, apice nigro maculatis. Siam. — Var. caractérisée par la présence d'une fascie transversale claire anté-apicale. La v. **reductesignatus** mihi, de la même espèce et du Tonkin, a les élytres noirs avec une bordure antérieure externe réduite et sur la suture, de la base au-delà du milieu, une bande sinuée rousse. Gorham cite (« Ann. Ent. Belg. », 1895, p. 297) une variété innommée de la même espèce, et de Birmanie, ayant les élytres jaunes non marqués de noir au sommet, qui peut prendre le nom de v. **Gorhami** mihi.

**Hydnocera cyanea** n. sp. [Cleride]. Parum elongatus, subnitidus, nigro-cyaneus, nigro hirsutus; capite thorace latiore, fortiter et dense punctato; thorace breve et lato, antice latiore, fortiter sat dense punctato; elytris postice attenuatis, non abbreviatis, dense punctatis. L. 5 mill. Mexique. — Voisin de *cyanipennis* Gorh., mais à coloration générale bleutée.

**H. Baeri** n. sp. Parum elongatus, sat robustus, nitidus, nigro-ænescens, membris rufis, antennis apice et femoribus posticis apice, tibiis posticis ad basin picis; capite thorace latiore, fortiter punctato; thorace breve et lato, antice paulo latiore, sat dense punctato; elytris sat brevibus, postice attenuatis et apice intus paulo incisus, fortiter et dense punctatis; abdomine paulo prominulo. L. 4 mill. B.-Ayres. — Espèce caractérisée par sa forme robuste, ses élytres abrégés et sa coloration.

**H. sordida** v. n. **prolongata**. Viride-ænescens, elytris antice luteo maculatis, macula postice lineato prolongata, apice metallicis, membris pro parte testaceis. Mexique. — La forme typique possède une macule basale flave non prolongée.

**H. Bruchi** v. n. **argentina**. Angustatus, nitidus, niger, pedibus 4 anticis pro

majora parte rufis; capite paulo piloso, elytris abbreviatis. R. Argentine. — La forme typique a les élytres ornés d'une macule basale testacée et la tête glabre.

**H. Grandjeani** n. sp. Robustus, parum elongatus, postice attenuatus, nitidus, ænescens, antennis, tibiis tarsisque rufis; capite lato, fortiter et dense punctato; thorace breve, antice valde latiore et arcuate sulcato, pro parte dense punctato; scutello albo pubescente; elytris sat brevibus, non abbreviatis, postice attenuatis, post medium externe reducte albo fasciatis. L. 4,5 mill. Mexique. — Par sa forme voisin de *trichroa* Gohr., mais coloration du dessus uniforme avec une courte bande pileuse blanche aux élytres.

**H. Tenenbaumi** n. sp. Angustatus, nitidus, olivaceo-æneus, elytris luteis, circa anguste et apice æneis, membris pro majora parte testaceis; capite thorace latiore, parum punctato; thorace angustato et elongato, diverse punctato; elytris angustatis et abbreviatis, fortiter non dense punctatis. L. 4,5 mill. Mexique. — Voisin de *subvittata* Gohr., avec la coloration différente.

**H. postsuturalis** mihi, du Mexique, de coloration générale olivâtre avec les membres et partie de l'abdomen flaves a l'avant-corps plus robuste que le précédent, le thorax plus court avec une coloration élytrale particulière, ces organes étant d'un noir métallique, avec sur chacun une longue macule humérale jaune et une bordure postérieure suturale commune de même coloration.

**Lycopolemius Donckieri** n. sp. [Malac.]. Parallelus, opacus, nigro-fuliginosus, thorace nigro, ad medium anguste, lateraliter late rufo vittato et paulo inciso; elytris ad humeros rufo notatis et breve lineatis, externe anguste et antice rufo marginatis, his paulo costulatis. L. 8 mill. Sumatra. — A placer près, de *lineatus* Pic.

**Macrosilis basipennis** n. sp. [Malac.]. Elongatus, nitidus, niger, pedibus, thorace elytrisque testaceis, his ad basin paulo nigro notatis; thorace transverso, postice paulo latiore, marginato; elytris thorace fere æqualibus, elongatis. L. 7 mill. Nouvelle-Guinée. — Voisin de *apicalis* Pic, coloration élytrale différente.

**Danæ s. g. n. Pseudodanæ** [Endom.]. Aspect et caractères généraux de *Danæ* Reiche, mais antennes paraissant n'avoir que 10 articles avec une massue de 2 articles, le 9<sup>e</sup> assez épais, le 10<sup>e</sup> plus long, comme formé de deux articles soudés, s. g. établi pour l'espèce suivante.

**Pseudodanæ diversicornis** n. sp. Elongatus, nitidus, griseo pubescens, antennis nigris, articulo 1<sup>o</sup> rufo; thorace sat lato, elytris angustiore lateraliter marginato et sulcato; elytris elongatis, lateraliter subarcuatis; pedibus gracilibus, tibiis posticis rectis, ad basin paulo incisus. L. 4 mill. Afr. Or. Angl.

**Mimopolemius abdominalis** n. sp. [Malac.]. Parum elongatus, paulo nitidus, elytris opacis, niger, thorace rufo, nigro trinotato, elytris nigris, rufo tinctis, abdomine luteo. Long. 9 mill. Siam. — Coloration particulière et antennes plus courtes que d'ordinaire.

**Discodon pelakanum** n. sp. [Malac.]. Elongatus, nitidus, griseo pubescens, rufescens, antennis elytrisque nigris, pedibus nigris, femoribus ad basim pro parte

rufis ; antennis gracilibus ; thorace parum elongato, antice paulo attenuato. Long. 6 mill. Perak. — Voisin de *subobscuripenne* Pic.

**D. humerale** n. sp. Elongatus, nitidus, griseo pubescens, rufo-testaceus, elytris nigris, ad humeros paulo testaceo notatis, antennis nigris, pedibus diverse pro parte testaceis. Long. 5-6 mill. Perak et Pahang (coll. Pic, aussi Salangor museum). — Voisin du précédent avec les épaules marquées de nuance plus claire.

**Rhagonycha longipennis** n. sp. [Malac.]. Valde angustatus, parum nitidus, elytris subopacis, niger, thorace rufo, illo subquadrato, antice paulo angustiore, triimpresso ; elytris valde elongatis, parallelis, costatis. L. 10 mill. Malacca. — Caractérisé par ses élytres très longs, costés.

**Chauliognathus atrobasis** n. sp. [Malac.]. ♀ Oblongo-elongatus, nitidus, niger, pro parte rufo-testaceus, capite late nigro, thorace rufo-testaceo, medio late nigro, elytris rufo-testaceis, ad basin sat late nigro notatis, diverse punctatis, diverse punctatis, apice ciliatis. L. 13 mill. Brésil. — A placer près de *4-punctatus* Pic.

**C. basipunctatus** n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, niger, thorace, abdomine elytrisque rufis aut luteis, his in singulo ad basin et post medium externe minute nigro maculatis, minute punctatis ; pedibus nigris et rufescentibus. L. 14 mill. Brésil. — Voisin de *bisbimaculatus* Pic.

**C. bisbimaculatus** Pic varie par le thorax à macules noires avec les élytres marqués de noir à la base et bimaculés de noir chacun vers leur milieu (*v. n. Sebastiani*), ou thorax et élytres roux avec une fascie prémédiane réduite foncée (*v. n. Hustachei*). Brésil.

**C. 8-maculatus v. n. basinotatus**. Elytris ad basin et ad medium in singulo minute nigro maculatis. Paraguay.

**C. 8-maculatus v. n. rufescens**. Rubro-testaceus, pro parte pallidior, elytris ad medium reducte brunneo notatis. Paraguay.

**C. sinuatipes v. n. pardoanus**. Elytris concoloribus, rufo-luteis. Brésil.

**C. binoticeps v. nov. leopoldensis**. Thorace medio late nigro notato, elytris infra humeros nigro maculatis. Brésil.

**C. Malleri** Pic ♂, variétés. Elytres ornés d'une fascie postmédiane noire, en outre marqués de noir à la base et à l'extrémité (*v. n. Portevini*), ou seulement brièvement marqués de noir sur la base et à l'extrémité (*v. n. Maublanci*). Brésil.

**C. spinipennis** Pic, variétés. Elytres seulement brièvement marqués de noir à la base ♂ (*v. n. dilatipennis*), ou élytres largement noirs à la base avec une macule humérale jaune ♀ (*v. n. luteohumeralis*). Brésil.

(A suivre.)

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE

M. Pic.

DE FRANCE

BIBLIOTHÈQUE

Le Cérant : E. REVERET.