

L'ÉCHANGE

# Revue Linnéenne

FONDÉE PAR LE DOCTEUR JACQUET

Organe des Naturalistes de la Région Lyonnaise et du Centre

CONTENANT LES DEVIANTS D'ÉCHANGE

D'ACHAT ET DE VENTE DE LIVRES ET DE TOUT AUTRE OBJET D'HISTOIRE NATURELLE

M. PIC (R. U. I. P. O.), Directeur

Membre correspondant du Muséum de Paris



COMITÉ DE RÉDACTION OU COMITÉ D'ÉTUDES

J. GRIGNON,  
— Anthonay, D.

P. TOLOZAN (Brest-Garonne),  
— Lyons, Histories Françaises.

Maurice PIC, (Moulin-Sabon-et-Loret), — Collections  
d'Europe, Asie, Afrique, Étiologie, Malacologie, Anémone,  
L'écologie, Crustacés, etc. du globe. — Collections de la Chine, du Japon, etc. Cryptogames  
des paléontologues, Malacologie du globe.

A. MAILLARD  
— L'écologie

Libre de Bréville, Paris (N. —  
[L'écologie des insectes]

Adressez toutes Communications

Concernant la Rédaction, les Échanges, les Abonnements et les Annonces.

A. M. M. PIC, à Dijon.

Compte-courant postal : N° 31-306, Dijon.

(5 Février 1946)

SOMMAIRE

Coléoptères du globe, par M. Pic (suite).

PRIX D'ABONNEMENT : UN AN

À PARTIR DU 1<sup>er</sup> JANVIER

France : 16 francs.

Étranger : 26 francs.

MOULINS

LES IMPRIMERIES RÉUNIES

10, RUE D'ENGHIEN, 10

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE

DE FRANCE

## ANNONCES

---

La page . . . . .	64 fr.	Le 1/4 de page . . . . .	20 fr.
La 1/2 page . . . . .	36 fr.	Le 1/8 de page . . . . .	12 fr.

*Réduction de 25 % pour les insertions plusieurs fois répétées*

TARIF SPECIAL POUR LES ANNONCES ANNUELLES

---

## PRIX DES SEPARATA

---

*Les auteurs désirant des « Separata » de leurs articles, voudront bien s'entendre directement avec l'imprimeur.*

---

## EN VENTE

---

Chez l'auteur, M. Maurice PIC, directeur de l'*Echange*, à Digoin (Saône-et-Loire) pour l'étranger, ou à Les Guerreaux par St-Agnan (Saône-et-Loire) adresse ordinaire.

1° L'ouvrage « *Matériaux pour servir à l'étude de Longicornes* » étant épuisé, des fascicules seulement restent à vendre, dont le 1<sup>er</sup> cahier (traitant spécialement les variétés françaises omises dans de récents ouvrages) et le 11<sup>e</sup> cahier plus récent.

2° *Mélanges Exotico-Entomologiques*, qui comprennent 71 fascicules.

3° *Opuscula Martialis ou Martialia*, qui comprennent 13 fascicules (1940-1944).

S'entendre pour les prix avec l'auteur. Paiement à l'avance. Frais de port à la charge de l'acheteur.

---

### Pour les déterminations

*Le Directeur de l'Echange s'offre pour déterminer des Coléoptères, ceux au moins rentrant dans ses groupes d'étude.*

*Tous les frais de poste et ceux nécessaires pour assurer le retour des insectes envoyés en étude sont à la charge de l'envoyeur.*

*Il ne sera répondu qu'aux lettres munies d'un timbre pour la réponse.*

# L'Échange, Revue Linnéenne

## Coléoptères du globe (suite) <sup>(1)</sup>



*Chauliognathus infrabasalis* n. sp. [Malac.]. Parum elongatus, postice attenuatus, opacus, elytris ad basin nitidis, luteo testaceus, capite pro maiore parte, antennis, articulis primis exceptis, pectore pro parte tarsisque nigris; thorace multo et diverse nigro signato; elytris ad basin infra nigro maculatis, his punctatis. L. 10 mill. Brésil. — Caractérisé par les macules basales des élytres non visibles en dessus.

*S. Leopoldi* mihi, du Brésil, voisin du précédent, est plus atténué postérieurement avec les élytres un peu granuleux et dentés au sommet, de coloration générale testacée ou flave avec la tête maculée de noir, les membres bicolores.

*C. opacicollis* n. sp. Oblongo-elongatus, subnitidus, thorace opaco, niger, capite reducte luteo notato, infra corpore membrisque pro parte rufo-testaceis, thorace medio late nigro, elytris postice in singulo, minute et oblique bimaculatis. Variat.: Elytris postice externe minute nigro maculatis, thorace late rufo (*v. freiburganus*). L. 11 mill. Brésil. — A placer près de *δ-maculatus* Pic.

*C. H. notatus* n. sp. Oblongo-elongatus, postice valde attenuatus, opacus, luteo-flavus, capite thoraceque nigro notatis, membris pro maiore parte nigris, elytris apice dentatis. L. 8 mill. Brésil. — Voisin de *latipennis* Pic, très caractérisé par le dessin noir du thorax formant une sorte de H.

*C. Emili* n. sp. Elongatus, subopacus, luteus, capite nigro et thorace brunneo maculatis, membris rufis et nigris; elytris elongatis, apice attenuatis et dentatis, paulo granulosus, in singulo post medium intus minute nigro maculatis. L. 8 mill. Brésil. — Peut se placer près de *ochraceus* Bl.

*C. atrobasis* Pic (1945), préoccupé par *atrobasis* Pic (1944), devra prendre le nom de *nigrobasis*.

*Ommadius indicus v. n. Perroudi* [Cleride]. Niger, elytris rufis, ad humeros nigro maculatis et transverse nigro trifasciatis; fasciis posticis ad suturam junctis, pedibus luteis et nigris. Bornéo. — Coloration plus foncée que chez forme typique avec les pattes plus largement noires.

*O. obscuripes* n. sp. Elongatus, parum nitidus et paulo pubescens, niger, elytris luteo 4 signatis, pedibus nigris aut obscuris; thorace sat robusto, incarinato; elytris pro parte irregulariter punctatis. L. 8 mill. Limbang. — Voisin de *ctenostomoides* W., caractérisé par sa ponctuation élytrale non régulière et les dessins flaves particuliers, comprenant une fascie basale, une fascie arquée prémédiane, une autre en dessous plus courte, une macule apicale allongée.

(1) Toutes les nouveautés décrites font partie de la collection Pic, sauf *Otiocephala opaca* var.

**O. Modiglianii** n. sp. Angustatus, subparallelus, nigro-olivaceus, capite, thorace paulo antice et postice, elytris ad basin breve, pectore pro parte, abdomine membrisque, ex parte, flavo luteis; thorace elongato, indistincte carinato; elytris striato-punctatis, nigro sinuate trifasciatis, fascia prima paulo interrupta; femoribus apice diverse nigris et tibiis nigro annulatis. L. 10 mill. Sumatra. — Peut se placer près de *notatus* Sch.

**O. flavonotatus** n. sp. Elongatus, nitidus, nigro-olivaceus, capite pro parte, elytris ad basin, abdomine et pedibus pro majeure partie luteis; thorace parum elongato, indistincte carinato; elytris striato-punctatis, apice attenuatis, vage et diverse nigro trifasciatis, externe pro parte luteo-rufo notatis. L. 8 mill. Iles Andaman. — Voisin de *trifasciatus* Cast., s'en distingue, à première vue, par la coloration du dessus en partie olivâtre.

**O. piceofasciatus** n. sp. Elongatus, postice attenuatus, parum nitidus, nigro metallicus, articulis basalibus antennarum, labro, abdomine pedibusque pro majeure partie luteo-flavis, elytris rufis, nigro-piceo sinuate trifasciatis; thorace elongato, incurvato; elytris striato-punctatis; pedibus luteis, femoribus et tibiis diverse brunneo maculatis. L. 7 mill. Bornéo. — Diffère de *trifasciatus* Cast. par la coloration plus claire des élytres et des pattes.

**O. variesignatus** mihi, de Bornéo, voisin du précédent par sa coloration, est plus robuste et plus grand, long de 10 mill., les dessins foncés des élytres sont différents avec la 1<sup>re</sup> fascie décomposée en macules et la 3<sup>e</sup> réduite, les cuisses postérieures sont largement noires au sommet.

**O. mediocripes** mihi, de Bornéo, dont la coloration des pattes est analogue à ce dernier, est moins pubescent de gris, les élytres, un peu plus courts, sont moins atténués au sommet et possèdent une fascie antémédiane foncée sinuée, une large fascie postmédiane presque droite et une macule antéapicale foncées.

**O. longipes** mihi, de Perak, de forme très allongée avec les pattes postérieures longues et grêles, a le thorax long, teinté de roux, les élytres longs sont d'un roux clair avec une fascie antémédiane, éloignée de la suture, brun de poix, celle-ci flanquée d'une macule externe antérieure de même coloration, ils sont ornés, en plus, d'une fascie postmédiane élargie latéralement et d'une petite macule antéapicale brun de poix, celle-ci flanquée d'une macule externe antérieure de même coloration, ils sont ornés, en plus, d'une fascie postmédiane élargie latéralement et d'une petite macule antéapicale, brun de poix, les tibias postérieurs sont largement noirs au sommet.

**O. paulonotatus** n. sp. Elongatus, paulo robustus, postice attenuatus, flavo-luteus, abdomine apice membrisque pro parte nigris, supra viride-olivaceus, thorace postice flavo et elytris ad basin paulo flavo notatis, his vage nigro fasciatis. L. 9 mill. Nouvelle-Guinée. — Très distinct des espèces à dessus vert par sa forme et l'absence de dessins foncés nets aux élytres.

**Metholcus multistriatus** n. sp. [Annob.]. Elongatus, convexus, nitidus, rufotestaceus; thorace breve et lato, lateraliter subarcuato, angulis anticis subrotundatis; elytris multi punctatis, striatis, striis externe fortioribus. L. 3,5 mill. Came-

roux. — Voisin de *arcuaticollis* Pic, mais élytres nettement striés, même sur le disque.

*M. robustithorax* mihi, du Kénya, est plus grand, d'un roux brunnâtre avec le thorax un peu plus large que les élytres. Peut être var. du précédent.

*Hypophlaeus javanus* n. sp. [Héter.]. Elongatus, nitidus, rufo-testaceus; capite minute et sparse punctato; antennis latis; thorace parum elongato, subparallelo, angulis anticis paulo prominulis, minutissime et sparse punctato; elytris elongatis, minute punctatis. L. 4,5-5 mill. Java. — Voisin de *borneensis* Pic, antennes et coloration générale plus claires.

*H. attenuaticollis* n. sp., de Lombok, voisin du précédent, roux, s'en distingue à première vue par le thorax nettement rétréci en avant. L. 5 mill.

*H. obscurior* n. sp. Elongatus, nitidus, castaneus, pedibus rufis; capite parum punctato; antennis latissimis; thorace parum elongato, subparallelo, angulis anticis paulo prominulis, sat minute et sparse punctato; elytris parum elongatis, postice paulo attenuatis, minute punctatis. L. 4,5 mill. Palawan. — Plus foncé que les espèces précédentes.

*H. andaiensis* n. sp. Angustatus, parallelus, rufus, antennis late nigris, his parum latis; capite parum punctato, ad oculos transverse sulcato; thorace elongato, parallelus, angulis anticis fere rectis, sat minute et sparse punctato; elytris parum elongatis, sat fortiter lineato-punctatis. L. 3 mill. Nouvelle-Guinée. — Peut se placer près de *analisis* Geb.

*H. bicoloriceps* n. sp. Angustatus, nitidus, niger, membris elytrisque testaceis, capite rufo, medio obscuriore; thorace parum elongato, sparse punctato; elytris elongatis, minute lineato-punctatis. L. 4 mill. Madura. — Voisin de *limbaticollis* Chp., s'en distingue par la coloration différente de l'avant-corps.

*Atimura intuberculata* n. sp. [Longic.]. Angustatus, parallelus, opacus, griseo et flavo pubescens, in capite infra et elytris postmedium dense albo pubescentibus; thorace elongato, supra luteo trivittato, inæquale punctato, pro parte granuloso; elytris æqualibus, elongatis, parallelis, apice paulo attenuatis et declivibus, intuberculatis, irregulariter et diverse punctatis. L. 8 mill. Pondichéry. — Espèce très caractérisée par ses élytres incostés et intuberculés, ornés sur chacun d'une grande macule blanche postmédiane.

*Otiocephalo opaca* v. n. *latecyanescens* [Phyt.]. Nigro-cyanescens, elytris ad basin externe et lateraliter, apice excepto, luteo marginatis, ante medium sinuate, ad suturam pro parte transverse luteo fasciatis et post medium externe breve luteo lineatis, in disco vage luteo notatis. Maroc (coll. Rotrou). — Se distingue de la v. *rufolimbata* Pic par un plus grand développement de la coloration foncée aux élytres.

*Cyaniris reductelineata* n. sp. [Phyt.]. Oblongus, nitidus, rufo-testaceus, elytris ad suturam et lateraliter reducte viride lineatis, antennis apice, scutello postice et infra corpore pro parte nigris. Long. 4 mill. Indes MÉR. — Voisin de *cochin-chinensis* Lef.

*C. nigropygidialis* n. sp. Oblongus, nitidus, rufo-testaceus, elytris in singulo ante et post medium oblique medio bimaculatis, pygidio pectoreque nigris. Long. 4,5 mill. Indes MÉR. — A placer près de *affinis* Jac.

*C. latemedionotata* n. sp. Elongatus, nitidus, testaceus, elytris ad medium late et longe nigro notatis, antennis apice et infra corpore pro majeure parte ni-

gris. Long. 5 mill. Indes MÉR. — Espèce caractérisée, ainsi que les suivantes, par le dessin foncé particulier des élytres.

*C. diversesignata* n. sp. Angustatus, nitidus, rufo-testaceus, elytris nigris, ad basin rufo fasciatis, fascia postice externe et in disco paulo prolongata, apice et in disco postice flavo notatis, antennis apice nigris. Long. 3,5 mill. Indes MÉR.

*C. salemensis* n. sp. Elongatus, nitidus, infra niger, supra testaceus et nigro notatus, capite post oculos nigro signato, elytris ad humeros reducte nigro lineatis, linea postice dilatata, ad suturam antice nigro maculatis, post medium vage brunneo notatis; antennis nigris, ad basin rufis; pedibus nigris, femoribus ad basin et tibiis pro parte rufis. Long. 5 mill. Indes MÉR. — Peut se placer près de *nilgiriensis* Jac.

*C. trimaculiceps* n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, infra niger, supra testaceus et nigro maculatus; capite antice et post oculos nigro maculato; thorace in disco nigro notato; elytris in singulo ad basin nigro bimaculatis; antennis ad basin et pedibus testaceis. Long. 4 mill. Indes MÉR.

*Cryptocephalus luteopectoralis* n. sp. [Phyt.]. Oblongus, nitidus, niger, capite antennis ad basin, pectore pedibusque luteis, elytris nigris, ad basin sat late luteis, ad humeros nigro maculatis. Long. 4 mill. Indes MÉR. — A placer près de *Lefevrei* Jac.

*C. presimulans* n. sp. Oblongus, nitidus, niger, antennis ad basin, capite elytrisque rufis, his ad humeros nigro maculatis et ante apicem nigro fasciatis. Long. 4 mill. Indes MÉR. — Voisin de *simulans* Jac., en diffère nettement par la tête rousse, la bande noire des élytres plus postérieure.

*C. inrufofemoralis* n. sp. Oblongo-subovatus, nitidus, niger, supra rufus, thorace ad basin nigro bimaculato; elytris post medium sinuate nigro fasciatis, antennis nigris, articulo 1° rufo. Long. 5 mill. Indes MÉR. — Paraît voisin de *rufofemoratus* Jac., les pattes sont plus foncées et les épaules immaculées.

*C. basiquadrimaculatus* n. sp. Oblongus, nitidus, niger, supra rufus, thorace postice late nigro bimaculato, elytris post basin, in singulo, minute nigro quadrimaculatis et post medium nigro fasciatis, antennis ad basin et pedibus anticis pro parte rufis. Long. 3,5 mill. Indes MÉR. — Moins large que le précédent avec les élytres à macules basales foncées.

*C. basiinnotatus* n. sp. Oblongus, nitidus, niger, supra rufus, elytris post medium nigro sinuatis, antennis ad basin pedibusque pro parte et diverse rufis. Long. 5 mill. Indes. — Voisin du précédent par la coloration des pattes, mais dessins noirs différents.

*C. basipaulonotatus* n. sp. Oblongus, nitidus, niger, capite pro parte, thorace, illo in disco nigro bimaculato, scutello elytrisque rufis, his ad basin in singulo minute piceo 4 maculatis et post medium interne nigro maculatis, antennis et femoribus ad basin rufis. Long. 5 mill. Indes MÉR.

*C. laterufipes* n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, rufo-testaceus, immaculatus, infra corpore pro majeure parte nigro, pygidio nigro, luteo marginato, pedibus 4 anticis rufis, tarsis nigris, posticis nigris, femoribus ad basin rufis. Long. 4,5 mill. Indes MÉR.

(A suivre.)

M. Ptc.

\*Le Gérant : E. REVERET.

## Souhaits et avis divers

Une nouvelle année commence, que sera-t-elle? Bien des soucis et de graves préoccupations demeurent à notre horizon sombre et limité, mais aussi l'espoir réconfortant subsiste. Le courage qui peut vaincre les difficultés attend les bonnes volontés, ne lui tournons pas le dos; la force morale qui sommeille est prête à se réveiller pour nous aider et le goût du travail peut nous sauver de la catastrophe. Ne soyons pas sourds à l'appel de la patrie et que la fraternité ne soit plus un vain mot. Au commencement de 1946, souhaitons-nous, mutuellement, la bonne entente, l'union qui fait la force, la reprise des relations anciennes et cordiales. Souhaitons une vigoureuse poussée de jeunes vers l'Entomologie et une longue vie active aux anciens entomologistes. Souhaitons des découvertes aux voyageurs, des nouveautés aux déterminateurs, des espèces, au moins des variétés ou aberrations, non encore nommées aux chasseurs et récolteurs d'insectes. Exprimons enfin des souhaits généraux pour tous, souhaits de prospérité matérielle et de bonne santé, avec une vie exempte de soucis matériels, mais remplie de satisfactions morales.

Un vœu terminera les souhaits d'usage. Celui, avec la reprise des relations normales, de l'échange des publications parues pendant la guerre entre collègues ignorant mutuellement ce que chacun a pu publier en ces dernières années. La bibliographie, si importante pour bien travailler, est mutilée; il faut, par des échanges ou communications réciproques, rassembler ses membres éparés pour en faire un tout utile à tous.

Avec les temps devenus difficiles, les frais de toutes sortes sont en hausse: impression, affranchissements, etc...; il n'est plus possible de ne pas envisager une augmentation d'abonnement, mais elle sera modérée. Maintenant l'envoi d'un numéro va coûter un franc, l'augmentation de quatre francs demandée pour la France couvrira simplement les frais d'envoi.

Comme la couverture l'indique, l'abonnement à « L'Echange » pour l'année courante sera de 16 francs pour la France et de 26 francs pour l'étranger. C'est un minimum demandé.

En raison des frais surélevés de la poste, il est prescrit à tous ceux qui enverront des insectes à déterminer au directeur de « L'Echange » de vouloir bien prendre à leur charge les frais de retour des envois et les frais de correspondance.

Pour l'année courante, il sera inutile de réclamer le 2<sup>e</sup> ou le 3<sup>e</sup> numéro du journal si l'abonnement n'est pas versé à l'avance, ou après le premier numéro reçu. Le premier numéro de l'année sera seulement envoyé aux abonnés qui sont en règle avec la caisse, autrement dit, dont l'abonnement pour 1945 a été payé. Il ne sera plus répondu aux demandes commerciales qui ne contiendront pas de timbres pour la réponse. Les anciennes années qui pourraient être demandées ne seront expédiées que sous garantie expresse de paiement. L'argent versé à l'avance sera exigé pour l'étranger.

---

## Notes de Chasses et captures diverses

L'année 1945, très sèche, n'a pas été bonne du point de vue chasses et, de divers côtés, des collègues se sont plaints de la pauvreté de leurs récoltes. Pour ma part, en dehors des quelques var. ou ab. de *Doryphora* (signalés l'an passé dans le présent périodique) je n'ai à peu près rien ramassé de particulièrement intéressant. J'ai repris la var. *Colini* Pic (décrite en 1945) de *Cr. pusillus* F. et ai capturé, le 23 mai, un exemplaire de *Edemera nobilis* Scop. bleu, représentant la nuance typique assez rare, tandis que la var. *viridescens* Pic, à coloration verte est plus répandue. Le 31 mai, j'ai recueilli aussi un diptère, rare dans la région, le *Calliprobola speciosa* F.

J'ai capturé, le 16 avril, attiré par la lumière dans mon cabinet de travail, un lépidoptère, le *Aglia tau* L. jamais encore rencontré.

J'ai reçu à déterminer de mon collègue Barbier la rare var. *notaticollis* Sch., de *Cantharis oralis* Germ. capturée par lui dans la Côte d'Or et nouvelle pour le département.

M. BARBIER me signale avoir capturé en Côte d'Or *Silis Ruficollis*, F. déjà recueilli à Saint-Jean-de-Losne par Thierriat.

Mon cabinet d'élevage, négligé, non garni de bois nouvellement rapportés, ne m'a rien donné en 1945.