

L'Échange, Revue Linnéenne



Coléoptères du globe (suite) ⁽¹⁾



Thanasimus formicarius v. n. Brioni [Cleride]. Poitrine, méso et métathorax noirs, abdomen roux. Environs de Bordeaux. Reçu de M. Coiffait et dédié, selon son désir, à M. Brion. La forme typique a le dessous du corps entièrement rouge.

Danacaea minuta v. n. bicoloripes [Malac.]. Fémurs en partie obscurs, thorax et élytres sur les côtés distinctement pubescents de blanc, le reste pubescent de jaune. Environs d'Oran (Barbier, in coll. Pic). Caractérisé par la coloration bicolore des pattes.

Ragonycha Peyroni v. n. discobirufa [Malac.]. Noir, élytres jaunes, thorax, sur le disque, bimaclé de noir. Taurus.

Stadenus leonensis n. sp. [Malac.]. Parum elongatus, sat latus, niger, thorace aurantiaco, supra nigro notato, scutello elytrisque aurantiacis, his apice sat late nigris; antennis, fractis, latis, articulo 2^o breve et transverso, 3^o lato et 4^o brevior, 5^o et sequentibus plus minusve elongatis et depressis; thorace breve et lato, antice medio paulo prolongato, angulis posticis fere rectis. L. 12 m. S. Leone. — Diffère de *Auberti* Brg. par ses antennes robustes et la partie noire apicale des élytres remontant un peu sur les côtés.

S. angustatus n. sp. Valde elongatus, angustatus, thorace circa luteo marginato, illo non transverso, lateraliter fere recto, supra inæquale; elytris longissimis, fortiter et regulariter sculptatis, aurantiacis, apice parum late nigris; infra corpore membrisque nigris, articulo ultimo antennarum flavo. L. 9 m. Uganda. — Espèce caractérisée par sa forme étroite et allongée, se rapprochant de *parallelus* Pic.

S. breveapicalis mihi, de l'Uganda, aussi de forme allongée, ressemble au précédent, il est moins étroit et plus grand, le thorax est court, très élargi postérieurement, les côtes des élytres sont plus élevées et ces organes sont brièvement marqués de noir à l'apex, le bord externe restant orangé, le dernier article des antennes est brièvement clair au sommet.

Le **bicoloripes mihi**, du Gabon, également de forme étroite et allongée, a les antennes un peu aplaties, à premiers et derniers articles testacés, le thorax, les 2/3 antérieurs des élytres et les pattes en partie sont orangés.

S. subelongatus v. n. notaticollis, du Gabon, a le thorax plus long, largement marqué de foncé au milieu.

S. laticornis n. sp., du Gabon, est robuste et large, noir, les premiers et le dernier articles des antennes sont orangés, ces organes étant très aplaties, à articles 3-6 diversement larges et impressionnés, le thorax et un peu plus de la moitié antérieure

(1) Toutes les nouveautés décrites font partie au moins de la coll. Pic.

des élytres sont orangés ; le thorax assez long est subsinué sur les côtés, à angles postérieurs peu avancés, l'écusson est un peu rembruni. L. 12 m.

S. nigricollis n. sp. Elongatus, niger, elytris luteis, apice parum late nigris ; antennis sat gracilibus, articulis 2-3 brevibus, 4 et sequentibus valde elongatis ; thorace transverso, antice arcuato, angulis posticis valde prominulis. L. 7 m. Congo : Kivu. — Diffère de *Mocquerysi* Pic par la structure différente des antennes, la sculpture régulière des élytres.

S. incrassicornis n. sp. Elongatus et angustatus, nigro-piceus, articulis duobus ultimis antennarum elytrisque luteis ; antennis sat gracilibus, articulis 3 et sequentibus elongatis, subparallelis ; thorace parum lato, antice subarcuato, angulis posticis paulo prominulis. L. 10 m. Congo : Kivu. — A placer près de *inapiculis* Pic.

S. Nodieri n. sp. Parum elongatus, niger, scutello piceo, thorace elytrisque ad basin alte aurantiacis ; antennis parum depressis, articulo 3° non breve, dilatato, 4° et sequentibus elongatis, apice externe paulo angulatis, thorace antice attenuato et subarcuato, angulis posticis paulo prominulis. L. 8 m. S. Thomé. — Voisin de *semifulvus* Pic, en diffère par le 3° article des antennes plus court que le 4°, le thorax subsinué, la sculpture plus forte des élytres.

Telopes Heydeni v. n. **opacus** [Clavic.]. Oblong-parallèle, large, opaque noir densément pubescent de gris jaunâtre en dessus, pubescence non hirsute, élytres sur la base maculés de foncé avec, vers et après le milieu, des fascies sinuées foncées, de poix, enfin maculés de même extérieurement avant le sommet ; antennes et pattes rousses. Alexandrie. (Barbier, in coll. Pic).

Attagenus trifasciatus v. n. **Barbieri** [Clavic.]. La fascie postmédiane grise des élytres est réduite, oblitérée en dedans, la fascie préapicale disjointe. Alexandrie (Barbier, in coll. Pic).

Engonius trisignatus n. sp. ♂ [Eudomyc.]. Oblongus, nitidus, glaber, niger, thorace lateraliter pro parte rufo notato, elytris in singulo post basin oblique aurantiaco bimaculatis et postice in disco grande et subtransverse aurantiaco-maculatis ; tibiis anticis longe, intermediis breve, dentatis. L. 10 m. Singapore. — Voisin de *junctus* Pic, élytres plus noirs avec des macules antérieures disjointes.

E. Theresæ n. sp. ♂ Oblongus, niger, nitidus, glaber, elytris vage æneis, in singulo infra humeros et post medium intus late aurantiaco rotundato maculatis ; thorace non transverso ; elytris latis, sat brevibus ; medio paulo dilatatis, antice attenuatis, sat late marginatis, humeris prominulis, tibiis anticis et intermediis minute dentatis. L. 8 m. Sumatra. — Espèce caractérisée par la forme particulière des élytres conjointement avec le thorax étroit.

E. celebensis n. sp. ♂. Oblongus, postice latior, nitidus, niger, elytris cyanescens, in singulo externe post humeros et ante apicem transverse sat anguste luteo maculatis ; thorace non transverso, ad medium paulo latiore ; elytris post medium paulo latioribus, sat convexis, mediocre marginatis, humeris paulo prominulis ; tibiis anticis minute dentatis, intermediis ante apicem paulo incis, posticis, longissimis. L. 13 m. Célèbes. — Espèce de forme élytrale particulière.

E. semilunulatus n. sp. Oblongus, nitidus, glaber, niger, elytris lunula circa hume-

ros externe aperta fasciaque postmediana flexuosa sanguineis ; thorace medio insulcato. L. 9 m. Java. — Voisin de *lunulatus* Gerst., mais, lunule antérieure non complète.

E. brevipennis n. sp. ♂. Oblongus, niger, élytris in singulo late transverse luteo bimaculatis, his sat brevibus, valde convexis, humeris paulo prominulis ; tibiis anticis minute dentatis, intermediis subsinuatis. L. 8 m. Malacca. — Sans doute voisin de *letrusphaera* Arrow, mais ayant des macules non subarrondies.

Epiclines basalis v. n. **testaceipes** [Cleride]. Bleu, élytres avec une longue macule prébasale jaune sur chacun, pattes testacées. Chili.

Mimosebasmia n. g. [Cerambycide]. Antennis pro parte deplanatis, articulis 5^o et sequentibus apice dilatatis et dentatis, ultimo apice externe inciso et angustiore, corpore paulo superantibus ; thorace sat lato et breve, antice attenuato, minute et paulo plicato ; élytris elongatis, medio paulo strangulatis, apice subrotundatis ; prosterno postice paulo inclinato ; pedibus posticis sat elongatis. De fascies rappelle *Sebasmia* Pasc. avec une forme moins étroite, le thorax plus robuste et court, les élytres non obliquement tronqués en dedans au sommet. Genre établi pour l'espèce nouvelle suivante.

M. purpurea n. sp. Elongatus, non angustatus, niger, supra opacus, sat dense et pro majore parte, in élytris complete purpureo pubescens, infra corpore nitido, griseo pubescente, membris breves griseo pubescentibus. L. 25 mill. Tonkin.

Le genre nouveau **Falsomassicus** [Cerambyc.] , ayant la base de l'insertion des antennes munie d'une dent émoussée, se rapproche ainsi de *Massicus* Pasc., mais le scape n'est pas caréné, l'angle sutural des élytres est inerme ; d'autre part, distinct de *Dissopachys* Reit. par l'écusson non transversal. A le faciès d'un *Derolus* Gah. de grande taille. Genre établi pour l'espèce nouvelle suivante.

F. Theresæ n. sp. Elongatus, parum angustatus, capite thoraceque élytris valde angustatis, niger, pro parte castaneus, sat uniformiter griseo-luteo pubescens ; thorace breve et lato, irregulariter diverse plicato, ad medium diverse sulcatulo ; élytris elongatis, subparallelis. L. 37 m. Chine.

Pachyteria luteofasciata n. sp. [Cerambyc.]. Nitidus, minute punctatus, niger, élytris ad medium late luteo fasciatis ; fascia paulo arcuata et sinuata ; articulis 6 ultimis antennarum luteis. L. 28-32 m. Annam. — Voisin de *dimidiata* W., en diffère par la coloration foncière nettement noire sur les élytres.

Eurybatus breveapicalis n. sp. [Cerambyc.]. Parum elongatus, sat robustus, subparallelus, niger, supra, capite et scutello exceptis, pectore et abdomine rubro-fulvo pubescentibus, élytris in singulo ante medium transverse nigro bimaculatis, post medium reducte fasciatis, ad apicem anguste nigro marginatis ; antennis gracilibus, infasciculatis, corpore paulo longioribus. L. 27 m. Sumatra : Medan. — Par l'apex des élytres foncé, se rapproche de *nigroapicalis* Pic.

Chelidonium testaceicorne n. sp. [Cerambyc.]. Allongé, un peu brillant ; élytres en majeure partie opaques, vert, élytres teintés de violet, membres testacés ; antennes et fémurs postérieurs dépassant le corps ; antennes simples, non dentées ; thorax particulier, court et large, sur les côtés, au milieu largement gibbeux, inerme, en dessus

orné de multiples petits plis en divers sens, antérieurement et postérieurement multiplissé ; écusson vert. Long. 18 m. Japon : Kioto. — Espèce très caractérisée par son thorax joint à la coloration claire des membres.

Agapanthia cardui v. n. *rufofemorialis* [Ceramb.]. Coloration et aspect de *v. marginalis* Muls. et s'en distinguant par les fémurs roussâtres. Constantinople.

Anthicus Barbieri n. sp. [Hétéér.]. Parum elongatus, sat robustus, convexus, breve pubescens, nitidus, minute dense punctatus, rufus, membris pallidioribus ; capite robusto, postice truncato ; thorace sat breve, antice valde dilatato et subarcuato ; elytris parum elongatis, postice attenuatis, humeris nullis. L. 3 m. Le Cap (Barbier). — Par sa forme, se rapproche de *truncatipennis* Pic, mais cuissés non épaissies, coloration plus claire.

A. truncatipennis v. n. *diversipennis*. Thorax en partie roussâtre, ainsi que les élytres sur la base et la suture. Le Cap.

A. (Aulacoderus) unicoloricornis n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, niger, tibiis pro parte vage rufescentibus ; capite thoraceque sparse punctatis ; capite postice subarcuato, thorace paulo latiore, illo sat angustato, postice distincte, stangulato et sulcato ; elytris parum latis, postice attenuatis, sparse griseo pubescentibus aut albo hirsutus. L. 2,5 m. Le Cap. — A placer près de *alronilidus* Laf.

Temnophthalmus unicarينات n. sp. [Hétéér.]. Piceo-subænescens, membris pro parte rufis ; thorace lateraliter unicarinato. L. 8 m. Gabon. — Diffère à première vue de *subvittatus* Pic par le thorax dépourvu de carène supérieure latérale et les élytres à coloration uniforme.

Nannocerus granulosus n. sp. [Hétéér.]. Elongatus, rufus, pro parte obscurus, capite thoraceque densissime punctatis ; elytris striatis, fortiter punctatis ; intervallis pro parte granulatis aut plicatis. L. 4-5 m. Zanzibar. — Voisin de *cylindricus* Frm. et caractérisé par la forte sculpture élytrale.

Xanthothopia brevipunctata n. sp. [Hétéér.]. Elongatus, parum nitidus, elytris opacis, cyaneo-viridis, abdomine apice rufo, elytris olivaceis, membris violaceis ; capite thoraceque parum fortiter et dense punctatis ; elytris thorace latioribus, subparallelis, apice attenuatis, minute striato-punctatis, intervallis subconvexis. L. 13 m. Gabon. — Se distingue de *gabonica* Pic par les élytres à ponctuation plus fine, sans aspect brillant.

X. angustata n. sp. Angustatus, parum nitidus, piceo-olivaceus, pro parte rufotinctus, elytris rufis ; capite thoraceque fortiter et pro parte dense punctatis, illo parum elongato ; elytris thorace sat latioribus, elongatis, post medium paulo dilatatis, apice attenuatis, minute striatis, sed sat fortiter lineato-punctatis et paulo plicatis ; femoribus ad basin rufis. L. 10 m. Gabon. — Plus allongé que *curvuleata* Frm., avec une toute autre coloration.

Deux Clerides nommés par moi sont à muter : *Lemidia obliquefasciata* (1941) en *obliquenotata* et *Eburiphora angustipennis* v. *semirufa* (1941) en *v. semicyanea*.

(A suivre.)

M. Pic.

Le Cérant : E. REVERET.