

L'Échange, Revue Linnéenne



Coléoptères du globe (suite) ⁽¹⁾

Dasytes (Hypodasytes) subalpinus, s. esp. **Vesubiensis** [Malac.] ♀. Elongatus, parum robustus, non dense griseo-luteo pubescens et nigro hirsutus, nigro-piceo subaenescens, elytris pallidioribus, membris rufescentibus, femoribus piceo-brunneis. Capite lato, inter oculos impresso, fere bisulcato; antennis brevibus, articulis 3-5 latis subtriangularibus, 6, 7 angustioribus apice latioribus, 8 et sequentibus angustatis et valde elongatis. Long. 5 mill. environ. St-Martin Vesubie (Pic.) — Caractérisé au moins par sa coloration moins foncée, plus claire sur les élytres avec les antennes rousses.

Eurybatus 10-punctatus W. [Longic.]. A distinguer les var. ou ab. (du Laos et Tonkin) de ma collection, suivantes ayant le thorax 4 maculé et des macules réduites aux élytres : v. *Salvazai*, élytres avec la macule discale médiane oblitérée ; v. *bisbinotatus*, les deux macules antérieures, discale et externe, sont seules marquées, ou bien ce sont les macules discales antérieure et médiane qui restent (v. *binotatus*) ; v. *uninotatus*, macule antérieure discale seule subsistante. Chez la var. *verticenotata*, du Laos, il existe 2 petites macules rouges au vertex et trois macules noires au thorax ; le dessin élytral est celui de la var. *bisbinotatus* mihi.

Chelidonium cyaneipes n. sp. [Longic.]. Elongatus, non angustatus, postice attenuatus, viridis, capite et thorace parum nitidis, elytris opacis, membris cyaneis, femoribus 4 anticis sat inflatis ; antennis corpore brevioribus, simplicibus ; thorace breve et lato, lateraliter antice gibbuloso, in disco dense et diverse ruguloso, medio longitudinaliter subsulcato, antice uni et postice bi transverse sulcato ; elytris sat elongatis, ad humeros distincte latioribus, minute et densissime punctatis. L. 25 mill. Corée (coll. Pic, ainsi que les formes suivantes). — Voisin de *C. rubrofemorale* Pic (espèce, non variété), s'en distingue par les pattes entièrement foncées et un long sillon longitudinal au thorax.

Anubis rostratus v. n. annamitus [Longic.]. Elytres bleus et opaques, avec la base verdâtre et un peu brillante, 2 bandes jaunes aux élytres, la 1^{re} droite, la 2^e obliquement disposée. Annam.

Polyzonus cyaneicollis n. sp. [Longic.]. Angustatus, non subparallelus, cyaneus, parum nitidus, elytris opacis, nigro-violaceis, ante medium sat anguste, post medium late luteo fasciatis, fasciis ad suturam fere junctis ; thorace lateraliter tuberculato, pro parte punctato, pro parte minute et reducte plicato. L. 19 m. Cambodge — voisin de *obtusus* Bat., en diffère par l'avant-corps bleu, la sculpture plus fine du thorax, la bande antérieure des élytres bien plus étroite que la postérieure.

P. opacus mihi, du Laos, voisin de *obtusus* Bat., est entièrement mat sur le

(1) Toutes les nouveautés décrites font partie au moins de la collection Pic.

dessus du corps qui est noir, à peine teinté de violacé et a deux bandes jaunes aux élytres, moins larges que chez *obtusus*, la 1^{re} étant rétrécie vers la suture, le thorax est faiblement tuberculé, mais non denté, à sculpture forte, diversement ridée longitudinalement ou transversalement, sur les côtes.

Leontium indentatum n. sp. [Longic.]. Angustatus, viride-olivaceus, membris cyaneis; thorace subnitido, inerme, lateraliter vage tuberculato, minute, breve et irregulariter plicato, lateraliter aurato tincto, in disco opace, cyaneo bilinato et implicato; elytris opacis, subparallelis. L. 17 m. Annam. — Très caractérisé par son thorax dépourvu de tubercule saillant.

L. gracile n. sp. Valde angustatus, pro parte opacus, viride-olivaceus, membris cyaneis; thorace lateraliter transverse regulariter plicato, in disco medio impresso et implicato, ruguloso punctato, elytris elongatis, apice attenuatis. L. 17 m. Annam. — Plus étroit et d'une autre coloration que *laosensis* Pic.

L. diverseplicatum n. sp. Parum elongatus, opacus, postice valde attenuatus, thorace viride, medio cyaneo, diverse longitudinaliter et transverse plicato; elytris viride-olivaceis (*forma typica*), aut violaceo-cyaneis, ut thorace (*v. semiviolaceum*). L. 14-16 m. Annam. Tonkin. — Espèce caractérisée par sa sculpture thoracique, le thorax ayant des plis disposés dans tous les sens et aussi sur son milieu.

L. robusticolle n. sp. Sat latus, postice attenuatus, opacus, supra pro majore parte cyaneus, lateraliter et apice viridescens; thorace breve et lato, antice distincte-tuberculato et post medium dentate tuberculato, lateraliter diverse et minute plicato, medio implicato. L. 18 m. Tonkin. — A placer près de *Lameeri* Pic, plus large et à thorax particulier (1).

Glenea javana n. sp. [Longic.]. Elongatus, opacus, postice valde attenuatus, niger, pedibus rufescentibus; thorace postice albo, elytris in singulo post medium reducte albo fasciatis, ante et ad apicem albo maculatis. L. 9 m. Java. — Voisin de *funerula* Thos., élytres moins longs et très atténués postérieurement avec desins blancs plus nombreux.

G. Monhoti v. n. albidiversa. Chaque élytre orné sur le disque près de la base d'une macule supplémentaire blanche. Cambodge et Annam.

G. luteoapicalis v. n. mediojuncta. Les deux macules noires discales du thorax jointes. Tonkin.

Mausarideus diversenotatus Pic [Longic.]. Varie par la première bande foncée des élytres, divisée et isolée de la suture (*v. divisa*), ou la 1^{re} et la 2^e bandes divisées, réduites à cinq macules noires, dont une suturale (*v. multidiuisa*). Tonkin.

Strongylium fortocostatum n. sp. [Hété]. Angustatus, parum nitidus, niger, articulo ultimo antennarum luteo; capite thoraceque dense punctatis, illo subtransverso, lateraliter margino; elytris thorace paulo latioribus, elongatis, apice attenuatis, fortiter et anguste costatis, intervallis minute punctatis et plicatis. L. 11 m. Congo. — Espèce caractérisée par sa coloration conjointement, avec ses élytres fortement et étroitement costés.

(1) Ces diverses espèces de *Leontium* ont les membres bleus et le dessous du corps généralement vert.

S. variefoveolatum n. sp. Oblongus, nitidus, æneus, infra corpore et epipleuris viride-olivaceis; capite thoraceque minute et sparse punctatis, illo lateraliter incarinato; elytris latis, sat brevibus, postice attenuatis, diverse et parum regulariter foveolatis, foveis pro parte striatis. L. 11 m. Gabon. — Voisin de *cingulatum* Geb. sculpture élytrale un peu différente, cuisses non marquées de rouge.

S. latestriatum n. sp. Parum elongatus, paulo nitidus, viride-metallicus, pro parte aurato tinctus, antennis nigris; capite thoraceque fortiter et dense punctatis, illo parum transverso, lateraliter marginato; elytris thorace paulo latoribus, parum elongatis, postice attenuatis, late striatis, striis fortiter punctato foveolatis, intervallis angustatis et elevatis. L. 12 m. Gabon. — Sans doute voisin de *nothum* Geb., qui est bien plus grand et cuivreux.

S. minimum n. sp. Elongatus, subopacus, parum rufo-testaceus, supra minute nigro signatus, membris luteis, antennis ad medium nigris. L. 5 m. Congo. — Voisin de *vagevittatum* Geb.

S. politum n. sp. Elongatus, postice attenuatus, viridis et metallicus, supra olivaceo-æneus, femoribus ad basin, vage rufis. L. 12 m. St.-Léone. — Espèce caractérisée par les stries indistinctes et la fine ponctuation des élytres.

S. purpureolineatum n. sp. Elongatus, postice attenuatus, convexus, nitidus, viridis, pro parte cupreo tinctus, elytris longitudinaliter anguste cupreo-purpureo et violaceo lineatis. L. 18, 19 m. Côte-d'Ivoire. — A placer près de *cupripes* Imh.

S. benitense n. sp. Parum elongatus, robustus, convexus, nitidus, viridescens, infra corpore pro parte, antennis ad basin pedibusque cyaneis. L. 26 m. Congo. — Voisin de *dichroum* Ths., plus robuste et coloration différente.

S. angustatum n. sp. Angustatus, subparallelus, nitidus, nigro-cyaneus, elytris vage purpureis, pedibus nigro-æneis, femoribus tibiisque pro parte rufis. L. 9 m. Côte-d'Ivoire. — A placer près de *geniculatum* Th., en diffère à première vue par sa forme très étroite et presque parallèle.

Xanthothopia olivacea mihi, du Gabon, qui est voisin de *angustata* mihi, et de coloration analogue, s'en distingue par la forme moins étroite, le thorax plus robuste et plus régulièrement ponctué, les élytres subparallèles et foncés, olivâtres comme l'avant-corps.

Lema viridescens n. sp. [Phytoph.]. Oblongus, niger, supra viridescens, membris nigris; thorace breve, sat lato, paulo strangulato, ad basin medio paulo impresso, elytris sat brevibus, sat fortiter lineato-punctatis, postice striatis et costulatis. L. 4 m. B.-Ayres. — Peut se placer près de *platanensis* Pic, bien distinct par la coloration verdâtre du dessus et la sculpture élytrale.

L. viridiventris mihi, de la R. Argentine, à coloration verdâtre avec le dessus un peu bronzé, les membres roux, marqués de foncé, ressemble à *annulimembris* Pic, s'en distingue par le dessous du corps foncé, les pattes moins claires, les élytres plus fortement impressionnés, moins rétrécis au sommet.

L. infrarufa n. sp. est roux avec les élytres violacés et les membres noirs; thorax court et large, fortement étranglé et sillonné transversalement; élytres assez larges, peu longs, faiblement impressionnés antérieurement, en dedans des épaules

et sur le disque, à ponctuation faible, disposée en rangées, peu sillonnées-costulées à l'apex. L. 6 m. R. Argentine. — Peut se placer près de *Ariadne* Baly, coloration et sculpture des élytres différentes.

L. Baeri n. sp. Oblongo-elongatus, nigro metallicus, elytris paulo olivaceis, lateraliter testaceo marginatis, ad humeros et apice sat late testaceo notatis, thorace breve, sat lato; elytris latis et elongatis, parum fortiter lineato-punctatis, inimpres-sis. L. 9 m. Pérou. — Diffère de *speciosa* Baly, par le thorax concolore, les pattes foncées.

L. maronica n. sp. Oblongus, niger, elytris lateraliter postice et apice luteis, abdomine, antennis pedibusque luteis; thorace apice parum robusto; elytris sat latis, parum brevibus, antice depressis, minute lineato-punctatis. L. 8 m. Guyanne. — Espèce bien caractérisée par sa particulière coloration.

L. nigrimembris n. sp. Oblongo-subparallelus, rufus, membris nigris: thorace breve et lato, postice paulo strangulato; elytris sat brevibus, antice arcuate impres-sis, minute lineato-punctatis, postice paulo sulcatis et costulatis. L. 6 m. R. Argen-tine. — A placer près de *rubida* Lac., dont la base des cuisses postérieures est rous-se. Parfois les cuisses sont rousses (v. n. *rufofemoralis*).

L. melanciasus mihi, du Brésil, voisin du précédent, et long de 7 mm. a une plus faible dépression élytrale et possède le 1^{er} article des antennes, les cuisses et la base des tibias roux, le reste de ces organes étant noir.

L. rufa v. n. *geræzensis*, du Brésil, a les membres entièrement foncés.

L. fulvina v. n. *pernanbuçosa* a les élytres sans impression marquée et dépour-vus de macule humérale noire. Brésil.

L. flavescens n. sp. Oblongus, flavo testaceus, articulo 4^o antennarum apice, 5 et sequentibus nigris, pectore externe nigro maculato, elytris latis et brevibus, an-tice vage impressis, fortiter sat regulariter punctatis. L. 5 m. B.-Ayres — Peut se placer près de *ferrugata* Lac.

L. tucumana n. sp. Oblongus, rufus, elytris pallidioribus, his ad humeros viride maculatis; capite antice antennisque nigris, pedibus rufis, tarsis apice paulo, femo-ribus posticis apice tarsisque pro parte nigris; thorace breve, sat lato, minute stran-gulato; elytris sat latis et brevibus, lineato-punctatis, antice paulo impressis. L. 4, 5 m. R. Argentine. A placer près de *nigromaculata* Pic.

L. 8-notata mihi, du Brésil, offre la coloration générale de *immaculata* Lac., dont il se distingue par le thorax orné, de chaque côté, d'une ligne postérieure noi-re et, en outre, maculé en dessous, près des pattes antérieures, avec les dessins noirs des élytres différents de forme, ceux-ci composés sur chaque étui, d'une double macule préscutellaire, d'une macule apicale commune, tronquée en avant, d'une ma-cule humérale, avec au dessus et en dessous du milieu, une bande transversale rac-courcie et non triangulaire.

L. platanensis v. n. *obscuripes*. Pattes foncées ainsi que les antennes. B.-Ayres.

(A. suïcre.)

M. Pic.
Le Gérant : E. REVERET.