



L'Échange, Revue Linnéenne

Coléoptères du globe (suite) ⁽¹⁾

Lema bicoloricornis n. sp. [Phytophage]. Oblongus, testaceus, antennis nigris, articulo 1° et ultimis paulo rufescentibus, femoribus apice, tibiis tarsisque nigris. L. 4,5 m. B.-Ayres. — Moins robuste que *flavescens* Pic, avec la poitrine non marquée de foncé, les antennes plus grêles.

L. ruficolor mihi, de la R.-Argentine, taille et fascies du précédent, mais roux avec les antennes toutes noires, l'extrémité des cuisses, les tibias et tarses également noirs.

L. infraatra n. sp. Oblongus, sat latus, niger, capite thoraceque rufis, elytris cyaneis, antice fortiter et arcuata impressis. L. 6 m. R.-Argentine. — Voisin de *pauloensis* Pic, en diffère, à première vue, par le dessous du corps noir.

L. diversiceps n. sp. Oblongo-elongatus, niger, capite medio rufo, inter oculos nigro maculato, elytris cyaneo-viridibus, antice vage impressis. L. 5 m. Tucuman — Peut se placer près de *maculifrons* Ch.

Cryptocephalus Tixieri n. sp. [Phytophage]. Oblongus, nitidus, rufo-testaceus, elytris nigris, post scutellum breve rufo notatis. L. 5 m. Tonkin. — A placer près de *inscutellaris* Pic.

C. biluteomaculatus n. sp. Oblongus, nitidus, rufo-testaceus, elytris nigris, post scutellum breve rufo notatis. L. 5 m. Tonkin. — A placer près de *inscutellaris* Pic.

C. biluteomaculatus n. sp. Oblongus, nitidus, rufo-luteus, thorace postice nigro bincato, elytris nigris, in singulo infra humeros rufo-luteo notatis et intus ad medium rufo-luteo maculatis. L. 3 m. Indes Mér. — Voisin de *madurensis* Jac.

C. bimaculiceps n. sp. Oblongus, nitidus, rufo-testaceus, capite inter oculos brunneo bimaculato, elytris nigris, epipleuris rufis. L. 4 m. Indes Mér. — Voisin du précédent, très distinct par les élytres immaculés.

C. maheensis n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, rufo-testaceus, elytris in singulo ad basin et post medium transverse nigro bimaculatis, pygidio et infra corpore pro parte nigris. L. 8 m. Indes. — A placer près de *atroapicalis* Pic.

Abirus attenuatus n. sp. [Phytophage]. Oblongus, postice valde attenuatus, glaber, viridi-metallicus, pro parte vage aurato tinctus, antennis nigris, ad basin pro parte rufis; thorace breve, lateraliter subsinuato, angulis anticis rectis, sat fortiter et sparse punctato; elytris sat brevibus, longe attenuatis, fortiter punctatis, pro parte transverse plicatis. L. 5 m. Basilan. — Caractérisé par sa forme élytrale.

Abirus Harmandi Lef. varie par le dessus du corps de coloration générale ver-

(1) Les formes diverses, sans indications spéciales, sont dans ma collection.

dâtre (*v. viridescens*) ou bronzée teintée de cuivreux (*v. cuprescens*). La *v. curlus mihi*, du Tonkin, est de forme raccourcie, le thorax est nettement arrondi sur les côtés, la coloration générale verdâtre, en partie et faiblement teintée de cuivreux doré.

A. sinensis v. n. Guerrii. Coloration générale bleue. Chine.

Apophyllia Raffrayi n. sp. [Phytophage]. Parum elongatus, niger, elytris viridibus, capite antice, antennis ad basin pedibusque testaceis; antennis elongatis et gracilibus, articulo 1° supra piceo notato, 3° 2° duplo longiore, 3° et 4° æqualibus; tibiis rectis. L. 4,5 m. Abyssinie. — Peut se placer près de *semiobscura* Frm., en diffère, à première vue, par sa pubescence grise.

A. Fruhstorferi n. sp. Elongatus, niger, elytris viridibus, capite antice breve, articulo 1° antennarum ad basin pedibusque testaceis, tarsis obscuris. L. 6 m. Java. — Peut se placer près de *pallipes* Jac.

A. Kannegeteri n. sp. Elongatus, niger, elytris viridibus, elongatis, apice impressis, pedibus testaceis, tarsis pro parte obscuris. L. 7 m. Java. — A placer près de *nigriceps* Lab., plus grand, avec les élytres impressionnés au sommet.

A. robustior mihi, du Yunnan, analogue à *nigriceps* Lab., est plus robuste, avec la tête plus grosse, les pattes plus robustes, en partie rembrunies.

A. medana n. sp. Elongatus, niger, elytris viridibus, capite antice, thorace, illo medio nigro notato, antennis ad basin pedibusque testaceis. L. 5 m. Sumatra. — Voisin de *ænescens* Frm., mais thorax avec une seule macule noire.

Strangalia nigra v. n. Giraudi [Longic.]. Diffère du type par la pubescence élytrale plus claire d'un blanc argenté, celle-ci aussi un peu plus longue. Beychac (Gironde). Capturée par M. Giraud et faisant partie de sa collection.

Leontium multiplicatum n. sp. [Longic.]. Elongatus, subparallelus, parum nitidus, viridis, supra parte aurato-purpureus, membris cyaneis; thorace fere regulariter et multi transverse plicato; elytris distincte unicostatis. L. 15 m. Japon. — Diffère de *tenellum* Bat. par la coloration et la structure thoracique.

Polyzonus obtusus v. n. reductus [Longic.]. La partie noire entre les larges fascies jaunes des élytres réduite à une courte bande isolée des bords. Cochinchine.

P. saigonensis v. n. semiviridis. Avant-corps, aussi d'ordinaire la base des élytres avec l'écusson verts. Cochinchine.

P. subobtus v. n. interruptus. Vert et élytres brillants, première fascie jaune des élytres éloignée de la suture, 2° complète. Annam.

Cephaloclerus niger [Cleride]. Plus minusve elongatus, nitidus, sparse albo pubescens et hirsutus, antennis luteo-testaceis; pedibus luteo-testaceis (*forma typica*), aut late nigris, femoribus ad basin paulo luteis (*v. obscuripes*). L. 4 m. Congo. — A placer près de *flavipes* H., en diffère (ex descr.) au moins par le thorax non fortement ponctué.

C. semiviridis n. sp. Parum elongatus, nitidus, albo-pubescens et hirsutus, nigro-metallicus, capite et thorace paulo cyanescentibus, illo supra paulo cupreato; elytris viridi-metallicis, membris flavo-testaceis, abdomine flavo, apice nigro-metallico. Long. 4 m. Congo. — Peut se placer près de *metallicollis* Pic.

C. viridipennis v. n. diversipes. Pattes bicolores. claires, cuisses annelées de foncé, tibias foncés, à sommet clair. Congo.

C. Villiersi n. sp. Parum robustus, nitidus, sparse albo pubescens et hirsutus, nigro æneus, elytris ad apicem externe luteo notatis, capite antice membrisque testaceis, capite latissimo; thorace breve et lato, postice angustiore, diverse et sparse punctato; elytris parum brevibus, apice dehiscentibus, fortiter et irregulariter punctatis. L. 4 m. Sénégal : Dakar (Communiqué par A. Villiers et aussi dans ma collection). — Espèce à coloration élytrale particulière.

Axina diversesignata n. sp. [Cleride]. Elongatus, nitidus, infra niger, abdomine apice testaceo marginato, luteo-rufescens, elytris paulo luteis, lateraliter, apice excepto, diverse nigro marginatis, ante apicem nigro fasciatis, membris pro majore parte nigris; elytris antice et ad medium fortiter non regulariter punctatis, postice minute et sparse punctatis. L. 14 m. Brésil. — Paraît différer de *analis* Kirb. par les élytres à bordure foncée irrégulière, élargie à la base.

A. plagiata v. n. **ininterrupta**. Les lignes noires des élytres sont irrégulièrement réunies entre elles. Brésil.

A. parcepunctata v. n. **uninotata**. Elytris luteis, postice late nigro-piceo maculatis. Brésil.

Cantharis vesicatoria v. n. **purpureicolor**. [Hétér.]. Dessus du corps de coloration générale pourprée; v. n. *bipartitipennis*. dessus du corps vert, parfois peu teinté de doré, élytres bicolores, verts en avant et cuivreux-pourprés postérieurement. Les Guerreaux (Pic).

Anaspis angustata n. sp. [Hétér.]. Elongatus et angustatus, postice attenuatus, parum nitidus, griseo pubescens, niger, membris rufescentibus. L. 3 m. Congo. — Plus allongé que *atricolor* Pic, en diffère par ses pattes non foncées.

A. holosericea mihi, du Congo, a la coloration générale foncée, les antennes un peu épaisses, noires à base testacée, d'une forme moins étroite que le précédent, les tarses postérieurs sont en partie annelées de roux. La v. *minuscule*, d'environ 1 mill., a les pattes entièrement claires.

A. congoana n. sp. Elongatus, nitidus, parum griseo pubescens, rufo-testaceus, capite postice, antennis apice nigris, elytris ad basin et intus vage obscure signatis. L. 3 m. Congo. — Voisin de *Magnei* Pic, en diffère par la tête foncée postérieurement. Le dessous du corps est marqué de foncé sur la poitrine.

Strongilium fortestriatum n. sp. [Hétér.]. Parum elongatus, nitidus, cyaneus, elytris viridibus; capite thoraceque parum fortiter et dense punctatis, illo sat lato, lateraliter incarinato, antice marginato; elytris thorace sat latioribus, modice elongatis, postice attenuatis, fortiter striatis, striis mediocre punctatis. L. 17 m. Congo : Kátanga. — Voisin de *longicollis* Geb. par ses yeux assez rapprochés, avec une autre coloration.

S. librevilleum n. sp. Elongatus, parum nitidus, diversicolor, capite thoraceque viride-æneus, illo lateraliter late rufo et minute marginato; elytris rufis, scutello, infra corpore pedibusque viride metallicis. antennis nigris, ad basin rufis. L. 18 mill. Congo. — Sans doute voisin de *gabonica* Geb., qui est d'une autre coloration.

S. breveangulosum n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, infra antennisque nigris, supra olivaceus, pedibus rufis, tarsis et femoribus pro parte piceis; thorace particulière, lateraliter sinuato, parum distincte marginate et ad medium distincte dentato,

supra dense punctato et paulo plicato. L. 7 m. Gabon. — Espèce caractérisée par la structure du thorax.

Glenea unialbonotata n. sp. [Longic.]. Elongatus, subopacus, niger, capite antice albo, inter oculos nigro maculato; thorace supra albo, antice medio nigro maculato; elytris griseo-luteo pubescentibus, ante apicem reducte albo fasciatis, pectore et abdomine pro parte dense albo pubescentibus. L. 15 m. Tonkin. — Ressemble à *Vilulisi* Pic, avec les dessins noirs de l'avant-corps différents.

G. Vitalisi v. n. **bimaculatithorax**. Le disque du thorax, au lieu d'une macule noire médiane, en possède deux. Annam.

Selasia atricornis n. sp. [Malac.]. Parum elongatus, postice paulo attenuatus, nitidus, rufus, antennis, articulo primo excepto, elytrisque nigris, pectore pro parte obscuro. L. 5 m. Congo. — Caractérisé par ses antennes, sauf le 1^{er} article, noires.

S. ruficolor n. sp. Sat robustus, postice attenuatus, nitidus, rufus; capite et thorace latis, antennis parum crassis, brevibus, articulo 3^o triangulare; elytris parum elongatis, ad suturam impressis. L. 4 m. Mozambique. A placer près de *minuta* Kolbe.

S. pectoralis n. sp. Elongatus, postice attenuatus, nitidus, testaceus; antennis, articulis 2 primis exceptis, abdomineque nigris, pectore nigro notato; articulo 3^o antennarum triangulare. L. 5 m. Congo. — Caractérisé par les antennes, base exceptée, franchement noires et la poitrine marquée de foncé.

S. Chaboti Pic varie. v. **semilimbatus**: les élytres sont roux-testacés sur la base, largement noirs en arrière sauf une bordure suturale et latérale étroites; v. **separatus**: élytres entièrement noirs, antennes testacées avec le 3^o article triangulaire. Congo.

Malthodes robustus n. sp. [Malac.]. Robustus, parum elongatus, griseo pubescens, niger, articulis 2 basalibus antennarum testaceis, his parum gracilibus, articulis 2 et sequentibus elongatis; thorace-breve et lato; ad medium externe arcuate dilatato; elytris latis et brevibus, minute et dense punctatis. L. 3 m. Congo. — A placer près de *pilosicornis* Pic, moins brillant avec les élytres non marqués de clair au sommet.

M. atricornis n. sp. Elongatus, parum nitidus, griseo-pubescens, niger, elytris apice breve luteis; antennis sat gracilibus, articulo 2^o-3^o paulo brevior; thorace-breve et lato, lateraliter non angulato, elytris vage angustior; elytris parum elongatis, minute et dense punctatis. L. 2,5 m. Congo. — A placer près de *ugandensis* Pic.

Silidius rufotestaceus n. sp. ♂ [Malac.]. Elongatus, parum nitidus, rufo testaceus, fere unicolor, oculis, antennis, aliquot tarsis nigris; thorace obcordato, postice attenuato, ad medium postice late impresso. L. m. Congo: Kivu.

Silidius binotaticollis n. sp. ♂. Parum elongatus, subnitidus, supra rufus, elytris pallidioribus (thorace medio bi et elytris ad basin uni nigro maculatis); antennis, infra corpore pedibusque pro parte rufis, pro parte nigris, femoribus ad basin diverse rufis; thorace fere quadrato, postice subsinuato et ad medium tuberculato. L. 11 m. Congo. — Voisin de *Gestroi* Pic avec le thorax moins large, maculé de noir en avant et en arrière. La v. n. *bisbinotatus* n'a pas la base des élytres marquée de foncé.

(A suivre.)

M. Pic.

Le Cérant: E. REVERET.