

L'ÉCHANGE Revue Linnéenne



FONDÉE PAR LE DOCTEUR JACQUET

Organe des Naturalistes de la Région Lyonnaise et du Centre

CONTENANT LES DEMANDES D'ÉCHANGE

D'ACHAT OU DE VENTE DE LIVRES ET DE TOUT AUTRE OBJET D'HISTOIRE NATURELLE

M. PIC (*, O. I. P., O.), Directeur

Membre correspondant du Muséum de Paris

COMITÉ DE RÉDACTION OU COMITÉ D'ÉTUDES

J. Clermont, à CASTANRY-TOLOZAN (Haute-Garonne).
— *Aphodians paléarctiques, Histérides français.*

A. Méquignon, 53, avenue de Breteuil, PARIS (7^e). —
Coléoptères de France (Curculionides exceptés.)

Maurice PIC, Digoïn (Saône-et-Loire). — *Coléoptères d'Europe, Mélyridae, Plinidae, Nanophyes, Anthicidae, Fedilidae, Crioceridae, etc du globe. — Cerambycides de la Chine, du Japon, etc. Cryptocéphalides paléarctiques, MalacoDERMES du globe.*

Adresser toutes Communications

Concernant la Rédaction, les Échanges, les Abonnements et les Annonces

A. M. M. PIC, à Digoïn

Compte - courant postal : N° 31-306, Dijon.

(14 Février 1947)

SOMMAIRE

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE
DE FRANCE
BIBLIOTHÈQUE

Coléoptères du globe, par M. P.

liste
ES R

PRIX D'ABONNEMENT: UN AN, A PARTIR DU 1^{er} JANVIER

France : 30 francs.

Etranger : 50 francs.

MOULINS

LES IMPRIMERIES RÉUNIES

15, RUE D'ENGHIEN, 15

ANNONCES

La page	64 fr.	Le 1/4 de page	20 fr.
La 1/2 page	36 fr.	Le 1/8 de page	12 fr.

Réduction de 25 % pour les insertions plusieurs fois répétées

TARIF SPECIAL POUR LES ANNONCES ANNUELLES

PRIX DES SEPARATA

Les auteurs désirant des « Separata » de leurs articles, voudront bien s'entendre directement avec l'imprimeur.

EN VENTE

Chez l'auteur, M. Maurice PIC, directeur de l'*Echange*, à Digoin (Saône-et-Loire) pour l'étranger, ou à Les Guerreaux par St-Agnan (Saône-et-Loire) adresse ordinaire.

1^o L'ouvrage « *Matériaux pour servir à l'étude de Longicornes* » étant épuisé, des fascicules seulement restent à vendre, dont le 1^{er} cahier (traitant spécialement les variétés françaises omises dans de récents ouvrages) et le 11^e cahier plus récent.

2^o *Mélanges Exotico-Entomologiques*, qui comprennent 71 fascicules.

3^o *Opuscula Martialis ou Martialia*, qui comprennent 13 fascicules (1940-1944).

S'entendre pour les prix avec l'auteur. Paiement à l'avance. Frais de port à la charge de l'acheteur.

Pour les déterminations

Le Directeur de l'Echange s'offre pour déterminer des Coléoptères, ceux au moins rentrant dans ses groupes d'étude.

Tous les frais de poste et ceux nécessaires pour assurer le retour des insectes envoyés en étude sont à la charge de l'envoyeur.

Il ne sera répondu qu'aux lettres munies d'un timbre pour la réponse.

L'Échange, Revue Linnéenne

Coléoptères du globe (suite) ⁽¹⁾



Phytœcia vulneris v. n. Staudingeri [Cerambyc.]. Assez robuste, atténué postérieurement ; thorax orné d'une grande macule rouge transversale en avant, subtriangulaire sur son milieu postérieur, base des tibias postérieurs marquée de testacé, pygidium en partie jaune. Provenance ? (acquis de Staudinger). — Var. caractérisée par sa macule thoracique très développée.

Ph. virgula v. n. Bravardi. Petit, pygidium au sommet largement noir, dernier segment de l'abdomen noir avec une fascie transversale rousse. L. 6 m. Macédoine (ex Bravard). — Var. caractérisée par la coloration largement noire de l'extrémité abdominale.

Ph. pustulata v. n. adnexa. Grand exemplaire à longue tache carénée rouge au thorax, tibias postérieurs en partie marqués de roux sur le bord supérieur. Perse : Asterabad.

Psalydolytta uniformis n. sp. [Hétérom.]. Elongatus, sat dense et uniformiter griseo pubescens, niger, epistome antice rufo-marginato, palpis membrisque nigris. L. 30 m. Soudan. — Voisin de *flavicornis* Maek, en diffère par la coloration générale noire avec les membres entièrement foncés.

P. flavicornis v. n. inlineata. Corpus niger, elytris in disco uniformiter pubescentibus, inlineatis, labro, clypeo pro parte, palpis et antennis testaceis. L. 30 m. Soudan.

P. Theresæ n. sp. Elongatus, dense griseo pubescens, niger, elytris anguste testaceo marginatis et in disco testaceo lineatis, membris rufo-testaceis. Capite nigro, labro, epistome et palpis rufis ; antennis gracilibus, ♂ articulo 3^o dilatato et impresso, ♀ elongato ; thorace breve et lato, capite angustiore, medio griseo lineato ; scutello albido ; elytris parallelis, apice arcuatis. Linea discalis elytrorum oblitérata (*v. n. oblitérata*). L. 16 m. Fort-Crampel. — Espèce caractérisée par la structure antennaire ♂, à placer près de *Jaloffa* Cast.

La var. *notatithorax* mihi, du Niam-Niam, a le thorax moins foncé marqué de testacé antérieurement avec coloration analogue des élytres et des membres.

P. fusca v. n. obscuricolor. Noir à pubescence grise, tête et thorax avec une ligne médiane blanche nette, antennes testacées, élytres foncés, à pubescence grise-fauve, bordure et bande discale complète blanches. Congo.

P. jaloffa v. n. longissima. Valde elongatus, niger, dense griseo pubescens, epistome antice, antennis ad basin, femoribus et tibiis testaceis, tarsis obscuris. L. 19 m. Haut-Niger. — Diffère au moins de la forme typique par les élytres non bordés de clair.

(1) Sauf indications spéciales, les nouveautés décrites figurent dans la collection Pic.

P. atripalpis n. sp. Elongatus, dense griseo-luteo pubescens, concolor, niger, palpis et membris nigris. L. 10-13 m. Oubangui. — Diffère de *cineracea* Maek., à première vue, par sa coloration générale noire, tous les membres, avec les palpes compris.

P. Crampeli v. n. *luteolineata*. Elytres ornés d'une bande discale claire avec une ligne transversale noire vers les épaules. Dahomey et Sénégal.

P. notaticeps n. sp. Elongatus, dense griseo pubescens, niger, elytris dilutioribus, capite pro parte testaceo et pro parte nigro, antennis nigris, ad basin rufis, articulis 2-3 sat brevibus, fere æqualibus; pedibus nigris. L. 17 m. Sénégal. — A placer près de *vestita* Duf., peut être simple modification de cette espèce.

P. vestita v. n. *basipennis*. Rufescens, pro parte dense cinereo pubescens, thorace et infra corpore obscurioribus, capite et membris rufo-testaceis, elytris ad basin brunneo-fulvo notatis. Sénégal. — Caractérisé au moins par la base des élytres nettement plus foncée. Le ♂ a les antennes aplaties et élargies à la base.

Epicauta atricolor n. sp. [Hétérom.]. Angustatus, parum dense griseo pubescens, unicolor, niger, ♂ articulo 3° antennarum parum elongato et crasso. L. 13 m. Sénégal. — Caractérisé par sa coloration générale noire et le 3° article des antennes.

Epicauta Donckieri n. sp. ♀. Elongatus, paulo nitidus, parum non clare pubescens, niger; capite sat robusto, medio sulcato; thorace sat breve, antice attenuato, medio sulcate-impresso; elytris elongatis, parallelis, opacis; articulo 3° antennarum longissimo. L. 27 m. Afrique (ex Donckier). — Coloration analogue au précédent, très caractérisé par sa grande taille.

Epicauta ou **Lytta bifoveiceps** v. n. *semiviridis*. Un peu allongé, vert métallique avec la tête et les membres noirs, le thorax peu long, rétréci en avant, rouge avec deux petites taches noires sur le disque. Tanganyka. — Diffère au moins de *bifoveiceps* Frm. par la coloration verte des élytres.

Epicauta ou **Lytta cærulescens** n. sp. Angustatus, nitidus, elytris opacis, nigro-cyanescens, pro parte viridescens, membris nigris; capite parum elongato, postice subarcuato, sparse punctato; antennis, sat gracilibus, articulo 2° breve, 3°-6° sat brevibus, sequentibus longioribus; thorace elongato, antice strangulato, supra postice impresso, parum punctato; elytris parallelis, minute et dense punctatis. Long. 15 m. Provenance? — A placer près de *Dusaulti* Duf.

Ommadius Rouyeri n. sp. [Clérède]. Elongatus, nitidus, griseo-holosericeo pubescens, pro parte nigro-piceus, capite antice, elytris ad basin abdomineque luteis, elytris rufis, nigro-piceo undulato trifasciatis, sutura rufa; antennis brevibus, articulo ultimo sat breve et lato, nigris, ad basin flavis, thorace parum elongato, subcarinato, sat distincte griseo lineato; elytris lineato-punctatis; pedibus nigris, femoribus ad basin et infra longe, tibiis ad basin paulo tarsisque testaceis. L. 8 m. Java. — A placer près de *trifasciatus* Cast.

O. multisignatus n. sp. Elongatus, parum nitidus, niger, capite antice, antennis ad basin, abdomine et pedibus pro parte flavis, elytris rufis, antice in singulo nigro tri aut quadri-notatis et humeros piceo notatis, post medium sinuate nigro fasciatis

et ante apicem reducte nigro fasciatis ; thorace parum elongato, incarinato ; elytris antice striato-punctatis, interne ad scutellum paulo granulatis ; pedibus flavis, femoribus supra nigro maculatis, posticis apice longe nigris, tibiis late nigris, posticis ad basin et apice testaceis. L. 10 m. Australie. — Paraît distinct des espèces décrites d'Australie par les élytres roux, à nombreux signes noirs. Peut se placer près de *Amberbakii* Kuw.

Silidius kivuensis mihi [Malac.], du Congo, voisin de *binotaticollis* Pic et de coloration générale testacée, non maculé de foncé, les membres étant noirs avec le 1^{er} articles des antennes en partie et les cuisses largement testacées à la base.

Chauliognathus infrabasalis n. sp. [Malac.]. Parum elongatus, postice attenuatus, opacus, elytris ad basin nitidis, luteo-testaceus, capite pro majore parte, antennis, articulis primis exceptis, pectore pro parte tarsisque nigris, thorace multi et diverse nigro signato ; elytris ad basin infra nigro maculatis, his punctatis. L. 10 m. Brésil. — A placer près de *multilineatus* Pic et caractérisé par les macules basales des élytres non visibles du dessus.

C. Leopoldi mihi, du Brésil, voisin du précédent, est plus atténué postérieurement, avec les élytres un peu granuleux et dentés au sommet ; il a une coloration générale testacée ou flave avec la tête maculée de noir, les membres bicolores.

C. Emili n. sp. Elongatus, subopacus, luteus, capite nigro et thorace brunneo maculatis, membris rufis et nigris ; elytris elongatis, apice attenuatis et dentatis, paulo granulosis, in singulo post medium intus minute nigro maculatis. L. 8 m. Brésil. — Peut se placer près de *ochraceus* Bl.

C. bireductipennis n. sp. Oblongo-elongatus, subnitidus, rufo-luteus, capite pro parte membrisque ex parte nigris, elytris in singulo ad basin reducte nigro bimaculatis, his minute punctatis, lateraliter, medio subparallelis. L. 13 m. Brésil. — A placer près de *fallax* Germ.

Clada laticollis n. sp. [Anobiide]. Parum elongatus, subnitidus, nigro-piceus aut rufescens, pro parte griseo-luteo pubescens ; thorace sat breve et lato, lateraliter postice subarcuato, mediocre punctato et granuloso ; elytris thorace paulo latioribus, parallelis, apice oblique attenuatis, pro majore parte striato-punctatis, vage et paulo subcostulatis. L. 5-6 m. Ethiopie : Bourié (Muséum de Paris). — Voisin de *humeralis* Pic, en diffère par le thorax plus étroit que les élytres.

Xyletinus robustus n. sp. [Anobiide]. Oblongus, sat latus, convexus, parum nitidus, rufo-brunneus, antennis testaceis ; thorace robusto, sat breve, angulis anticis latis et rotundatis, minute et dense punctato ; elytris latis, parum brevibus, postice paulo attenuais, intus lineato-punctatis, extus striatis. L. 6 m. Afr. Au^{le}. — Espèce mimant en plus robuste le genre *Metholcus* II.

Mesozaelopus Jeanneli n. sp. [Anobiide]. Oblongo-elongatus, nitidus, nigro-piceus, capite rufo, antennis testaceis, thorace antice diverse rufo, illo robusto, antice attenuato, minute sat dense punctato, elytris postice valde attenuatis, minute pro parte ruguloso-punctatis, apice diverse rufescentibus. L. 3 m. Ethiopie : Bourié (Muséum de Paris et coll. Pic). — Caractérisé par sa taille supérieure à la normale.

Lasioderma curtum n. sp. [Anobiide]. Minutus, subovatus, postice attenuatus, nitidus, rufo-testaceus, oculis nigris ; thorace breve et lato, fere uniformiter pubescente, minute sat sparse punctato ; elytris brevibus, postice attenuatis, minute sat dense punctatis. L. 1-1,5 m. Bourié (Muséum de Paris et coll. Pic). — Espèce caractérisée par sa très petite taille, ses élytres courts.

L. tanganum n. sp. Oblongus, nitidus, rufescens, capite thoraceque pro parte obscuris ; thorace sat breve et lato, minute sat sparse punctato ; elytris parum elongatis, postice attenuatis, minute sat sparse punctatis. L. 3 m. Tanga. — A placer près de *Seydeli* Pic, dont il n'est peut-être qu'une variété.

Isnus rufo-apicalis n. sp. [Phytophage]. Oblongo-subovatus, nigro-olivaceus, elytris apice rufo-maculatis, pedibus pro parte rufis ; thorace breve, antice attenuato, sat fortiter et dense punctato ; elytris latis et brevibus, intus paulo striato-punctatis, externe subsulcatis. L. 1,5 m. Kenya. — A placer près de *niger* W.

Cœnobius rufomaculatus n. sp. [Phytophage]. Oblongo-subovatus, nitidus, niger, elytris ad suturam postice rufo maculatis, antennis et pedibus pro parte rufis, antennis sat brevibus, gracilibus, articulis ultimis latioribus et nigris ; thorace breve et lato, antice attenuato, in disco minute, lateraliter, fortiter et inæquale punctato, ad basin transverse lineato punctato ; scutello angustato et elongato ; elytris latis et brevibus, intus minute striato-punctatis, externe fortiter striatis. L. 2 m. Kenya : Kitale (Mus. de Paris). — Voisin de *Sjosstedti* W., en diffère par les pattes presque entièrement rousses, le thorax dépourvu d'impressions ponctuées.

Lema bidisjuncta n. sp. [Phytophage]. Oblongo-elongatus, niger, capite postice rufo, viride maculato, thorace rufo, postice paulo strangulato et subsulcato ; elytris rufis, viride notatis, antice in singulo macula humeralis, macula discoidalis ante medium, macula interna presuturalis elongata, apice late viride notato ; femoribus ad basin reducte rufis. L. 4,5 m. Tucuman. — Voisin de *dorsalis* Ol.

L. tapenagosa mihi, de la R. Argentine, de forme plus large que le précédent et de coloration proche, n'a pas la tête marquée de vert sur le vertex, les élytres ont une grande macule verte apicale analogue et seulement sur chacun une macule humérale et une macule discale antémédiane.

L. ingrabilis mihi, de la Guyane, de forme analogue au précédent, a le dessous du corps bicolore, les cuisses largement claires, les élytres à macule postérieure laissant, extérieurement, le sommet clair avec une macule antérieure en forme de T renversé et une macule humérale. Peut se placer près de *gracilis* Lac.

Grammoptera ustulata v. n. *semirufescens* [Long.]. Avant-corps et dessous noirs sauf extrémité de l'abdomen rousse, élytres teintés de roussâtre et ainsi de coloration nettement plus claire que celle de l'avant-corps. De mes anciennes chasses aux Guerreaux.

(A suivre.)

M. Pic.

Le Gérant : E. REVERET.

Souhais, dissertations et renseignements divers

Le propriétaire-directeur du présent périodique profite de la couverture du 1^{er} numéro de 1947 pour exprimer ses multiples souhaits aux abonnés de « L' Echange », ainsi qu'à ses anciens et nouveaux correspondants. Il déplore de n'avoir pu obtenir aucune nouvelle de certaines entomologistes avec lesquels il était en bonnes relations courtoises autrefois (on ignore aujourd'hui à peu près ce qui se passe dans certains pays) et serait heureux d'en recevoir, les espérant toutes satisfaisantes. Quittant le style impersonnel, j'ajouterai: mes souhaits sont complexes, inutile de les énumérer, je les résume ainsi: tout ce que chacun peut désirer, en mettant en tête une bonne santé et un excellent moral. A l'aide de ces deux puissantes forces, la santé et un bon moral, je crois que l'on peut espérer une existence pas trop dure et douloureuse malgré les épreuves ou les peines qui peuvent s'abattre sur vous. J'ai passé par de dures épreuves du cœur; par la force de la volonté, l'acharnement au travail avec l'appui de la santé, je suis parvenu à sortir de la mauvaise passe et à reprendre une vie peu près normale. Je souhaite cordialement à tous, jeunes ou vieux, une constitution robuste, la considérant comme le plus grand des biens. Tous les entomologistes désirent naturellement quelques captures merveilleuses, des raretés, une forme inconnue, qui leur causeront de grandes joies ou une légitime fierté; je souhaite aussi à tous de belles et nombreuses conquêtes... non féminines.

L'ignorance généralisée qui continue à subsister entrave parfois vos travaux, tout au moins les expose à des lacunes regrettables; il serait utile que cette situation cesse. On pense à des musées où se trouvent de vos types; on songe à des collègues dont on a jamais eu à se plaindre et conservé de bons souvenirs; ne rien savoir d'eux vous plonge dans la mélancolie, ou une grande tristesse en songeant au pire.

Souhaitons encore que l'année 1947 nous apporte, avec de bonnes et générales nouvelles, un peu de lumière paisible et que doucement toutes les relations courtoises des temps meilleurs soient reprises au cours de l'année qui commence. Je remercie à l'avance ceux qui pourraient me donner des indications ou des précisions sur les musées ou collègues étrangers, sujets qui me préoccupent beaucoup et viennent souvent assombrir un peu plus mes tristes pensées.

M. PIC.

Par mesure d'équilibre financier, les frais de poste ou d'impression augmentant sans cesse, une augmentation du prix de l'abonnement s'impose; en conséquence, pour 1947, l'abonnement à « L'Echange » sera de 30 francs pour la France et de 50 pour l'étranger.

L'abonnement devra être payé au plus tard après la réception du 1^{er} numéro. Il sera inutile de réclamer le 2^e ou le 3^e numéro du journal, si l'abonnement n'a pas été réglé. Il ne sera pas répondu aux demandes commerciales ou autres intéressées qui ne contiendraient pas de timbres pour la réponse. Il est demandé à ceux qui envoient des insectes à déterminer de vouloir bien prendre à leur charge les frais de retour. En cas d'abus, le déterminateur se réserve le droit de se payer en nature et à son choix.

Les anciennes années qui pourraient être demandées, ainsi que les autres publications, ne seront expédiées que sous garantie expresse de paiement. L'argent versé d'avance sera exigé pour l'étranger.

Notes de chasses

Le directeur de « L'Echange » a observé de nouveau, en 1946 et à plusieurs reprises, que la punaise bleue, *Dicrenis caerulea* L., peu commune malheureusement, s'attaquait aux larves des Doryphores. A signaler la capture aux Guerreaux, le 25 août, d'une mante religieuse; c'est seulement le 2^e exemplaire capturé dans la région.

Dans une promenade entomologique, faite le 6 juillet dans les bois de Chizeuil, près de Digoïn, et sur de jeunes rejets de bouleaux, quelques exemplaires du rare *Cryptocephalus punctiger* Payk. ont été recueillis; l'espèce n'avait pas encore été capturée dans la région.

De la même chasse, on peut citer les Coléoptères suivants peu communs: *Malthinus balteatus* Suf., *Rhynchites caeruleus* Schr. et *sericeus* Her., *Magdalis memnonia* Gylh., *Cryptocephalus marginatus* F.

Même observation pour le cabinet d'élevage négligé en 1946 que celle faite l'an passé.