

L'ÉCHANGE

# Revue Linnéenne



FONDÉE PAR LE DOCTEUR JACQUET

Organe des Naturalistes de la Région Lyonnaise et du Centre

CONTENANT LES DEMANDES D'ÉCHANGE

D'ACHAT OU DE VENTE DE LIVRES ET DE TOUT AUTRE OBJET D'HISTOIRE NATURELLE

M. PIC (\*, O. I. P., O.), Directeur

Membre correspondant du Muséum de Paris

COMITÉ DE RÉDACTION OU COMITÉ D'ÉTUDES

J. Clermont, à CASTANET-TOLOZAN (Haute-Garonne).  
— Aphodians paléarctiques, Hétéroptères français.

A. Méquignon, 53, avenue de Breteuil, PARIS (7<sup>e</sup>). —  
Coléoptères de France (*Circulionides* exceptés.)

Maurice PIC, DIGOIN (Saône-et-Loire). — Coléoptères  
d'Europe, Mélyridae, Ptinidae, Nanophyes, Anthi-  
cidae, Pédilidae, Crioceridae, etc du globe. — Ceram-  
bycidae de la Chine, du Japon, etc. *Cryptocepha-  
lides paléarctiques*, Malacostrèmes du globe.

Adresser toutes Communications  
Concernant la Rédaction, les Échanges, les Abonnements et les Annonces

A. M. M. PIC, à Digoïn  
Compte - courant postal : N° 31-306, Dijon.

(14 Février 1947)

SOMMAIRE

Coléoptères du globe, par M. P.

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE  
DE FRANCE  
BIBLIOTHÈQUE

PRIX D'ABONNEMENT: UN AN, A PARTIR DU 1<sup>er</sup> JANVIER

France : 30 francs.

Etranger : 50 francs.

MOULINS  
LES IMPRIMERIES RÉUNIES  
15, RUE D'ENGHIEN, 15

## ANNONCES

---

La page . . . . .	64 fr.	Le 1/4 de page . . . . .	20 fr.
La 1/2 page . . . . .	36 fr.	Le 1/8 de page . . . . .	12 fr.

*Réduction de 25 % pour les insertions plusieurs fois répétées*

TARIF SPECIAL POUR LES ANNONCES ANNUELLES

---

## PRIX DES SEPARATA

---

*Les auteurs désirant des « Separata » de leurs articles, voudront bien s'entendre directement avec l'imprimeur.*

---

## EN VENTE

---

Chez l'auteur, M. Maurice PIC, directeur de l'*Echange*, à Digoin (Saône-et-Loire) pour l'étranger, ou à Les Guerreaux par St-Agnan (Saône-et-Loire) adresse ordinaire.

1<sup>o</sup> L'ouvrage « *Matériaux pour servir à l'étude de Longicornes* » étant épuisé, des fascicules seulement restent à vendre, dont le 1<sup>er</sup> cahier (traitant spécialement les variétés françaises omises dans de récents ouvrages) et le 11<sup>e</sup> cahier plus récent.

2<sup>o</sup> *Mélanges Exotico-Entomologiques*, qui comprennent 71 fascicules.

3<sup>o</sup> *Opuscula Martialis ou Martialia*, qui comprennent 13 fascicules (1940-1944).

S'entendre pour les prix avec l'auteur. Paiement à l'avance. Frais de port à la charge de l'acheteur.

---

### Pour les déterminations

*Le Directeur de l'Echange s'offre pour déterminer des Coléoptères, ceux au moins rentrant dans ses groupes d'étude.*

*Tous les frais de poste et ceux nécessaires pour assurer le retour des insectes envoyés en étude sont à la charge de l'envoyeur.*

*Il ne sera répondu qu'aux lettres munies d'un timbre pour la réponse.*

# L'Échange, Revue Linnéenne

## Coléoptères du globe (suite) <sup>(1)</sup>



**Phytoecia vulneris v. n. Staudingeri** [Ceram.]. Assez robuste, atténué postérieurement ; thorax orné d'une grande macule rouge transversale en avant, subtriangulaire sur son milieu postérieur, base des tibias postérieurs marquée de testacé, pygidium en partie jaune. Provenance ? (acquis de Staudinger). — Var. caractérisée par sa macule thoracique très développée.

**Ph. virgula v. n. Bravardi**. Petit, pygidium au sommet largement noir, dernier segment de l'abdomen noir avec une fascie transversale rousse. L. 6 m. Macédoine (ex Bravard). — Var. caractérisée par la coloration largement noire de l'extrémité abdominale.

**Ph. pustulata v. n. adnexa**. Grand exemplaire à longue tache carénée rouge au thorax, tibias postérieurs en partie marqués de roux sur le bord supérieur. Perse : Asterabad.

**Psalydolytta uniformis** n. sp. [Hétérom.]. Elongatus, sat dense et uniformiter griseo pubescens, niger, epistome antice rufo-marginato, palpis membrisque nigris. L. 30 m. Soudan. — Voisin de *flavicornis* Maek, en diffère par la coloration générale noire avec les membres entièrement foncés.

**P. flavicornis v. n. inlineata**. Corpus niger, elytris in disco uniformiter pubescentibus, inlineatis, labro, clypeo pro parte, palpis et antennis testaceis. L. 30 m. Soudan.

**P. Theresæ** n. sp. Elongatus, dense griseo pubescens, niger, elytris anguste testaceo marginatis et in disco testaceo lineatis, membris rufo-testaceis. Capite nigro, labro, epistome et palpis rufis : antennis gracilibus, ♂ articulo 3<sup>o</sup> dilatato et impresso, ♀ elongato ; thorace breve et lato, capite angustiore, medio griseo lineato ; scutello albido ; elytris parallelis, apice arcuatis. Linea discalis elytrorum oblitérata (*v. n. oblitérata*). L. 16 m. Fort-Crampel. — Espèce caractérisée par la structure antennaire ♂, à placer près de *Jaloffa* Cast.

La var. *notatithorax* mihi, du Niam-Niam, a le thorax moins foncé marqué de testacé antérieurement avec coloration analogue des élytres et des membres.

**P. fusca v. n. obscuricolor**. Noir à pubescence grise, tête et thorax avec une ligne médiane blanche nette, antennes testacées, élytres foncés, à pubescence grise-fauve, bordure et bande discale complète blanches. Congo.

**P. jaloffa v. n. longissima**. Valde elongatus, niger, dense griseo pubescens, epistome antice, antennis ad basin, femoribus et tibiis testaceis, tarsis obscuris. L. 19 m. Haut-Niger. — Diffère au moins de la forme typique par les élytres non bordés de clair.

(1) Sauf indications spéciales, les nouveautés décrites figurent dans la collection Pic.

**P. atripalpis** n. sp. Elongatus, dense griseo-luteo pubescens, concolor, niger, palpis et membris nigris. L. 10-13 m. Oubangui. — Diffère de *cineracea* Maek., à première vue, par sa coloration générale noire, tous les membres, avec les palpes compris.

**P. Crampeli** v. n. *luteolineata*. Elytres ornés d'une bande discale claire avec une ligne transversale noire vers les épaules. Dahomey et Sénégal.

**P. notaticeps** n. sp. Elongatus, dense griseo pubescens, niger, elytris dilutioribus, capite pro parte testaceo et pro parte nigro, antennis nigris, ad basin rufis, articulis 2-3 sat brevibus, fere æqualibus; pedibus nigris. L. 17 m. Sénégal. — A placer près de *vestita* Duf., peut être simple modification de cette espèce.

**P. vestita** v. n. *basipennis*. Rufescens, pro parte dense cinereo pubescens, thorace et infra corpore obscurioribus, capite et membris rufo-testacéis, elytris ad basin brunneo-fulvo notatis. Sénégal. — Caractérisé au moins par la base des élytres nettement plus foncée. Le ♂ a les antennes aplaties et élargies à la base.

**Epicauta atricolor** n. sp. [Hétérom.]. Angustatus, parum dense griseo pubescens, unicolor, niger, ♂ articulo 3° antennarum parum elongato et crasso. L. 13 m. Sénégal. — Caractérisé par sa coloration générale noire et le 3° article des antennes.

**Epicauta Donckieri** n. sp. ♀. Elongatus, paulo nitidus, parum non clare pubescens, niger; capite sat robusto, medio sulcato; thorace sat breve, antice attenuato, medio sulcate-impresso; elytris elongatis, parallelis, opacis; articulo 3° antennarum longissimo. L. 27 m. Afrique (ex Donckier). — Coloration analogue au précédent, très caractérisé par sa grande taille.

**Epicauta** ou **Lytta bifoveiceps** v. n. *semiviridis*. Un peu allongé, vert métallique avec la tête et les membres noirs, le thorax peu long, rétréci en avant, rouge avec deux petites taches noires sur le disque. Tanganyka. — Diffère au moins de *bifoveiceps* Frm. par la coloration verte des élytres.

**Epicauta** ou **Lytta cærulescens** n. sp. Angustatus, nitidus, elytris opacis, nigro-cyanescens, pro parte viridescens, membris nigris; capite parum elongato, postice subarcuato, sparse punctato; antennis, sat gracilibus, articulo 2° breve, 3°-6° sat brevibus, sequentibus longioribus; thorace elongato, antice strangulato, supra postice impresso, parum punctato; elytris parallelis, minute et dense punctatis. Long. 15 m. Provenance? — A placer près de *Dusaulti* Duf.

**Ommadius Rouyeri** n. sp. [Cleride]. Elongatus, nitidus, griseo-holosericeo pubescens, pro parte nigro-piceus, capite antice, elytris ad basin abdomineque luteis, elytris rufis, nigro-piceo undulato trifasciatis, sutura rufa; antennis brevibus, articulo ultimo sat breve et lato, nigris, ad basin flavis; thorace parum elongato, subcarinato, sat distincte griseo lineato; elytris lineato-punctatis; pedibus nigris, femoribus ad basin et infra longe, tibiis ad basin paulo tarsisque testacéis. L. 8 m. Java. — A placer près de *trifasciatus* Cast.

**O. multisignatus** n. sp. Elongatus, parum nitidus, niger, capite antice, antennis ad basin, abdomine et pedibus pro parte flavis, elytris rufis, antice in singulo nigro tri aut quadri notatis et humeros piceo notatis, post medium sinuate nigro fasciatis

et ante apicem reducte nigro fasciatis; thorace parum elongato, incarinato; elytris antice striato-punctatis, interne ad scutellum paulo granulatis; pedibus flavis, femoribus supra nigro maculatis, posticis apice longe nigris, tibiis late nigris, posticis ad basin et apice testaceis. L. 10 m. Australie. — Paraît distinct des espèces décrites d'Australie par les élytres roux, à nombreux signes noirs. Peut se placer près de *Amberbalkii* Kuw.

*Silidius kivuensis* mihi [Malac.], du Congo, voisin de *binotaticollis* Pic et de coloration générale testacée, non maculé de foncé, les membres étant noirs avec le 1<sup>er</sup> articles des antennes en partie et les cuisses largement testacées à la base.

*Chauliognathus infrabasalis* n. sp. [Malac.]. Parum elongatus, postice attenuatus, opacus, elytris ad basin nitidis, luteo-testaceus, capite pro majore parte, antennis, articulis primis exceptis, pectore pro parte tarsisque nigris, thorace multi et diverse nigro signato; elytris ad basin infra nigro maculatis, his punctatis. L. 10 m. Brésil. — A placer près de *multilineatus* Pic et caractérisé par les macules basales des élytres non visibles du dessus.

*C. Leopoldi* mihi, du Brésil, voisin du précédent, est plus atténué postérieurement, avec les élytres un peu granuleux et dentés au sommet; il a une coloration générale testacée ou flave avec la tête maculée de noir, les membres bicolores.

*C. Emili* n. sp. Elongatus, subopacus, luteus, capite nigro et thorace brunneo maculatis, membris rufis et nigris; elytris elongatis, apice attenuatis et dentatis, paulo granulosis, in singulo post medium intus minute nigro maculatis. L. 8 m. Brésil. — Peut se placer près de *ochraceus* Bl.

*C. bireductipennis* n. sp. Oblongo-elongatus, subnitidus, rufo-luteus, capite pro parte membrisque ex parte nigris, elytris in singulo ad basin reducte nigro bimaculatis, his minute punctatis, lateraliter, medio subparallelis. L. 13 m. Brésil. — A placer près de *fallax* Germ.

*Clada laticollis* n. sp. [Anobiide]. Parum elongatus, subnitidus, nigro-piceus aut rufescens, pro parte griseo-luteo pubescens; thorace sat breve et lato, lateraliter postice subarcuato, mediocre punctato et granuloso; elytris thorace paulo latioribus, parallelis, apice oblique attenuatis, pro majore parte striato-punctatis, vage et paulo subcostulatis. L. 5-6 m. Ethiopie: Bourié (Muséum de Paris). — Voisin de *humeralis* Pic, en diffère par le thorax plus étroit que les élytres.

*Xyletinus robustus* n. sp. [Anobiide]. Oblongus, sat latus, convexus, parum nitidus, rufo-brunneus, antennis testaceis; thorace robusto, sat breve, angulis anticis latis et rotundatis, minute et dense punctato; elytris latis, parum brevibus, postice paulo attenuais, intus lineato-punctatis, extus striatis. L. 6 m. Afr. Au<sup>le</sup>. — Espèce mimant en plus robuste le genre *Metholcus* II.

*Mesozaelopus Jeanneli* n. sp. [Anobiide]. Oblongo-elongatus, nitidus, nigro-piceus, capite rufo, antennis testaceis, thorace antice diverse rufo, illo robusto, antice attenuato, minute sat dense punctato, elytris postice valde attenuatis, minute pro parte ruguloso-punctatis, apice diverse rufescentibus. L. 3 m. Ethiopie: Bourié (Muséum de Paris et coll. Pic). — Caractérisé par sa taille supérieure à la normale.

**Lasioderma curtum** n. sp. [Anobiide]. Minutus, subovatus, postice attenuatus, nitidus, rufo-testaceus, oculis nigris ; thorace breve et lato, fere uniformiter pubescente, minute sat sparse punctato ; elytris brevibus, postice attenuatis, minute sat dense punctatis. L. 1-1,5 m. Bourié (Muséum de Paris et coll. Pic). — Espèce caractérisée par sa très petite taille, ses élytres courts.

**L. tanganum** n. sp. Oblongus, nitidus, rufescens, capite thoraceque pro parte obscuris ; thorace sat breve et lato, minute sat sparse punctato ; elytris parum elongatis, postice attenuatis, minute sat sparse punctatis. L. 3 m. Tanga. — A placer près de *Seydeli* Pic, dont il n'est peut-être qu'une variété.

**Isnus rufo-apicalis** n. sp. [Phytophage]. Oblongo-subovatus, nigro-olivaceus, elytris apice rufo-maculatis, pedibus pro parte rufis ; thorace breve, antice attenuato, sat fortiter et dense punctato ; elytris latis et brevibus, intus paulo striato-punctatis, externe subsulcatis. L. 1,5 m. Kenya. — A placer près de *niger* W.

**Cœnobius rufomaculatus** n. sp. [Phytophage]. Oblongo-subovatus, nitidus, niger, elytris ad suturam postice rufo maculatis, antennis et pedibus pro parte rufis, antennis sat brevibus, gracilibus, articulis ultimis latoribus et nigris ; thorace breve et lato, antice attenuato, in disco minute, lateraliter, fortiter et inæquale punctato, ad basin transverse lineato punctato ; scutello angustato et elongato ; elytris latis et brevibus, intus minute striato-punctatis, externe fortiter striatis. L. 2 m. Kenya : Kitale (Mus. de Paris). — Voisin de *Sjosstedti* W., en diffère par les pattes presque entièrement rousses, le thorax dépourvu d'impressions ponctuées.

**Lema bidisjuncta** n. sp. [Phytophage]. Oblongo-elongatus, niger, capite postice rufo, viride maculato, thorace rufo, postice paulo strangulato et subsulcato ; elytris rufis, viride notatis, antice in singulo macula humeralis, macula discoidalis ante medium, macula interna presuturalis elongata, apice late viride notato ; femoribus ad basin reducte rufis. L. 4,5 m. Tucuman. — Voisin de *dorsalis* Ol.

**L. tapenagosa** mihi, de la R. Argentine, de forme plus large que le précédent et de coloration proche, n'a pas la tête marquée de vert sur le vertex, les élytres ont une grande macule verte apicale analogue et seulement sur chacun une macule humérale et une macule discale antemédiane.

**L. ingracilis** mihi, de la Guyane, de forme analogue au précédent, a le dessous du corps bicolore, les cuisses largement claires, les élytres à macule postérieure laissant, extérieurement, le sommet clair avec une macule antérieure en forme de T renversé et une macule humérale. Peut se placer près de *gracilis* Lac.

**Grammoptera ustulata** v. n. *semirufescens* [Long.]. Avant-corps et dessous noirs sauf extrémité de l'abdomen rousse, élytres teintés de roussâtre et ainsi de coloration nettement plus claire que celle de l'avant-corps. De mes anciennes chasses aux Guerreux.

(A suivre.)

M. Pic.

Le Cérant : E. REVERET.

## Souhaits, dissertations et renseignements divers

Le propriétaire-directeur du présent périodique profite de la couverture du 1<sup>er</sup> numéro de 1947 pour exprimer ses multiples souhaits aux abonnés de « L' Echange », ainsi qu'à ses anciens et nouveaux correspondants. Il déplore de n'avoir pu obtenir aucune nouvelle de certaines entomologistes avec lesquels il était en bonnes relations courtoises autrefois (on ignore aujourd'hui à peu près ce qui se passe dans certains pays) et serait heureux d'en recevoir, les espérant toutes satisfaisantes. Quittant le style impersonnel, j'ajouterai : mes souhaits sont complexes, inutile de les énumérer, je les résume ainsi : tout ce que chacun peut désirer, en mettant en tête une bonne santé et un excellent moral. A l'aide de ces deux puissantes forces, la santé et un bon moral, je crois que l'on peut espérer une existence pas trop dure et douloureuse malgré les épreuves ou les peines qui peuvent s'abattre sur vous. J'ai passé par de dures épreuves du cœur ; par la force de la volonté, l'acharnement au travail avec l'appui de la santé, je suis parvenu à sortir de la mauvaise passe et à reprendre une vie à peu près normale. Je souhaite cordialement à tous, jeunes ou vieux, une constitution robuste, la considérant comme le plus grand des biens. Tous les entomologistes désirent naturellement quelques captures merveilleuses, des raretés, une forme inconnue, qui leur causeront de grandes joies ou une légitime fierté ; je souhaite aussi à tous de belles et nombreuses conquêtes... non féminines.

L'ignorance généralisée qui continue à subsister entrave parfois vos travaux, tout au moins les expose à des lacunes regrettables ; il serait utile que cette situation cesse. On pense à des musées où se trouvent de vos types ; on songe à des collègues dont on a jamais eu à se plaindre et conservé de bons souvenirs ; ne rien savoir d'eux vous plonge dans la mélancolie, ou une grande tristesse en songeant au pire.

Souhaitons encore que l'année 1947 nous apporte, avec de bonnes et générales nouvelles, un peu de lumière paisible et que doucement toutes les relations courtoises des temps meilleurs soient reprises au cours de l'année qui commence. Je remercie à l'avance ceux qui pourraient me donner des indications ou des précisions sur les musées ou collègues étrangers, sujets qui me préoccupent beaucoup et viennent souvent assombrir un peu plus mes tristes pensées. M. PIC.

Par mesure d'équilibre financier, les frais de poste ou d'impression augmentant sans cesse, une augmentation du prix de l'abonnement s'impose ; en conséquence, pour 1947, l'abonnement à « L'Echange » sera de 30 francs pour la France et de 50 pour l'étranger.

L'abonnement devra être payé au plus tard après la réception du 1<sup>er</sup> numéro. Il sera inutile de réclamer le 2<sup>e</sup> ou le 3<sup>e</sup> numéro du journal, si l'abonnement n'a pas été réglé. Il ne sera pas répondu aux demandes commerciales ou autres intéressées qui ne contiendraient pas de timbres pour la réponse. Il est demandé à ceux qui envoient des insectes à déterminer de vouloir bien prendre à leur charge les frais de retour. En cas d'abus, le déterminateur se réserve le droit de se payer en nature et à son choix.

Les anciennes années qui pourraient être demandées, ainsi que les autres publications, ne seront expédiées que sous garantie expresse de paiement. L'argent versé d'avance sera exigé pour l'étranger.

---

## Notes de chasses

Le directeur de « L'Echange » a observé de nouveau, en 1946 et à plusieurs reprises, que la punaise bleue, *Dicrena caerulea* L., peu commune malheureusement, s'attaquait aux larves des Doryphores. A signaler la capture aux Guerreaux, le 25 août, d'une maute religieuse ; c'est seulement le 2<sup>e</sup> exemplaire capturé dans la région.

Dans une promenade entomologique, faite le 6 juillet dans les bois de Chizeuil, près de Digoin, et sur de jeunes rejets de bouleaux, quelques exemplaires du rare *Cryptocephalus punctiger* Payk. ont été recueillis ; l'espèce n'avait pas encore été capturée dans la région.

De la même chasse, on peut citer les Coléoptères suivants peu communs : *Malthinus balteatus* Suf., *Rhynchites caeruleus* Schr. et *sericeus* Her., *Magdalis memnonia* Gylh., *Cryptocephalus marginatus* F.

Même observation pour le cabinet d'élevage négligé en 1946 que celle faite l'an passé.



# L'Échange, Revue Linnéenne

## Coléoptères du globe (suite) <sup>(1)</sup>

**Cicindela flexuosa** v. n. **Pelissieri**. Coloration du dessus verdâtre, lunule humérale divisée et macule présuturale antérieure interne presque effacée, fascie médiane étroite antérieurement et réduite, pour le reste dessins ordinaires. Gard : Le Sauvage (coll. Péliissier). — Dessin élytral voisin de *ab. inhumeralis* Beut. avec la coloration élytrale de la *v. smaragdina* Beut.

**Cantharis albanica** n. sp. [Malac.]. Noir, devant de la tête, base des antennes, thorax (celui-ci avec une macule discale et une bordure médiane antérieure noires) et parties de l'abdomen rouges, pattes noires avec l'extrême base des cuisses antérieures et postérieures, ainsi que le sommet interne des tibias antérieurs rouges. L. 14 m. Albanie. — Voisin de *rustica* F., caractérisé par la coloration des pattes et le dessin noir particulier du thorax, avec une bordure noire sur son milieu.

**Oplatocera maculata** n. sp. [Ceramb.]. Elongatus, rufus, supra et infra nigro notatis ; thorace medio et lateraliter nigro signato, lateraliter postice fortiter tuberculato ; elytris elongatis, postice attenuatis, costulatis, in singulo antice oblique nigro-piceo bimaculatis, post medium oblique, pro parte interrupte, nigro-piceo anguste et sinuate fasciatis, ad apicem externe reducte nigro-piceo lineatis ; membris rufis, articulis antennarum apice, femoribus apice et tibiis postice nigris. L. 32 m. Tonkin. — Voisin de *Oberthuri* Gah., dessins du thorax et des élytres différents.

**Falsoplatocera** n. g. Scapo breve dilatato ; antennis corpore paulo longioribus ; thorace breve, lateraliter minute tuberculato ; elytris latis, apice paulo attenuatis, ad basin externe minute incisus ; prosterno antice deplanato. Voisin de *Oplatocera* W. et établi pour l'espèce qui suit.

**Falsoplatocera Theresæ** n. sp. Parum elongatus, subconvexus, luteus, capite pro parte brunneo notato, thorace nigro marginato, lateraliter latiore, et irregulare, medio nigro bimaculato ; elytris irregulariter nigro-marginatis, ad suturam antice piceo marginatis, in disco et in singulo ad basin vage, ad medium distincte, piceo signatis, membris rufis, femoribus et tibiis postice brunnescentibus. L. 27 m. Indes. — Les dessins foncés des élytres sont composés au milieu d'une sorte de point d'exclamation renversé, suivi de deux macules allongées divergentes.

**Falsopachybrachys** n. g. [Phytophage]. Corpus robustus ; antennis brevibus, thorace sat breve, lateraliter antice paulo et postice valde attenuato, ad basin elytris angustiore ; scutello piloso, grande, triangulare ; elytris ad basin latioribus, post humeros paulo strangulatis, apice attenuatis ; pedibus crassis. Genre voisin de *Pachybrachys* Suf., caractérisé par la structure particulière du thorax et des élytres, son grand écusson revêtu de poils blancs. Etabli pour l'espèce suivante.

(1) Sauf indications spéciales, les nouveautés figurent dans la collection Pic.

**F. diversepubens** n. sp. Oblongo-elongatus, opacus, aut paulo nitidus, niger, supra pro parte et infra uniformiter albo pubescentibus; capite grande, parce punctato, nigro, epistome rufo, labro luteo; thorace paulo fortiter sat dense punctato, nigro, lateraliter antice et postice pro parte rufo cincto, non uniformiter pubescente; elytris nigris, lateraliter et apice rufo marginatis, ad medium anguste arcuate rufo fasciatis, irregulariter et dense punctatis, ante apicem transverse luteo carinatis, diverse albo pubescentibus. L. 4,5 m. Mauritanie.

**Pachybrachys Le Cerfi** mihi, du Maroc, voisin de *exclusus* Rey. (peut-être simple variété), présente une coloration générale et des dessins jaunes assez analogues à ceux signalés par Rey pour *exclusus* Rey, la tête est marquée de plusieurs taches jaunes, le thorax présente une ponctuation moyenne, rapprochée, les élytres, irrégulièrement et diversement ponctués, ont une bordure jaune basale et latérale complète, remontant sur la suture en avant du milieu et possèdent chacun, sur le milieu du disque, une grande macule jaune sans côte marquée. L. 4 m.

**Ababa longipennis** n. sp. [Cleride]. Longus, angustatus, subparallelus, hirsutus, parum nitidus, rufescens; capite elongato, postice paulo attenuato, minute et sparse punctato; thorace elongato, postice non strangulato, lateraliter minute crenulato, sat fortiter et sparse punctato, inimpreso; elytris elongatis, sat fortiter lineato-punctatis, apice breve attenuatis, inimpresis; pedibus sat validis. L. 4 m. Tonkin: Hoa-Binh (Reçu de Clermont). — Espèce très caractérisée par sa forme tout à fait allongée.

**Trigonogenius curtus** n. sp. [Ptinide]. Oblongo-subovatus, longe hirsutus, rufescens, dense luteo pubescens, elytris pro parte denudatis; thorace sat lato, parum breve, elytris angustiore, medio fortiter non regulariter sulcato, lateraliter arcuate impresso, minute non dense punctato; elytris latis et brevibus, lateraliter arcuatis, apice attenuatis et deflexis, fortiter punctatis. L. 2,5 m. Paraguay. — Diffère de *peruvianus* Pic par la forme plus trapue, le thorax autrement impressionné.

**Danacæa imperialis** v. n. *testaceo apicalis* [Malac.]. Elytris viride-olivaceis, pro parte denudatis, apice testaceis. Algérie.

Je possède, sous le nom de *Glaphyrus persicus* Kr., que je n'ai pas noté être publié, une ♀ de Perse, de forme allongée, coloration verte-métallique, cuisses comprises avec les tibias et tarses roux teintés de vert par places, les antennes jaunes avec la base et le sommet des lamelles foncés. La taille est de 10 mill., le labre a 3 dents, le thorax, sauf sur la base, celle-ci à peu près imponctuée, a une ponctuation peu forte, plus ou moins rapprochée, les élytres sont courtement acuminés au sommet, sans dent nette, en partie et peu pubescents de gris. Voisin de *oxypterus* Pall.

**Trichius zonatus** ab. nov. **Vaucheri** [Lamell.]. Elytres noirs avec une étroite bande présuturale, longitudinale jaune, remontant sur la base et deux fascies transversales étroites jaunes, 1<sup>re</sup> disjointe, 2<sup>e</sup> jointe à la bande présuturale. Tanger. — Dessins particuliers, moins réduits que chez ab. *Theresæ* Pic.

**T. zonatus** v. n. **tangerianus**. Voisine de la précédente, avec la 2<sup>e</sup> fascie jaune interrompue. Tanger.

**T. zonatus ab. n. Theresæ.** Elytres noirs avec les dessins jaunes très réduits et ainsi faits sur chaque élytre : une courte bande antérieure présuturale, 2 fascies jaunes étroites, isolées et éloignées de la suture, 1<sup>re</sup> prémédiane, 2<sup>e</sup> postmédiane. Tanger. — Caractérisée par les dessins jaunes réduits et particuliers.

**Trichius orientalis ab. n. macedonicus.** La bande jaune présuturale est oblitérée postérieurement, isolée d'une fascie jaune transversale postmédiane. Mont-Athos.

**T. orientalis ab. n. multividivus.** Dessins comme chez ab. précédente avec la différence que la fascie postmédiane jaune est divisée en plusieurs macules dont une externe plus grande. Akbès.

**T. orientalis ab. n. Delagrangi.** Dessins des élytres voisins de la forme typique, mais la fascie transversale postérieure jaune est divisée. Akbès.

**Macratria gabonica** [Hétér.]. *Elongatus*, *parum nitidus*, *griseo pubescens* et *hirsutus*, *rufus*, *antennis apice pedibusque nigris*, *femoribus diverse rufis*. L. 6 mill. Gabon. — Cette espèce, voisine de *tricoloripes* Pic, a la tête courte, atténuée derrière les yeux, tronquée au sommet, un peu entaillée, les antennes à derniers articles allongés, le thorax assez long, peu robuste, granuleux, les élytres substriés.

**Hylophilus gracilior** n. sp. [Hétér.]. *Elongatus*, *parum nitidus*, *griseo-holosericeo pubescens*, *rufus*, *antennis nigris*, *ad basin et apice rufis*, *gracilibus*, *pedibus rufis*, *tibiis posticis pro parte brunneis*, *gracilibus*; *capite postice truncato*, *oculis minutis*, *distantibus*; *thorace antice paulo latiore*, *non angulato*, *fortiter punctato*; *elytris elongatis*, *postice attenuatis*, *antice fortiter impressis*, *sat minute punctatis*. L. 2 m. environ. Congo : Kivu. — Plus long que *Kraatzi* Pic, dont il se rapproche.

**H. kivuensis** n. sp. *Oblongo-elongatus*, *nitidus*, *minute griseo pubescens*, *rufotestaceus*, *elytris pro parte brunnescentibus*, *membris testaceis*; *antennis elongatis*, *non brevibus*; *pedibus gracilibus*; *capite postice subarcuato*, *oculis grandis*; *thorace parum elongato*, *antice subrotundato*, *fortiter punctato*, *ad basin paulo impresso*; *elytris parum elongatis*, *antice impressis*, *sat fortiter punctatis*. L. 2,5 m. Congo: Kivu. — A placer près de *subangulatus* Pic.

**Themus magnificus v. n. diversipes** [Malac.]. *Tibias entièrement noirs*, *deux derniers articles des antennes foncés*. Chine.

**Mimopolemium basipennis** n. sp. [Malac.]. *Grandis*, *elongatus*, *niger*, *thorace elytrique ad basin rubris*, *scutello rubro*, *medio nigro lineato*; *thorace sat lato*, *antice attenuato*; *elytris elongatis*, *costatis*. L. 14 m. Sumatra. — Espèce caractérisée par sa grande taille, les élytres à partie basale rouge émettant plusieurs prolongements en arrière.

**M. testaceicollis** n. sp. *Angustatus*, *niger*, *thorace abdomineque testaceis*; *antennis latis et impressis*; *thorace parum elongato*, *antice attenuate arcuato*, *lateraliter sinuato*, *supra triimpresso*; *elytris thorace paulo laioribus*, *parallelis*, *dense punctatis*, *nigris*, *ad basin et ad suturam antice anguste rufis*. L. 9 m. Sumatra. — Espèce caractérisée par la forme de son thorax, jointe à sa coloration élytrale.

**M. aurantiacus v. n. sukabuminus.** *Sat elongatus*, *niger*, *thorace*, *scutello elytrique aurantiacis*, *his apice brevis*, *piceo notatis*, *vage costulatis* et *dense punctatis*. L. 8 m. Java.

**M. obscuricolor** mihi, de Java, présente une coloration générale obscurcie avec le thorax bordé en partie de jaune, de forme obconique, les élytres ont quelques poils pourprés vers la base et la suture, ceux-ci sont subparallèles, pas très longs. L. 8 m.

**Pseudosilis reductus** n. sp. ♀ [Malac.]. Etroit, parallèle, opaque, pubescent de gris, noir avec le thorax roux, marqué de foncé sur les côtés, écusson et élytres orangés, ces derniers marqués sur la suture, avant le sommet, d'une bande rembrunie raccourcie ; le thorax est transversal, un peu échancré vers les angles postérieurs, qui sont marqués, il est triimpressionné en dessus. L. 7 m. Sumatra.

**P. ruficeps** mihi, ♀, de Sumatra, a l'avant-corps roux, assez robuste, le dessous du corps en partie et la base des élytres jaunes, ceux-ci étant largement foncés au sommet, membres foncés. L. 6,5 m.

**P. longipennis** mihi, ♀, de Sumatra, est d'une coloration générale noire avec la tête en partie et le thorax roux, l'écusson et la base des élytres largement orangés, la portion orangée étant non régulière, sinuée en arrière, étroitement prolongée sur la suture. L. 9 m. — Elytres plus longs que chez *bicolor* Pic, avec la coloration un peu différente.

**Lycocerus longipennis** n. sp. [Malac.]. Angustatus, nigro-rufescens, capite scutelloque nigris, thorace, illo medio nigro notato, elytrisque rubris ; capite thorace latiore, oculis valde prominulis ; antennis parum depressis et elongatis ; thorace paulo elongato ; elytris longissimis, parallelis, costulatis, ad suturam brunneo lineatis ; pedibus gracilibus. L. 12 m. Chine : Yunnan. — Caractérisé par ses élytres longs et costés

**L. lineaticeps** v. n. *notatithorax*. Thorax testacé à longue médiane noire et, en outre, marqué de noir de chaque côté. Yunnan.

**Stadenus leonensis** n. sp. [Malac.]. Parum elongatus, sat latus, niger, thorace aurantiaco, supra nigro notato, scutello elytrisque aurantiacis, his apice sat late nigris ; antennis latis, articulo 2° breve et transverso, 3° lato, 4° paulo brevior, 5° et sequentibus plus minusve elongatis et depressis ; thorace breve et lato, antice medio paulo prolongato, angulis posticis fere rectis. L. 12 m. S. Leone. — Voisin de *Auberti* Brg., se reconnaît à ses antennes robustes et à la partie noire apicale remontant un peu sur les côtés des élytres.

**Xylobaenus ivoirensis** n. sp. [Malac.]. Angustatus, parallelus, nigro-piceus, pectore rufescente, articulis 2 ultimis antennarum flavis, thorace, scutello, elytrisque testaceis, his apice brevissime obscuris ; antennis depressis, pro parte longe dentatis ; thorace parum lato, antice medio paulo angulate prolongato, lateraliter fere recto, angulis posticis paulo prominulis, medio supra postice canaliculato-foveolato, antice carinato ; elytris sat regulariter et fortiter fenestratis. L. 7 m. Côte d'Ivoire. — Peut se placer près de *Anceyi* Pic, plus petit, pattes foncées, etc.

(A suivre.)

M. PIC.

Le Gérant : E. REVERET.

# L'Échange, Revue Linnéenne



## Coléoptères du globe (suite) <sup>(1)</sup>

**Dorcadion suturale v. nov. rufescentimembris** ♀ [Cerambyc.] Les pattes et les antennes en partie sont rouges. Espagne.

**D. insuturale v. nov. Schaufussi** ♀. Les pattes et les antennes sont roussâtres. Espagne.

**D. Bolivari v. nov. toledense** ♀. Pubescence foncière des élytres brun fauve avec une bande suturale et une bande humérale blanches nettes, en surplus une bande dorsale plus ou moins raccourcie. Espagne.

**Lema unicoloripes** n. sp. [Phytophage]. Oblongus, robustus, niger, capite postice (inter oculos nigro foveolato), thorace elytrisque rufis, his apice late cyaneis, antice ad suturam cyaneo notatis et in singulo ad humeros et ad medium cyaneo maculatis. L. 5 m. Montevideo. — A placer près de *gracilis* Lac., plus robuste, avec les cuisses entièrement foncées. Voisin de *latejuncta* Pic.

**L. varienotata** n. sp. Oblong noir, membres compris, sauf racine des cuisses antérieures ; thorax roux avec 2 macules discales arrondies et une macule transversale postérieure noires ; élytres roux avec les dessins noirs métalliques suivants : macule basale suturale commune, subcarrée, grande, macule humérale, sur chaque élytre, prolongée en arrière en s'élargissant, fascie antéapicale éloignée du bord, remontant obliquement sur la suture en avant, puis prolongée étroitement sur la suture en arrière en s'élargissant un peu à l'apex. I. 5 m. Bolivie. — Espèce à dessins particuliers qui la caractérisent nettement.

**L. dorsalis** Ol. A distinguer, chez cette espèce, les variétés suivantes : Elytres ayant sur chacun les macules bleues d'acier qui suivent. Une macule commune préscutellaire, une humérale et une antémédiane ; en plus, une fascie antéapicale prolongée postérieurement sur la suture, du Brésil (*v. mediosignata*) ; dessins du précédent avec la macule préscutellaire en moins, de Montévidéo (*v. medionotata*) ; élytres roux, soit sur chaque, avec une seule macule humérale foncée, de Montevideo (*v. unisignata*), soit avec trois macules externes disposées longitudinalement (*v. trisignata*), du Brésil, ou deux, une humérale, une postérieure (*v. bisignata*), du Brésil.

**Lenia confusa** Chevr. On peut séparer chez cette espèce les modifications nettes suivantes, ayant l'avant-corps noir ; élytres avec la bande suturale noire non régulière, mais élargie sur son milieu, du Brésil (*v. diverselineata*) ; bande suturale jointe postérieurement avec la bordure latérale, de Cuba (*v. internejuncta*) ; soit élytres testacés avec une bande suturale noire réduite, sans autre dessin noir (*v. insignata*).

(1) Les nouveautés décrites se trouvent dans la coll. Pic.

soit avec un petit trait externe postérieur noir (*v. externesignata*) ; ces deux dernières de Haïti.

**Colposis simplicicollis** n. sp. [Hétér.]. Elongatus, nitidus, niger, supra viridi-metallicus, antennis ad basin pedibusque pro parte rufescentibus ; capite sat fortiter punctato, inter oculos biimpresso ; thorace parum breve, antice valde dilatato, externe biimpresso, fortiter sat dense punctato, elytris elongatis, postice attenuatis, antice impressis, sat minute, pro parte lineato-punctatis, punctis ad basin fortioribus. L. 4 m. Congo. — Très distinct de *rugosicollis* Pic par la simple sculpture du thorax, les pattes moins claires.

**Chilopeltis denticulatus** n. sp. [Hétér.]. Oblongo-elongatus, nitidus, rufescens, supra viride-metallicus, elytris flavo bimaculatis, antennis ad basin pedibusque testaceis ; capite parum fortiter et sparse punctato, rostro paulo elongato ; thorace breve et lato, lateraliter multi denticulato, sat fortiter et sparse punctato, postice transverse impresso ; elytris elongatis, postice attenuatis, minute punctatis, in singulo ad humeros late albo maculatis, ante apicem albo elongato maculatis. L. 2,5-3 m. Congo. — Espèce caractérisée par le thorax multidenticulé.

**Zonabris Klugi v. n. Graffi** (Vésicant). Les deux macules médianes noires sont jointes sur chaque élytre. Perse.

**Xenogena grandis** n. sp. [Hétér.]. Parum elongatus, paulo nitidus et hirsutus, rufus, elytris pallidioribus, membris nigris, antennis femoribusque ad basin rufis ; antennis parum crassis, brevibus, articulo ultimo parum elongato ; capite thoraceque fortiter et dense punctatis ; elytris elongatis, laeraliter subsinuatis, apice attenuatis, sat fortiter striato-punctatis, intervallis latis, paulum punctatis. L. 9 m. Erythrée. — Voisin de *cochlophora* Borch., coloration plus claire avec le dernier article des antennes un peu plus court, pas plus long que les deux précédents ensemble.

? **Toxidium brevipenne** n. sp. [Scaphidiide]. Minutus, paulo convexus et parum compressus, nitidus, minutissime punctatus, rufo-brunneus, abdomine, pygidio, pedibusque testaceis, antennis nigris, ad basin luteis ; thorace elongato, antice attenuato ; elytris sat brevibus, postice attenuatis, stria presuturalis fere oblitérata. L. 1 m. environ. Côte-d'Ivoire. — Espèce caractérisée par sa petite taille, le corps peu comprimé, etc...

**Scaphosoma impressipenne** n. sp. [Scaphidiide]. Oblongo-elongatus, nitidus, niger, capite antice, abdomine apice pygidioque pro parte luteis, pro parte brunneis, membris rufo-testaceis ; thorace parum breve, antice attenuato, minute punctato ; elytris parum elongatis, postice attenuatis, ad suturam longitudinaliter impressis, sat minute punctatis, stria presuturalis minuta, integra. L. 2,5 m. Congo. — A placer près de *Schoutedeni* Pic, s'en distingue par les élytres impressionnés, la coloration de l'abdomen.

**Psilorynchus bifasciatus v. n. inapicalis** [Malac.]. Elytres jaunes à base marquée de foncé. Brésil.

**P. abdominalis v. n. prolongatus**. La macule pré-apicale noire des élytres se prolonge en avant, sur chaque étui, sous forme de ligne discale. Brésil.

**Chauliognathus discoidalis** n. sp. [Malac.]. Elongatus, parum nitidus, elytris sub-

opacis, niger, thorace circa elytrisque luteis, his in disco longitudinaliter nigro vittatis, vittis apice latioribus, abdomine pro parte luteo. L. 12 m. Mexico. — Se rapproche de *luteosuturalis* Pic, élytres un peu atténués et autrement colorés.

J'attribue à **C. Sallei** Pic, comme var., sous le nom de *v. inlineatus*, un ♂, du Mexique, à thorax rougeâtre bordé étroitement de jaune, à coloration largement claire, élytres de coloration générale jaune, un peu obscurcis sur le pourtour postérieur ; se distingue de la *v. ♀ rubrithorax* Pic, par l'absence d'une bande humérale claire, détachée du fonds foncé.

J'ai donné le nom de **atroapicalis** à un ♂, d'origine litigieuse américaine, ressemblant à *corvinus v. chiriquensis* Pic par sa coloration générale noire, les élytres orangés largement noirs au sommet, mais en diffèrent par le thorax entièrement noir en dessus, avec les côtés en dessous blancs et que je considère comme une simple variété de la même espèce.

**Ch. peryanus** n. sp. Elongatus, parum nitidus, niger, thorace lateraliter late rufo-testaceo, infra corpore paulo albo notato ; capite cum oculos thorace paulo latiore, nigro, antice externe albo notato ; antennis gracilibus, articulo 3° valde elongato, 4° multo longiore ; thorace subquadrato, medio postice impresso ; elytris thorace paulo latioribus, apice paulo attenuatis et breve dehiscentibus. L. 8 m. Brésil : Péry-Péry. — Espèce caractérisée par sa coloration jointe à la forme des élytres brièvement déhiscentes et un peu dépassés par les ailes. Peut être placé près de *mexicanus* Pic.

**Ch. preexiguus** n. sp. Elongatus, nitidus, supra niger, capite antice et infra flavo, thorace rufo, antice medio vage nigro notato, infra corpore testaceo et flavo, abdomine pro parte nigro, pedibus rufis ; capite cum oculos thorace paulo latiore, illo parum lato, sat breve, lateraliter recto, antice medio prolongato-arcuato, in medio supra biimpresso ; elytris sat brevibus, apice paulo attenuatis et dehiscentibus. L. 8 m. Brésil. — Voisin de mon co-type ♀ *C. exiguus* Gorh., en diffère par le thorax moins large, les élytres entièrement foncés et nettement déhiscentes.

**Ch. Gaullei** n. sp. Elongatus, postice attenuatus, fere opacus, luteus, capite postice, thorace medio membrisque pro majore parte nigris, femoribus ad basin rufis, elytris luteis, in disco aut externe pro parte obscuris ; capite thorace non latiore ; antennis sat validis, filiformibus ; thorace elongato, antice arcuato, lateraliter sinuato, medio longe canaliculato et reducte biplicato ; elytris thorace latioribus, postice valde attenuatis et paulo dehiscentibus ; abdomine elytris paulo prominulo ; pedibus longissimis, parum gracilibus. L. 10 m. Pérou. — Voisin de *Plaumanni* Pic, avec le thorax particulier et une coloration autre.

Le **C. diamantineus** mihi, du Brésil, voisin du précédent quant à son faciès et sa coloration, en diffère par le thorax moins long et plus large, rouge avec plusieurs macules noires discales, les élytres largement obscurcis postérieurement, à apex jaune vers la suture, étant longuement jaunes au milieu antérieur, avec une macule basale foncée sur chaque étui et les bords externes antérieurs jaunes.

**Ch. bilineatithorax** n. sp. Oblongo-elongatus, subopacus, luteo-aurantiacus, capite postice medio, antennis pedibusque (femoribus ad basin rufis exceptis) nigris, infra corpore paulo nigro notato ; thorace in disco nigro bilineato ; elytris, in singulo

ad basin post scutellum reducte nigro lineatis et ante apicem late nigro notatis, his paulo reductis, apice breve dehiscentibus; abdomine supra nigro, elytris superante. L. 8 m. Paraguay. — Espèce caractérisée par sa coloration thoracique et ses élytres un peu raccourcis; à placer près de *nigriceps* Gorh.

**Ch. brevemarginatus** n. sp. ♂. Angustatus, subopacus, elytris dehiscentibus, luteus, thorace postice et infra corpore paulo albescentibus, capite postice, thorace medio, scutello et membris pro majeure parte nigris, femoribus infra et tibiis intus pro parte flavis, pectore nigro lineato, epipleuris elytrorum angustatis, ad medium obscuris. L. 8 m. Guatemala. — A placer près de *emaciatus* Gorh., plus étroit, avec les élytres longuement déhiscentes et caractérisé par la coloration tricolore du thorax.

**Ch. Forreri v. n. Eichelbaumi.** Thorax et tête orangés; maculés de noir, élytres noirs avec la base et les côtés antérieurs jusqu'au milieu orangés. Mexique.

**V. nov. Dugesii.** Tête foncée, thorax jaune à 6 macules noires et élytres jaunes à macule basale discale noire sur chaque étui. Mexique.

**Ch. albohumeralis** n. sp. Etroit et allongé, forme de *fenestratus* Perty avec un aspect mat, une coloration générale noire, sauf les côtés du thorax largement jaunés et une petite macule blanche aux épaules avec le dessous un peu taché de clair. L. 12 m. Brésil.

**Ch. tricoloricollis v. n. mediointerruptus.** Elytres d'un jaune flave avec, sur chacun, une macule prescutellaire et une macule anteapicale discale noires, la seconde moins marquée. Buenos-Ayres.

**Ch. Kraatzi** n. sp. Oblongo-elongatus, opacus, niger, thorace circa luteo marginato, medio rubro, postice breve nigro notato; elytris parum latis, sat brevibus, anguste marginatis, pedibus supra pro parte luteis. L. 12 m. Paraguay. — Ressemble à *tricoloricollis* Pic, avec les élytres plus courts et entièrement foncés.

**Ch. brevenotatus v. n. humeronotatus.** Elytres ayant les épaules marquées de jaune. Brésil.

**Ch. Metzi** n. sp. Elongatus, opacus, niger, thorace lateraliter elytrisque aurantiacis, his apice luteis, postice paulo strangulatis et attenuatis, apice dehiscentibus; antennis parum robustis, brevibus; thorace elytris angustiore, paulo elongato, antice subarcuato, medio longe sulcato; aliis et abdomine elytris superantibus. L. 10 m. Brésil: Santos. — Caractérisé par sa forme, jointe à sa coloration; à rapprocher de *his-trio* Gorh.

**Ptilodactyla multiimpressa** n. sp. [Helodide]. Oblongus, postice attenuatus, pubescens, nitidus, rufescens, pectore obscuriore, pedibus luteis; thorace transverso, elytris angustiore, postice triimpresso, minute sat dense punctato; elytris ad basin minute multi impressis, ad suturam antice paulo impressis, minute striato-punctatis. L. 7 m. Brésil. — Caractérisé par ses nombreuses impressions au thorax et aux élytres.

(A suivre.)

M. PIC.

Le Couant : E. REVERET.

# L'Échange, Revue Linnéenne



## Coléoptères du globe (suite) <sup>(1)</sup>

**Malthesis reductus** n. sp. [Malac.] Longatus, postice attenuatus, subopacus, niger, capite antice diverse albo, elytris nigris, antice externe aurantiacis; thorace nigro, lateraliter aurantiaco (*forma typica*), aut rufo et nigro bilineato (*v. bilineatus*), aut rufo et immaculato (*v. innotatus*). L. 8-10 m. Mérida. — Voisin de *ephippiatus* Pic, s'en distingue par la partie latérale orangée des élytres plus réduite.

**M. diversus** n. sp. Angustatus, postice attenuatus, parum nitidus, niger, capite antice lateraliter et postice anguste, infra corpore lateraliter abdomineque pro parte luteis. L. 9 m. Bolivie. — Voisin de *impressithorax* Pic avec le thorax différent, plus largement et moins profondément impressionné, les élytres plus longs.

**Chauliognathus vagenotatus** n. sp. [Malac.] Allongé, peu brillant, testacé-rougeâtre, antennes foncées, tête marquée brièvement de noir près des yeux, dessus de l'abdomen noir, élytres foncés avec la base et le disque en avant un peu jaunâtres, en dessous des épaules extérieurement marqués de testacé; tête pas plus large que le thorax, celui-ci court et large, marqué de 4 impressions en dessus avec un sillon médian bordé de plis surélevés; élytres plus larges que le thorax, peu longs, atténués et un peu déhiscent au sommet, peu dépassés par les ailes. L. 7 m. Pérou. — Voisin de *plicatithorax* Pic.

**C. kouranus** n. sp. Allongé, peu brillant, élytres assez courts, très déhiscent, longuement dépassés par les ailes et l'abdomen, roux testacé, partie postérieure de la tête, antennes moins la base, dessus de l'abdomen et tarsi noirs, élytres foncés, en partie bordés de clair, ayant, sur chacun, une courte ligne humérale jaune. L. 5,5 m. Guyane Fr. — Se rapproche de *reductus* Pic, caractérisé par une coloration particulière et la forme grêle.

**C. sulcithorax** mihi, du Paraguay, ressemble un peu à ce dernier quant à la coloration, avec une forme moins étroite; le thorax est fortement impressionné, les élytres sont obscurcis avec le disque un peu jaunâtre, ornés d'une macule apicale jaune, les pattes sont en partie rembrunies. L. 7 m.

**C. flavolineatus** n. sp. Étroit et allongé, brillant, noir, thorax flave avec 2 lignes longitudinales noires, jointes en avant, élytres sur chacun à bande longitudinale discale plus rapprochée de la suture que les autres, côtés des élytres vers les épaules flaves, dessous du corps en partie flave. L. 5 m. Guyane Fr. — Espèce caractérisée par sa coloration jointe à sa forme étroite et allongée; à placer près de *latelineatus* Pic.

(1) Les nouveautés décrites se trouvent toutes dans la coll. Pic, sauf *Megalopides* nommés d'après des figures.

**C. longiceps** n. sp. Etroit, avec les élytres atténués, déhiscent et un peu raccourcis, la tête munie d'un long museau, le thorax étroit et long ; jaune avec la tête derrière les yeux, le milieu du thorax, les élytres sur les côtés, sommet excepté, et les membres, sauf la base des cuisses qui est rousse, noirs. L. 10 m. Guyane Fr. — Espèce caractérisée par sa longue tête, jointe à sa coloration élytrale, pouvant se placer près de *brevebasalis* Pic.

**C. Palmeri** (nov.). Etroit, allongé, brillant, jaune marqué de noir en dessus et dessous, tête, écusson et membres noirs ; thorax non transversal, jaune, largement noir sur le disque, élytres jaunes, à macule transversale basale préscutellaire et bande longitudinale discale allongée sur chaque étui, celles-ci noires, la bande part du quart basal et n'atteint pas le sommet des élytres. L. 11-12 m. Monclova (Dr Palmer). — A placer près de *scutellaris* Lec., peut-être simple variété de cette espèce.

**Strongylium fortistriatum** n. sp. [Hétérom.]. Peu allongé, brillant, bleu, élytres verdâtres ; tête et thorax peu fortement et densément ponctués, ce dernier assez large, non caréné sur les côtés, bordé en avant ; élytres plus larges que le thorax, modérément allongés, atténués à l'extrémité, fortement striés, striés médiocrement ponctués, intervalles subconvexes, finement ponctués. L. 17 m. Congo. Katanga. — Par ses yeux assez rapprochés, voisin de *longicolle* Geb. avec une autre coloration.

**S. librevilleum** n. sp. Allongé, peu brillant, à couleurs diverses ; tête et thorax d'un vert bronzé, ce dernier sur les côtés largement roux et étroitement marginé ; élytres roux, écusson, dessous du corps et pattes d'un vert métallique, antennes noires, rousses à la base ; tête et thorax fortement et assez densément ponctués, ce dernier peu court, plus étroit que les élytres ; élytres convexes, allongés, atténués postérieurement, fortement striés-ponctués, intervalles convexes. L. 18 m. Congo Français. — Sans doute voisin de *gabonense* Geb., qui est d'une autre coloration.

**S. Favareli** n. sp. Oblong, assez court et large, vert-bleu, élytres pourprés ; tête et thorax densément ponctués, yeux rapprochés ; thorax non caréné latéralement, court et large, subarqué latéralement, en dessus, au milieu, largement déprimé ; élytres bien plus larges que le thorax, assez courts, atténués à l'extrémité, assez convexes, fortement fovéolés en rangées, costés vers l'extrémité, intervalles étroits. L. 17 m. Gabon. — Paraît voisin de *fraternum* Kolbe et en différer par la coloration et les antennes peu allongées.

**S. muata v. n. viridanum.** Allongé, convexe, thorax finement et éparsément ponctué, élytres fortement striés, intervalles subconvexes, verdâtre, membres bleus. L. 25-27 m. Côte d'Ivoire.

**S. bicoloripes** n. sp. Allongé et étroit, brillant, dessus vert, élytres teintés de pourpre, dessous du corps diversement roux, membres noirs, fémurs roux à la base ; yeux très rapprochés ; antennes grêles ; thorax subcarré, non caréné sur les côtés, fortement et densément ponctué, en dessus au milieu un peu impressionné ; élytres un peu plus larges que le thorax, allongés, atténués à l'extrémité, fortement striés-ponctués, intervalles élevés ; tibias antérieurs en dedans vers le milieu un peu dilatés. L. 10 m. Gabon. — A placer près de *tibiale* Geb., coloration non foncée, et celle des pattes différente.

**Notoxus unifasciatus** n. sp. [Hétérom.]. Elongatus, nitidus, albo pubescens, rufo-testaceus, membris elytrisque pallidioribus, his post medium anguste piceo fasciatis, sparse punctatis ; cornu thoracis parum lato. L. 2,5 m. Arabie. — Peut se placer près de *Schimperi* Pic, en diffère par la corne plus robuste, les élytres fasciés.

**Formicomus luteomaculatus** n. sp. [Hétérom.]. Elongatus, elytris parum latis, nitidus, niger, elytris paulo metallicis, infra humeros luteo maculatis, antennis (apice pro parte piceis) coxisque rufis ; capite postice attenuato, pro parte ruguloso ; thorace antice valde dilatato-rotundato, supra pro parte minute plicato ; elytris sat latis, lateraliter subarcuatis, ad basin et apice attenuatis ; pygidio valde inciso et biangulato ; femoribus anticis longe spinosis. L. 3,5 m. Congo. — Espèce très caractérisée par son dessin élytral et la sculpture du thorax.

**Formicomus Boviei** n. sp. ♀. Elongatus, sparse griseo pubescens, nitidus, rufus ; elytris metallicis, viride cyaneis ; capite lato, postice paulo attenuato, sparse punctato ; thorace paulo elongato, antice dilatato-rotundato et sparse punctato ; ad basin paulo granuloso ; elytris elongatis, ad basin fere rectis et transverse impressis, apice attenuatis. L. 4 m. Congo (ex Bovie). — Peut se placer près de *spinierus* Frm., dont la coloration est différente.

**Agathomerus** s. g. nov. **Longathomerus**. Forme allongée ; antennes longues ; dessus presque glabre ; fémurs munis d'une sorte de lamelle bidentée. S. genre créé pour *A. humeralis* Serv. et var. *binotatus* Pic (Phytophage).

**Colobopsis Theresæ** n. sp. [Megalopide]. Elongatus, opacus, niger, supra aurantiacus, capite et thorace medio nigro notatis, elytris apice reducte et oblique nigro notatis ; antennis latis et brevibus ; thorace post medium paulo dilatato, ad basin fortiter transversim sulcato ; elytris parallelis, postice attenuatis, lateraliter minute carinatis. L. 9 m. Congo. — A placer près de *apicata* Frm., ayant la macule apicale noire différente, les élytres avec une faible côte latérale.

**Colobopsis nyassæ** v. n. **lateniger**. Elytres noirs, avec la base rousse, thorax roux sans dessin noir. Nyassaland.

**Temnaspis Bonneuili** n. sp. [Megalopide]. Oblongus, minutus, nitidus, pro parte longe hispidus, rufus, antennis nigris, brevibus et latis ; capite cum oculos thorace paulo latiore, sparse punctato, in vertice foveolato ; thorace sat breve, lateraliter sub-sinuato, antice late et postice anguste transverse sulcato, postice minute anguloso, fortiter et sparse punctato ; elytris sat latis et parum brevibus, ad humeros paulo prominulis, apice attenuatis, fortiter sat sparse punctatis ; femoribus posticis indentatis. L. 7 m. Sibérie. — Exemple défraîchi, me venant de la coll. de Bonneuil et se rapprochant de *brunneipennis* Pic.

**Agathomerus subfasciatus** v. n. **Monrosi** [Megalopide]. Les macules noires des élytres sont dilatées et se réunissent. Rép. Argentine. Ce nom est donné à la Fig. C de la page 197 de la monographie de Monros (1947) (1).

(1) Revista Soc. Entom. Argentina, XIII, 1947.

**Agathomerus 4-maculatus v. n. Guerini.** Elytres largement jaunes antérieurement avec une fascie basale interne noire, noirs au sommet avec une grande macule jaune incluse. Rép. Argentine. — Nom donné au dessin fig. A de la page 184 de la monographie de Monros.

**Plesioagathomerus canus.** Monros. Rép. Argentine. Trois dessins nets sont figurés par Monros et je propose les noms suivants pour désigner deux modifications variétistes : *v. bilineatus* (fig. 8, p. 201), à lignes noires des élytres jointes postérieurement et macule basale interne noire ; *v. atrodiscalis*, à élytres noirs, en partie bordés de clair (fig. C).

**Ptilodactyla multicostata** n. sp. [Helodide]. Entièrement noir, avec les élytres faiblement et multicostés, assez courts, le thorax ayant une ponctuation bien marquée et granuleuse. L. 7 m. Brésil.

**P. lojaensis** n. sp. *Elongatus, apice attenuatus, pubescens, nitidus, testaceus, capite pro parte brunneo ; thorace sparse punctato, lateraliter postice late impresso ; elytris distincte striato-punctatis, intervallis deplanatis, pro parte plicatis et punctatis.* L. 7 m. Equateur. — A placer près de *notata* Pic.

**Ptilodactyla humeridens** n. sp. *Elongatus, nitidus, breve pubescens, rufo-testaceus, thorace medio paulo brunnescente, dense granuloso, postice triimpresso ; elytris marginatis, apice paulo attenuatis, leviter striatis, humeris minute dentatis.* L. 5,5 m. Colombie. — Distinct du précédent par les épaules munies d'une petite dent, la sculpture plus fine des élytres.

**P. Fruhstorferi** n. sp. *Parum elongatus, postice valde attenuatus, depressus, nitidus, pubescens, niger ; thorace valde transverso, minute et sparse punctato, élytris æquale ; elytris fere instriatis, minute lineato-punctatis et sparse minutissime punctatis.* L. 9 m. Brésil. — Espèce caractérisée par sa forme très atténuée postérieurement et son thorax très transversal.

**P. compressa** n. sp. *Elongatus, postice valde attenuatus, nitidus, pubescens, rufo-castaneus, capite et thorace nigris ; thorace sat breve, elytris angustiore, minute et sparse punctato ; elytris inæqualibus, profunde et diverse striatis, lateraliter pro parte compressis, ad suturam longitudinaliter late impressis.* L. 9 m. Pérou. — Caractérisé entre tous par la structure particulière des élytres, de même que l'espèce suivante.

**P. forteimpressa** n. sp. *Angustatus, nitidus, breve holosericeo-pubescens, nigropiceus, elytris pro parte pallidioribus, pedibus testaceis ; thorace parum breve, dense punctato-granuloso ; elytris apice paulo attenuatis, ad suturam transverse biimpressis, fere instriatis et minutissime punctatis.* L. 6 m. Brésil.

**P. multistriata** mihi, du Brésil, voisin de *compressa*, mais plus foncé, moins étroit et plus parallèle, ayant le thorax plus fortement étranglé sur les côtés antérieurs, les élytres fortement striés. L. 8 m.

M. Pic.

(A suivre.)

Le Gérant : E. REVERET.