

L'Échange, Revue Linnéenne



Coléoptères du globe (suite) ⁽¹⁾

Dorcadion suturale v. nov. rufescentimem. ♀ [Cerambyc.] Les pattes et les antennes en partie sont rouges. Espagne.

D. insuturale v. nov. Schaufussi ♀. Les pattes et les antennes sont roussâtres. Espagne.

D. Bolivari v. nov. toledense ♀. Pubescence foncière des élytres brun fauve avec une bande suturale et une bande humérale blanches nettes, en surplus une bande dorsale plus ou moins raccourcie. Espagne.

Lema unicoloripes n. sp. [Phytophage]. Oblongus, robustus, niger, capite postice (inter oculos nigro foveolato), thorace elytrisque rufis, his apice late cyaneis, antice ad suturam cyaneo notatis et in singulo ad humeros et ad medium cyaneo maculatis. L. 5 m. Montevideo. — A placer près de *gracilis* Lac., plus robuste, avec les cuisses entièrement foncées. Voisin de *latejuncta* Pic.

L. varienotata n. sp. Oblong noir, membres compris, sauf racine des cuisses antérieures ; thorax roux avec 2 macules discales arrondies et une macule transversale postérieure noires ; élytres roux avec les dessins noirs métalliques suivants : macule basale suturale commune, subcarrée, grande, macule humérale, sur chaque élytre, prolongée en arrière en s'élargissant, fascie antéapicale éloignée du bord, remontant obliquement sur la suture en avant, puis prolongée étroitement sur la suture en arrière en s'élargissant un peu à l'apex. I. 5 m. Bolivie. — Espèce à dessins particuliers qui la caractérisent nettement.

L. dorsalis Ol. A distinguer, chez cette espèce, les variétés suivantes : Elytres ayant sur chacun les macules bleues d'acier qui suivent. Une macule commune préscutellaire, une humérale et une antémédiane ; en plus, une fascie anteapicale prolongée postérieurement sur la suture, du Brésil (*v. mediosignata*) ; dessins du précédent avec la macule préscutellaire en moins, de Montévidéo (*v. medionotata*) ; élytres roux, soit sur chaque, avec une seule macule humérale foncée, de Montevideo (*v. unisignata*), soit avec trois macules externes disposées longitudinalement (*v. trisignata*), du Brésil, ou deux, une humérale, une postérieure (*v. bisignata*), du Brésil.

Lenia confusa Chevr. On peut séparer chez cette espèce les modifications nettes suivantes, ayant l'avant-corps noir ; élytres avec la bande suturale noire non régulière, mais élargie sur son milieu, du Brésil (*v. diverselineata*) ; bande suturale jointe postérieurement avec la bordure latérale, de Cuba (*v. internejuncta*) ; soit élytres testacés avec une bande suturale noire réduite, sans autre dessin noir (*v. insignata*).

(1) Les nouveautés décrites se trouvent dans la coll. Pic.

soit avec un petit trait externe postérieur noir (*v. externesignata*) ; ces deux dernières de Haïti.

Colposis simplicicollis n. sp. [Hétér.]. Elongatus, nitidus, niger, supra viridi-metallicus, antennis ad basin pedibusque pro parte rufescentibus ; capite sat fortiter punctato, inter oculos biimpresso ; thorace parum breve, antice valde dilatato, externe biimpresso, fortiter sat dense punctato, elytris elongatis, postice attenuatis, antice impressis, sat minute, pro parte lineato-punctatis, punctis ad basin fortioribus. L. 4 m. Congo. — Très distinct de *rugosicollis* Pic par la simple sculpture du thorax, les pattes moins claires.

Chilopeltis denticulatus n. sp. [Hétér.]. Oblongo-elongatus, nitidus, rufescens, supra viride-metallicus, elytris flavo bimaculatis, antennis ad basin pedibusque testaceis ; capite parum fortiter et sparse punctato, rostro paulo elongato ; thorace breve et lato, lateraliter multi denticulato, sat fortiter et sparse punctato, postice transverse impresso ; elytris elongatis, postice attenuatis, minute punctatis, in singulo ad humeros late albo maculatis, ante apicem albo elongato maculatis. L. 2,5-3 m. Congo. — Espèce caractérisée par le thorax multidenticulé.

Zonabris Klugi v. n. Graffi (Vésicant). Les deux macules médianes noires sont jointes sur chaque élytre. Perse.

Xenogena grandis n. sp. [Hétér.]. Parum elongatus, paulo nitidus et hirsutus, rufus, elytris pallidioribus, membris nigris, antennis femoribusque ad basin rufis ; antennis parum crassis, brevibus, articulo ultimo parum elongato ; capite thoraceque fortiter et dense punctatis ; elytris elongatis, laeraliter subsinuatis, apice attenuatis, sat fortiter striato-punctatis, intervallis latis, paulum punctatis. L. 9 m. Erythrée. — Voisin de *cochlophora* Borch., coloration plus claire avec le dernier article des antennes un peu plus court, pas plus long que les deux précédents ensemble.

? **Toxidium brevipenne** n. sp. [Scaphidiide]. Minutus, paulo convexus et parum compressus, nitidus, minutissime punctatus, rufo-brunneus, abdomine, pygidio, pedibusque testaceis, antennis nigris, ad basin luteis ; thorace elongato, antice attenuato ; elytris sat brevibus, postice attenuatis, stria presuturalis fere oblitérata. L. 1 m. environ. Côte-d'Ivoire. — Espèce caractérisée par sa petite taille, le corps peu comprimé, etc...

Scaphosoma impressipenne n. sp. [Scaphidiide]. Oblongo-elongatus, nitidus, niger, capite antice, abdomine apice pygidioque pro parte luteis, pro parte brunneis, membris rufo-testaceis ; thorace parum breve, antice attenuato, minute punctato ; elytris parum elongatis, postice attenuatis, ad suturam longitudinaliter impressis, sat minute punctatis, stria presuturalis minuta, integra. L. 2,5 m. Congo. — A placer près de *Schoutedeni* Pic, s'en distingue par les élytres impressionnés, la coloration de l'abdomen.

Psilorynchus bifasciatus v. n. inapicalis [Malac.]. Elytres jaunes à base marquée de foncé. Brésil.

P. abdominalis v. n. prolongatus. La macule pré-apicale noire des élytres se prolonge en avant, sur chaque étui, sous forme de ligne discale. Brésil.

Chauliognathus discoidalis n. sp. [Malac.]. Elongatus, parum nitidus, elytris sub-

opacis, niger, thorace circa elytrisque luteis, his in disco longitudinaliter nigro vittatis, vittis apice latioribus, abdomine pro parte luteo. L. 12 m. Mexico. — Se rapproche de *luteosuturalis* Pic, élytres un peu atténués et autrement colorés.

J'attribue à *C. Sallei* Pic, comme var., sous le nom de *v. inlineatus*, un ♂, du Mexique, à thorax rougeâtre bordé étroitement de jaune, à coloration largement claire, élytres de coloration générale jaune, un peu obscurcis sur le pourtour postérieur ; se distingue de la *v. ♀ rubrithorax* Pic, par l'absence d'une bande humérale claire, détachée du fonds foncé.

J'ai donné le nom de *atroapicalis* à un ♂, d'origine litigieuse américaine, ressemblant à *corvinus v. chiriquensis* Pic par sa coloration générale noire, les élytres orangés largement noirs au sommet, mais en diffèrent par le thorax entièrement noir en dessus, avec les côtés en dessous blancs et que je considère comme une simple variété de la même espèce.

Ch. peryanus n. sp. Elongatus, parum nitidus, niger, thorace lateraliter late rufo-testaceo, infra corpore paulo albo notato ; capite cum oculos thorace paulo latiore, nigro, antice externe albo notato ; antennis gracilibus, articulo 3° valde elongato, 4° multo longiore ; thorace subquadrato, medio postice impresso ; elytris thorace paulo latioribus, apice paulo attenuatis et breve dehiscentibus. L. 8 m. Brésil : Péry-Péry. — Espèce caractérisée par sa coloration jointe à la forme des élytres brièvement déhiscentes et un peu dépassés par les ailes. Peut être placé près de *mexicanus* Pic.

Ch. preexiguus n. sp. Elongatus, nitidus, supra niger, capite antice et infra flavo, thorace rufo, antice medio vage nigro notato, infra corpore testaceo et flavo, abdomine pro parte nigro, pedibus rufis ; capite cum oculos thorace paulo latiore, illo parum lato, sat breve, lateraliter recto, antice medio prolongato-arcuato, in medio supra biimpresso ; elytris sat brevibus, apice paulo attenuatis et dehiscentibus. L. 8 m. Brésil. — Voisin de mon co-type ♀ *C. exiguus* Gorh., en diffère par le thorax moins large, les élytres entièrement foncés et nettement déhiscentes.

Ch. Gaullei n. sp. Elongatus, postice attenuatus, fere opacus, luteus, capite postice, thorace medio membrisque pro majore parte nigris, femoribus ad basin rufis, elytris luteis, in disco aut externe pro parte obscuris ; capite thorace non latiore ; antennis sat validis, filiformibus ; thorace elongato, antice arcuato, lateraliter sinuato, medio longe canaliculato et reducte biplicato ; elytris thorace latioribus, postice valde attenuatis et paulo dehiscentibus ; abdomine elytris paulo prominulo ; pedibus longissimis, parum gracilibus. L. 10 m. Pérou. — Voisin de *Plaumanni* Pic, avec le thorax particulier et une coloration autre.

Le *C. diamantineus* mihi, du Brésil, voisin du précédent quant à son faciès et sa coloration, en diffère par le thorax moins long et plus large, rouge avec plusieurs macules noires discales, les élytres largement obscurcis postérieurement, à apex jaune vers la suture, étant longuement jaunes au milieu antérieur, avec une macule basale foncée sur chaque étui et les bords externes antérieurs jaunes.

Ch. bilineatithorax n. sp. Oblongo-elongatus, subopacus, luteo-aurantiacus, capite postice medio, antennis pedibusque (femoribus ad basin rufis exceptis) nigris, infra corpore paulo nigro notato ; thorace in disco nigro bilineato ; elytris, in singulo

ad basin post scutellum reducte nigro lineatis et ante apicem late nigro notatis, his paulo reductis, apice breve dehiscentibus; abdomine supra nigro, elytris superante. L. 8 m. Paraguay. — Espèce caractérisée par sa coloration thoracique et ses élytres un peu raccourcis; à placer près de *nigriceps* Gorh.

Ch. brevemarginatus n. sp. ♂. Angustatus, subopacus, elytris dehiscentibus, luteus, thorace postice et infra corpore paulo albescentibus, capite postice, thorace medio, scutello et membris pro majeure parte nigris, femoribus infra et tibiis intus pro parte flavis, pectore nigro lineato, epipleuris elytrorum angustatis, ad medium obscuris. L. 8 m. Guatemala. — A placer près de *emaciatus* Gorh., plus étroit, avec les élytres longuement déhiscentes et caractérisé par la coloration tricolore du thorax.

Ch. Forreri v. n. Eichelbaumi. Thorax et tête orangés, maculés de noir, élytres noirs avec la base et les côtés antérieurs jusqu'au milieu orangés. Mexique.

V. nov. Dugesi. Tête foncée, thorax jaune à 6 macules noires et élytres jaunes à macule basale discale noire sur chaque étui. Mexique.

Ch. albohumeralis n. sp. Etroit et allongé, forme de *fenestratus* Perty avec un aspect mat, une coloration générale noire, sauf les côtés du thorax largement jaunes-roux et une petite macule blanche aux épaules avec le dessous un peu taché de clair. L. 12 m. Brésil.

Ch. tricoloricollis v. n. mediointerruptus. Elytres d'un jaune flave avec, sur chacun, une macule prescutellaire et une macule anteapicale discale noires, la seconde moins marquée. Buenos-Ayres.

Ch. Kraatzi n. sp. Oblongo-elongatus, opacus, niger, thorace circa luteo marginato, medio rubro, postice breve nigro notato; elytris parum latis, sat brevibus, anguste marginatis, pedibus supra pro parte luteis. L. 12 m. Paraguay. — Ressemble à *tricoloricollis* Pic, avec les élytres plus courts et entièrement foncés.

Ch. brevenotatus v. n. humeronotatus. Elytres ayant les épaules marquées de jaune. Brésil.

Ch. Metzi n. sp. Elongatus, opacus, niger, thorace lateraliter elytrisque aurantiacis, his apice luteis, postice paulo strangulatis et attenuatis, apice dehiscentibus; antennis parum robustis, brevibus; thorace elytris angustiore, paulo elongato, antice subarcuato, medio longe sulcato; aliis et abdomine elytris superantibus. L. 10 m. Brésil: Santos. — Caractérisé par sa forme, jointe à sa coloration; à rapprocher de *histrion* Gorh.

Ptilodactyla multiimpressa n. sp. [Helodide]. Oblongus, postice attenuatus, pubescens, nitidus, rufescens, pectore obscuriore, pedibus luteis; thorace transverso, elytris angustiore, postice triimpresso, minute sat dense punctato; elytris ad basin minute multi impressis, ad suturam antice paulo impressis, minute striato-punctatis. L. 7 m. Brésil. — Caractérisé par ses nombreuses impressions au thorax et aux élytres.

(A suivre.)

M. PIC.

Le Coeurant: E. REVERET.