

# L'Échange, Revue Linnéenne



## Coléoptères du globe (suite) <sup>(1)</sup>

**Malthesis reductus** n. sp. [Malac.] Longatus, postice attenuatus, subopacus, niger, capite antice diverse albo, elytris nigris, antice externe aurantiacis; thorace nigro, lateraliter aurantiaco (*forma typica*), aut rufo et nigro bilineato (*v. bilineatus*), aut rufo et immaculato (*v. innotatus*). L. 8-10 m. Mérida. — Voisin de *ephippiatus* Pic, s'en distingue par la partie latérale orangée des élytres plus réduite.

**M. diversus** n. sp. Angustatus, postice attenuatus, parum nitidus, niger, capite antice lateraliter et postice anguste, infra corpore lateraliter abdomineque pro parte luteis. L. 9 m. Bolivie. — Voisin de *impressithorax* Pic avec le thorax différent, plus largement et moins profondément impressionné, les élytres plus longs.

**Chauliognathus vagenotatus** n. sp. [Malac.] Allongé, peu brillant, testacé-rougeâtre, antennes foncées, tête marquée brièvement de noir près des yeux, dessus de l'abdomen noir, élytres foncés avec la base et le disque en avant un peu jaunâtres, en dessous des épaules extérieurement marqués de testacé; tête pas plus large que le thorax, celui-ci court et large, marqué de 4 impressions en dessus avec un sillon médian bordé de plis surélevés; élytres plus larges que le thorax, peu longs, atténués et un peu déhiscent au sommet, peu dépassés par les ailes. L. 7 m. Pérou. — Voisin de *plicatithorax* Pic.

**C. kouranus** n. sp. Allongé, peu brillant, élytres assez courts, très déhiscent, longuement dépassés par les ailes et l'abdomen, roux testacé, partie postérieure de la tête, antennes moins la base, dessus de l'abdomen et tarsi noirs, élytres foncés, en partie bordés de clair, ayant, sur chacun, une courte ligne humérale jaune. L. 5,5 m. Guyane Fr. — Se rapproche de *reductus* Pic, caractérisé par une coloration particulière et la forme grêle.

**C. sulcithorax mihi**, du Paraguay, ressemble un peu à ce dernier quant à la coloration, avec une forme moins étroite; le thorax est fortement impressionné, les élytres sont obscurcis avec le disque un peu jaunâtre, ornés d'une macule apicale jaune, les pattes sont en partie rembrunies. L. 7 m.

**C. flavolineatus** n. sp. Étroit et allongé, brillant, noir, thorax flave avec 2 lignes longitudinales noires, jointes en avant, élytres sur chacun à bande longitudinale discalc plus rapprochée de la suture que sur les autres, côtés des élytres vers les épaules flaves, dessous du corps en partie flave. L. 5 m. Guyane Fr. — Espèce caractérisée par sa coloration jointe à sa forme étroite et allongée; à placer près de *latelineatus* Pic.

(1) Les nouveautés décrites se trouvent toutes dans la coll. Pic, sauf *Megalopides* nommés d'après des figures.

**C. longiceps** n. sp. Etroit, avec les élytres atténués, déhiscent et un peu raccourcis, la tête munie d'un long museau, le thorax étroit et long ; jaune avec la tête derrière les yeux, le milieu du thorax, les élytres sur les côtés, sommet excepté, et les membres, sauf la base des cuisses qui est rousse, noirs. L. 10 m. Guyane Fr. — Espèce caractérisée par sa longue tête, jointe à sa coloration élytrale, pouvant se placer près de *brevebasalis* Pic.

**C. Palmeri** (nov.). Etroit, allongé, brillant, jaune marqué de noir en dessus et dessous, tête, écusson et membres noirs ; thorax non transversal, jaune, largement noir sur le disque, élytres jaunes, à macule transversale basale préscutellaire et bande longitudinale discale allongée sur chaque étui, celles-ci noires, la bande part du quart basal et n'atteint pas le sommet des élytres. L. 11-12 m. Monclova (D<sup>r</sup> Palmer). — A placer près de *scutellaris* Lec., peut-être simple variété de cette espèce.

**Strongylium fortestriatum** n. sp. [Hétérom.]. Peu allongé, brillant, bleu, élytres verdâtres ; tête et thorax peu fortement et densément ponctués, ce dernier assez large, non caréné sur les côtés, bordé en avant ; élytres plus larges que le thorax, modérément allongés, atténués à l'extrémité, fortement striés, stries médiocrement ponctuées, intervalles subconvexes, finement ponctués. L. 17 m. Congo. Katanga. — Par ses yeux assez rapprochés, voisin de *longicolle* Geb. avec une autre coloration.

**S. librevilleum** n. sp. Allongé, peu brillant, à couleurs diverses ; tête et thorax d'un vert bronzé, ce dernier sur les côtés largement roux et étroitement marginé ; élytres roux, écusson, dessous du corps et pattes d'un vert métallique, antennes noires, rousses à la base ; tête et thorax fortement et assez densément ponctués, ce dernier peu court, plus étroit que les élytres ; élytres convexes, allongés, atténués postérieurement, fortement striés-ponctués, intervalles convexes. L. 18 m. Congo Français. — Sans doute voisin de *gabonense* Geb., qui est d'une autre coloration.

**S. Favareli** n. sp. Oblong, assez court et large, vert-bleu, élytres pourprés ; tête et thorax densément ponctués, yeux rapprochés ; thorax non caréné latéralement, court et large, subarqué latéralement, en dessus, au milieu, largement déprimé ; élytres bien plus larges que le thorax, assez courts, atténués à l'extrémité, assez convexes, fortement fovéolés en rangées, costés vers l'extrémité, intervalles étroits. L. 17 m. Gabon. — Paraît voisin de *fraternum* Kolbe et en différer par la coloration et les antennes peu allongées.

**S. muata v. n. viridanum.** Allongé, convexe, thorax finement et éparsément ponctué, élytres fortement striés, intervalles subconvexes, verdâtre, membres bleus. L. 25-27 m. Côte d'Ivoire.

**S. bicoloripes** n. sp. Allongé et étroit, brillant, dessus vert, élytres teintés de pourpre, dessous du corps diversement roux, membres noirs, fémurs roux à la base ; yeux très rapprochés ; antennes grêles ; thorax subcarré, non caréné sur les côtés, fortement et densément ponctué, en dessus au milieu un peu impressionné ; élytres un peu plus larges que le thorax, allongés, atténués à l'extrémité, fortement striés-ponctués, intervalles élevés ; tibias antérieurs en dedans vers le milieu un peu dilatés. L. 10 m. Gabon. — A placer près de *tibiale* Geb., coloration non foncée, et celle des pattes différente.

**Notoxus unifasciatus** n. sp. [Hétérom.]. Elongatus, nitidus, albo pubescens, rufo-testaceus, membris elytrisque pallidioribus, his post medium anguste piceo fasciatis, sparse punctatis ; cornu thoracis parum lato. L. 2,5 m. Arabie. — Peut se placer près de *Schimperi* Pic, en diffère par la corne plus robuste, les élytres fasciés.

**Formicomus luteomaculatus** n. sp. [Hétérom.]. Elongatus, elytris parum latis, nitidus, niger, elytris paulo metallicis, infra humeros luteo maculatis, antennis (apice pro parte piceis) coxisque rufis ; capite postice attenuato, pro parte ruguloso ; thorace antice valde dilatato-rotundato, supra pro parte minute plicato ; elytris sat latis, lateraliter subarcuatis, ad basin et apice attenuatis ; pygidio valde inciso et biangulato ; femoribus anticis longe spinosis. L. 3,5 m. Congo. — Espèce très caractérisée par son dessin élytral et la sculpture du thorax.

**Formicomus Boviei** n. sp. ♀. Elongatus, sparse griseo pubescens, nitidus, rufus ; elytris metallicis, viride cyaneis ; capite lato, postice paulo attenuato, sparse punctato ; thorace paulo elongato, antice dilatato-rotundato et sparse punctato ; ad basin paulo granuloso ; elytris elongatis, ad basin fere rectis et transverse impressis, apice attenuatis. L. 4 m. Congo (ex Bovie). — Peut se placer près de *spinierus* Frm., dont la coloration est différente.

**Agathomerus s. g. nov. Longathomerus**. Forme allongée ; antennes longues ; dessus presque glabre ; fémurs munis d'une sorte de lamelle bidentée. S. genre créé pour *A. humeralis* Serv. et var. *binotatus* Pic (Phytophage).

**Colobopsis Theresæ** n. sp. [Megalopide]. Elongatus, opacus, niger, supra aurantiacus, capite et thorace medio nigro notatis, elytris apice reducte et oblique nigro notatis ; antennis latis et brevibus ; thorace post medium paulo dilatato, ad basin fortiter transversim sulcato ; elytris parallelis, postice attenuatis, lateraliter minute carinatis. L. 9 m. Congo. — A placer près de *apicata* Frm., ayant la macule apicale noire différente, les élytres avec une faible côte latérale.

**Colobopsis nyassæ v. n. lateniger**. Elytres noirs, avec la base rousse, thorax roux sans dessin noir. Nyassaland.

**Temnaspis Bonneuili** n. sp. [Megalopide]. Oblongus, minutus, nitidus, pro parte longe hispidus, rufus, antennis nigris, brevibus et latis ; capite cum oculos thorace paulo latiore, sparse punctato, in vertice foveolato ; thorace sat breve, lateraliter sub-sinuato, antice late et postice anguste transverse sulcato, postice minute anguloso, fortiter et sparse punctato ; elytris sat latis et parum brevibus, ad humeros paulo prominulis, apice attenuatis, fortiter sat sparse punctatis ; femoribus posticis indentatis. L. 7 m. Sibérie. — Exemple défraîchi, me venant de la coll. de Bonneuil et se rapprochant de *brunneipennis* Pic.

**Agathomerus subfasciatus v. n. Monrosi** [Megalopide]. Les macules noires des élytres sont dilatées et se réunissent. Rép. Argentine. Ce nom est donné à la Fig. C de la page 197 de la monographie de Monros (1947) (1).

(1) Revista Soc. Entom. Argentina, XIII, 1947.

**Agathomerus 4-maculatus v. n. Guerini.** Elytres largement jaunes antérieurement avec une fascie basale interne noire, noirs au sommet avec une grande macule jaune incluse. Rép. Argentine. — Nom donné au dessin fig. A de la page 184 de la monographie de Monros.

**Plesioagathomerus canus.** Monros. Rép. Argentine. Trois dessins nets sont figurés par Monros et je propose les noms suivants pour désigner deux modifications variétistes : *v. bilineatus* (fig. 8, p. 201), à lignes noires des élytres jointes postérieurement et macule basale interne noire ; *v. atrodiscalis*, à élytres noirs, en partie bordés de clair (fig. C).

**Ptilodactyla multicostata** n. sp. [Helodide]. Entièrement noir, avec les élytres faiblement et multicostés, assez courts, le thorax ayant une ponctuation bien marquée et granuleuse. L. 7 m. Brésil.

**P. lojaensis** n. sp. *Elongatus, apice attenuatus, pubescens, nitidus, testaceus, capite pro parte brunneo ; thorace sparse punctato, lateraliter postice late impresso ; elytris distincte striato-punctatis, intervallis deplanatis, pro parte plicatis et punctatis.* L. 7 m. Equateur. — A placer près de *notata* Pic.

**Ptilodactyla humeridens** n. sp. *Elongatus, nitidus, breve pubescens, rufo-testaceus, thorace medio paulo brunnescente, dense granuloso, postice triimpresso ; elytris marginatis, apice paulo attenuatis, leviter striatis, humeris minute dentatis.* L. 5,5 m. Colombie. — Distinct du précédent par les épaules munies d'une petite dent, la sculpture plus fine des élytres.

**P. Fruhstorferi** n. sp. *Parum elongatus, postice valde attenuatus, depressus, nitidus, pubescens, niger ; thorace valde transverso, minute et sparse punctato, elytris æquale ; elytris fere instriatis, minute lineato-punctatis et sparse minutissime punctatis.* L. 9 m. Brésil. — Espèce caractérisée par sa forme très atténuée postérieurement et son thorax très transversal.

**P. compressa** n. sp. *Elongatus, postice valde attenuatus, nitidus, pubescens, rufo-castaneus, capite et thorace nigris ; thorace sat breve, elytris angustiore, minute et sparse punctato ; elytris inæqualibus, profunde et diverse striatis, lateraliter pro parte compressis, ad suturam longitudinaliter late impressis.* L. 9 m. Pérou. — Caractérisé entre tous par la structure particulière des élytres, de même que l'espèce suivante.

**P. forteimpressa** n. sp. *Angustatus, nitidus, breve holosericeo-pubescens, nigropiceus, elytris pro parte pallidioribus, pedibus testaceis ; thorace parum breve, dense punctato-grnuloso ; elytris apice paulo attenuatis, ad suturam transverse biimpressis, fere instriatis et minutissime punctatis.* L. 6 m. Brésil.

**P. multistriata** mihi, du Brésil, voisin de *compressa*, mais plus foncé, moins étroit et plus parallèle, ayant le thorax plus fortement étranglé sur les côtés antérieurs, les élytres fortement striés. L. 8 m.

M. Pic.

(A suivre.)

Le Gérant : E. REVERET.