

53C



# L'ÉCHANGE

  

# Revue Linnéenne

FONDÉE PAR LE DOCTEUR JACQUET

Organe des Naturalistes de la Région Lyonnaise et du Centre

CONTENANT LES DEMANDES D'ÉCHANGE

D'ACHAT OU DE VENTE DE LIVRES ET DE TOUT AUTRE OBJET D'HISTOIRE NATURELLE

M. PIC (\*, C. I. P., O.), Directeur

Membre correspondant du Muséum de Paris

### COMITÉ DE RÉDACTION OU COMITÉ D'ÉTUDES

J. Clermont, à CASTANRY-TOLOZAN (Haute-Garonne).  
— *Aphodius paléarctiques, Hétérodes français.*

A. Méquignon, 53, avenue de Breteuil, PARIS (7<sup>e</sup>). —  
*Coléoptères de France (Curculionides exceptés.)*

Maurice PIC, DIJON (Saône-et-Loire). — *Coléoptères d'Europe, Mégaloptère, Pimplide, Nanophyes, Anthicidae, Pédilidae, Cratocoridae, etc du globe. — Cerambycides de la Chine, du Japon, etc. Cryptocephalites paléarctiques, Malacoisermes du globe.*

Adresser toutes Communications  
Concernant la Rédaction, les Échanges, les Abonnements et les Annonces

A. M. M. PIC, à Dijon  
Compte - courant postal : N° 31-306, Dijon.

(12 Février 1948)



SOMMAIRE

— SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE  
DE FRANCE

Coléoptères du globe, par M. Pic (suite). BIBLIOTHÈQUE

PRIX D'ABONNEMENT: UN AN, A PARTIR DU 1<sup>er</sup> JANVIER  
France : 50 francs. | Etranger : 80 francs.

MOULINS  
LES IMPRIMERIES RÉUNIES  
15, RUE D'ENGHIEN, 15

## ANNONCES

La page . . . . .	64 fr.	Le 1/4 de page . . . . .	20 fr.
La 1/2 page . . . . .	36 fr.	Le 1/8 de page . . . . .	12 fr.

*Réduction de 25 % pour les insertions plusieurs fois répétées*

TARIF SPECIAL POUR LES ANNONCES ANNUELLES

---

## PRIX DES SEPARATA

*Les auteurs désirant des « Separata » de leurs articles, voudront bien s'entendre directement avec l'imprimeur.*

---

## EN VENTE

Chez l'auteur, M. Maurice PIC, directeur de l'*Echange*, à Digoin (Saône-et-Loire) pour l'étranger, ou à Les Guerreaux par St-Agnan (Saône-et-Loire) adresse ordinaire.

1° L'ouvrage « *Matériaux pour servir à l'étude de Longicornes* » étant épuisé, des fascicules seulement restent à vendre, dont le 1<sup>er</sup> cahier (traitant spécialement les variétés françaises omises dans de récents ouvrages) et le 11<sup>e</sup> cahier plus récent.

2° *Mélanges Exotico-Entomologiques*, qui comprennent 71 fascicules.

3° *Opuscula Martialis ou Martialia*, qui comprennent 13 fascicules (1940-1944).

S'entendre pour les prix avec l'auteur. Paiement à l'avance. Frais de port à la charge de l'acheteur.

**A demander  
à l'auteur M. PIC**

LA NOUVELLE PUBLICATION

commencée en 1947

sous le titre de :

**Diversités entomologiques**

**Pour les déterminations**

*Le Directeur de l'Echange s'offre pour déterminer des Coléoptères, ceux au moins rentrant dans ses groupes d'étude.*

*Tous les frais de poste et ceux nécessaires pour assurer le retour des insectes envoyés en étude sont à la charge de l'envoyeur.*

*Il ne sera répondu qu'aux lettres munies d'un timbre pour la réponse.*

# L'Échange, Revue Linnéenne

## Coléoptères du globe (suite)



**Ptinus (Eutaphrus) diversicollis v. n. Panousei** ♂. [Ptinide]. *Elongatus*, parum pubescens, rufus, elytris piceis, ad basin et ante apicem reducte rufo fasciatis, ad medium interne paulo rufo notatis et apice rufo marginatis. Plage de Foun Assaka (Communiqué par de Peyerimhoff). — Diffère de la forme typique par les élytres peu pubescents avec des dessins roux particuliers.

**Gyponix latus** n. sp. [Cleride]. Oblongo-elongatus, latus, parum nitidus, sat sparse breve griseo pubescens, rufus, capite thoraceque brunnescentibus, elytris luteis, pro parte irregulariter brunneo maculatis et brunneo punctatis, punctis pro majeure parte lineato dispositis, fere usque ad apicem prolongatis; epistome, labro, palpis, antennis pedibusque luteis, femoribus apice et tibiis ad basin late nigro-piceis, tarsis pro parte brunneis. Capite thoraceque sat robustis, illo postice valde strangulato, minute et dense punctatis, thorace supra paulo et diverse impresso, ad medium reducte transverse sulcato, lateraliter postice subarcuate sulcato; elytris thorace latioribus, parum elongatis, apice breve attenuatis, late punctatis, punctis pro parte regulariter, pro parte irregulariter, dispositis, his ad suturam piceo marginatis. L. 10 mill. Afrique-Australe (Communiqué par Corporaal). — Caractérisé par sa forme large et les élytres sans dessins apparents, simplement mouchetés et ponctués de brun.

**Corynetes analis v. n. obscurimembris** [Cleride]. Viridi-metallicus, abdomine apice testaceo. Les antennes et les pattes sont foncées, au lieu d'être testacées. Congo (coll. Pic).

**C. analis v. n. intermedius**. Membres testacés avec les tibiais presque entièrement rembrunis. Congo (coll. Pic).

**Corynetes nigratarsis** n. sp. Minutus, oblongus, convexus, nitidus, sparse hirsutus, supra nigro-cyaneus, membris pro parte nigris, pro parte testaceis. Capite breve et lato, thorace fere æquale, oculis prominulis, paulo incis, dense pupillato-punctato; antennis testaceis, clava nigra; thorace breve et lato, postice angustiore, sat dense pupillato-punctato; elytris thorace paulo latioribus, sat brevibus, postice inclinatis et attenuatis, ante medium transverse impressis, antice diverse, pro parte fortiter lineato-punctatis, postice minute et irregulariter punctatis; pedibus nigris, tibiis testaceis. L. 2 mill. environ. Afrique Australe: Boknes (Van Hille, communiqué par Corporaal). — Espèce caractérisée par sa petite taille, la sculpture des élytres et les pattes bicolores.

**Opetiopalpus bicoloriceps** n. sp. [Cleride]. Minutus, oblongus, convexus, nitidus, hirsutus, niger, thorace rubro, elytris nigro-viridescentibus, aut paulo cyaneis, capite antice, antennis ad basin, pedibusque rufo-testaceis; thorace sat minute, non sparse punctato; elytris sat fortiter, pro parte regulariter lineato punctatus. L. 2,5 mill. Afr. Or. (coll. Pic). — Peu robuste, à coloration bicolore de la tête, pouvant se placer près de *scutellaris* Panz. et près du suivant.

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE  
DE FRANCE  
BIBLIOTHÈQUE

**Op. diversipes** n. sp. Minutus, oblongus, convexus, nitidus, longe hirsutus, niger, elytris viridescens, thorace rubro, articulis basalibus antennarum pedibusque testaceis, femoribus et tibiis medio brunneo notatis, tarsis apice brunneis aut nigris, thorace parum fortiter sat dense punctato; elytris fortiter, pro parte lineato-punctatis. L. 3 mill. environ. Afrique Australe : Boknes (ex Van Hille. Communiqué par Corporaal (1). — Espèce caractérisée par la particulière coloration des pattes. Peut se placer près de *scutellaris* Panz.

**Op. Fourchei** mihi, du Congo, paraît être une simple variété de *atriceps* Pic, ayant les pattes en partie rembrunies, les élytres un peu moins fortement ponctués et de coloration un peu verdâtre.

La var. **Conradsi** mihi, du Tanganika, a les pattes plus ou moins noires, les élytres bleus. Ces deux dernières variétés se trouvent dans ma collection.

**Anthicus (Liparoderus) Panousei** n. sp. [Hétéromère]. Elongatus, subopacus, capite nitidior, niger, thorace postice rufo, elytris rufo-signatis et argenteo bifasciatis, pedibus testaceis, femoribus ad medium late nigris; antennis nigris, ad basin rufis, gracilibus, articulo ultimo elongato; capite breve et lato, postice subarcuato, thorace latiore, minute et sparse punctato; thorace parum elongato, postice attenuato, dense punctato, ad basin marginato; elytris elongatis, post medium paulo latioribus, postice attenuatis, post basin transverse impressis, minute parum dense punctatis, his lateraliter testaceis et in singulo ante et post medium testaceo-argenteo fasciatis, fascia prima ad humeros remota et dilatata, fascia secunda arcuata et ad suturam postice anguste prolongata. L. 5 mill. Soulimine (communiqué par de Peyerimhoff). — Espèce voisine de *venustus* Duf. et très caractérisée par ses dessins élytraux faits de fascies claires, particulières, recouvertes de pubescence argentée.

**Synallecta microceps** n. sp. [Hétéromère]. Elongatus et angustatus, antice et postice attenuatus, parum nitidus, non dense griseo pubescens, inhirsutus, rufescens, capite, abdomine, membrisque nigris, femoribus ad basin paulo rufis. Capite thorace angustiore, sat fortiter, sat dense punctato, oculis transversis, approximatis; antennis elongatis, sat gracilibus, articulis 3 et sequentibus elongatis, apice latioribus; thorace breve et lato, antice subarcuato, lateraliter fere recto, densissime pupillato-punctato, elytris paulo angustiore; elytris sat elongatis, postice attenuatis, striato-punctatis, intervallis deplanatis, minute punctatis; pedibus parum elongatis, femoribus paulo crassioribus. L. 6 mill. Sénégal : Bouake (Communiqué par A. Villiers). — Par sa forme allongée, se rapproche de *macroceps* Pic. S'en distingue par sa tête plus petite, le thorax moins robuste, la forme plus étroite du corps.

**Xenogena laticollis** n. sp. [Hétéromère]. Oblongus, sat latus, parum nitidus, sparse albo pubescens et paulo hirsutus, rufus, pro parte piceus, supra paulo ænescens, membris piceis, femoribus ad basin late testaceis, tarsis testaceis; capite fortiter punctato, thorace angustiore, oculis distantibus; antennis apice paulo latioribus; thorace breve et lato, fortiter sat dense punctato, elytris angustiore; elytris sat latis, parum elongatis, postice attenuatis, sat fortiter striato-punctatis, intervallis subcon-

(1) Aussi dans la collection Pic.

vexis, punctatis. L. 5 mill. Sénégal (coll. Pic). — Diffère de *X. laticeps* Pic, de Fort Sibus, par la tête moins large, tandis que le thorax est plus transversal. Cette dernière espèce est robuste, noire, avec les élytres roux, elle est fortement ponctuée sur l'avant-corps, les élytres ont de larges stries-ponctuées.

*X. Auberti* mihi, du Gabon, par contre, a une forme élytrale plus allongée et le thorax est moins large. Espèce rousse avec les élytres plus clairs, les antennes noires moins les premiers articles roux, les pattes noires moins la base des cuisses rousse. Le dernier article des antennes, chez ♂, est épais, pas très long, un peu courbé. L. 5 à 6 mill. (coll. Pic).

La var. *Laurenti* mihi, du Sénégal (coll. Pic), long. 8 mill., a l'avant-corps plus fortement ponctué, les élytres moins déprimés.

*Strongylium Favareli* n. sp. [Hétér.]. Oblongus, sat curtus et latus, viride-cæruleus, elytris purpureis; capite thoraceque dense punctatis, oculis approximatis; thorace lateraliter incarinato et subarcuato, breve et lato, supra medio late depresso; elytris thorace valde latioribus, sat brevibus, apice attenuatis, sat convexis, fortiter lineato-foveolatis, apice costatis, intervallis angustatis. L. 17 mill. Gabon (coll. Pic). — Paraît voisin de *fraternum* Koll. et en différer par la coloration avec les antennes peu allongées.

*S. episcopale* v. n. *paulopurpureum*. Noir-olivâtre en dessus avec les élytres mats à reflets pourprés. Congo (coll. Pic).

*S. oyemun* n. sp. Elongatus, parum nitidus, cyaneus, violaceus, pedibus pro parte paulo cupreis; thorace lateraliter marginato, minute et sparse punctato; elytris convexis, fortiter striatis, striis antice et parte fortiter foveolato punctatis, postice minute punctatis et costulatis. L. 15 mill. Gabon (coll. Pic). — Paraît voisin de *clavigerum* Geb. (ex descr.), mais antennes grêles et coloration différente.

*S. cæruleum* n. sp. Elongatus, postice attenuatus, nitidus, cæruleus, oculis sat approximatis; antennis brevibus, apice latioribus; thorace sat breve et parum lato, minute non dense punctato, lateraliter marginato; elytris thorace valde latioribus, elongatis, postice attenuatis, subconvexis. L. 17 mill. Gabon (coll. Pic). — Par ses longues antennes, paraît devoir se placer près de *clavigerum* Geb., dont la couleur n'est pas uniformément bleue.

*Apalochrus atricornis* n. sp. ♂ [Malac.]. Subparallelus, nitidus, paulo griseo pubescens et breve hirsutus, niger, supra viride-cyaneus, elytris viridescentibus, pro parte vage auratis, membris nigris, antennis ad basin infra, pedibus anticis pro majore parte (femoribus paulo et tarsis nigris) et femoribus intermediis infra testaceis. Capite nitido, minute et sparse punctato; antennis depressis; thorace breve et lato, elytris non angustiore, nitido, transverse bisulcato; elytris parum elongatis, postice paulo latioribus et apice attenuatis, minute et irregulariter punctatis; tibiis anticis parum crassis, subsinuatis, femoribus ad basin paulo dentatis, coxis inermibus, tibiis intermediis simplicibus, sinuatis, ante apicem paulo dilatatis. L. 4,5 mill. Sénégal: Dakar (Communiqué par A. Villiers). — Peut se placer près de *Tschoffeni* Pic, mais antennes plus foncées, pattes antérieures un peu différentes, etc. Je n'ai pas pu voir

distinctement le dessous du corps (avec le type unique collé), mais je pense que l'abdomen est foncé.

**Chauliognathus ignatiosus** Pic [Malac.]. Les dessins élytraux de cette espèce varient de la façon suivante : 1° Base des élytres marquée de foncé, soit sans autre dessin noir (v. n. *Micheli*), soit ayant vers le milieu tantôt une seule macule noire (*forme type*), tantôt deux (v. *trimaculatus*), tantôt encore une sorte de bande faite par les macules réunies (v. *Graffi*), ou bien une grande macule s'étendant presque jusqu'au sommet des élytres (v. *Fauconneti*) ; 2° Parfois les dessins noirs se réunissent plus ou moins antérieurement, tandis que le sommet des élytres est largement clair (v. n. *Wyoni*), ou bien la coloration noire envahit les élytres, sauf une bordure latérale postérieure (v. n. *Viturati*) ; 3° La base des élytres n'est pas marquée de foncé. Elytres ornés soit de deux macules médianes noires (v. n. *Clayeuxi*), soit d'une sorte de fascie postmédiane noire (v. n. *Hickeri*), soit encore d'une grande macule postérieure noire qui laisse tantôt au sommet une partie claire (v. n. *Mariæ*), ou tantôt le recouvre complètement (v. n. *Marihæ*). Quand les élytres n'ont pas de dessin noir et sont concolores jaunes, c'est la var. nov. *Richardi*. — Les var. diverses sont du Brésil (coll. Pic).

**C. bicoloritarsis** n. sp. Elongatus, opacus, elytris subnitidis, rufo-luteus, tarsi pro parte nigris, elytris ad medium in singulo reducte nigro fasciatis, his sat fortiter et dense punctatis, post humeros paulo dilatatis, apice paulo attenuatis. L. 13 mill. Brésil (coll. Pic). — Voisin de *medionotatus* Pic.

**C. basiquadrinotatus** n. sp. ♂. Parum elongatus, fere parallelus, subopacus, luteus, capite, pectore pro parte, antennis (articulo 1° testaceo) et tarsi nigris ; thorace transverso, medio nigro 5 signato ; elytris ad basin nigro bimaculatis, his sat brevibus, paulo granulatis. L. 9 mill. Brésil (coll. Pic). — Peut se placer près de *infrabasis* Pic, dessins noirs différents.

**C. Tixieri** n. sp. Oblongo-elongatus, postice attenuatus, subnitidus, niger, abdomine, capite pro parte, thorace, illo medio nigro binotato, membrisque pro parte rufis, elytris luteis, ad basin nigro maculatis et ad medium reducte nigrofasciatis, his minute punctatis, apice subtruncatis. L. 10 mill. Brésil (coll. Pic). — Peut se placer près de *hausanus* Pic. — La var. *brunneonotatus* est plus largement claire avec le thorax concolore et les élytres n'ayant sur chacun qu'une macule discale postmédiane noire. Brésil (coll. Pic).

**C. Laboissierei** n. sp. Elongatus, postice attenuatus, opacus, luteus, capite pro majore parte, thorace medio, scutello, infra corpore membrisque pro parte nigris, elytris infra humeros maculatis. L. 11 mill. Brésil (coll. Pic). — Ressemble à *riosus* Pic, mais non brillant, plus étroit et nettement atténué postérieurement.

**C. opacipennis** v. n. *postuninotatus*. Elytris luteis, ad basin nigro signatis, post medium interne uni nigro maculatis. Brésil (coll. Pic).

(A suivre.)

M. PIC.

Le Gérant : E. REVERET.

## Souhais du jour

Les relations normales ne reprennent pas vite et c'est très regrettable, car elles sont indispensables pour faciliter nos études générales, ou pour fournir la documentation complète nécessaire à nos travaux d'ensemble. Pour ma part, je regrette particulièrement de n'avoir plus de nouvelles de divers musées avec lesquels j'étais en relations suivies avant la guerre : Budapest, Dahlem, Salangor Museum, etc...

Au commencement d'une année nouvelle, le Directeur de « L'Echange », avec les vœux sincères exprimés pour tous ses anciens correspondants, souhaite la reprise des relations cordiales du passé et cela, dans le plus bref délai. Bonne santé et bon courage au travail pour tous ceux qui ont pu résister à l'ouragan mortel ; souvenirs émus à ceux qui ne sont plus et que l'on ignore disparus.

Enfin, bonne année, dans la complète interprétation du terme, à tous les vivants, correspondants anciens ou nouveaux, abonnés de « L'Echange » et autres collègues de France ou de l'étranger.

M. PIC.

---

## Avis et renseignements divers

Le directeur de « L'Echange » annonce les résolutions suivantes. Par mesure d'équilibre financier avec les frais divers en hausse, l'augmentation de l'abonnement est devenu nécessaire ; en conséquence, le prix sera, pour 1948, de 50 fr. pour la France et de 80 fr. pour l'étranger, estimations non exagérées comparées aux déboursés nécessaires.

L'abonnement devra être payé au plus tard après la réception du premier numéro. Il sera inutile de réclamer le 2<sup>e</sup> numéro du journal, si l'abonnement n'a pas été réglé. Il ne sera pas répondu, ni satisfait à aucune demande commerciale, ou autre, s'il n'est pas envoyé des timbres pour la réponse.

Les anciens paragraphes (pour les déterminations, demandes d'imprimés), publiés sur la couverture du N<sup>o</sup> 507, de 1947, restent valables.

Il arrive que des sommes dues sont envoyées de l'étranger et laissent à la charge de l'auteur-envoyeur des frais de change qui diminuent sa créance, ce qui n'est pas admissible. Il convient que l'on s'assure, avant de faire un règlement, que le fournisseur touchera la somme intégrale qui lui est due.

Etant donné les difficultés du remboursement, souvent produites, il ne sera plus fourni (jusqu'à ce que les relations deviennent normales) des collections d'imprimés représentant une certaine somme, sauf si le versement est fait à l'avance.

La nouvelle publication « Diversités Entomologiques », substituée à « Opuscula Martialia », sera fournie sur demande par l'auteur, M. Pic ; le prix est fixé à 50 fr. le fascicule (frais de port en surplus). Deux fascicules sont parus en 1947 et un nouveau va paraître.

« Opuscula martialia » comprend 13 fascicules, au prix de 40 fr. le fascicule (port en plus).

---

## Notes de chasses (suite)

M. M. Pic a capturé à Saint-Agnan, le 10 juin 1947, deux exemplaires de *Colambius filum* Rossi, Longicorne nouveau pour le département de Saône-et-Loire.

Le 27 juin 1947, dans les bois de Chiseuil-sur-Digoin, capture renouvelée de deux exemplaires du *Cryptocephalus punctiger* Payk.

A signaler la capture, dans les environs de Saint-Agnan, de *Tenthredo Rossii* v. *scissa* Klug., au commencement de juin.

J'ai capturé autrefois *Pamphilus vafer* L., à Seynes (Basses-Alpes) et *Xyphodria picta* Kon. a été trouvé à Broût-Vernet par feu du Buysson (coll. Pic).

M. M. Pic a capturé, dans son cabinet de travail et attirés par la lumière, les Lépidoptères suivants : dans le courant d'avril, une variété de *Saturnia pavonia* L. et plusieurs *Bombyx* B., en septembre.

M. A. Villiers a recueilli, au Sénégal, *Sora pallidimembris* Pic, espèce décrite de Sierra-Leone. Précédemment, je n'avais vu que le type unique.