

L'Échange, Revue Linnéenne



Tenthredinides en partie nouveaux [HYMEN.]

Dolerus germanicus v. n. Berlandi. ♂. Deuxième segment de l'abdomen rouge, transversalement marqué de noir à la base, 3 suivants roux, les autres noirs; antennes teintées de roussâtre; pattes antérieures en grande partie jaunâtres, les autres largement foncées. L. 7,5 m. Mont-Cenis (Pic).

D. germanicus v. n. Buyssoni. ♀. Mesonotum rouge, marqué de foncé sur son milieu antérieur, scutellum noir; premier segment de l'abdomen noir, les autres d'un roux jaunâtre; pattes largement noires, sommet des fémurs antérieurs avec la base des tibias jaunâtres. L. 7 m. Allier. Var. voisine de la var. *mediator* Ensl.

D. æriceps v. n. Thersæ. ♂. Abdomen noir sur le 1^{er} et les derniers segments, le 6^e étant brièvement roux sur les côtés et le 2^e roux maculé de noir sur la base, cuisses I et II en majeure partie foncées, les cuisses III foncées sauf genoux roux, tibias entièrement clairs, les postérieurs marqués de foncé au sommet. L. 7 m. Bourges (ex coll. du Buysson).

Tenthredopsis carbonaria v. n. medionotata ♀. Abdomen noir, avec les segments 2 et 3 en partie marqués de roux. Morée: Olympia (Pic).

T. Andrei Kon. La forme typique ♀ (et aussi le ♂) a les segments médians de l'abdomen rouges avec les extrémités de cet organe noirs. Un ♂, que j'ai récolté à Corfou, représente une var. nouvelle (v. *atronotata*), dont les segments intermédiaires rouges de l'abdomen sont diversement marqués de noir sur leur milieu. L'espèce est très caractérisée par ses antennes annelées de blanc près de leur extrémité, tandis que les mésopleures ont une ponctuation rugueuse, qui leur donne un aspect mat.

J'ai capturé à Corfou 2 ♀ de coloration abdominale différente que je ne puis rapporter aux espèces connues du même genre et que je présente ici sous le nom de *Thersæ*. Ces ♀ diffèrent de *T. corcyrensis* André par les clypeus, labre et écusson blancs, les pattes postérieures presque entièrement rousses, le clypeus non échancré, etc...

T. Thersæ ♀. Forme étroite et allongée, aspect brillant, noir, avec l'avant-corps brièvement marqué de blanc, antennes noires, pattes rougeâtres avec les genoux des cuisses postérieures et les tarses des mêmes pattes foncés; abdomen rouge avec seulement l'extrême base noire (*forme typique*) ou noir avec les segments 3-4 entièrement, le 5^e largement, roux, le 6^e un peu teinté de roux sur les côtés (v. n. *Baudyi*). Orbites internes des yeux bordés de blanc; thorax noir, écusson et post-écusson marqués de blanc; mésopleures brillants, pas sensiblement ponctués; tegulæ foncées; stigma foncé à base claire; antennes noires, parfois en partie plus claires en des-

sous ; pattes presque complètement rousses, hanches et trochanters foncés, genoux postérieurs, parfois sommet des tibias postérieurs, tarses en partie rembrunis ou noirâtres. L. 10-11 m. — Peut se placer près de *T. campestris* L., ou *scutellaris* F. Autrefois, feu Pigeot m'a déterminé une ♀ de *Tenthredopsis* des Guerreaux (et non reprise depuis) ; *T. n. sp.*, groupe *Beuthini*, ayant les mesopleures peu brillants, distinctement ponctués ruguleusement avec le clypeus blanc (il est noir chez *Beuthini* Kon.), ainsi que le labre et l'écusson, les antennes non annelées. Cette ♀ se rapprocherait de *T. laticeps* Kon. (Rev. d'Ent., IX, 1890, p. 68) et s'en distinguerait par la tête pas très large, non élargie postérieurement, la coloration de l'abdomen, dont les segments 3-6 sont entièrement, et le 7^e en partie rouges. Les pattes postérieures sont noires avec les tibias roussâtres dans leur milieu et les autres pattes claires avec la base des cuisses, ou leur dessus, différemment foncés, les hanches et les trochanters sont foncés. L. 12 m. Je donne à cette forme le nom de **Pigeoti**. Dans les *Tenthredinoides* de Berlaud, *Pigeoti* se placerait près de *tarsata* F. avec une sculpture plus faible sur les mésopleures, une coloration toute autre de l'abdomen.

T. nassata v. n. martialis ♀. Abdomen jaune avec les 2 premiers segments largement noirs au milieu et les avant-derniers brièvement marqués de foncé en dessus. Les Guerreaux. — A placer près de *v. metapleuris* Ens., mais métapleuris non marqués de foncé.

T. nassata v. n. Buyssoni. Roux, avec les deux premiers segments de l'abdomen noirs, le labre, l'épistome et l'écusson blancs, les pattes presque entièrement claires, avec les hanches et trochanters antérieurs et postérieurs d'un brun obscur, de même les tarses postérieurs. Toulouse (ex coll. du Buysson).

M. Prc.

Coléoptères du globe (suite) ⁽¹⁾

Callidium impressipenne n. sp. [Cerambyc.]. Parum elongatus, nitidus, paulo et sparse griseo pubescens, nigro-piceus, membris rufis. Capite in vertice ruguloso ; antennis, elytris fere æqualibus, articulo 2° sat breve, 3° quarto paulo longiore, ceteris paulo longioribus, æqualibus, paulo depressis ; thorace sat breve, parum lato, lateraliter subarcuato, paulo fortiter diverse sat dense punctato, medio diverse impresso ; elytris thorace sat latioribus, parum brevibus, apice paulo attenuatis, parum fortiter sat sparse-punctatis, ad humeros breve et post scuellum late impressis, post medium ad suturam impressis, his apice subrotundatis, paulo et breve dehiscentibus ; sutura elevata ; pedibus robustis, femoribus valde clavatis, tibiis posticis longitudinaliter pro parte subsulcatis. L. 16 mill. Bois de Chêne de l'Île de Wight (communiqué par le Museum de Paris). — Espèce caractérisée par son faciès et sa coloration générale obscure, jointe aux impressions des élytres.

(1) Sauf indication spéciale, les types sont dans ma collection.

Hylophilus omissus n. sp. [Hétér.]. Petit, étroit, brillant, à fine pubescence soyeuse, roussâtre, avec les yeux foncés ; antennes assez courtes, à articles 2 à 4 à peu près égaux, les avant-derniers courts et élargis, le dernier assez court, suboviforme ; tête tronquée postérieurement, yeux assez gros, écartés ; thorax un peu plus long que large, plus étroit que la tête, non angulé en avant, avec une double impression basale et des petites en avant ; élytres un peu plus larges que le thorax, longs, atténués au sommet, à faible dépression prébasale ; pattes grêles, plus claires que la coloration générale. L. 1,5 m. Exemple de la vieille collection Chevrolet étiqueté Allemagne. — Ressemble à *corsicus* Pic, mais les antennes sont plus courtes (rapprochées de celles de *pentatomus* Ths.), les impressions thoraciques différentes, la forme des élytres plus allongée.

Hylophilus Lacroixi n. sp. Allongé, brillant, à pubescence soulevée grise, noir de poix, avec les épaules teintées de roussâtre, antennes un peu rembrunies, à base rousse, celles-ci longues, pileuses, à dernier article assez long, tronqué au sommet ; tête subarquée en arrière, yeux assez grands, écartés ; thorax plus long que large, bien plus étroit que les élytres qui sont un peu longs, atténués à l'extrémité et subconvexes, très peu déprimés en avant ; pattes grêles, roussâtres, les postérieures et tarsi testacés. L. 2 m. Congo. — A placer près de *kivuensis* Pic avec une coloration plus foncée, les antennes différentes.

H. angulicollis mihi, du Congo, de coloration générale foncée, plus allongé que le précédent, s'en distingue nettement par les antennes plus courtes, testacées, le thorax robuste, inégal en dessus, subangulé antérieurement, les élytres plus longs, à large impression antérieure, les pattes antérieures rousses, les autres en majeure partie foncées (sans caractère particulier).

H. Stanlayi n. sp. Oblong, atténué postérieurement, un peu brillant, à pubescence soyeuse grise, entièrement d'un rouge testacé, avec les yeux gris ; tête subarquée en arrière, yeux pas très grands, écartés ; antennes longues et assez grêles ; thorax un peu plus long que large, non angulé en avant ; élytres assez courts, atténués postérieurement, à impressions postscutellaire et prébasale transversale peu densément ponctués ; pattes grêles. L. 2 m. environ : Stanleyville. — A placer près de *brevissimus* Pic, moins trapu, plus brillant, thorax différent.

H. longioricornis n. sp. Assez allongé, brillant, à pubescence un peu épaisse, non dense, roussâtre, avec les élytres un peu rembrunis, membres clairs, grêles ; antennes très longues, à dernier article un peu long, acuminé ; tête rétrécie et arquée derrière les yeux, ceux-ci grands, assez rapprochés ; thorax plus long que large, non angulé en avant ; élytres assez longs, atténués postérieurement, nettement et diversement impressonnés en avant ; tibias antérieurs subsinués, angulés en dedans près de la base, intermédiaires longs et simples, postérieurs sinués et largement, mais faiblement, échancrés en dedans vers le milieu. L. 3 m. environ. Congo, à Kivu. — Espèce caractérisée par ses membres longs, grêles, avec une structure diverse pour les tibias.

H. gracilicornis Pic (1927), du Tonkin, préoccupé par *gracilicornis* Pic (1914), devra prendre le nom de **gracilioricornis**.

H. dilaticornis Pic (1929), du Congo, préoccupé par *dilaticornis* Pic (1898), devra prendre le nom de *crassioricornis*.

H. macrocephalus Pic (1935), du Cameroun, préoccupé par *macrocephalus* Chap. (1916), devra prendre le nom de *latecephalus*.

Formicomimus Pic (1939), genre Anthicidæ, préoccupé par *Formicomimus* Pic (1923), genre d'Hylophilidæ, est à muter en *Falsoformicomus*.

Hylophilus pubescens v. n. *fuscofemoratus*. Les cuisses postérieures sont plus ou moins foncées. Tonkin.

H. ptinomorphus n. sp. Oblong, opaque, noir avec une pubescence grise dense, condensée en bande grise sur le pourtour postérieur du thorax et étendue sur les élytres largement sur leur milieu longitudinal avec des prolongements en fascies près de la base et avant le sommet, bord apical marqué de même pubescence ; antennes robustes et courtes, noires ; yeux écartés ; thorax assez étroit ; élytres peu longs et larges ; pattes bicolores, noires et testacées. L. 2,5 m. Ile Maurice. — Caractérisé par son aspect robuste et son revêtement particulier.

H. curesignatus n. sp. Petit, oblong, presque opaque, à pubescence soyeuse grise, moins rapprochée sur les élytres, testacé avec les yeux gris et les élytres ornés antérieurement d'une étroite ligne suturale foncée ; ponctuation générale fine et plus ou moins rapprochée ; antennes courtes, à dernier article peu long ; tête tronquée postérieurement ; thorax court, dilaté anguleusement en avant ; élytres courts, atténués postérieurement ; pattes grêles. L. 1,5 m. Casamance. — Peut se placer près de *Raffrayi* Pic, forme et dessins des élytres différents.

Donaldia bourbenica n. sp. [Malacod.]. Oblongo-elongatus, nitidus, hirsutus, niger, thorace pro parte testaceo marginato, parum fortiter punctato ; elytris parum brevibus, apice attenuatis, fortiter punctatis, luteis, signaturis piceis ornatis in singulo ; linea suturalis medio dilatata, macula prebasalis in disco, linea prelateralis sinuata, medio intus dilatata, fascia obliqua et reducta discoidalis postmediana. L. 3 m. Ile Bourbon. — Voisin de *elegans* All., moins large, élytres ayant une fascie post-médiane interne supplémentaire.

D. minor v. n. *Caroli*. Thorax presque entièrement foncé, dessins noirs assez étendus sur la partie postérieure des élytres, mais avec l'apex non marqué de foncé. Ile Maurice (ex Alluaud).

Eryzia Baikii v. n. *paulonotata*. Oblong et large, noir en dessous, roux en dessus, avec le milieu du thorax, une assez longue et pas très large bande suturale (sur un peu plus de la moitié antérieure des élytres) foncée, à reflets métalliques, revêtement squamuleux en dessus non continu, en partie jaune, en partie blanc et pas de bande nette au thorax. Haut-Sénégal (ex Nodier).

(A suivre.)

M. Pic.

Le Cérant : E. REVIRET.