



L'Échange, Revue Linnéenne

Coléoptères du globe (suite)



Chloridolum Descarpentrii n. sp. [Ceram.] (1). Allongé, étroit, peu brillant, dessus glabre, dessous à pubescence soyeuse, argentée, coloration générale verte, plus ou moins dorée sur les côtés, milieu du thorax et partie longitudinale des élytres, près de la suture, plus sombre ou un peu bleutée, membres d'un bleu violacé. Antennes ♂ bien plus longues, ou un peu plus longues ♀, que le corps ; thorax peu robuste, gibbeux et tuberculé-épineux sur les côtés, à plis transversaux antérieurs et postérieurs complets, réduits aux côtés sur la partie médiane, disque un peu creusé, finement et densément orné d'une ponctuation granuleuse ; élytres peu longs, rétrécis postérieurement ; cuisses postérieures dépassant les élytres. Long. 15-17 mill. Indochine : Blao : Haute-Donnai. — Voisin de *cyaneum* Pic, mais thorax moins robuste, à partie médiane différente et élytres présentant une portion latérale dorée, ou teintée un peu de pourpre.

La v. n. **Dessumi**, ayant 23 mill., a les élytres assez élargis antérieurement, puis un peu étranglés vers leur milieu et leur coloration est plus terne, les cuisses postérieures sont encore plus longues.

Lycocerus apicalis n. sp. [Malac.]. Étroit et allongé, peu brillant, à pubescence claire et obscure, en partie redressée, noir, membres compris, avec près de la moitié apicale des élytres orangée. Tête, entre les yeux, ornée de deux macules pubescentes pourprées, parties en dessous des yeux claires ; antennes à articles médians élargis et impressionnés, derniers étroits ; thorax peu large, droit sur les côtés, sillonné au milieu ; élytres étroits et longs, ruguleusement ponctués avec quelques côtes s'éfaçant en arrière. Long. 11 mill. Blao. — Espèce très caractérisée dans le genre par sa particulière coloration.

Metriorrhynchus Dessumi n. sp. [Lycide]. Allongé, étroit, atténué aux extrémités, un peu brillant, avec les élytres opaques, noir, membres compris, avec les élytres orangés sur environ leur tiers postérieur. Antennes aplaties ; thorax avec 7 aréoles, assez étroit, rétréci en avant ; élytres un peu plus larges que le thorax, longs, atténués à l'extrémité, ayant chacun, en outre des bords, 4 côtes élevées, intervalles à 2 rangées de points séparées par une costule. Long. 16-17 mill. Blao. — Voisin de *nobilis* Wat., plus grand, élytres non brillants, de sculpture différente et moins accentuée.

Cladiscus apicalis n. sp. [Cleride]. Allongé et étroit, pubescent et hirsute, un peu brillant avec les élytres subopaques, noir, membres compris, avec le sommet des

(1) Cette espèce et les formes suivantes de Blao m'ont été communiquées et procurées par M. Descarpentrie. Je ne possède pas la var. *Dessumi* ; par contre, le *Lycocerus* (ex. unique) m'a été abandonné.

élytres brièvement orangé, antennes longuement pectinées au milieu ; thorax long, sinué, impressionné en dessus et sur les côtés ; élytres longs, parallèles, brièvement atténués au sommet, multicostés avec les côtes inégalement élevées et entre elles une rangée de points carrés, les côtes s'effaçant et la ponctuation devenant plus ronde et irrégulière au sommet. Long. 12-13 mill. Blao. — Espèce bien caractérisée dans le genre par sa particulière coloration, celle-ci étant analogue à celle des deux espèces précédentes.

Pallenothriocera n. g. [Cleride]. Articulis tribus ultimis antennarum valde dilatatis ; thorace lateraliter marginato, postice angustiore, sulcato et marginato ; elytris ad medium paulo strangulatis et depressis, ad basin tuberculato-fasciculatis, epipleuris postice nullis ; tarsis 4 articulatis. — Voisin de *Thriocera* Gorh., en diffère par les élytres étranglés-déprimés vers le milieu, gibbeux et pénicillés vers la base, les derniers articles des antennes très élargis. — Genre établi pour l'espèce suivante.

P. rufimembris n. sp. Allongé, opaque, à pubescence blanche avec des poils dressés clairs ou obscurs, avant-corps à ponctuation pupilleuse dense et élytres finement, irrégulièrement ponctués, noir avec la poitrine et les membres roux, sauf les tarsi foncés. Tête avec les yeux de la largeur du thorax en avant, ce dernier assez robuste et peu long, transversalement déprimé en avant, rétréci postérieurement, sillonné vers la base, cette partie ornée de petits plis transversaux avec le rebord postérieur élevé ; élytres à peu près de la largeur du milieu du thorax, assez longs, un peu étranglés et déprimés en dessus vers le milieu, ayant une fascie arquée, étroite, d'un blanc jaunâtre ; avant le milieu, et, avant le sommet, une sorte de bande transversale faite de poils blancs ; sur le disque de chaque étui, antérieurement, il existe une gibbosité longuement pénicillée, suivie d'une autre plus petite, celle-ci près de la fascie jaunâtre ; en dedans des épaules, une impression nette ; pattes un peu fortes avec les cuisses antérieures épaissies. Long. 7 mill. Afrique Centrale (coll. Pic). — De fascies mime *Pallenis bicolorifasciata* Pic.

Trichalus Barbieri n. sp. [Malac.]. Allongé, subparallèle, noir, thorax, pourtour de l'écusson et élytres orangés, ces derniers marqués de noir assez brièvement au sommet. Antennes très aplaties, les articles médians ayant leur sommet externe anguleux ; thorax plutôt court et large, sinué sur le pourtour, à longue fovéole discale et quelques faibles plis en dehors ; élytres pas très longs, parallèles, à côtes nettes avec les intervalles ayant deux rangés de points carrés. L. 9 m. Environs de Saïgon (Barbier) (1). Ressemble à *undulatithorax* Pic, thorax plus large, élytres moins longs.

Le **T. curteapicalis** mihi, de Java, de coloration analogue, a la tête orangée, le thorax moins large, peu sinué, l'extrême base des cuisses testacée, le thorax moins sinué, les élytres plus longs, plus brièvement marqués de noir au sommet. L. 9 m.

Calochromus impressithorax n. sp. [Malac.]. Etroit, noir, avec l'avant-corps et l'écusson nettement bleus métalliques, cuisses de coloration analogue, élytres orangés. Antennes aplaties, assez larges ; thorax non transversal, avec un long et large sillon

(1) Les nouveautés décrites sans indications spéciales sont dans ma collection.

médian et un long pli de chaque côté vers la base ; élytres étroits et longs avec des costules internes nettes, mais seulement antérieurement ; pattes longues, cuisses non épaisses. L. 9 m. Laos. — Voisin de *minutus* Pic, caractérisé par une longue et large impression sur le milieu du thorax.

C. laosensis n. sp. Etroit, noir, un peu bleuté avec les antennes franchement noires, le thorax et les élytres orangés. Antennes plates, assez larges ; thorax non transversal, ayant un long et large sillon médian, avec, de chaque côté, en arrière, un long pli oblique ; élytres à peine plus larges que le thorax, longs, ayant des costules longues ; cuisses un peu robustes. L. 8 m. Laos. — A placer près de *Coomani* Pic, qui a un étroit sillon au thorax.

Lygistropterus curvipes n. sp. [Malac.]. Etroit, très brillant, noir avec les côtés du thorax et les élytres d'un jaune paille, les pattes teintées de roussâtre, ayant les cuisses, surtout intermédiaires, fortes avec les tibias arqués. Thorax avec un long et étroit sillon médian et des plis latéraux, non transversal, plus large postérieurement ; élytres longs, non parallèles, costulés. L. 8 m. Laos. — Diffère de *aurantiacus* Pic par le thorax moins large, plus fortement plissé, la forme des pattes, la coloration claire plus pâle.

Pseudocolotes uniformis n. sp. [Malac.]. Oblong, un peu robuste, brillant, finement pubescent, noir-olivâtre avec partie des membres testacés. Tête large, impressionnée et inégale entre les yeux, ceux-ci très saillants ; thorax court et large, de la largeur des élytres, ces derniers assez courts, peu élargis et un peu bombés postérieurement, finement ponctués. L. 2 m. Afr. Australe. — Se distingue au premier abord par sa forme jointe à sa coloration uniforme.

Anthocomus punctaticeps n. sp. [Malac.]. Allongé, peu brillant, avant-corps assez fortement ponctué, la tête plus densément que le thorax, coloration générale noire avec les élytres ornés chacun, avant et après le milieu, d'une macule transversale flave, celles-ci rapprochées des bords, mais un peu éloignées de la suture. Antennes cassées, pattes foncées, les antérieures un peu roussâtres. Thorax un peu long, nettement tuberculé sur les côtés, à base faiblement plus claire ; élytres bien plus larges que le thorax, assez longs, subparallèles, peu et inégalement ponctués, un peu impressionnés en avant. L. 4 m. Etiqueté Le Cap dans la vieille collection Armitage, provenance peut-être fautive à cause de sa ressemblance avec plusieurs espèces de Madagascar. — A placer près de *bifasciatus* Pic.

Brachysilidius n. g. [Malacoderme]. Voisin de *Silidius* Gorb. avec le thorax court, transversal, un peu échancré près des angles postérieurs et caractérisé avant tout par l'absence d'ailes avec les élytres courts, longuement dépassés par l'abdomen. Genre établi pour l'espèce nouvelle suivante.

Brachysilidius curtipennis n. sp. Allongé, brillant, noir, thorax roux un peu rembruni par places, écusson rembruni, élytres jaunes, abdomen roux en dessous, noir en dessus, marqué de roux sur les côtés postérieurement, membres noirs. Long. 7 mill. Congo : Ituri (Bredo), in musée du Congo Belge et coll. Pic.

Astylus subtruncatus mihi [Malac.]. Allongé, brillant, en partie pubescent de gris,

noir, membres compris, élytres avec une bordure latérale jaune se joignant, avant le sommet, à une large bande longitudinale de même couleur et près de la suture, en surplus une autre bande discale jointe à la présuturale en avant, mais isolée postérieurement. ♀ à élytres tronqués et brièvement échancrés au sommet, ♂ à apex atténué-subarrondi. Long. 7-8 mill. Colombie (coll. Pic). — Voisin de *nigronotatus* Pic avec le sommet des élytres sans épines chez ♀.

Rhipidius Ghesquierei n. sp. [Hétéromère]. Un peu brillant, testacé, avec le dessus du thorax et le pourtour des élytres rembrunis ou noirâtrés, tête noire avec les antennes foncées, pattes pâles, abdomen foncé. Tête de forme allongée, étroite, droite sur les côtés et creusée aussi antérieurement à la place des yeux, tronquée postérieurement; antennes à rameaux flabellés longs et droits; thorax court, plus large postérieurement avec les angles postérieurs longs; écusson pâle, creusé au milieu, échancré et bidenté au sommet; élytres relativement longs et étroits, un peu élargis en avant, faiblement étranglés vers le milieu, pâles sur leur disque, plus ou moins obscurcis et relevés sur leur pourtour; ailes avec les nervures plus foncées. Long. 5 mill. environ. Congo: Rutshuru (Ghesquière). Un exemplaire au musée du Congo belge. — Espèce, par sa coloration, se rapprochant de *angusticollis* Pic, de Bornéo, avec l'avant-corps autrement conformé et l'écusson tout autre.

Cryptocephalus Bedeli v. n. **Mimeuri** [Phytophage]. Noir, avec l'avant-corps verdâtre, les élytres jaunâtres, ayant sur chacun les macules noires suivantes: 1 humérale, 2 postmédianes jointes formant fascie. Maroc: Mahedia (Mimieur, in coll. Institut Scient. Chérifien).

Cr. rufipes v. n. **timhaditus**. Oblong, dessous foncé; en dessus, avant-corps roux. élytres jaunes avec les côtés blancs, la base ayant une bande noire avec, en dessous des épaules, une faible partie teintée de brunâtre. Maroc: Timhadit (Alluaud, in coll. Institut Scient. Chérifien).

Titubæa 13 punctata v. n. **Kocheri** [Phytophage]. Peu allongé, noir, tête et thorax testacés avec des dessins noirs, le thorax étant trimaculé de noir sur la base. un point médian, une grosse tache externe de chaque côté; élytres testacés avec, sur chacun, 4 taches disposées obliquement 2 à 2. Long. 6 mill. Maroc: Ain-Kahla (Kocher, in Inst. Sc. Chérifien et coll. Pic). — Modification de la forme typique avec les macules au thorax différentes et moins nombreuses.

Diegobruchus rubroguttatus Fairm. [Bruchide]. Espèce variable, ayant les pattes parfois rouges (v. n. *rufipes*), parfois entièrement foncées avec les dessins pubescents tirant sur le grisâtre (v. n. *nigripes*). Long. 3 à 4 mill. Diego-Suarez. (coll. Pic et Muséum de Paris).

Rhagonycha Lindbergi v. n. **marocana** [Malac.]. Allongé, brillant, dessous en partie noir, dessus testacé avec la tête postérieurement et le milieu du thorax noirs, membres testacés, antennes rembrunies à l'extrémité. L. 7 mill. Maroc: Ras-el-Ma (Théry, in coll. Pic). — Coloration plus claire que chez la forme typique.

(A suivre.)

: Le Gérant : E. REVERET