



L'ÉCHANGE

Revue Linnéenne

FONDÉE PAR LE DOCTEUR JACQUET

Organe des Naturalistes de la Région Lyonnaise et du Centre

CONTENANT LES DEMANDES D'ÉCHANGE

D'ACHAT OU DE VENTE DE LIVRES ET DE TOUT AUTRE OBJET D'HISTOIRE NATURELLE

M. PIC (*.O.L.P., 04), Directeur

Membre correspondant du Muséum de Paris

COMITÉ DE RÉDACTION OU COMITÉ D'ÉTUDES

J. Clermont, à Dax (Landes)

A. Réquignon, 52, avenue de Breteuil, Paris (7^e). —
Coléoptères de France (Circulaires exceptées)

Maurice Pic, Dijon (Côte-d'Or). — Coléoptères
d'Europe, Malaises, Péninsule Malaise, Antilles,
Indes, Australie, Océanie, etc. du globe. — Caram-
bicides de la Chine, du Japon, etc. Cryptopha-
gides paléarctiques, Malacodermes du globe.

Adresser toutes Communications

Concernant la Rédaction, les Échanges, les Abonnements et les Annonces

A M. M. PIC, à Dijon

Compte-courant postal : N° 31-306, Dijon.



PRIX D'ABONNEMENT: UN AN, A PARTIR DU 1^{er} JANVIER

France : 80 francs. | Étranger : 140 francs.

MOULINS

LES IMPRIMERIES RÉUNIES

13, RUE D'ENGHEN, 15

ANNONCES

La page	64 fr.	Le 1/4 de page	20 fr.
La 1/2 page	36 fr.	Le 1/8 de page	12 fr.

Réduction de 25 % pour les insertions plusieurs fois répétées

TARIF SPECIAL POUR LES ANNONCES ANNUELLES

PRIX DES SEPARATA

Les auteurs désirant des « Separata » de leurs articles, voudront bien s'entendre directement avec l'imprimeur.

EN VENTE

Chez l'auteur, M. Maurice PIC, directeur de l'*Echange*, à Digoin (Saône-et-Loire) pour l'étranger, ou à Les Guerreaux par St-Agnan (Saône-et-Loire) adresse ordinaire.

1^o L'ouvrage « *Matériaux pour servir à l'étude de Longicornes* » étant épuisé, des fascicules seulement restent à vendre, dont le 1^{er} cahier (traitant spécialement les variétés françaises omises dans de récents ouvrages) et le 11^e cahier plus récent.

2^o *Mélanges Exotico-Entomologiques*, qui comprennent 71 fascicules.

3^o *Opuscula Martialis ou Martialia*, qui comprennent 13 fascicules (1940-1944).

S'entendre pour les prix avec l'auteur. Paiement à l'avance. Frais de port à la charge de l'acheteur.

**A demander
à l'auteur M. PIC**

LA NOUVELLE PUBLICATION

commencée en 1947

sous le titre de :

Diversités entomologiques

Pour les déterminations

Le Directeur de l'Echange s'offre pour déterminer des Coléoptères, ceux au moins rentrant dans ses groupes d'étude.

Tous les frais de poste et ceux nécessaires pour assurer le retour des insectes envoyés en étude sont à la charge de l'expéditeur.

Il ne sera répondu qu'aux lettres munies d'un timbre pour la réponse.



L'Échange, Revue Linnéenne

Coléoptères du globe (suite)

Quand je ne donne pas d'indications contraires, les nouveautés décrites font partie de ma collection. Les espèces de la Rép. Argentine proviennent surtout des chasses de W. Wittmer.

Ototretadrius atritarsis v. n. obscuripes [Malac.]. Roux-testacé avec la tête largement noire, les élytres foncés à base rousse, cette dernière coloration s'étendant un peu en arrière sur la suture ; antennes foncées, à base claire, pattes rousses avec les tarses plus ou moins rembrunis. Indes Mèr La forme typique, du Malabar, a la tête rousse.

Discodon Wittmeri n. sp. [Malac.]. Assez allongé, un peu élargi en dessous du milieu des élytres, peu brillant, élytres subopaques, roux-testacé avec les élytres, la partie médiane et postérieure du dessous du corps noirs, membres testacés avec le sommet inférieur des tibias plus ou moins noir, les tarses noirs. Antennes assez grêles ; thorax court et large, rétréci et subarqué antérieurement, un peu échancré sur les côtés postérieurement, frangé de poils vers la base ; élytres de la largeur du thorax, longs, un peu élargis après le milieu, puis rétrécis postérieurement, densément et assez finement granuleux. L. 10 m. Chaparé, en Bolivie. — Communiqué par W. Wittmer et aussi dans ma collection. — Peut se placer près de *annulipes* Pic, en diffère par la forme non parallèle des élytres, la coloration claire plus étendue sur les membres.

Chauliognathus Hahneli v. n. pallidicolor : Coloration générale claire, en partie obscurcie en dessous et rembrunie sur les élytres qui sont marqués d'une ligne discale basale courte et d'une bordure infra-humérale plus claires ; thorax avec une bande médiane longitudinale foncée, tête un peu rembrunie entre les yeux, antennes en partie et tarses obscurcis. L. 7 m. Brésil : Porto-Allegro (communiqué par Wittmer). — Le *Hahneli* typique, avec la suture en partie claire, est de coloration plus foncée sur la tête et les élytres, les yeux sont plus proéminents.

Apalochrus longior v. n. flavofasciatus [Malac.]. Elytres verts, en plus du sommet testacé-flave, ornés, vers le milieu, d'une fascie flave étroite et ondulée complète. Congo.

A. ugandanus n. sp. ♀. Assez robuste, peu allongé, foncé, vert métallique en-dessus avec le thorax au milieu et l'écusson dorés, les parties antérieures de la tête jaunes, les élytres ayant une macule externe triangulaire vers le milieu et une bordure apicale, dilatée sur la suture, rougeâtres ; antennes noires, premiers articles testacés ; pattes obscures avec le sommet des 4 cuisses antérieures et tibias diversement roux-testacés. L. 7 mill. Uganda. — Dessins des élytres analogues à ceux de *A. longior* Pic, mais forme moins allongée, pattes de coloration moins claire.

A. luteomaculatus n. sp. ♀. Assez robuste, peu long, diversement vert en dessus, parties antérieures de la tête, premier article des antennes et tibias jaunes, élytres ornés en dessous du milieu et près des bords, d'une petite macule jaunâtre. L. 7 mill. Fort-Sibut. — Voisin de *inæqualis* Pic, autrement maculé. Une ♀, de l'Uganda, ayant les pattes foncées, peut prendre le nom de *v. metallicipes*.

Falsopelonium [n. g. Cleride]. Voisin de *Pelonium* Spin., avec une forme svelte, les élytres inégaux, impressionnés, ayant des gibbosités sur la partie basale, un peu étranglés et déprimés vers le milieu et là, avec une fascie éburnée étroite et arquée, un peu bombés avant le sommet. Antennes de 11 articles, les intermédiaires non transversaux, les 3 derniers très grands. Thorax assez court, sinué, à rebord latéral faible, tuberculé latéralement en dessous du milieu. Pattes antérieures plus robustes que les autres, avec les tibias arqués. Antennes longues, à articles intermédiaires non transversaux et diversement courts; derniers articles des palpes cylindriques, un peu élargis au sommet. Genre établi pour l'espèce suivante.

Falsopelonium impressipenne n. sp. Noir, avant-corps opaque, à ponctuation pupilleuse dense; antennes noires, largement testacées sur la base; élytres brillants, à reflets métalliques en partie bleutés, à ponctuation diverse, ornés de poils redressés épars; pattes foncées. L. 7 m. Rép. Argentine.

Lebasiella basipennis n. sp. [Cleride]. Oblong-allongé, très brillant, orné de quelques poils obscurs dressés, noir, vert métallique en dessus, avec les élytres rouges, ayant une grande macule verte préscutellaire. Antennes foncées avec les premiers articles teintés de clair, grêles, à massue triarticulée. L. 5 m. Rép. Argentine. — Peut se placer près de *4-maculata* Pic, thorax plus large, élytres autrement colorés.

L. Duboulayi n. sp. Allongé, brillant, hirsute, olivâtre-métallique avec la tête en partie, côtés du thorax et les élytres jaunes, ceux-ci foncés sur la suture, le sommet excepté. Antennes claires à sommet obscurci; pattes claires. Thorax à ponctuation assez fine et élytres à forte ponctuation irrégulière. L. 3 m. Swan-River. — A placer près de *subanchoralis* Chevr., la coloration, tout au moins, est différente.

L. lineata n. sp. Allongé, brillant, hirsute, noir-olivâtre métallique avec la tête largement claire, le thorax bordé de clair, avec une trace de ligne médiane non foncée, les élytres ayant une bordure latérale et une bande discale longitudinale complète jaunes, membres testacés. L. 3 m. Chili. — A placer près de *limbipennis* Chevr., ayant les élytres d'une coloration claire très étendue et peut-être la forme plus oblongue.

Je rapporte à *L. subanchoralis* Chevr., au titre de variétés, les modifications suivantes, du Chili: *v. subinterrupta*, élytres jaunes avec la base, une bande suturale élargie à l'extrémité et éloignée du sommet, un point discal postérieur sur chacun d'un noir métallique; *v. ininterrupta*, les élytres jaunes ont seulement une large bande suturale s'amincissant et bifurquant postérieurement; *v. latemetallica*, élytres largement foncés à bordure latérale, sommet et bande discale ininterrompue jaunes; *v. apicalis*, élytres foncés avec le sommet jaune.

L. ruficollis n. sp. Allongé, mais assez large, noir avec en dessus l'avant-corps rou-

géâtre, les élytres jaunes à macule humérale, large bande suturale antérieure, se joignant à une fascie sinuée transversale anteapicale et s'atténuant au-dessous de cette bande, foncés ; membres clairs. La *v. n. sinuatelineata* a les élytres foncés, bordés de clair avec, sur chacun, une bande discale complète, subsinuée en dedans postérieurement. L. 4 m. Chili. — Se distingue, à première vue, des formes décrites ici, et des deux espèces chiliennes décrites par Chevrolat, par la coloration générale du thorax claire.

Chilenolagria atripes n. sp. [Hétér.]. Allongé, mais non étroit, presque mat, noir, partie antérieure de la tête et thorax roux, celui-ci orné d'une ligne postérieure de chaque côté et d'une macule médiane noires. Tête très densément ponctuée, avec les yeux saillants, un peu moins large que le thorax, celui-ci sinué en avant, élargi sur les côtés postérieurs, ayant 3 sillons longitudinaux, le médian plus long ; élytres un peu déprimés et creusés vers la suture, fortement rebordés, à ponctuation forte, rapprochée. L. 9 m. Rép. Argent. — Diffère de *limbata* Pic par le thorax particulier et autrement marqué de noir, les pattes entièrement foncées.

Blapida luteolineata n. sp. [Hétér.]. Allongé, étroit, convexe sur la base des élytres, ceux-ci dépourvus d'impressions, striés-ponctués avec les intervalles un peu convexes, roux, thorax un peu teinté d'olivâtre, élytres à lignes alternées vertes et jaunes. Antennes foncées, pattes roussâtres. Thorax un peu transversal, à ponctuation fine, écartée, plus étroit que les élytres. L. 25 m. Brésil. — Espèce très caractérisée par sa grande taille, les élytres sans impression, avec les intervalles des stries peu convexes.

Copobænus ruficeps n. sp. [Hétér.]. Etroit, allongé, brillant, éparsément pubescent de gris avec des poils obscurs dressés, noir, membres compris, avec l'avant-corps roux et les élytres d'un bleu verdâtre, assez fortement et densément ponctués, tandis que l'avant-corps est finement ou peu ponctué, le thorax étant dilaté-arrondi antérieurement. L. 11 m. Rép. Argent. — Distinct, à première vue, de *nobilis* Germ. par la tête d'un roux testacé.

Je ne crois pas publiées les deux espèces du même genre et du Chili nommées dans ma collection, qui diffèrent de ce dernier, en outre de la coloration entièrement ou presque, foncée, par le dessus du corps un peu déprimé.

maculicollis. Un peu allongé, brillant, noir de poix, parties buccales jaunes, thorax jaune, à macule discale postérieure noire, à ponctuation irrégulière en partie grosse, pattes non complètement foncées. L. 5 m.

ater. Allongé, brillant, entièrement noir, tête à ponctuation forte, peu écartée ; thorax peu élargi en avant, en partie lisse et irrégulièrement ponctué, au milieu avec 2 rangées de points assez gros ; élytres à ponctuation assez forte et rapprochée. L. 6 m.

Dasytomorphus hiimpessus n. sp. [Hétér.]. Allongé, brillant, finement pubescent, noir, parties buccales, base des antennes, thorax et pattes testacés, élytres étroitement bordés de clair postérieurement et au sommet, finement et densément ponctués ; thorax court, peu large, à deux fortes impressions discales. L. 4 m. Rép. Argent. — Plus allongé que *ruficollis* F. G., avec le thorax marqué de deux grosses impressions.

Le *D. angustatus* n. sp., de la même origine et de coloration analogue, a les antennes grêles, longuement testacées, le thorax plus étroit, impressionné transversalement sur la base, les élytres ne sont pas bordés de clair. L. 3 m.

Scryptia Wittmeri n. sp. [Hétér.]. Un peu allongé, brillant, courtement pubescent, noir, élytres marqués de jaune postérieurement et au sommet, avant-corps, base des antennes, écusson et pattes d'un roux testacé. Tête plus étroite que le thorax et celui-ci plus étroit que les élytres, orné de 3 impressions transversalement disposées. Chez la v. n. *sublimbata*, les élytres sont longuement bordés de clair et la suture est aussi longuement claire. L. 4 m. Rép. Argent. (Reçu de Wittmer). — A placer près de *Fairmairei* Pic.

Aspisoma rufescens n. sp. [Hétér.]. Large, brillant, subarqué sur les côtés et atténué postérieurement; roussâtre, antennes noires, à base rousse. Thorax court et large avec une trace de saillie prémédiane latérale, angles postérieurs peu marqués, ponctuation forte, écartée; élytres larges, à épaules peu marquées quoique arrondies, subarqués en avant, longuement atténués postérieurement, à ponctuation forte, rapprochée, avec une dépression antérieure latérale nette, de chaque côté. L. 6 m. Vénézuëla. — Voisin de *inhumeralis* Pic, mais épaules non effacées.

Pachymerus brevelineatus n. sp. [Bruchide]. Allongé, brillant, roux, membres compris, avec une macule allongée noire de chaque côté du thorax en dessus, les élytres ayant aux épaules une ligne noire raccourcie, en surplus avec des lignes longitudinales alternées de pubescence blanche, mais dépourvus de mouchetures foncées. L. 4 m. Madagascar : Diego-Suarez (Un ex communiqué par le Museum de Paris). — Voisin de *minutus* Pic, en diffère par la présence de dessins noirs au thorax et aux élytres, ces derniers organes ayant, en surplus, des bandes alternées de pubescence grise.

Scelodonta lineaticollis n. sp. [Phytoph.]. Robuste, dessous et pattes d'un noir un peu cuivreux, dessus cuivreux et pourpré avec des dessins verts-bleutés ainsi disposés : au thorax, quatre bandes longitudinales, les deux internes longues, les externes raccourcies; aux élytres, suture et, sur chacun, deux macules discales allongées et d'autres externes, une longue, une courte. Thorax à ponctuation pupilleuse dense; élytres à ponctuation assez forte, en partie disposée en rangées; côtés de la poitrine densément pubescents de blanc. L. 4,5 m. Sénégal (ex D^r Laurent). — Caractérisé par les macules vertes des élytres disposées sur deux rangées longitudinales, les bandes du thorax.

Pagria annulicornis n. sp. [Phytoph.]. Petit, testacé, antennes en partie annelées de foncé. Thorax subarqué sur les côtés, assez fortement et non densément ponctué; élytres courts et larges, un peu impressionnés à la base, à rangées de points divers, suture un peu rembrunie. L. 1,5 m. Indochine. — A placer près de *recticollis* Pic, thorax différent, plus fortement ponctué, élytres moins élargis.

M. PIC.

(A suivre.)

Le Cérant : E. REVERET.

Aux Lecteurs et Abonnés

Pour obéir à la vieille tradition, j'exprime avant tout mes vœux de nouvel an, sous une formule généralisée à tous les souhaits réalisables et offerts aux entomologistes faisant partie de mes relations: abonnés, correspondants, connaissances anciennes ou nouvelles. Après mes souhaits, je tiens à faire une déclaration. Mon ancienne complaisance obligeante, depuis deux ans, a été sérieusement douchée par certains faits que je vais en partie rapporter impersonnellement. Un jeune correspondant *obligé* qui n'envoie rien en compensation; il a bien promis, pour plus tard, des insectes désirés mais ceux-ci ne viennent pas malgré le temps qui passe. Un jeune spécialiste, embarrassé pour déterminer certains insectes qu'on lui a envoyés pour être nommés, me fait un envoi assez important comme nombre mais, en ayant pris soin de n'envoyer à peu près rien que des uniques. Il a conservé chez lui les doubles reçus de divers côtés et ceux-ci lui serviront plus tard pour critiquer les descriptions du vieux spécialiste ayant décrit quelques nouveautés (de l'envoi) sur des types uniques. Mes déterminations ont servi à augmenter la collection de mon correspondant mais pas la mienne.

Un entomologiste étranger, en paiement anticipé d'ouvrages, m'envoie des épingles (sans mon autorisation préalable) dont je n'ai que faire. N'ayant pas été remboursé de plusieurs envois d'imprimés faits à l'étranger, je me refuse maintenant à faire des envois avant un versement anticipé d'argent. Il me faut perdre beaucoup de temps pour répondre à certaines demandes (celle par exemple de tous mes *separata*, publiés sur l'une ou l'autre des familles de Coléoptères que j'ai spécialement travaillées) alors qu'il me serait plus productif d'employer le même temps à déterminer des envois qui augmenteraient mes collections.

Certains nouveaux spécialistes ont des prétentions exagérées en demandant aux anciens la communication de *tous leurs types*. Et qu'offre-t-on en compensation? Rien, ou pas grand'chose, des promesses qui sont incertaines. Au lieu de demander la communication de *types uniques*, pourquoi ne pas envoyer plutôt au descripteur des insectes que l'on possède en le priant de les comparer aux *types*. Pour ma part, je ne refuse jamais ce service (à condition d'être remboursé de mes frais de poste divers). Les frais d'expédition sont trop élevés aujourd'hui pour que je les prenne, comme autrefois, à ma charge. Et parfois, je ne réponds pas à certaine demande complexe pour ce motif. En résumé, il y a un peu d'égoïsme et pas mal de fatuité dans le comportement de certains jeunes spécialistes. Il semble que les vieux déterminateurs, ou descripteurs, ne sont bons que pour les documenter, ou les instruire bénévolement. A l'imitation de tout ce qui s'imprime maintenant, une majoration doit être établie pour 1950: en conséquence, le prix de l'abonnement à *l'Echange*, sera de 80 frs. pour la France, et de 140 frs. pour l'étranger, payables *au plus tard* après la réception du premier numéro de l'année. Les autres avis publiés dans le numéro 515, de 1949, restent valables.

M. PIC.

Notes de chasses (suite)

Lors d'une chasse aux insectes faite à Saint-Arnand (étang Rigaud), le 26 juin 1949, j'ai capturé deux Col. intéressants: *Cerapheles terminatus* Men. (nouveau pour notre département) et un ex. anormal de *Strangalia maculata* Poda ayant des antennes monstrueuses: droite munie, à l'extrémité du 6^e article, d'un appendice en forme de Z et pointu au sommet; gauche coudée en dehors à partir du 9^e article, celui-ci court avec les deux derniers assez longs.

Dans une seconde chasse (30 juin) dans la même station, je n'ai pas repris *Cerapheles*, mais j'ai capturé *Cantharis thoracicus* v. *Theresia* Pic, qui est assez rare, et plusieurs *Thelmatophilus typhae* Fall.

A Neuvy-Granchamp, en juin dernier, j'ai capturé un *Dilus fugax* Ol., espèce plutôt rare dans nos régions.

Le 22 mai, aux Guerreaux, j'ai capturé, sur une vitre de châssis, un *Acilius sulcatus* L. ♂, se débattant sur le verre et s'efforçant en vain de plonger. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que j'observe cette erreur d'instinct chez des *Hydrocuthures*, les reflets du verre au soleil leur donnant l'illusion d'un creux d'eau.