



---

# L'Échange, Revue Linnéenne

---

## Coléoptères du globe (suite)

Quand je ne donne pas d'indications spéciales, les insectes décrits font partie de ma collection seulement.

**Cryptocephalus Rossii** v. n. **Schæferi** [Phyt.]. Élytres noirs avec une bordure latérale et apicale plus ou moins large, en surplus, sur chaque étui, une tache basale et une autre discale prémédiane d'un jaune roussâtre. France. Crest (coll. Pic). Vernet-les-Bains (Schæfer).

**Cryptocephalus podager** v. n. **alberensis** ♀. Noir, taché de flave en dessous avec une pubescence argentée dense, roux et blanc jaunâtre en dessus, écusson blanc, élytres avec une petite macule humérale brunâtre pas très nette; antennes longues et grêles, bicolores. L. 6,5. St-Laurent-de-Cerdans (Pyr-Or.). Recueilli par L. Schæfer en un seul ex. figurant dans sa collection. Espèce nouvelle pour la faune française. La var. se distingue de la forme typique, de la péninsule ibérique, par l'écusson blanc au lieu d'être noir et les élytres ayant aux épaules une petite macule brunâtre peu nette, au lieu d'une plus grande tache noire très tranchée.

**Cryptocephalus bouriensis** n. sp. Subovale, convexe, roux, thorax bimaillé de noir sur le disque, élytres plus pâles, ayant sur chacun, sur la base et au milieu, une large macule noire, suture étroitement noire, écusson, dessous du corps et pygidium noirs, antennes noires au sommet. L. 3 mill. Ethiopie: Bourié (Muséum de Paris). — Voisin de *callias* Suf., en diffère par le thorax bimaillé de noir, les macules des élytres non bleutées.

**C. indicus** n. sp. Petit et allongé, peu pubescent et finement ponctué, brillant, noir avec la tête rousse antérieurement, les antennes (cassées) testacées au moins à leur base, pattes foncées. L. 2,5 mill. Indes: Madura. — Voisin de *madurensis* Pic et s'en distinguant par la tête bicolore et les élytres plus uniformément foncés.

**C. longicornis** n. sp. Assez petit, étroit et allongé, peu pubescent, finement ponctué, brillant, noir. Antennes robustes, longues et pileuses, noires, premiers articles clairs en dessous; pattes foncées avec l'extrême sommet des cuisses ou base des tibias testacée. Thorax un peu plus long que large, impressionné postérieurement et un peu relevé sur la base; élytres pas très longs, parallèles, tuméfiés et très brillants à l'apex, leur milieu un peu teinté de jaunâtre. L. 3,5 mill. Indes: Trichonopoli. — Voisin du précédent, et sans doute aussi de *pilicornis* Chp., qui a les pattes entièrement foncées.

**C. vitticollis** n. sp. Grand et allongé, en majeure partie noir, devant de la tête, base des antennes, thorax (moins une bande discale large), cuisses antérieures, base des tibias et tarses antérieurs, parties de l'abdomen en dessus testacés ou roussâtres. Antennes longues et robustes; thorax, pas plus long que large, nettement

impressionné et relevé sur la base, celle-ci étroitement roussâtre ; élytres longs, faiblement élargis au sommet, à ponctuation assez fine, diversement espacée. L. 5,5 m. Tonkin : Hoa-Binh. — Espèce caractérisée entre toutes par la présence d'une bande foncée au thorax.

**Carpūrus s. g. n. Brevecarpūrus.** Petit et étroit avec l'avant-corps robuste, les yeux grands, le thorax subtransversal, à base fortement relevée derrière un étroit sillon transversal. Etabli pour l'espèce suivante.

**Brevecarpūrus latetestaceus** n. sp. Petit, étroit et allongé, peu pubescent, brillant, roux-testacé, élytres un peu rembrunis vers les épaules. Tête avec les yeux un peu plus grosse que le thorax, celui-ci roux au milieu, testacé sur les bords antérieur et postérieur, un peu plus large que long ; élytres à peine plus larges que le thorax, peu longs, un peu élargis postérieurement, à ponctuation assez forte, irrégulièrement répartie. L. environ 2 mill. Basilan.

**Carpūroides samarensis** n. sp. [Malac.]. Petit, allongé, avant-corps un peu robuste, peu pubescent, finement ponctué, brillant, noir, à reflets métalliques en dessus, antennes à la base, tibias et tarse en partie testacés. Antennes robustes, subfiliformes ; thorax assez court et large, rétréci en avant et en arrière, sans impression nette, rebordé postérieurement ; élytres peu longs, parallèles, peu nettement ponctués. L. 2,5 mill. Samar. — Sans doute voisin de *preangerensis* Witt., qui ne m'est pas connu en nature.

**C. albosignatus** n. sp. Allongé, subparallèle, peu pubescent, brillant, noir, 2 premiers articles des antennes en partie et bordure de l'abdomen sur une partie des segments et sur les côtés flaves. Antennes pectinées, assez robustes. Thorax à peu près aussi large que long, à peine ponctué, sans impression ; élytres assez courts, à ponctuation fine, irrégulière, écartée, d'un noir de poix, ayant chacun, touchant les côtés sans atteindre les extrémités, une longue macule blanche de forme triangulaire allongée avec la pointe dirigée en avant. L. 4,5 mill. Mindanao. — Voisin de *nitidulus* Chp. (ex descr.) avec le dessin blanc des élytres différent de forme et position.

**Clorophorus impressithorax** n. sp. [Cerambyc.]. Allongé, subcylindrique, à revêtement grisâtre, noir avec le sommet des élytres roussâtre, les élytres ayant en surplus de petites places dénudées asymétriques. Tête faiblement sillonnée entre les yeux, antennes peu écartées, grêles et assez courtes, roussâtres au sommet ; thorax particulier, allongé, un peu rétréci aux extrémités, impressionné sur le disque et muni de carènes, densément et grossièrement ponctué-granulé ; écusson pubescent de gris ; élytres un peu plus larges que le thorax, pas très longs, parallèles, tronqués au sommet avec l'angle externe saillant en petite pointe ; cuisses postérieures plus courtes que les élytres. L. 11 mill. Kaschmir. A placer près de *insignifer* Pic, plus large et très caractérisé par sa structure thoracique.

**Cl. varius v. n. Mounieri.** Grand, à revêtement du dessus d'un jaune un peu fauve avec des dessins noirs réduits, sans macules thoraciques et élytres sans macule antéapicale, ayant des macules basales diverses et sur leur milieu une fascie noire touchant la suture, mais éloignée des bords. Annam.

*Cl. notabilis* v. n. *Jeanvoinei*. Les élytres sont dépourvus de macules postérieures noires. Tonkin.

*Eurymetopum diversesignatum* n. sp. [Cleride]. Allongé, un peu robuste, brillant avec la tête en majeure partie foncée postérieurement, le devant étant jaune, élytres avec des dessins latéraux clairs. Thorax un peu long, faiblement élargi au milieu, inégal en dessus, densément ponctué; élytres roussâtres ayant quelques taches rembrunies sur les côtés avec une demi-lunule antérieure externe flave bordant une macule allongée verdâtre, une autre macule postmédiane flave un peu oblique, entre les dessins flaves, une impression faible densément ponctuée, ces organes en partie fortement et irrégulièrement ponctués, membres testacés-rougeâtres. L. 7 mill. Chili. — A placer près de *bilineatum* Pic, plus robuste, avant-corps plus large, élytres autrement colorés.

*E. nudatum* v. n. *undulatum*. Avant-corps roussâtre, élytres largement flaves avec, sur chacun, les dessins noirs de poix suivants: macule postscutellaire courte, bande infrahumérale, deux lignes discales également courtes et très petite macule antéapicale; pattes presque entièrement claires. Chili.

*E. nudatum* v. n. *mediointerruptum*. Avant-corps roux, élytres roux, rembrunis par places sur le disque avec des dessins blancs nets sur les côtés, composés de petites macules et d'une courte ligne vers les épaules, d'une bordure postérieure bifurquant en avant, prolongée en dedans par une courte fascie oblique, apex bordé de blanc; pattes largement claires. Chili.

*E. chilense* n. sp. Allongé, un peu brillant, foncé en dessous, roussâtre sur l'avant-corps avec des macules d'un noir verdâtre au thorax, celui-ci un peu long, élargi vers le milieu, inégal en dessus, densément ponctué. Elytres verts ornés d'une bande externe étroite blanche, celle-ci couvrant la base et se prolongeant sinuée après le milieu, se rapprochant du bord en se recourbant vers l'extrémité, épaules rousses, ces organes sont un peu teintés de jaunâtre sur le disque postérieurement bordés de roux antérieurement, marqués de foncé après le milieu et au sommet; membres roussâtres. L. 5,5 mill. Chili. — A placer près de *prasinum* Chevr.

*E. seminigrum* v. n. *reductum*. Elytres largement jaunâtres avec, sur chacun, une macule rembrunie derrière l'écusson, une vague tache brunâtre avant le milieu et en dessous une grande macule brune, éloignée de la suture. Chili.

*Microtillus* n. g. [Cleride]. Faciès de *Tillus* Ol., mais de très petite taille avec les antennes assez grêles à la base, mais à articles 5 et suivants courts et larges, formant comme une sorte de longue massue, dernier article court. Thorax assez long, fortement étranglé et étroit sur la base. Genre établi pour l'espèce suivante.

*Microtillus luteofasciatus* n. sp. Allongé, étroit, brillant, noir avec le dessus un peu violacé, les élytres ayant une large bande transversale jaune, finement ponctué sur l'avant-corps, élytres plus larges que le thorax, longs, à rangées de points assez forts, qui s'effacent vers l'extrémité, celle-ci ayant une ponctuation irrégulière. L. 3 mill. Madagascar.

*Phlœocopus Seyrigi* n. sp. ♀ [Cleride]. Allongé, étroit, brillant, noir de poix,

thorax roux par places, élytres jaunes à dessins noirs ainsi composés sur chacun : macule préhumérale, bordure suturale et latérale antérieures, fascie antémédiane décomposée en taches, fascie postmédiane large et complète, un peu sinuée en avant, se prolongeant en arrière sur les côtés et surtout sur la suture, antennes testacées à dernier article plus long que les deux précédents réunis, pattes jaunes, sommet des cuisses et base des tibias de poix. Thorax long et étroit, impressionné au milieu, à côtés granulés ; élytres longs et étroits, antérieurement à rangées de points, postérieurement à fine sculpture et ponctuation diverse avec une côte discale nette, n'atteignant pas le sommet. L. 9 mill. Madagascar. — A placer près de *multiplicatus* Pic, élytres moins longs, à côtes discales, dessins foncés plus étendus.

**Ph. multiplicatus v. n. separatus.** Forme un peu moins allongée que chez le type spécifique, élytres antérieurement avec des macules brunâtres réduites et peu distinctes, une fascie postmédiane de même couleur décomposée et irrégulière. Long. 9 mill. Madagascar.

**Opilo brunneotinctus v. n. diversenotatus** [Cleride]. La base des élytres est nettement rougeâtre, tandis que les dessins jaunes, très élargis et nets, se réunissent sur la suture. Madagascar (Muséum de Paris).

**Macrosiagon subattenuatum** n. sp. [Hétér.]. Allongé, étroit, avec les élytres peu déhiscent, terminés en pointe émoussée, peu brillant, testacé avec la poitrine, le pygidium et partie des pattes noires. Antennes cassées. Thorax à lobe triangulaire surélevé au milieu de la base avec une forte impression de chaque côté ; élytres relativement étroits et assez courts, à apex non très pointu. L. 7 mill. Indes. — A placer près de *Leseleuci* Pic, élytres moins longs et thorax sans macule noire.

**M. discoidale** n. sp. Allongé, étroit, peu brillant, noir, chaque élytre orné d'une bande discale longitudinale jaune, ne touchant pas la base et éloignée du sommet. Thorax très long, à lobe triangulaire, densément ponctué ; élytres assez longs, brièvement déhiscent et terminés en pointe émoussée. L. 8 mill. Sumatra. — Voisin du précédent, dessins des élytres particuliers.

**M. undulatum** n. sp. Oblong, peu brillant, densément ponctué en dessus, en partie nettement pubescent de gris soyeux, roux et orangé, deux lignes noires sur la partie postérieure du thorax et sur chaque élytre, avec une bande longitudinale noire à contours sinués, apex roux, antennes (cassées) testacées et noires ; pattes noires, partie des cuisses testacée ; pygidium noir. L. 16 mill. Guyane Fr. — A placer près de *nigronotatum* Pic, mais avec un dessin noir particulier et rentrant dans la division I de Gerstæcker.

**M. atriceps** n. sp. ♀. Allongé, étroit, brillant, noir, avec le thorax roux et la base des antennes testacée ; lobe du thorax aplani et triangulaire, thorax long, à ponctuation assez forte et écartée. Elytres longs, acuminés et un peu déhiscent au sommet, à longue impression discale un peu oblique. L. 5-7 m. Indes : Khurda. — Peut se placer près de *variicolle* Frm. et s'en distinguant au moins par l'abdomen foncé.

M. Pic.

Le Cérant : E. REVERET

(A suivre.)