



# L'Échange, Revue Linnéenne

## Coléoptères du globe (suite) <sup>(1)</sup>

**Discodon lagesense** n. sp. [Malac.]. Allongé, un peu brillant, testacé, tête, antennes en partie, abdomen largement et élytres noirs. Antennes grêles, noires, à premiers articles testacés, les autres brièvement annelés de clair à la base ; thorax court et large, subsinué sur les côtés ; élytres à peu près de la largeur du thorax, assez longs, un peu rugueux. L. 9 m. Brésil : Lages. — Caractérisé par la coloration des antennes et l'abdomen largement noir ; à placer près de *flaviventre* Bl.

**D. amazonum** n. sp. Allongé, un peu élargi postérieurement, brillant, testacé membres compris, tête et élytres noirs, ces derniers avec la suture un peu teintée de roussâtre antérieurement, antennes longues et grêles ; thorax pas très large, subarqué en avant, subsinué sur les côtés postérieurs, élytres un peu plus larges que le thorax, longs, à rugosités fines et écartées. L. 7 m. Amazones. — Peut se placer près de *castaneipenne* Pic.

**D. semipallidum** n. sp. Un peu allongé subparallèle, brillant, assez nettement pubescent de blanc et hirsute, roux-testacé, plus pâle sur les élytres, tête, antennes, sommet des cuisses, tibias et tarses foncés. Thorax peu large, nettement échancré vers son milieu, plus étroit que les élytres qui sont presque lisses sur la base, puis granuleux. L. 9 m. Brésil : Lages. — A placer près de *Reitteri* Pic, qui a les pattes plus foncées.

**D. bifoveicolle** n. sp. Étroit, subparallèle, peu brillant, testacé, tête foncée entre les yeux, élytres noirs, en partie étroitement bordés de roux, le sommet plus nettement, antennes noires à base testacée, pattes testacées. Antennes grêles ; thorax large et court, subsinué sur les côtés, impressionné-déprimé sur son milieu postérieur, marqué, de chaque côté du milieu, d'une foveole à fond noir ; élytres un peu plus larges que le thorax, longs, finement rugueux. L. 10 m. Amér. M<sup>e</sup> : Sabanila (D' Ohaus). — Espèce très caractérisée par le thorax, ayant des foveoles à fond noir, les élytres très longs et non complètement noirs.

**D. griseopubens** n. sp. Étroit et allongé, noir-fuligineux, en partie grisâtre sur la base des élytres, ceux-ci nettement pubescents de gris, thorax jaune, un peu teinté de rouge sur les côtés, largement noir au milieu, en surplus, avec une macule noire de chaque côté sur la partie claire. Antennes grêles. L. 9 m. Tucuman. — Espèce caractérisée par son aspect gris et la coloration du thorax.

**D. reducticolle** n. sp. Allongé, brillant, noir, tête flave en dessous des yeux, dessous non absolument complètement noir, thorax jaune et rouge avec, sur son milieu postérieur, un trait transversal noir et en avant une macule triangulaire noire. An-

(1) Toutes les nouveautés figurent au moins dans ma collection.

tennes grêles ; thorax assez court et large, faiblement entaillé sur les côtés. L. 10 m. Brésil. — Voisin de *nigrocephalum* Pic, mais dessins noirs du thorax particuliers.

**Mimopolemius preapicalis** n. sp. [Malac.]. Mat, allongé, un peu rétréci à l'apex, noir, élytres marqués d'une grande macule orangée vers le sommet. Antennes aplaties, noires, les 2 avant-derniers articles orangés. L. 10 m. Provenance ? — Espèce très particulière de forme et coloration.

**Falsoptilinus** n. g. [Anobiide]. Subcylindrique, convexe, élytres dépourvus de stries. Tête robuste avec les yeux très grands et saillants, inclinée. Antennes particulières, paraissant avoir 10 articles, à premier article gros, 2<sup>e</sup> assez long et peu épais, 3<sup>e</sup> peu long, suivants diversement courts, avec 3 articles terminaux longuement flabellés, le dernier plus épais, paraissant fait de deux rameaux joints. — Faciès de *Lasioderma* allongé avec les antennes se rapprochant de celles des *Ptilinus*. Genre établi pour l'espèce nouvelle suivante.

**F. modestus** n. sp. Oblong-allongé, garni d'une pubescence soyeuse d'un gris jaunâtre, finement et densément ponctué, peu brillant, roussâtre, antennes testacées. Tête large, avec les yeux de la largeur du thorax, celui-ci court et transversal, subarqué et relevé sur son bord antérieur, presque droit et finement rebordé sur les côtés, sinué postérieurement ; écusson petit ; élytres peu plus larges que le thorax, peu longs, rétrécis à l'extrémité, subtronqués-arrondis à l'apex. L. 3 m. Congo.

**Chilenogenius** n. g. [Ptinide]. établi pour *Trigonogenius aeneus* Pic, du Chili, ayant les principaux caractères suivants : Thorax sans trace de sillon, étroit, un peu élargi anguleusement vers le milieu, hérissé de longs poils ; élytres bien plus larges que le thorax, assez courts, sans squamules, mais avec de longs poils divers ; pattes grêles. — Voisin du genre *Trigonogenius* Sol., avec un revêtement différent et un thorax particulier.

Dans le genre *Niptus* Boield. (ayant pour type l'espèce *hololeucus* Fald.), dont le revêtement est densément pubescent, je sépare, sous le nom sous-générique de **Niptomimus**, l'espèce nouvelle suivante, peu pubescente.

**Niptus (Niptomimus) subelongatus** n. sp. Oblong-allongé, brillant, peu pubescent, orné de quelques soies, jaune-roux, un peu brunâtre sur les élytres. Thorax relativement long, un peu étranglé près de la base ; élytres assez longs, très rétrécis en avant, élargis ensuite en arc, atténués vers le sommet, à rangées de points faibles, intervalles larges ; se distingue, à première vue, de *Hilleri* Reitt. par la forme plus allongée du thorax et des élytres. CHINE

**Ptinus Van Hillei** n. sp. Oblong, noir à reflets métalliques en dessus, en partie orné de petites squamules blanches condensées en ligne sur le milieu du thorax, en partie transversalement et non régulièrement disposées sur les élytres vers la base et vers le milieu, puis postérieurement plutôt près de la suture. Antennes longues et grêles ; thorax assez court et large, étranglé à la base, faiblement sillonné au milieu, sans oreillettes pileuses ; élytres courts et larges, rétrécis à l'extrémité, à rangées de points fins, sans stries appréciables. L. 2,5 m. Afrique Australe. Reçu de Van Hille. — Aspect de *cupreus* Pic, mais d'une forme, plus robuste, thorax moins étroit, revêtement différent.

*Ptinus testaceus* v. n. *densepubens* ♀. De coloration roussâtre avec les élytres un peu rembrunis, le devant de la tête foncé, les élytres étant densément revêtus de poils gris couchés avec d'autres épars redressés. France: La Ciotat (Condrillier, in coll. Pic). — Mime *fimicolla* Desbr.

J'ai reçu de Monros, sous le nom de *Plectonycha correntina* Lac. [Phytophage]; et originaire de la R. Argentine, un ex. devant être rapporté à *testaceipes* Pic sous le nom de v. *Monrosi*, n'ayant qu'une macule foncée sur la base des élytres (au lieu de deux) avec les cuisses rouges, les tibias et tarse noirs. Les antennes sont testacées avec les 4 derniers articles noirs.

*Trochoideus Dalmani* v. n. *junctus* (Endomychide). Les macules antérieures jaunes sont jointes sur chaque élytre. Madagascar.

*T. cruciatus* v. n. *semiobliteratus*. Elytres jaunâtres, ayant deux fascies transversales de poix, 1<sup>re</sup> au milieu, 2<sup>e</sup> avant le sommet, celles-ci jointes sur les côtés et la suture, à ponctuation fine, rapprochée, stries présuturales très nettes; thorax nettement sillonné sur son milieu. Madagascar.

*Clorophorus Micheli* n. sp. [Longicorne]. Etroit, noir, membres compris, à revêtement en dessus d'un gris jaunâtre; thorax dépourvu de dessins noirs; élytres ayant chacun cinq macules noires diverses ainsi disposées: 2, 1, 1, 1, celle placée vers le milieu étant subtransversale. L. 10 m.: Chine et Tonkin. — Espèce voisine de *monpinensis* Frm., mais dépourvue de fascie noire.

Quelques *Xylotrechus* Ch., du Br. Boouang (coll. Lepesme et Pic) que je rapporte comme sous-espèce à *atronotatus* Pic sous le nom de *Dureli*, n'ont pas une longue bande discale noire au thorax, mais simplement une macule postérieure; en surplus, la macule postérieure noire des élytres n'est pas longuement prolongée sur les côtés, ainsi plus éloignée du sommet et les élytres sont plus ou moins marqués de clair sur la base, au moins dans le voisinage de l'écusson. Parfois, la pubescence grise s'étend sur le milieu des élytres en réduisant les parties noires: v. n. *bootangensis*.

*Epiciines Wittneri* n. sp. [Cleride]. Oblong-allongé, assez brillant, pubescent de blanc et hirsute, noir à reflets métalliques en dessus avec les élytres ornés chacun des dessins jaunes-roussâtres suivants: une bordure externe, une grande macule humérale triangulaire, 2 petites macules prémédianes discales connées et une macule transversale apicale. Antennes assez courtes, élargies au sommet, foncées, mais en partie claires sur les premiers articles. Tête assez courte et thorax large, la première densément, le second fortement ponctué, aussi marqué d'une impression de chaque côté de la base; élytres assez larges, finement et peu densément ponctués, fortement rebordés; pattes noires, genoux roux. L. 6 m. Buenos-Aires (reçu de Wittmer). — Espèce très caractérisée par son dessin élytral particulier.

*E. trimaculatus* n. sp. Noir, à reflets métalliques, avec les élytres ornés chacun: d'une fascie sinuée prébasale, ne touchant pas la suture, d'une macule postmédiane discale et d'une apicale arquée de couleur rougeâtre. Antennes rousses, en partie rembrunies; pattes rougeâtres avec les tarse rembrunis. L. 5 m. B. Aires. — Voisin du précédent, de forme plus courte, les élytres moins rebordés et d'un dessin différent.

**Tenerus diversithorax** n. sp. [Cleride]. Allongé, subparallèle, brillant, noir, dessus avec la tête jaune à partie antérieure et ligne médiane noires, thorax orangé, à bande latérale noire et parties discales un peu rembrunies, assez court et un peu large avec un tubercule arrondi sur le milieu de la base, écusson et élytres orangés, ces derniers obscurcis à l'extrémité, plus longuement sur les côtés, finement et densément ponctués, ayant chacun 3 côtes nettes. Antennes noires et aplaties, à article 2 subtriangulaire, moins long que le 4<sup>e</sup>, les suivants larges, plus ou moins dentés au sommet; pattes noires, avec la base des cuisses largement flave. L. 7 m. Bornéo. — Par la coloration des pattes, voisin de *proximus* Sch., en diffère par le thorax ayant un seul tubercule et noir latéralement.

**T. borneensis** n. sp. Etroit, allongé, parallèle, brillant, finement et, sauf la tête, densément ponctué, noir, tête avec une macule frontale allongée jaune et thorax maculé de jaune-roux sur son milieu antérieur; élytres noirs avec la partie médiane basale assez courtement orangée, ayant une seule costule discale réduite sur chaque étui; membres noirs. L. 5 m. Bornéo. — A placer près de *sumatranus* Pic, moins étroit avec une autre coloration de l'avant-corps.

**Pelonium jucundum** v. n. **Pujoli** (Cleride). Les élytres, en surplus du dessin jaune basal, sont marqués de jaune en dessous du milieu. Brésil.

**Pelonium Corporaali** n. sp. Allongé, étroit, brillant, à longs poils clairs plus ou moins hirsutes, rouge avec l'avant-corps noir, les élytres rouges et maculés de jaune antérieurement sur les épaules et le disque, jaunes postérieurement avec, sur cette partie jaune, une large fascie noire antéapicale, arqués en arrière, membres clairs. L. 8-9 m. Brésil; Goyaz. — Peut se placer près de *Gounellei* Pic; dessins des élytres particuliers, qui le distinguent au premier abord.

**Eburneoclerus** n. g. [Cleride]. Derniers articles des palpes securiforme ou subcylindrique; antennes grêles, à 3 derniers articles un peu élargis; yeux presque entiers; thorax peu long, dilaté-subarrondi vers le milieu, resserré et sillonné près de la base; élytres ornés de macules ou fascies surélevées claires; tarses de 5 articles avec le 1<sup>er</sup> non visible en dessus. Genre voisin de *Clerus* F., surtout caractérisé par la présence de parties éburnées sur les élytres, établi pour l'espèce ci-dessous, ainsi que celle qui suit.

**E. ater** n. sp. Un peu allongé, brillant avec quelques poils hirsutes, noir, parties buccales et antennes testacées, pattes rousses et noires. Thorax sillonné au milieu; élytres plus larges que le thorax, peu longs, sans rangées de points forts, ornés près de la base et avant le milieu de deux fascies étroites éburnées jaunâtres, l'antérieure plus courte, la postérieure un peu oblique, les 2 éloignées de la suture. L. 3 m. Afr. Australe.

**E. nigroapicalis** n. sp. Oblong, brillant, rouge, avec l'abdomen et le sommet des élytres largement noirs, membres roux; élytres ayant 2 fascies éburnées avec la 2<sup>e</sup> placée en dessous du milieu. L. 4 m. Afr. Australe.

M. PIC.

(A suivre.)

Le Gérant : E. REVERET