



L'Échange, Revue Linnéenne

Coléoptères du globe (suite) ⁽¹⁾



Demonax Perroti n. sp. [Cerambycidae]. Allongé, atténué postérieurement, opaque, noir, densément revêtu d'une pubescence d'un gris jaunâtre, blanche par places en dessous avec le thorax ayant 2 vagues macules noires vers le milieu et les élytres avec 2 bandes d'un noir un peu fauve, la première antérieure oblique, ayant sur son milieu une étroite bande un peu blanchâtre également oblique, la 2^e transversale assez large et droite, placée en dessous du milieu. Antennes longues, roussâtres, scape plus foncé, à articles 3 et 4 épineux ; pattes grêles et roussâtres. Tête à courte ligne médiane lisse ; thorax assez long et étroit, rétréci en avant et un peu étranglé près de la base, à ponctuation rapprochée. Elytres peu longs, assez larges aux épaules, rétrécis après, atténués, tronqués au sommet. Long. 12 mill. Tonkin : Tam-Dao (Général Perrot, in collection Perrot) (1). — Voisin de *Marnei* Pic, quant à son revêtement, mais dessins des élytres foncés sur fond clair (et non clair sur fond foncé), antennes plus longues et membres clairs.

Perissus luteofasciatus n. sp. Un peu allongé, subparallèle, opaque, densément revêtu en majeure partie de pubescence jaune, noir avec la base des élytres d'un roux jaunâtre, membres roussâtres. Tête assez large entre les yeux, à faible ligne lisse médiane. Antennes courtes, dépassant un peu la base des élytres. Thorax subglobuleux, un peu plus long que large, faiblement rétréci en avant, moins en arrière, à ponctuation rapprochée. Elytres subparallèles, assez courts, tronqués au sommet, noirs à base un peu rousse-jaunâtre et densément revêtue de pubescence jaune en surplus avec 2 fascies à fond clair et pubescence jaune, la 1^{re} antémédiane arquée, remontant vers l'écusson, la 2^e postmédiane presque droite, plus large sur la suture, qui est largement pubescente. En résumé, les élytres sont en majeure partie garnis d'une pubescence jaune, moins fournie à l'extrémité, en laissant en noir, sur chaque étui : deux grandes macules discales externes, 1^{re} avant, 2^e après, le milieu et une fascie postérieure externe plus étroite du côté de la suture. Dessous du corps noir, en partie densément pubescent de jaune. Long. 11 mill. Tonkin. — Par sa forme, ressemble à *ruficornis* Pic, mais plus grand, plus parallèle, dessins des élytres différents et membres clairs.

Thermistes croceocincta v. n. *rufobasalis*. Entièrement noir, avec, sur la base des élytres, une fascie sinuée d'un roussâtre clair revêtue de pubescence blanchâtre, le devant de la tête, le dessous et les côtés du thorax, la majeure partie du dessous du

(1) L'espèce nouvelle qui suit (Longicornes) est de la même provenance, récoltée par le général Perrot et faisant partie de sa collection.

corps revêtus de pubescence jaunâtre. Elytres munis d'une forte épine à l'apex. Long. 28 mill. Tonkin : Chapa (coll. Perrot). — Exemplaire défloré et frotté surtout sur les élytres et que, pour ce motif, je n'ose pas présenter comme espèce.

Plicatodihammus (s. g. de *Dihammus* Ths. ou genre proche), établi pour l'espèce suivante. Antennes plus longues que le corps, annelées, scape à faible cicatrice, 3^e article plus long que le 4^e ; front non trapeziforme. Thorax particulier, court, tuberculé sur les côtés, tubercule un peu relevé, muni postérieurement sur son milieu d'un pli en forme de V, avec une impression accusée, de chaque côté, en dessous. Elytres sub-parallèles. Tibias intermédiaires munis d'un sillon ; crochets des tarsi divariqués.

Plicatodihammus daosus n. sp. Allongé, peu robuste, noir, en partie revêtu de pubescence grise ou un peu jaunâtre avec de nombreuses mouchetures blanches sur les élytres, dont la ponctuation est irrégulière, celles-ci irrégulièrement disposées et jointes par places, surtout vers l'extrémité. Antennes rousses, à articles en partie pubescents de gris sur la base et rembrunis à leur extrémité, pattes foncées. Tête robuste, de la largeur du thorax. Antennes longues, dépassant le corps de 5 articles. Thorax court et large, opaque, densément ponctué, ayant de chaque côté un petit tubercule un peu relevé et sur la base au milieu une sorte de pli en V précédé d'une courte ligne pubescente jaunâtre avec une impression nette en dessous et un simple sillon basal, de chaque côté. Ecusson assez grand, densément pubescent de jaune. Elytres longs, parallèles, seulement un peu atténués à l'extrémité avec l'apex sub-arrondi, à ponctuation écartée peu forte, plus fine vers l'extrémité et multimouchetés de dessins clairs sur fond un peu brillant. Pattes foncées, densément pubescentes. Long. 12 mill. Tonkin (coll. Pic).

Pseudocolotes minutissimus n. sp. [Malac.]. Oblong, peu brillant, à pubescence grise un peu soulevée, noir olivâtre, membres foncés, base des antennes et tibia en partie testacés. Tête peu ponctuée, avec les yeux un peu plus large que le thorax, celui-ci court et large, subarqué sur les côtés, peu plus étroit que la base des élytres. Elytres assez longs, un peu élargis postérieurement, atténués à l'extrémité, finement mais nettement ponctués. Long. 1,5 m. Congo (coll. Pic). — Espèce caractérisée par sa très petite taille jointe à sa coloration uniforme olivâtre.

Falsoanthocomus submarginatus n. sp. [Malac.]. Allongé, brillant, presque glabre, roux, élytres d'un roux testacé ayant chacun, vers la base, une macule interne rembrunie et une autre postérieure discale longue, membres testacés, en partie rembrunis. Thorax peu long, un peu rétréci postérieurement ; élytres plus larges que le thorax, longs, un peu creusés vers la base, à ponctuation diverse espacée. Long. 3 m. Madagascar (coll. Pic). — Voisin de *unifasciatus* Pic, de coloration générale moins foncée avec les élytres en grande partie clairs.

Aphronycha natalensis n. sp. [Malac.]. Court et large, brillant, testacé, partie postérieure de la tête, grande macule discale au thorax, écusson et milieu du dessous du corps d'un vert olivâtre, antennes noires à 1^{er} article testacé. Long. 6 mill. Natal (coll. Pic, ainsi que les suivants). — Sans doute voisin de *pallidipennis* Wit., mais de coloration générale claire plus étendue.

Cænioxylobanus bicoloricollis n. sp. ♂ [Lycide]. Allongé, subparallèle, opaque, noir, bord antérieur et côtés du thorax, plus étroitement en arrière, d'un rouge orangé. Antennes flabellés, à rameaux larges; thorax un peu sinué latéralement, prolongé en arc en avant, à angles postérieurs saillants, couvrant les épaules; élytres à plis intercostaux assez écartés. Long. 9 mill. Madagascar: Firano. — Distinct, à première vue, des espèces décrites du genre par son thorax bicolore.

C. subdilatus n. sp. ♂. Allongé, modérément élargi en arrière, mat, noir avec le thorax antérieurement et sur les côtés largement bordé de couleur orangée. Antennes aplaties, larges, à rameaux larges, peu longuement flabellés. Thorax subtransversal, unicaréné au milieu, obconique sur son milieu antérieur, presque droit sur les côtés avec les angles postérieurs peu larges et faiblement saillants, élytres assez longs, un peu élargis en arrière, à aréoles intercostales larges, se dédoublant en partie et irrégulièrement vers l'extrémité. Long 8 mill. Madagascar: Androna. — Ressemble à *Gondoti* Brg., sculpture élytrale différente.

Cautires tricarinatus n. sp. [Lycide]. Allongé, plutôt mat, noir, thorax assez large à bordure orangée et trois carènes antérieures claires, un peu sinué, obconique sur son milieu antérieur, à angles postérieurs peu avancés, 7 aréolé; élytres un peu plus larges que le thorax. Long. 12 mill. Madagascar. — Très caractérisé par son thorax ayant des carènes antérieures claires.

C. Wittmeri n. sp. Allongé, opaque, noir, thorax largement orangé en avant, étroitement sur les côtés postérieurs, 5 aréolé, obconique ou tronqué sur le milieu antérieur, étranglé latéralement, à angles postérieurs saillants. Antennes à articles un peu flabellés ♂, ou aplaties et dentées au sommet ♀. Long. 9 à 10 m. Androna. — Peut se placer près de *minutus* Pic, dont la taille est bien plus petite et le thorax différent.

C. 7-areolatus n. sp. Allongé, étroit, noir avec une très étroite et peu définie bordure claire sur les côtés antérieurs du thorax, celui-ci un peu brillant, obconique sur son milieu antérieur, peu étranglé latéralement avec les angles postérieurs un peu avancés; élytres un peu fuligineux, mats. Long. 5,5 mill. Madagascar. — Peut se placer près de *dolens* Brg.

Opilo Chaffanjon n. sp. [Cleride]. Allongé, étroit, brillant, ayant des poils blancs hirsutes, brun et jaune, tête largement rousse, thorax foncé, brièvement marqué de roux par places, ou largement roux au milieu, élytres jaunes à dessins brun de poix ainsi composés sur chacun: une bande transversale antémédiane remontant largement vers l'écusson sur la suture et ne touchant pas le bord latéral, une fascie post-médiane se prolongeant en arrière vers la suture et celle-ci foncée entre les 2 bandes; des parties claires variables se montrent sur les bandes dans le voisinage de la suture. Antennes testacées; pattes brunâtres ou rousses avec la base des cuisses largement jaune. Thorax assez long, un peu impressionné sur le disque avec une impression transversale antérieure; élytres peu plus larges que le thorax, assez longs, parallèles, courtement atténués au sommet, finement strié-ponctués. Long. 9 mill. Kouy-Tcheou: Chaffanjon. — Voisin de *luteonotatus* Pic, mais plus étroit avant-corps moins foncé, bord externe antérieur des élytres non foncé.

Pujoliclerus n. g. [Cleride]. Antennes (le dernier article manque) relativement épaisses, de 8 articles, le 5^e difforme, le 6^e long et aplati, le 7^e moins long et moins large avec, sur sa base, un petit prolongement pectiniforme, ayant l'apparence d'un article supplémentaire. Palpes à dernier article sécuriforme ou subcylindrique. — Diffère du genre *Pyticeroopsis* Schl. par la structure des antennes sans article flabellé. Genre créé pour l'espèce suivante.

P. modestus n. sp. Allongé, subparallèle, peu brillant, jaune avec des parties rembrunies sur le vertex et le disque du thorax. Avant-corps à ponctuation assez fine et espacée, thorax plus long que large, tuberculé latéralement. Elytres plus larges que le thorax, assez longs, parallèles, peu rétrécis au sommet, aplatis en dessus, ayant un rebord latéral très marqué, des rangées de points assez forts et de différentes dimensions, postérieurement avec une ponctuation forte, irrégulièrement disposée et rapprochée. Long. 6 mill. Brésil.

Galeruclerus Mathani n. sp. [Cleride]. Allongé, subparallèle, peu brillant, orangé, tête marquée de noir sur le vertex, thorax orangé, à large bande discale noire et une autre latérale raccourcie; élytres orangés ayant chacun une macule brunâtre vers le sommet. Antennes de 10 articles avec le 1^{er} article roux en dessous; pattes testacées avec les tarsi foncés. Long. 6 mill. Amazones. — Très voisin d'aspect et de ponctuation de *guyanensis* Pic avec une coloration autre, des dessins différents.

G. preapicalis n. sp., du Brésil. Très voisin d'aspect de *guyanensis* Pic, un peu plus large, la tête en majeure partie foncée, plus fortement, ou densément, ponctuée, les élytres ornés, au lieu d'une macule apicale, d'une fascie antéapicale noire, éloignée des bords. Long. 6 mill.

G. subarcuatus mihi, du Brésil, est voisin du précédent, mais plus allongé, de coloration jaune pâle, la tête marquée de foncé, le thorax ayant deux larges bandes foncées sinuées, les élytres ornés chacun des dessins noirs métalliques suivants: macule scutellaire, irrégulière, en dessous du milieu plusieurs petites macules discales disposées obliquement et, avant le sommet, une fascie présuturale raccourcie et arquée postérieurement. Long. 5 mill.

Eburneoclerus Simoni n. sp. [Cleride]. Oblong allongé, brillant, noir, membres compris, avec chaque étui orné des signes éburnés suivants: 2 macules transversales infrahumérales rapprochées, l'antérieure plus longue et étroite, la postérieure interne oblique, une fascie postmédiane étroite, peu oblique, éloignée de la suture. L. 5 m. Cape Town (Simon).

Macrosiagon Theresæ n. sp. ♂ [Hétérom.]. Assez allongé, brillant, rouge, avec le dessous du corps, sauf l'abdomen, largement foncé, pattes rouges avec les tarsi en partie noirs, antennes flabellées, noires à base testacée, élytres jaunes, rouges au sommet, avec les dessins noirs suivants sur chacun: bordure basale prolongée sur la suture, ligne antérieure externe, macule discale antéapicale. L. 5,5 m. Congo français. — A placer près de *bipunctatum* F., s'en distingue à première vue par le sommet des élytres rouge.

M. Pic.

(A suivre.)

Le Gérant : E. REVERÉT