



L'Échange, Revue Linnéenne

Coléoptères du globe (suite) ⁽¹⁾

Attagenus arcuatefasciatus nouv. (Clavicorne). Oblong, brillant, finement et densément ponctué, noir, revêtu d'une pubescence blanchâtre plus dense par places, dessinant, vers la base des élytres, une fascie sinuée remontant sur les épaules et la suture, membres testacés avec la massue des antennes parfois plus foncée. L. 2,5-3 m. Saïgon. — Voisin de *grisescens* Pic et en différant, au moins comme variété, par les élytres non à pubescence uniforme, mais ornés d'une fascie antérieure nette.

Telopes hirtulus v. n. confusus. Noir, élytres ornés de nombreuses macules ou fascies grises non nettement limitées ou séparées. — Espagne : Cadix.

Telopes robustior n. sp. (Clavicorne). Plus ou moins robuste, oblong, noir avec les membres roussâtres, revêtu d'une pubescence grise longue couvrant la presque totalité du thorax, avec, sur les élytres : une large bande basale ayant quelques parties dénudées, celle-ci sinuée postérieurement, une étroite fascie sinuée anteapicale faite de pubescence pileuse claire ; en surplus, vers l'apex, soit une série de poils clairs, soit une bordure pileuse ou subfascie préapicale. L. 4 m. Sénégal. — Voisin de *rhodesianus* Pic, plus robuste, avec les dessins pubescents des élytres reposant tous sur un fond foncé.

Je possède, du Sénégal, un exemplaire ayant 3 mill. et présentant aux élytres, avec une bordure pubescente apicale, deux fascies postérieures étroites sinuées (en surplus des dessins complexes de la base) et que je juge être une var. du précédent (plutôt qu'une espèce propre), à laquelle je donne le nom de **postfasciatus**. En résumé, *postfasciatus* se distingue, à première vue, de *robustior* par la présence d'une bande postérieure supplémentaire.

Thaumaglossa pygidialis Pic (Clavicorne). Cette espèce varie un peu quant à son revêtement. Thorax à pubescence jaune sur son milieu et blanche sur les côtés, taille plus grande, de 4 m. et de Sumatra (**v. n. sumatrana**), ou pubescence de l'avant-corps jaunâtre, pygidium peu pubescent et taille moindre, de 3 m. Chine : Tali (**v. n. sinensis**).

Scaphidiolum subpunctatum n. sp. (Claviforme). Oblong-allongé, brillant, roux, antennes foncées à l'extrémité, ponctuation fine et écartée sur le thorax, plus ou moins fine et irrégulièrement disposée sur les élytres, qui n'ont pas de rangées de gros points sur le disque, mais la strie suturale bien marquée. L. 5 m. Diégo-Suarez. — Plus allongé que *unicolor* Cast. et caractérisé par sa ponctuation élytrale sans rangées de points discaux.

(1) En principe, les types des nouveautés se trouvent dans ma collection ; quand il en est autrement, je le signale.

S. rubricolle n. sp. Oblong-allongé, brillant, noir, avec le thorax rouge, la tête d'un roux obscur, les élytres ornés d'une large fascie jaune prébasale, antennes testacées à la base, pattes roussâtres. Thorax long, rétréci en avant, à ponctuation très fine et espacée, avec une rangée transversale arquée de points médiocres sur la base. Elytres assez courts, un peu atténués à l'extrémité, à strie présuturale ponctuée, remontant sur la base, dans l'ensemble peu et finement ponctués avec seulement quelques points plus gros sur le milieu du disque. L. 6 m. Baie d'Antongil. — Voisin de *interruptum* Frm., qui a le thorax foncé.

Toxidium nigrum n. sp. (Clavicorne). Allongé, atténué aux deux extrémités, modérément comprimé, convexe brillant, noir, antennes et tarses testacés, finement non densément ponctué. Tête allongée, roussâtre en avant. Thorax peu long, bombé, infléchi et rétréci en avant. Elytres longs, longuement atténués, tronqués au sommet, foncés; pygidium peu long. L. 3 m. Madagascar. — Voisin de *Sikorai* Pic avec les pattes plus foncées, la strie présuturale presque nulle, etc..

Malthodes Barbieri n. sp. [Malac.]. Petit, peu brillant, sauf la tête, noir de poix, fuligineux avec la tête en dessus et les pattes jaunes. Antennes ♂ noires, plus longues et plus robustes, ♀ plus courtes et jaunes à la base. Tête grande ♂, plus petite ♀, avec les yeux peu plus large que le thorax, celui-ci court et large, impressionné au milieu, sans angles marqués. Elytres courts, concolores, un peu déhiscent, longuement dépassés par les ailes qui sont enfumées. L. 2-2,5 m. Saïgon (ex Barbier). — A placer près de *excavatithorax* Pic, de Sumatra.

Laius nitidior n. sp. ♀ [Malac.]. Oblong, brillant, finement et non densément ponctué, noir avec 3 macules flaves diverses sur chaque élytre, ainsi disposés, l'une au-dessus de l'autre: petite infrahumérale, grande et subarrondie avant le milieu, 2^e assez grande près du sommet, ces deux dernières plus rapprochées du bord que de la suture, membres en partie foncés, en partie testacés. Antennes obscurcies à base testacée, 1^{er} article long et peu épais, 2^e court, 3^e un peu épaissi et assez long, suivants plus étroits et diversement allongés. Thorax assez court, rétréci et déprimé sur la base, plus étroit que les élytres. Elytres peu longs, élargis postérieurement, courtement rétrécis au sommet, peu déprimés en dessous de la base. Pattes antérieures largement claires, les autres en majeure partie foncées. L. 2,5 m. Saïgon (Barbier, in coll. Barbier). — Espèce très caractérisée par ses dessins élytraux conjointement avec le dessus du corps très brillant.

Sphingopalpus atricollis n. sp. ♀ [Malac.]. Allongé, plus large et bombé postérieurement, peu brillant; noir un peu olivâtre avec seulement une tache externe, peu allongé et peu large, blanche avant le milieu des élytres, membres presque totalement foncés. L. 3 m. Dahomey. — Espèce se distinguant au premier abord par le thorax non marqué de clair sur sa base conjointement avec les membres foncés. — Peut se placer près de *convexipennis* Pic.

S. discomaculatus n. sp. Oblong-allongé, brillant, noir-olivâtre, ayant, sur chaque élytre, une grande macule discale blanche caractérisant l'espèce. Devant de la tête et base des antennes de coloration blanche, thorax marqué de clair postérieurement, pattes presque entièrement foncées. L. 2,5 m. Congo.

Pterolophia saigonensis n. sp. [Longicorne]. Oblong-allongé, noir, en majeure partie pubescent de jaune fauve, avec, sur les élytres, des mouchetures ou d'étroites fascies blanches, membres annelés de blanc. Thorax peu long et assez large, bien plus étroit que les élytres, ayant sur son milieu des bandes longitudinales jaunes nettes ou un peu confuses. Antennes moins longues que le corps. Elytres non tronqués au sommet, progressivement atténués en arrière, assez longs, ayant de gros points et de courtes stries en dessus, sans gibbosité basale, avec des dessins blancs divers non réguliers plus ou moins maculiformes antérieurement et surtout sur les côtés avec, avant le sommet, deux étroites fascies blanches en zig-zag entre lesquelles la pubescence du fond est plus condensée qu'avant et après ces fascies, présentant ainsi une large bande sinuée doublement colorée. L. 7 m. Saïgon (ex Barbier). — A placer près de *baiensis* Pic, avec un dessin élytral différent, surtout caractérisé par la présence de 2 fascies postérieures étroites blanches.

Ropica Barbieri n. sp. [Longicorne]. Petit, un peu allongé, peu brillant, noir teinté de roux par places, membres diversement roux et rembrunis. Antennes robustes, à peu près de la longueur du corps. Thorax assez court et large, fortement ponctué, à pubescence uniforme, plus étroit que les élytres. Elytres assez courts, atténués et un peu déclives à l'extrémité, déprimés et ayant une impression en arc à la base, avec les parties préscutellaires un peu élevées et rembrunies, une sorte de fascie un peu jaunâtre oblique antérieure, les côtés largement foncés avec un prolongement interne en forme de bande sur leur milieu, le sommet en partie clair et parsemé de macules foncées irrégulières. L. 4 m. Saïgon (ex Barbier). — Ressemble à *exocentroides* Pasc. (déterminé par Breuning), moins robuste, élytres moins larges, à parties foncées plus étendues.

Ropica saigonensis n. sp. Allongé, subparallèle, opaque, noir, roux par places, membres roux et rembrunis. Antennes de la longueur du corps. Thorax court et large, largement pubescent de jaune (comme le vertex). Elytres longs, atténués à l'extrémité, en partie foncés, largement roux et pubescents intérieurement vers la suture, en partie aussi et moins régulièrement sur les côtés. L. 7 m. Saïgon (ex Barbier). — Peut se placer près de *rufonotata* Pic, plus allongé, avec un dessin pubescent différent.

Ropica Clermonti n. sp. Oblong-allongé, brunâtre, avec une pubescence générale grise fine, thorax ayant deux bandes discales pubescentes et élytres en ayant plusieurs non régulières ni très accentuées, membres roux, cuisses postérieures en partie rembrunies. Thorax assez court et large, orné de nombreux points assez petits, irrégulièrement disposés. Elytres plus larges que le thorax, peu longs, atténués postérieurement, courtement subtronqués à l'apex, avec une ponctuation assez forte, en partie disposée en rangées et des traces de costules. L. 7 m. Tonkin : Hoa-Binh. — Voisin de *curtelineata* Pic, plus trapu avec 2 lignes pubescentes au thorax et celles des élytres différentes.

Sybra varielineata n. sp. [Longicorne]. Allongé, en partie brillant, en partie revêtu d'une pubescence grisâtre, noir, ayant des lignes pubescentes sur fond clair au thorax et aux élytres, membres roux en partie rembrunis. Tête plus étroite que le

thorax : antennes grêles, à peu près de la longueur du corps. Thorax à peu près aussi large que long, droit sur les côtés, orné de 5 bandes pubescentes avec des points assez forts et dispersés. Elytres un peu plus larges que le thorax, longs, atténués à l'extrémité, subangulés triangulairement à l'apex, ornés chacun, en surplus de la suture et des bords, de quatre bandes claires, les internes complètes, les externes effacées au milieu, avec une ponctuation médiocre plus ou moins disposée en rangées. L. 8 m. Hoa-Binh. — Ressemble à *multilineata* Pic, le thorax est moins large, les bandes sont moins complètes et moins étroites sur les élytres.

Zonabris bissexmaculatus Borch. (1940), préoccupé par *Z. bisseptemmaculata* Pic v. *bissexmaculata* Pic (1924) devra prendre le nom de *Borchmanni*.

Zonabris bisseptemmaculata Pic v. n. *diversicornis*. Antennes jaunes avec leur base noire. Oubangui.

Decatoma Maindroni Pic v. n. *subfasciata*. Elytres ayant une fascie jaune complète, non interrompue. Congo.

Decatoma affinis v. n. *diversicornis*. Antennes noires, rousses à l'extrémité. Togo.

Notoxus sinuatefasciatus n. sp. [Hétér.]. Assez allongé, brillant, roux-testacé, élytres noir de poix ayant sur chacun 2 fascies jaunes, la première près de la base, sinuée, remontant vers les épaules et la suture, la 2^e antéapicale étroite et un peu oblique. Thorax assez large, mais plus étroit que les élytres, à corne longue, assez étroite, faiblement inclinée en avant. Elytres assez longs, un peu atténués à l'extrémité, subtronqués à l'apex, impressionnés antérieurement, à ponctuation peu forte, écartée. L. 3 m. Congo. — Voisin de *Raffrayi* Pic, dessins des élytres différents et corne plus étroite.

Notoxus francevilleus Pic, espèce variable. Chez la v. *nouv. lateniger*, de la Côte-d'Ivoire, les élytres sont largement noirs, seulement d'un testacé-roussâtre extérieurement et à l'extrémité. Elytres avec une macule discale foncée prémédiane très développée (v. *nov. Ferrierei*), de la Haute-Sanga, soit avec des dessins noirs sur la base et au milieu joints sur la suture (v. n. *brevejunctus*), du Congo.

Formicomus obscuripes n. sp. [Hétéromère]. Oblong allongé, brillant, noir, avec les élytres verdâtres, base des antennes rousse. Thorax sillonné longitudinalement. L. 2,5 m. Congo. — Paraît se distinguer de *sulcifer* Pic et voisins par les pattes de coloration générale foncée.

F. longespinus n. sp. ♂. Etroit, allongé, noir de poix, un peu roussâtre sur l'avant-corps et les pattes, élytres verts, allongés. Tête allongée, un peu rétrécie en arrière, à ponctuation forte ; antennes noires à base rousse. Thorax en partie mat sur son milieu, bien plus étroit que les élytres qui sont longs avec les épaules droites. Cuisses antérieures avec une dent mince, longue, tronquée au sommet, tibias simples, subsinués. L. 3 m. Congo : Ruanda. — Sans doute voisin de *indigaceus* Laf., ce dernier étant plus foncé avec une longue épine aux cuisses.

(A suivre.)

M. Pic.

Le Cérant : E. REVERET