
L'Échange, Revue Linnéenne

Coléoptères du globe (suite) (1)

À signaler la capture, par M. Pourtoy, le 1^{er} mai 1947, à Fleury-sur-Loire (Nièvre), de *Anthicus tobias* Mars., espèce venant d'être décrite à tort sous le nom de *parisiensis* Saint-Albin (Bul. Soc. Ent. Fr., 1952, p. 21).

Opilo germanus v. n. Pourtoyi [Cleride]. De coloration générale jaune avec l'avant-corps en parti rembruni, les élytres dépourvus de la bande antéapicale brune qui existe chez la *forme typique*, simplement étroitement bordés de brunâtre à la suture ; pattes jaunes marquées de brun vers le sommet des cuisses et la base des tibias. St-Chaffray, dans les Hautes-Alpes, recueilli par mon collègue de voisinage, M. Pourtoy, et faisant partie de sa collection. — Mime *O. pallidus* Ol., de coloration un peu plus foncée sur l'avant-corps et moins pâle aux élytres, surtout caractérisé par la forte sculpture des élytres, tandis que ces organes sont, chez *pallidus* Ol., absolument strié-punctués.

Thriocera bigibbosa n. sp. [Cleride]. Oblong, brillant, dessous en partie noir, avant-corps roux, élytres noirs avec la base largement rouge et ornés d'une fascie prémédiane étroite et arquée blanche, placée en dessous d'une dépression nette ; antennes largement rousses, pattes foncées. Thorax robuste, à ponctuation pustuleuse rapprochée. Elytres courts et larges, à ponctuation plutôt forte et irrégulièrement disposée, ayant sur chacun une gibbosité basale développée avec des impressions vers les épaules et une dépression transversale avant le milieu. L. 4,5 m. Fort-Natal. — Doit se rapprocher de *bituberculata* Boh., mais ce dernier est décrit comme ayant les élytres en partie opaques et une ponctuation en rangs serrés sur leur base, ce qui n'est pas le cas chez *bigibbosa*, très brillant partout avec une ponctuation irrégulière et diverse.

Paraiwongius ivoirensis n. sp. [Eumolpide]. Oblong-subovalaire, vert avec le dessus plus ou moins bleu ou violacé, antennes foncées à base testacée. Thorax assez court et peu large, rétréci en avant, plus étroit que les élytres, à ponctuation peu forte, espacée, soit bleu, soit à reflets pourprés cuivreux. Elytres courts et larges, nettement strié-punctués, les stries latérales n'étant pas régulières et courtes, bleus ou violacés. Parfois la couleur du dessus du corps est olivâtre avec les élytres ayant des reflets pourprés cuivreux (v. n. *inunicolor*). L. 3,5-4 m. Côte-d'Ivoire. Peut se placer près de (*Syagrus olim*) *testaceipes* Pic, qui a les pattes claires.

P. minimus mihi, des Ashanti, est plus petit, avec le dessous noir et vert, les pattes sont vertes, le dessus bleu avec l'avant-corps un peu verdâtre, les élytres sont un peu déprimés antérieurement et les épaules un peu proéminentes. L. 3 m.

(1) Sauf indication spéciale, les types des formes décrites se trouvent dans ma collection.

P. viridipes mihi, vert avec le dessus teinté de bleu, est plus grand, plus allongé, la ponctuation du thorax est assez forte et écartée, les élytres sont finement strié-punctués et les stries assez régulières latéralement. L. 4,5 m. Cameroun.

P. viridissimus n. sp. Oblong, subovalaire, très brillant, vert, antennes foncées à base testacée. Thorax court et peu large, plus étroit que les élytres, rétréci en avant, à ponctuation fine et écartée. Elytres courts et larges, fortement strié-punctués avec les stries latérales diversement raccourcies ; pattes vertes avec les tibias en partie teintés de roux. L. 3,5 m. Côte-d'Ivoire. — Voisin de *ivoirensis* mihi, non bleuté, ni cuivreux en dessus.

P. curtus n. sp. Subovalaire, brillant, noir verdâtre, élytres roux, un peu irisés. Antennes et pattes testacées, sommet des cuisses et base des tibias foncés. Thorax court, rétréci en avant, un peu plus étroit que les élytres, à ponctuation fine, espacée. Elytres courts et larges, à rangées de points fins et quelques traces de stries latéralement, sans stries marquées. Cuisses dentées. L. 3,5 m. Gabon. — Très caractérisé par sa forme trapue jointe à sa coloration.

P. Theresæ n. sp. Subovalaire, brillant, vert olivâtre, un peu bronzé en dessus, abdomen et membres testacés. Thorax court et large, subarqué et rebordé nettement sur les côtés, à ponctuation assez fine, écartée. Elytres courts et larges, à rangées de points fins avec quelques stries plus ou moins marquées, côtés à stries raccourcies. L. 3 m. Libreville. — Plus foncé et moins trapu que le précédent.

Dæmon Theresæ n. sp. [Helodide]. Allongé, atténué postérieurement, brillant, noir, poitrine, élytres, antennes et pattes testacés, genoux foncés. Thorax à ponctuation fine et dense. Elytres à rebord basal noir, à ponctuation assez fine et rapprochée. L. 8 m. Madagascar. — Voisin de *geniculata* Pic, moins pâle avec les élytres un peu enfumés postérieurement, cuisses peu marquées de foncé.

D. diversitarsis n. sp. Allongé, assez large, atténué postérieurement, brillant, roux, tête, tarsi antérieurs et intermédiaires noirs, disque des élytres brièvement rembruni vers le milieu. Thorax à ponctuation fine et dense. Elytres à rebord basal noir avec des traces de costules, à ponctuation fine et rapprochée. L. 10 m. Madagascar. — A placer près de *atopoides* Frm.

D. atriceps n. sp. Oblong-allongé, atténué postérieurement, roux avec la tête noire. Thorax à ponctuation fine, rapprochée. Elytres un peu atténués, faiblement striés, à ponctuation fine, rapprochée. L. 8 m. Madagascar. — Peut se placer près de *longulus* Frm.

D. dermestoides n. sp. Oblong, un peu rétréci en avant et en arrière, brillant, roux. Thorax à ponctuation fine et rapprochée, bifovéolé sur le disque en arrière. Elytres courtement atténués au sommet avec quelques faibles stries raccourcies, à ponctuation fine et dense. L. 6 m. Diégo-Suarez. — Plus court et plus large que le précédent, très caractérisé par son faciès qui mime un Dermestide.

Cyphon atriceps n. sp. [Helodide]. Allongé, brillant, finement punctué, testacé, tête noire, antennes noires à base testacée. L. 3 m. Mont d'Ambre. — Diffère de *ovatus* Frm. par la tête noire et la forme plus allongée.

C. Sikorai n. sp. Subovale, brillant, noir, avant-corps roussâtre, élytres jaunes ornés d'une bande transversale noire de poix prébasale qui se joint à une bande longitudinale, humérale et discale également noire de poix, en surplus une macule externe près des épaules, également unie à la bande discale, suture rembrunie, membres testacés. L. 2 m. Annanarive. — A placer près de *notatus* Pic.

C. Fouqueti n. sp. Subovale, brillant, peu pubescent, noir avec les élytres marqués de jaune sur la suture vers le sommet, membres roux. Avant-corps robuste, à ponctuation fine, élytres nettement rebordés, à épaules marquées, à ponctuation plus forte et plus écartée que sur l'avant-corps. L. 3 m. Saïgon (ex Fouquet). — Je possède, de Saïgon et Barbier, un ex. pouvant être rapporté à cette espèce comme var. sous le nom de *vagefasciatum*, de coloration générale rousse avec les membres testacés, les élytres ayant une vague fascie noire transversale près du sommet et ces organes marqués de jaune à l'apex

Scirtes luzonicus mihi. Petit, oblong, pubescent de gris, entièrement testacé avec les yeux noirs, finement ponctué. L. 2,5 m. Luzon. — Plus petit et moins allongé que *victoris* Pic.

S. unifasciatus v. n. **bisbinotatus**. Noir avec les élytres ornés chacun de deux macules antérieures flaves obliquement disposées. Mindanao.

S. semiexplanatus mihi. Grand, oblong-allongé, pubescent de gris, brillant, finement et non densément ponctué, testacé, élytres un peu explanés et impressionnés en dessous des épaules. L. 4,5 m. Luzon. — Voisin de *Seimondi* mihi, de Pérak., qui est testacé avec l'avant-corps noir.

S. semicinctus mihi. Oblong-allongé, brillant, finement ponctué, testacé, élytres, moins la base, bordés de noir sur les côtés, avant-corps diversement obscurci. L. 3 m. Mindanao. — Plus petit que le précédent, avec les élytres non concolores.

S. sandakanus mihi. Oblong-allongé, pubescent de gris, brillant, finement ponctué, testacé, élytres largement bruns postérieurement, antennes noires à base testacée, pattes claires, cuisses postérieures en partie rembrunies. L. 3 m. Bornéo. — Coloration des élytres particulière. La v. *differens* mihi n'a pas les élytres marqués de foncé.

S. bicoloricornis mihi. Oblong-suballongé, pubescent de gris, brillant, finement ponctué, testacé, antennes noires à base testacée, élytres à strie présuturale et traces de costules. L. 3 m. Ile Samar. La strie présuturale caractérise l'espèce.

S. pilipes mihi. Oblong-subovale, peu pubescent, brillant, à élytres assez fortement ponctué, roux avec les élytres rembrunis à base rousse, ainsi que le sommet, membres clairs, cuisses postérieures marquées de brun. L. 3 m. Bornéo. — Coloration particulière.

Macrosiagon Benschi v. n. **Seyrigi** ♂. Un peu robuste, tête, antennes, thorax en partie, poitrine et pattes noirs; thorax en partie roux sur le pourtour avec le dessus largement noir, abdomen et élytres jaunes, ceux-ci enillés derrière l'écusson. Madagascar: Bekily (ex Seyrig). — Diffère de *Benschi* All. (ex descr.) par le thorax et le dessous du corps bicolorés.

M. bifasciatum v. n. semiobliteratum. Avant-corps rouge, élytres jaunes à dessins noirs oblitérés sur la base, ayant une macule médiane foncée réduite, isolée de la suture et du bord avec le sommet noir. Thibet.

Bruchidius rufopygus n. sp. Oblong-allongé, rétréci aux deux extrémités, peu pubescent et un peu brillant, noir, base des antennes, pattes et pygidium roux. Thorax obconique, fortement et densément ponctué; pygidium grand. L. 5 m. Afr. Or. — Peut se placer près de *longipennis* Pic.

B. longipennis Pic varie. Dessous du corps et pygidium noirs (*v. n. nigropygus*); avant-corps et dessous à pubescence d'un gris jaunâtre plutôt dense, élytres franchement noirs, mats (*v. n. luteopygus*). Afr. Au^{l'}.

Le **B. maracosensis** mihi, d'Abyssinie, noir avec les membres roux, les cuisses postérieures à base noire, possède un revêtement gris et le pygidium est dépourvu de macule foncée. L. 4,5 m. — A placer près de *Babaulti* Pic.

B. diversimembris n. sp. Petit, oblong, revêtu d'une pubescence grise fine, uniforme, noir avec la base des antennes, les 4 pattes antérieures testacées, mais avec la base des cuisses intermédiaires foncée. Antennes longues, un peu épaisses. Thorax long, cône, densément ponctué. Elytres assez courts; pygidium petit, vertical. L. 2 m. Natal. — A placer dans le voisinage de *obscurus* Fahr. dont les membres sont noirs.

Le **B. subconvexus** mihi, du Natal, voisin du précédent, a les antennes noires à base rousse, une coloration générale noire avec une pubescence uniforme grise; les pattes sont toutes noires.

B. lafescapularis n. sp. Petit, subovale, mat, roux clair avec une ligne sur le front, une bande médiane raccourcie au thorax, les élytres sur la suture et au sommet, le dessous, moins l'abdomen, noirs; membres testacés avec l'extrême base des cuisses postérieures obscurcie. L. à peine 2 m. Tanganyka. — Espèce caractérisée par son thorax à bande noire raccourcie, les élytres noirs avec, sur chacun, une grande macule antérieure externe testacée. Peut se placer près de *centromaculatus* All.

B. bilineatithorax n. sp. Assez étroit et long, rétréci aux deux extrémités, diversement roux, membres testacés, tête avec une, thorax et pygidium avec deux lignes noires, élytres avec la suture rembrunie et quelques macules brunes. Tête et thorax longs, ce dernier atténué en avant, densément ponctué; pygidium avec une ligne médiane blanche. L. 3 m. Le Cap. — Très caractérisé par ses lignes noires diverses sur plusieurs parties du dessus du corps.

Pseudopachymerus inspeculifer n. sp. [Bruchide]. Thorax obconique, postérieurement orné de plis peu surélevés, testacé, pubescent de gris jaunâtre avec, en dessus, des parties brunâtres peu nettes, antennes à avant-derniers articles foncés et élargis. Elytres courts et larges, à épaules un peu saillantes. Long. 3 mill. Pérou. — Voisin de *speculifer* Gylh. et s'en distinguant, à première vue, par le pygidium concolore, les antennes nettement épaissies à l'extrémité.

(A suivre.)

M. PIC.

Le Gérant : E. REVERET