



L'Échange, Revue Linnéenne

Coléoptères du globe (suite) ⁽¹⁾



Avant tout, je signale (la publication étant peu connue en France et, en sur- plus, les amateurs de Longicornes s'y rencontrant nombreux) que récemment (Bulletin de Juillet de la Soc. Entomologique de Mulhouse, p. 58-59), le spécialiste Heyrowsky, de Prague, a décrit une huitaine d'aberrations de *Longicornes* pouvant se retrouver en France, avec quelques autres évidemment étrangères à notre faune.

Phaleria Koepecke n. sp. [Hétéromère]. Oblong, un peu large, brillant, testacé, élytres ornés d'une grande macule brunâtre commune sur la suture, se rétrécissant aux extrémités (*forme typique*), parfois divisée vers la suture (*v. divisa*). Avant-corps très finement et éparsément ponctué, le thorax étant très large avec trois petites impressions postérieures. Elytres courts, atténués postérieurement, finement striés-ponctués, intervalles larges, sans ponctuation appréciable. Tibias antérieurs aplatis, fortement élargis à l'extrémité, les autres allongés, ordinaires. Long. 5-6 mill. Pérou : Lima (Koepecke). — Très distinct de l'espèce péruvienne *P. subparallela* Chevr. par sa forme large jointe au dessin élytral.

Ph. multesignata n. sp. Oblong, peu large, un peu convexe, brillant, testacé, élytres ornés de plusieurs petites lignes discales et superposées brunâtres. Avant-corps à ponctuation fine et écartée ; thorax assez large et peu court. Elytres assez courts, atténués à l'extrémité, très finement striés avec les intervalles larges, sans ponctuation appréciable. Tibias antérieurs modérément élargis à l'extrémité. Long. 5 mill. Cayenne. — Espèce d'un dessin foncé particulier.

Ph. cearaensis n. sp. Oblong, peu large, un peu convexe, brillant, entièrement testacé pâle. Avant-corps à ponctuation fine et écartée, le thorax étant assez large, peu plus étroit que les élytres, ces derniers un peu longs, atténués à l'extrémité, finement striés-ponctués avec les intervalles larges, sans ponctuation appréciable. Tibias antérieurs assez fortement élargis à l'extrémité. Long. 5-5,5 m. Brésil : Ceara. — Voisin du précédent.

Ph. neotropicalis n. sp. Oblong, peu large, très peu convexe, brillant, testacé, tête foncée postérieurement, élytres ayant chacun une fascie médiane interne noire, très éloignée des bords latéraux (*forme typique*), ou ayant une longue et large macule suturale foncée (*v. n. latesignata*). Avant-corps finement et éparsément ponctué ; élytres finement striés-ponctués, intervalles nettement ponctués. Tibias antérieurs très élargis à l'extrémité. Long. 5-6 m. Rio Parana. — Espèce à dessin noir particulier, voisine de la précédente.

(1) Quand il n'y a pas d'indication spéciale, les insectes font partie uniquement de ma collection et tous les types m'appartiennent.

Ph. peruviana n. sp. Oblong-subovale, large, un peu convexe, brillant, entièrement testacé. Espèce de forme plus robuste que les précédentes, les élytres avec les striés moins fines, ayant les pattes différemment robustes. Long. 6,5 m. Pérou. — Très distinct de *P. subparallela* Chevr. par sa forme non subparallèle.

Le **P. brasiliensis** mihi, du Brésil, est lui aussi robuste comme ce dernier avec les stries bien marquées, mais les élytres ont, sur leur milieu, et sur chacun, une bande longitudinale discale interne raccourcie et assez large noire avec une ligne également courte, suturale, noire. L. 7 m.

Sora testaceicornis n. sp. [Hétéromère]. Oblong-allongé, très brillant, glabre, à coloration générale claire avec les membres plus pâles, la tête seule étant en partie obscurcie entre les yeux, celle-ci non élargie, diversement ponctuée. Thorax plus long que large, à ponctuation fine et espacée, bien plus étroit que les élytres. Elytres pas très longs, un peu élargis après le milieu et atténués à l'extrémité avec des rangées de points fins sans stries appréciables, intervalles larges, déprimés, imponctués. Long. 9 m. Cameroun. — Espèce très caractérisée par ses antennes entièrement claires, conjointement à la faible sculpture élytrale.

S. unicolor n. sp. Oblong-allongé, un peu brillant, de coloration générale claire, pattes comprises. Antennes (cassées). Tête assez petite, munie d'une dépression postérieure, un peu moins large que le thorax, diversement ponctuée. Thorax assez court et modérément large, à ponctuation pupilleuse peu forte et espacée, bien plus étroit que les élytres. Elytres pas très longs, un peu élargis après le milieu, atténués à l'extrémité, nettement striés-ponctués, intervalles sans ponctuation appréciable, assez larges, plutôt plans. Long. 10 m. Congo Fr.: Ogooué. — Très distinct du précédent par la tête concolore, les élytres nettement striés.

S. congoana n. sp. Allongé sans être étroit, assez brillant, moins sur les élytres, de coloration générale claire, tarsi et antennes en partie rembrunis. Tête pas très large, munie d'un cou net, irrégulièrement ponctuée, yeux peu écartés; antennes longues et grêles, testacées, à articles 4 et suivants plus ou moins rembrunis. Thorax plus long que large, à ponctuation assez fine, écartée, plus étroit que les élytres. Elytres longs, subparallèles, atténués à l'extrémité, nettement striés, intervalles étroits, un peu surélevés. Long. 8 m. Congo. — Diffère du précédent par la forme du corps, ainsi que pour les intervalles des élytres rapprochés et surélevés.

Glyptothorax atricolor mihi. Allongé, un peu brillant, à longs poils gris soulevés, noir, base des antennes testacée; avant-corps densément ponctué avec le thorax assez large, subarqué sur les côtés, serratulé. Elytres un peu plus larges que le thorax, longs, atténués à l'extrémité, striés-ponctués. Long. 4,5 m. Congo. — Voisin de *Collarti* Pic (non *Dietopsis*), en diffère par le thorax plus large, les élytres à faible dépression prébasale, sans bossettes marquées.

Le **semipallidior** mihi, devant être considéré comme variété, est plus ou moins roussâtre ou rembruni sur le dessus du corps.

Mimopraogena n. genre. [Hétéromère, Alleculidæ]. Je crée ce genre pour l'espèce *A. metallicipennis* Pic (Op. Mart. VI, 1942. p. 16) proche de *Allecula* F. et caractérisé

par les élytres à épaules un peu effacées, métalliques, ayant un faciès de *Praogena femorata* Ths. et voisins, mais avec les tarses pectinés et non pas simples.

Rhambastus variabilis Har. [Eumolpide]. A distinguer chez cette espèce les variétés suivantes. Roux avec les élytres, soit entièrement concolores d'un vert métallique (*v. viridipennis*), soit brièvement marqués de roux au sommet, tandis que les pattes et le dessous du corps, moins l'abdomen qui est roux, sont noirs (*v. Madoni*). Sur fond roux, les élytres ont deux macules transversales vertes, tantôt séparées (*v. separatus*), tantôt se joignant étroitement sur la suture (*v. paulojunctus*). Afrique Australe, surtout Rhodesia.

Rh. Crampeli n. sp. Oblong-subovale, brillant, testacé, élytres verts métalliques avec, sur chacun, une grande macule allongée discale jaune, un peu obliquement disposée. Antennes foncées à l'extrémité. Tête à ponctuation écartée diverse, plus forte en avant, à faible impression entre les yeux. Thorax court et large, peu plus étroit que les élytres, à ponctuation assez forte, écartée. Elytres larges et assez courts, courtement atténués à l'extrémité, à épaules saillantes, finement ponctués en rangées, sans stries appréciables. Long. 3,5 m. Fort Crampel. — A placer près de *rufohumeralis* Pic.

Anguleumolpus curtipennis n. sp. [Eumolpide]. Subovale, court et large, brillant, testacé. Tête dégagée du thorax, à ponctuation assez fine, écartée, 2^e article des antennes plus court que 3^e. Thorax court et large, très rétréci en avant, plus étroit que les élytres, à ponctuation fine et écartée. Elytres larges et courts, atténués à l'extrémité, à impression antérieure faible, épaules subarrondies, à rangées de points assez fins sur la base et postérieurement avec une ponctuation fine et écartée. Cuisses dentées. Long. 4 m. Delagoa Bay. — Voisin de *pallidicolor* Pic, mais plus large.

Colasposoma Favareli v. n. major [Eumolpide]. Grand, oblong, à coloration générale d'un vert métallique s'étendant sur les pattes et la base des antennes; ponctuation du thorax forte et écartée, ainsi que celle des élytres. Long. 8 m. Cameroun.

C. Micheli n. sp. Oblong, brillant, glabre, bronzé, membres compris avec le dessus olivâtre foncé. Tête à ponctuation assez fine, non dense, un peu plissée vers les yeux. Thorax court et large, subarqué sur les côtés, un peu plus étroit que les élytres, à ponctuation assez fine et écartée. Elytres larges et assez courts, faiblement étranglés derrière les épaules, courtement atténués à l'extrémité, à épaules marquées, sans impression antérieure nette, à ponctuation assez fine et un peu rapprochée. Long. 9 m. Fort Crampel. — Diffère de *Crampeli* Pic par la forme moins trapue et la coloration tout autre.

Nanophyes maximus n. sp. [Curculionide]. Grand, subovale, roux, orné de bandes diverses d'un gris jaunâtre sur le thorax et les élytres, massue des antennes triarticulé, yeux un peu distants. Thorax obconique, à ponctuation peu forte, rapprochée, à ligne pubescente claire médiane et côtés diversement pubescents de clair. Elytres courts et larges, très atténués postérieurement, striés et peu ponctués, ayant dans les intervalles des bandes pubescentes diverses plutôt courtes. Pattes robustes avec les cuisses épaissies munies d'une longue épine suivie de plusieurs petites, tibias antérieurs rétrécis et subarqués à la base. Long. (sans le rostre) 4-4,5 m. Saïgon (Bar-

bier, in coll. Pic et Barbier). — Par sa grande taille, se rapproche de *robustus* Pic, de Java, mais la disposition de la pubescence est tout autre.

N. longirostris n. sp. Oblong, atténué aux deux extrémités, à fine pubescence grise presque uniforme, brillant, noir, scape, base des cuisses et des tibias, diversement jaunes. Rostre très long et un peu arqué; massue des antennes de 3 articles; yeux très rapprochés. Thorax obconique, assez finement et peu densément ponctué. Elytres larges aux épaules, progressivement atténués postérieurement, peu longs, finement striés, les intervalles peu ponctués. Pattes longues, cuisses élargies, multidentées. Long. (sans le rostre) : 3 m. Saïgon (Barbier, in coll. Pic et Barbier). Espèce caractérisée, parmi les espèces de coloration noire, par le rostre très long et la coloration en partie claire des pattes.

N. Phungi v. n. médionotatus. Un peu globuleux, à pubescence blanche nette, brillant, roux ou testacé, membres plus clairs, partie des tarse et massue des antennes obscurcies, élytres ornés, vers la base, de plusieurs macules brunâtres avec, en surplus, sur chacun, une autre nette prémédiane discale : Saïgon (Barbier). — La forme typique n'a pas de macule discale.

N. maculicollis n. sp. Oblong-subovale, à pubescence grise longue et peu dense, brillant, dessous du corps noir, tête et rostre rembrunis, thorax et élytres jaunés à dessins noirs. Thorax conique, orné de 5 macules noires transversalement disposées; élytres ornés d'une bande basale noire un peu oblique, ceux-ci courts, atténués à l'extrémité, nettement striés. Pattes longues, grêles, cuisses antérieures presque inermes. Long. (sans le rostre) 2 m. environ : Saïgon (Barbier). — Espèce caractérisée par les macules noires du thorax. Peut se placer près de *Phungi* Pic.

N. albofasciatus v. n. semipubens. Les élytres sont largement et longuement jaunes sur le disque, foncés sur la base, la suture et une partie des côtés. des élytres, sans parties de pubescence particulièrement dense : Saïgon (Barbier).

Pseudopachymerus inspeculifer v. n. mattosus [Bruchide]. Ressemble à la forme typique, mais avec les élytres plus larges et plus courts. Brésil.

Bruchus (? Bruchidius) faroensis n. sp. Oblong, opaque, dessous, pygidium, pattes et thorax revêtus de pubescence grisâtre uniforme, dessous roux, dessus noir avec la tête roussâtre postérieurement, élytres antérieurement largement pubescents de gris avec quelques parties foncées incluses, postérieurement noirs, avec quelques petites taches grises. Antennes rousses avec les avant-derniers articles rembrunis. Thorax large en arrière, un peu rétréci en avant, très sinué postérieurement, avec deux impressions allongées et longitudinales sur le disque et une courte impression de chaque côté de la base. Elytres courts et larges, subarqués sur les côtés, davantage à l'extrémité, faiblement striés. Pattes rousses, cuisses postérieures très épaissies, sans dent apparente, tibias minces, très arqués. Long. 3,5 m. Amazones : Faro. — Peut se placer près de *B. lateapicalis* Pic, en diffère par la structure du thorax et le système pubescent des élytres autre.

(A suivre.)

M. Pic.

Le Cédant : E. REVERET