68e Année. — N° 530. 8 Novembre 1952.

L'Échange, Revue Linnéenne

BIBLIOTHÈQUE SOC. ENT. FR.

Coléoptères du globe *(suite)* (1)

Casmena minuta n. sp. [*Phyt. Eumolpide*]. Petit, assez allongé, peu brillant, à pubescence blanche ou jaunâtre non dense, noir, membres compris, avec la base des antennes testacée. Tête large, à peu près comme le thorax avec les yeux grands, rapprochés en avant, finement et densément ponctuée. Antennes grêles, assez longues, bicolores. Thorax court et large, plus étroit que les élytres, finement et densément ponctué. Elytres longs, atténués à l'extrémité, à rangées de points assez petits avec des traces de faibles stries. Pattes assez robustes. L. 3 mill. Congo : Kisantu. — Espèce bien caractérisée par sa petite taille conjointement à sa coloration générale noire.

Stylosomus lateniger n. sp. [*Phyt. Cryptocephalide*]. Allongé, pubescent de gris, peu brillant, noir, devant de la tête, pourtour du thorax jaunes, élytres jaunes, largement noirs sur la suture, sommet excepté, et brièvement foncés sur le milieu des côtés, base des antennes et pattes testacées. Thorax à ponctuation forte et rapprochée, plus étroit que les élytres. Elytres parallèles, nettement striés-ponctués. Pattes longues et grêles. L. 2 mill. Chine : Kansou. — Caractérisé par sa forme étroite, jointe à sa coloration.

Paraglenea Jeanvoinei n. sp. [Longicorne]. Allongé, élytres subparallèles ou peu atténués à l'extrémité, plutôt glabres et brillants, noir, en partie d'un bleu grisâtre ou verdâtre métallique, autrement dit coloration foncière métallique avec les dessins noirs suivants : une macule frontale, quatre sur le thorax transversalement disposées ; en surplus, sur chaque élytre, en outre des épaules foncées, 4 macules ou fascies discales superposées. Elytres à ponctuation forte, subarrondis au sommet, faiblement carénés latéralement. Membres foncés. L. 12-13 mill. Tonkin : Chapa. — Voisin de *Par. chrysochloris* Bates, mais apex des élytres sans dent avec une autre disposition des dessins foncés sur les élytres.

P. Jeanvoinei subs. postjuncta. Elytres avec un dessin noir particulier, ayant des macules noires antérieures séparées et postérieurement un demi-cercle interne noir, ouvert extérieurement en renfermant une macule noire antéapicale. Tête sans macule frontale foncée. Chapa.

P. chrysochloris v. n. Bruningi. D'un gris bleu-métallique avec quatre macules noires sur le thorax et, sur chaque élytre, deux macules antérieures discales subcarrées, placées l'une au-dessus de l'autre, celles-ci noires avec une autre postérieure discale en forme de C ; en surplus, épaules et carènes latérales noires. Sommet des élytres avec une dent apicale externe. Japon.

(1) Les nouveautés décrites dans ce numéro se trouvent dans ma collection.

Numérisation Société linnéenne de Lyon

Paraglenea obscuricollis mihi. Sous le nom de *obscuricollis*, et originaire de Chapa, figure dans ma collection un insecte qui ne doit pas être publié et se rapprochant de *latefasciata* Breun. récemment édité. Voici le signalement descriptif de cet insecte :

Coloration générale noire ; thorax foncé sur son dessus, élytres, en surplus du sommet qui est brièvement pubescent de gris, ayant, vers leur milieu, une large bande grise-verdâtre, non échancrée en avant, émettant antérieurement, sur le milieu de chaque étui, une petite ligne oblique de même pubescence. Les élytres sont fortement élargis vers les épaules. L. 16 mill. — Très distinct de *P. Fortunei* Saud. par les élytres fortement élargis aux épaules, à fascie grise, particulière, ainsi que par son thorax foncé, à pubescence sombre, d'un noir un peu fauve.

Astylus (Heteracrius) densepubens n. sp. [Malac.]. Assez étroit et allongé, avec l'avant-corps plus étroit que les élytres, atténué en avant, assez densément pubescent de gris blanchâtre avec des poils noirs dressés en dessus. Thorax noir ayant une ligne médiane pubescente. Elytres ayant, sur coloration foncée, une bordure latérale jaune et, sur le disque de chacun, quatre macules jaunes diverses superposées, ces organes longuement bidentés au sommet, membres noirs. L. 5 mill. Caracas. — A placer près de *A. Lebasi* Chp., dont il se distingue par la pubescence foncière claire nette et assez dense.

Aderus (? Zarcosia) dilatimembris n. sp. [Hétérom.]. Allongé, un peu élargi postérieurement, opaque, pubescent de gris, noir, base des antennes et pattes (en partie cassées) largement testacées. Tête tronquée postérieurement, yeux écartés, distants, ne touchant pas le bord postérieur de la tête. Antennes non grêles, à articles 2 et 3 courts, 4 long, suivants élargis et obliquement angulés au sommet, dernier tronqué à l'extrémité. Thorax assez court, un peu élargi-subarrondi en avant, plus étroit que les élytres. Elytres peu longs, un peu élargis en arrière et courtement atténués à l'extrémité, faiblement déprimés vers la base, à ponctuation peu forte et dense. Pattes antérieures non grêles, postérieures un peu robustes. L. 8 mill. Congo. — Ressemble un peu à Z. *speluncarum* Pic, mais membres non grêles et thorax différent.

Ora Coomani n. sp. [Helodide]. Large, subovalaire, peu pubescent de gris, brillant, noir de poix, côtés du thorax et abdomen testacés, élytres en partie jaunes sur la suture, ayant de vagues parties jaunâtres, en surplus, sous certains jours, membres clairs. Tête large et thorax court, bien plus étroit que les élytres. Elytres fortement rebordés et creusés extérieurement en dessous des épaules qui sont très saillantes, assez fortement ponctués. L. 3 mill. Tonkin : Hoa-Binh. — Espèce caractérisée par sa forme courte et large, pouvant se placer près de *costifera* Pic, ou de *singaporensis* Pic.

Scirtes luzonicus mihi (1), de Luzon [Helodide]. Petit, oblong, pubescent de gris, entièrement testacé, avec les yeux noirs, finement ponctué. L. 2,5 mill. Luzon. — Plus petit et moins allongé que *victoris* Pic.

Scirtes unifasciatus v. bisbinotatus mihi. Noir, avec les élytres ornés chacun de deux macules antérieures flaves obliquement disposées. Mindanao.

(1) Je retrouve dans mes cartons une série de formes, reçues autrefois de Baker, que je suppose inédites ; celles-ci sont signalées ici sous la rubrique **mihi.**

Numérisation Société linnéenne de Lyon

Scirtes semiexplanatus mihi. Grand, oblong-allongé, pubescent de gris, brillant, finement et non densément ponctué, testacé. Elytres un peu explanés et impressionnés en dessous des épaules. L. 4-4,5 mill. Luzon. — Voisin de *Scimundi* Pic.

Scirtes semicinctus mihi. Oblong-allongé, brillant, finement ponctué, testacé, élytres, moins la base, bordés de noir sur les côtés, avant-corps diversement obs urci. L. 3 mill. Mindanao. — Plus petit que le précédent, avec les élytres non concolores.

Scirtes sandakanus mihi. Oblong-suballongé, pubescent de gris, brillant, finement ponctué, testacé, élytres largement bruns postérieurement ; antennes noires à base testacée, pattes claires, cuisses postérieures en partie rembrunies. L. 3 mill. Bornéo.

La **v. differens** mihi n'a pas les élytres marqués de foncé.

Scirtes bicoloricornis mihi. Oblong suballongé, pubescent de gris, brillant, finement ponctué, testacé, antennes noires à base testacée, élytres à strie présuturale et traces de costules. L. 3 mill. Ile Samar.

Scirtes pilipes mihi. Oblong subovalaire. peu pubescent, brillant, élytres assez fortement ponctués, roux avec les élytres rembrunis, mais à base rousse, ainsi que le sommet, membres clairs, cuisses postérieures marquées de brun. L. 3 mill. Bornéo.

Scirtes subapicalis mihi. Oblong, pubescent de gris, brillant, finement ponctué, roux-testacé avec les élytres ornés d'une tache noire à l'extrémité, antennes obscurcies à l'extrémité. L. 4 mill. Bornéo. — Elytres à dessins particuliers. Voisin de *nigroapicalis* Pic.

Pachybruchus pygidionotatus n. sp. [Bruchide]. ♂. Thorax obconique, élytres très courts et larges, un peu brillant, noir, roussâtre par places, par exemple vers les épaules, membres noirs, 1er article des antennes, quatre pattes antérieures et partie des cuisses postérieures rousses. Antennes en partie longuement flabellées. Thorax densément ponctué, à sillon médian avec bordure postérieure et lignes discales jaunes. Elytres courts et larges, à épaules arrondies, ornés de macules allongées ou lignes raccourcies jaunes. Dessous du corps en partie pubescent de gris; pygidium grand, roux bordé de pubescence jaune avec une longue ligne médiane pubescente. L. 4 m. Pérou. — A placer près de *lunulatus* Pic, plus robuste, dessus différent.

Pseudopachymerus viridenotatus n. sp. [Bruchide]. Subovalaire, opaque, testacé, tête verte, thorax muni sur le disque d'une grande tache verte. Antennes peu élargies à l'xtrémité. Thorax obconique, non surélevé postérieurement. Elytres courts et larges, à épaules arrondies ; pygidium concolore. L. 3,5 m. Brésil : Caraca. — Espèce plus large que *multinotatus* Pic, sans macules noires aux élytres, très caractérisée par la grande macule verte du thorax.

Bruchidius fulvomarginatus n. sp. [Bruchide]. Oblong-allongé, mat, testacé, bordé en partie de fauve sur le thorax et les élytres, ces derniers intérieurement largement pubescents de gris et ayant sur chaque étui trois macules brunes présuturales longitudinalement placées. Antennes filiformes, subdentées. Thorax long, cônique, à ligne médiane blanche et côtés un peu blancs. Elytres plus longs que larges ; pygidium ayant deux macules allongées fauves. L. 3 m. Pérou. — Coloration particulière, espèce devant se placer près de *pygidiolineatus* Pic.

Numérisation Société linnéenne de Lyon

B. ruber n. sp. Oblong-ovale, brillant, peu pubescent, roux, avec la tête en majeure partie, l'extrémité des antennes, la poitrine et partie des pattes postérieures noires. Antennes subfiliformes. Thorax obconique, ayant quelques mouchetures grises. Elytres peu plus longs que larges, arqués latéralement, ayant une fascie transversale grise prébasale ; pygidium concolore. L. 3 m. Pérou. — Peut se placer près de *breve-apicalis* Pic, moins robuste, thorax plus long et élytres ayant une fascie grise.

Metapteron Nodieri n. sp. [Lycide]. Allongé, étroit, subparallèle, peu brillant, noir, thorax ayant les côtés largement jaunes, cet organe assez large, un peu rétréci en avant, à angles postérieurs proéminents, élytres noirs avec, vers les épaules, les 2 côtes externes, ainsi que leur intervalle, jaunes, ces organes ayant chacun 4 côtes, dont deux plus élevées, avec les intervalles à aréoles fenestrées presque carrées. Membres noirs, 2e article des antennes, hanches et base des cuisses, testacés. L. 8 mill. Guyane : Maroni. — Espèce très caractérisée par sa coloration en majeure partie noire.

La **v. santaremense** mihi, du Brésil, est d'une forme proportionnellement plus élargie et le 2e article des antennes est foncé.

M. minasense n. sp. Allongé, étroit, subparallèle, peu brillant, noir, côtés du thorax testacés, hanches claires. L. 7 mill. Brésil : Minas. — Distinct du précédent par le thorax ayant ,au lieu d'un étroit sillon postérieur, un sillon très élargi avec les angles moins proéminents, les élytres non marqués de jeune aux épaules et munis de quatre côtes égales.

M. Le Moulti mihi, de la Guyane Fr., de coloration analogue au précédent, est plus court et moins étroit, le thorax est muni d'un sillon plus étroit avec une forme plus élargie. L. 6 mill.

Photinus bicoloripes n. sp. [Lampyride]. Allongé, mais non étroit, élytres faiblement arqués sur leur milieu ou subparallèles, brillant, noir, avec, en dessous, les 3 derniers segments de l'abdomen jaunes, dessus noir avec le pourtour du thorax, la suture et les côtés des élytres, sommet compris, bordés de jaune, membres foncés, partie des cuisses et des tibias testacées. L. 13 mill. Guyane Fr. — Plus allongé que *angustecinctus* Pic, du Brésil, avec la bordure élytrale moins étroite, le thorax plus long, non sensiblement atténué sur son milieu antérieur.

Cyphon luteosignatus n. sp. [Helodide]. Oblong-allongé, peu brillant, pubescent de gris, noir, thorax roux à disque foncé, élytres noirs à suture et bords externes en partie jaunes avec sur chacun, avant le milieu, et près de la suture, une macule allongée jaune, membres plutôt roux, L. près de 3 mill. Afrique : Nanyuki. — Espèce à dessins clairs des élytres particuliers.

Cyphon attenuatus n. sp. Oblong-subovalaire, atténué à l'extrémité, pubescent de gris, brillant, coloration générale testacée, avant-corps à ponctuation fine, plus faible que celle des élytres. Thorax court, très rétréci en avant. Elytres un peu effacés à la base, mais à épaules marquées, peu longs, très atténués postérieurement. Long. 2 mill. environ. Saigon (ex Barbier). — Voisin de *dalatensis* Pic, mais plus atténué en arrière et élytres non marqués de noir.

(*A suivre.*)

M. Pic.

Le Gérant : E. REVERET

Les Imprimeries Réunies, Moulins - 11-52 - Dépôt légal 4e trimestre 1952 - 58.356

Numérisation Société linnéenne de Lyon