

L'Échange, Revue Linnéenne



Coléoptères du globe (suite) ⁽¹⁾



Allotarsus luteonotatus n. sp. [Malacoderme]. Oblong, plus atténué en avant qu'en arrière, un peu brillant, élytres subopaques, à pubescence blanchâtre peu longue et assez régulière avec des poils courts obscurs dressés, d'un noir un peu plombé, avec le sommet des élytres marqué de jaune testacé; pattes testacées avec les cuisses rembrunies. Antennes à 3^e article mince, à peu près de la longueur du 4^e, qui est plus ou moins large, 5^e et suivants un peu angulés, dernier long, mince. Tête densément ponctuée, labre clair. Thorax un peu large, subarqué sur les côtés, un peu convexe, à ponctuation forte, peu écartée, surtout sur les côtés. Elytres larges et assez courts, à ponctuation fine, rapprochée, à faible impression prébasale, nettement rebordés. Long. 5 à 6 mill. Maroc : Moyen Atlas, forêt Berkine (Kocher). Institut scientifique chérifien et coll. Pic. — Voisin de *senescens* Duv., avec le 1^{er} article des tarses postérieurs plus court, à peu près de la longueur du 2^e, les antennes différentes et surtout caractérisé par la présence, vers le sommet des élytres, d'une macule jaunâtre variable.

Actenodia curtula v. n. Burni (Vésicant). Les bandes noires antérieure et médiane des élytres sont interrompues. Natal.

Actenodia 10-guttata Th. Les deux macules jaunes préapicales ne sont pas divisées, mais jointes entre elles. Avec ce dessin, les élytres ont, soit les macules médianes jointes (v. n. *bijuncta*), soit les macules basales jointes (v. n. *basijuncta*), ou seulement les macules postérieures jointes en fascie et toutes les autres isolées (v. n. *unijuncta*). Ces variétés sont de diverses localités de l'Afrique Australe.

Leptaleus mauritanicus n. sp. [Hétér.]. Assez large et robuste, roux, avec les membres plus clairs, les élytres largement rembrunis à l'extrémité. Tête assez grosse, un peu rétrécie et arquée postérieurement, à ponctuation distincte. Antennes courtes, testacées, faiblement rembrunies au sommet. Thorax long, à lobe antérieur large, étranglé près de la base, cette partie peu large et surélevée en dessus. Elytres larges et assez courts, atténués à l'extrémité, ornés d'une large impression prébasale à peu près de la coloration basale, la coloration claire se prolongeant en arrière vers la suture, bossettes préscutellaires très marquées et ponctuation fine. Long. 3 mill. Mauritanie. — Voisin de *senegalensis* Pic, mais sans fascie prébasale blanche aux élytres et partie claire de la base prolongée en arrière sur la suture.

Alogista hirsuta Pic (1951), préoccupé par *hirsuta* Borch. (1942) ou *hirsutula* Borch. (1943) devra prendre le nom nouveau de *saganensis*.

(1) Les insectes nouveaux font partie de ma collection, quand il n'y a pas d'indications spéciales.

Alogista diversipes n. sp. [Hétéér.]. Un peu allongé, rétréci aux deux extrémités, peu brillant, roux, antennes noires à base rousse, celles-ci grêles. Tête petite, densément ponctuée, plus étroite que le thorax, impressionnée transversalement devant les yeux qui sont transversaux, assez écartés. Thorax presque en demi-cercle, nettement rétréci en avant, finement et densément ponctué, un peu sinué sur la base, sans impression marquée. Elytres pas plus larges que la partie postérieure du thorax, assez longs, atténués à l'extrémité, peu fortement strié-ponctués, intervalles assez étroits et ponctués. Cuisses larges, sauf antérieures, un peu angulées en dessous, tibias intermédiaires arqués, postérieurement un peu sinués et élargis en dedans vers le milieu. Long. 5 mill. Dahomey. — Se rapproche de *benitoensis* par la structure des pattes, mais forme moins large, élytres non foncés vers la suture.

A. breveimpressa n. sp. Assez allongé, rétréci aux deux extrémités, peu brillant, roux, en partie clair, tête obscurcie, antennes entièrement noires, dessous du corps à coloration mélangée rousse et noire, les cuisses marquées de roux à la base. Antennes assez grêles. Tête courte et peu large, yeux grands et rapprochés. Thorax presque en demi-cercle, presque droit sur les côtés postérieurs, pas très court, finement et densément ponctué, ayant une impression nette au milieu de la base. Elytres peu plus larges aux épaules que le thorax en arrière, longs, très atténués à l'extrémité, à stries-ponctuées nettes, mais peu fortes, avec les intervalles peu larges. Cuisses un peu robustes. Long. 5 mill. Côte d'Ivoire. — Peut se placer près de *elongata* Pic, forme plus étroite avec le thorax à impression médiane basale plus marquée.

Trycherus latefasciatus mihi [Endomychide]. Oblong subovale, brillant, noir, thorax marqué largement de roux (côtés et bord antérieur) et dessous du corps en partie roussâtre, élytres avec deux fascies jaunes sinuées, la première remontant vers l'écusson près de la suture, la deuxième réduite éloignée de la suture et du bord latéral, pas très près du sommet. Antennes (cassées) à base noire. Thorax court et très large, mais bien plus étroit que les élytres, ayant trois impressions sillonnées postérieures et fortement ponctué. Elytres à épaules bien marquées, peu finement ponctués. Long. 7 mill. Gabon. — Espèce ayant aux élytres des dessins particuliers avec le thorax fortement sculpté.

T. lateclavus mihi. Moins court que le précédent, avec une coloration de l'avant-corps analogue, mais ayant le thorax finement ponctué et peu impressionné de chaque côté, moins large, les épaules moins marquées, la ponctuation des élytres plus fine avec des dessins jaunes bien différents, ayant une fascie prémédiane raccourcie sinuée et la fascie anteapicale non définie postérieurement. Antennes noires ayant une très large massue avec le dernier article en partie clair. Long. 8 mill. Cameroun.

Sagra (Tinosagra) brevior n. sp. ♀. [Phytophage]. Oblong-allongé, peu brillant, noir-olivâtre, antennes bleues. Tête alutacée, à ponctuation fine, espacée. Thorax peu long et assez large, à angles antérieurs marqués, alutacé avec de petits points épars. impressionné sur le milieu de la base. Elytres peu larges et assez longs, atténués à l'extrémité, ayant des rangées de points divers, non réguliers, sur la base qui, en surplus, présente quelques petites rides, ou sillons, finement ponctués postérieurement

avec le sommet à points irréguliers. Cuisses postérieures à base pileuse, un peu crénelées et finement bidentées, tibias un peu arqués, bituberculés à la base avec un petit mucron au sommet. Long. 12 mill. Angola. — Voisin de *benitensis* Pic (espèce propre non var. de *Murrayi* Baly) par sa structure élytrale, mais la forme des élytres est bien moins large avec une sculpture moins fine sur la base, le thorax est moins robuste et autrement impressionné.

Sagra (Tinosagra) longior n. sp. ♂. Grand, oblong-allongé, peu brillant, en partie subopaque, noir-olivâtre, antennes et partie des pattes bleues. Tête alutacée avec quelques petits points épars, sillonnée sur le front. Thorax assez court et peu large, un peu élargi en avant avec les angles arrondis, à faible sillon médian se terminant dans une impression postérieure, alutacé, avec de très petits points épars. Elytres assez larges et longs, très atténués postérieurement, à rugosités et plis antérieurs assez forts, plus faibles sur le milieu, s'effaçant au sommet. Cuisses intermédiaires à forte dent, postérieures très longues, à base pileuse et munies d'une forte dent près du sommet, tibias longs, subsinués, impressionnés en dedans vers l'extrémité, longuement dentés assez loin du sommet et courtement près de l'apex. Long. 22 mill. Kili-mandjaro. — Diffère de *mullierana* Qued. (ex descr.) par le thorax longuement sillonné, les tibias avec une dent prononcée, longue, placée assez loin du sommet. Sous le nom de *Sagra cribrosa* (qui me paraît inédit), figure dans ma collection, originaire de Benguela, une ♀ robuste, oblongue, de coloration olivâtre, avec le dessus plutôt bronzé, à ponctuation élytrale non uniforme, irrégulière, mélangée de quelques plis surtout sur la base, avec le thorax à fond alutacé, ayant une ponctuation pupilleuse assez forte, irrégulière; pattes postérieures sans dent marquée. Long. 18 mill.

Sagra amethystina v. n. viridescens ♂. Oblong, peu brillant, vert, base des antennes comprise. Cuisses postérieures non pileuses à la base, la dent médiane étant plus forte, tibias coudés à la base, robustes, creusés en dedans, sinués sur l'arête extérieure, et sur l'intérieure avec une large expansion anteapicale, apex mucroné. Gabon. — La forme typique est décrite comme ayant une coloration d'un violet sombre et diverses variétés sont différemment pourprées ou cuivreuses.

Sagra suturalis n. sp. Oblong, noir bleuté ou verdâtre, thorax presque opaque, élytres très brillants, pourprés, avec la suture marquée de noir violacé. Tête peu brillante en arrière, à ponctuation diverse, dense par places. Antennes longues, peu fortes. Thorax court et large, un peu dilaté sur les côtés antérieurs, mais sans angle pointu, faiblement alutacé avec de gros points irrégulièrement disposés. Elytres assez larges et peu longs, à faible et courte impression sur la suture près de la base et une plus forte infrahumérale, à ponctuation espacée, irrégulière, de diverses grosseurs. Pattes à reflets métalliques, cuisses postérieures plutôt unidentées, tibias arqués, frangés, sans dent marquée, mucronés au sommet. Long. 8-10 mill. Laos, Tonkin. — Espèce caractérisée conjointement par son thorax presque opaque, avec la coloration élytrale particulière, ainsi que la structure des tibias postérieurs ♂. A placer près de *carbuncula* Hope.

Sagra impressipennis n. sp. Petit, oblong, brillant, bleu, avant-corps vert métallique, élytres presque complètement dorés, un peu verdâtres sur la suture. Tête fine-

ment et éparsément ponctuée. Antennes d'un bleu noir, assez courtes, robustes. Thorax avec des points moyens, espacés irrégulièrement, en surplus d'une fine ponctuation, avec une impression basale devant l'écusson. Elytres larges et courts, très fortement impressionnés transversalement près de la base, en surplus d'une impression en dedans de chaque épaule, à ponctuation peu forte, irrégulière et espacée. Pattes postérieures peu longues, robustes. Long. 8 mill. Indochine.

Caractérisé par la forte impression prébasale des élytres et la coloration non absolument uniforme de ces organes, les antennes robustes. Peut se placer près de *fulgida* Weber.

Sagra Petelii v. n. cyanescens. Oblong, brillant, coloration générale d'un bleu (parfois teinté un peu de verdâtre ou de violacé) métallique. Elytres nettement ponctués. Cuisses postérieures ♂ bidentées avec les tibias postérieurs subarqués, puis coudés, munis d'une très longue dent vers le milieu. Long. 7-8 mill. Tonkin. — La nuance typique est d'un vert bleuâtre en dessous et sur les pattes, alors que le dessus est doré et, en surplus, décrite de Java.

S. Jansoni n. Farrei. Allongé, étroit, peu brillant, peu ponctué, vert, antennes noires. Long. 12 mill. Indes.

S. purpurea v. n. atricolor. Oblong-allongé, atténué postérieurement, peu brillant, finement ponctué, à coloration générale noire, ♂ cuisses postérieures presque tridentées, tibias courbés, munis d'une courte dent près de leur sommet interne. Long. 15-17 mill. Tonkin. — La forme typique et autres variétés décrites ont des colorations différentes et sont plus brillants.

Sagra subalutacea n. sp. Oblong, brillant, vert-métallique avec les élytres pourprés. Tête peu ponctuée. Antennes d'un noir bleuté, plutôt grêles. Thorax court et assez large, dilaté sur les côtés antérieurs en toute évidence, mais sans angle pointu, finement ponctué avec quelques plus gros points irrégulièrement disposés. Elytres assez larges et peu longs, subalutacés et un peu ridés, presque sans ponctuation nettement marquée, à faibles impressions antérieures. Pattes très vertes et brillantes, cuisses postérieures avec plusieurs dents et tibias avec une longue dent. Long. 14 mill. Chine : Yunnan. — Diffère de *suturalis* Pic par les élytres moins brillants, à sculpture spéciale, non marqués de foncé sur la suture, l'avant-corps nettement vert et brillant.

Sagra minuta v. insuturalis Pic ♂. Oblong, brillant, bleu teinté de noir sur l'avant-corps, élytres d'un pourpre métallique avec une bordure latérale bleue. Pattes postérieures très robustes, cuisses longues, tridentées, tibias arqués, munis d'une longue dent vers le milieu. Long. 12 mill. Yunnan. — Par la structure des pattes, se rapproche de *Petelii* Lac., mais bien différent par sa coloration. Par ses pattes, se rapproche aussi de l'espèce ci-dessus, avec l'avant-corps bleu et moins brillant.

Sagra purpurea v. n. Jeanvoinei. Coloration générale verte avec, par places, des reflets dorés. Tonkin.

(A suivre.)

M. PIC.

Le Gérant : E. REVERET