

## L'Échange, Revue Linnéenne

## Coléoptères du globe (suite) (1)

**Aphronycha circumdata** v. n. **latenigra** [Mala]. La coloration noire est très étendue sur le thorax et la bande discale noire des élytres est plus développée. Le Cap.

Presque en même temps, en 1925, deux *Adoceta* Bourg. [Lycides] ont été décrits sous le nom de *Alluaudi*, ce sont : *Alluaudi* Pic (Bull. Mus. Paris, N° 2, p. 186) et *Alluaudi* Peyr. (Bull. Soc. Ent. Fr., p. 55) ; le nom postérieurement publié devra prendre le nom de *mutata*.

Pour le *Leptispa* nouveau [Hispidé] venant d'être décrit (Mém. Inst. Sc. Madag. III, 1953, p. 271), il faut lire comme dénomination *subangustata* (et non pas *angustata*). La coquille est d'autant plus évidente que la nouvelle espèce est comparée à *angustata* Pic anciennement décrit.

**Cryptocephalus rabatensis** [Phyt.]. Petit, oblong, testacé, en partie un peu rougeâtre, antennes foncées, à base testacée. Tête pâle avec une ligne rousse frontale et un faible sillon. Thorax presque uniformément roussâtre, à ponctuation presque indistincte. Ecusson pâle. Elytres peu larges et assez courts, testacés avec une bande suturale assez large, d'un roux brunâtre, s'effaçant postérieurement, ces organes ayant des rangées de points fins prolongés presque jusqu'au sommet. Dessous du corps clair. Long. 2,5 mill. Maroc : Rabat (ex Théry). — Ressemble à *discicollis* v. *Thereseae* Pic, en diffère par le dessous du corps clair, la bande suturale d'un roux brunâtre des élytres.

**Cryptocephalus sagraensis** n. sp. Oblong, robuste, large et relativement court, dessus clair, roux ou testacé avec de petites parties plus foncées, rembrunies (sur la base du thorax, les épaules et la suture), écusson bicolore, dessous foncé, sommet de l'abdomen et pygidium testacés. Tête claire. Thorax de coloration rousse, ou plus claire, à tache basale externe parfois obscurcie. Elytres courts et larges, à rangées de points pas très gros avec de faibles stries latérales se prolongeant presque jusqu'à l'extrémité, testacés, à macule humérale brune et suture étroitement foncée. Long. 3 mill. Espagne : La Sagra. — Ressemble aux var. claires de *connexus* Ol., avec un dessin élytral différent et moins foncé.

**Cryptocephalus Ivanovi** n. sp. Court et très convexe, roux et testacé avec le dessous du corps et le pygidium noirs, mentes clairs. Tête à ligne frontale rousse et sillon oblitéré, yeux noirs, très écartés. Thorax roux avec une bordure antérieure et une ligne médiane plus claires, ainsi que la base. Ecusson testacé. Elytres testacés à rangées de points peu gros avec des stries en partie marquées. Pattes entièrement

(1) Sauf indications spéciales, les types des nouveautés sont dans ma collection.

claires. Long. 3 mill. Taskent (Ivanov, in coll. Pic). — Cette espèce, de forme plus trapue que d'ordinaire, peut se placer près de *fulvus* Goeze, qui a les antennes bicolores.

**Cryptocephalus zantensis** n. sp. Court et robuste, convexe, roux et testacé, dessous du corps foncé avec le sommet de l'abdomen et aussi le pygidium plus ou moins testacés, élytres avec une macule humérale brune et la suture plus ou moins brunâtre, écusson plutôt noir. Long. 2 mill. environ. Zante (Pic). — A placer près de *blandulus* Har.

**Pseudopidonia japonica** n. sp. [Longicorne]. Allongé, subparallèle, un peu brillant, noir en dessous, dessus tricolore. Tête rousse en avant et sur le cou, noire entre et devant les yeux, thorax roux, ainsi que l'écusson. élytres testacés, à suture, sauf près de l'extrémité, et apex noirs, ayant en surplus, sur chaque étui, les macules allongées foncées suivantes (non visibles du dessus) : une tout à fait sur la base et deux externes, la première en dessous des épaules, l'autre vers le milieu. Antennes testacées avec divers articles foncés à l'extrémité : pattes testacées avec les cuisses plus ou moins marquées de foncé à l'extrémité, le sommet des tibias et les tarses en partie obscurcis. Thorax bombé antérieurement, puis incliné en avant, faiblement surélevé au milieu, impressionné transversalement sur la base, finement et densément ponctué. Elytres plus larges que le thorax, assez longs, subparallèles, un peu tronqués à l'apex, à ponctuation irrégulière, pas très forte, plus fine postérieurement. Long. 11 mill. Japon : Communiqué par Chujo. — Voisin de *alticollis* Kr., en diffère (ex descr.) par la tête seulement foncée postérieurement, les pattes plus largement claires, etc...

**Strangalia tenuicornis** v. n. *quadriluteonotata*. Elytres noirs, ayant sur chacun, vers la base et vers l'extrémité, une macule transversale jaune. Antennes noires, jaunes à l'extrémité. Japon. Communiqué par Breuning.

**Str. tenuicornis** v. n. *semisuturalis*. Les élytres testacés sont longitudinalement et plus ou moins marqués de noir vers la suture, aussi avec deux macules antérieures externes noires, non visibles du dessus, une aux épaules, l'autre en dessous. Japon (coll. Pic). — Vu aussi communiqué par Chujo (co-types).

**Leptura scotodes** v. n. *rufonotata* ♀ [Longicorne]. Noir, avec les élytres ayant chacun une macule humérale d'un roux rougeâtre et également avec le sommet teinté de roux. Court et assez large, opaque, épistome brillant à ponctuation écartée, avant-corps densément ponctué, élytres à ponctuation écartée, plus fine postérieurement. Soukyo Hokkaido. Communiqué par Breuning.

**Megacantha granulosa** n. sp. [Hétérom.]. Oblong-allongé, peu brillant, noir. Thorax à ponctuation peu forte, mais bien distincte, écartée, faiblement impressionné au milieu, court et large, plus étroit que les élytres. Elytres larges et peu longs, atténués, à l'extrémité, fortement striés, ornés d'une ponctuation granuleuse. Cuisses antérieures munies d'une dent triangulaire longue. Long. 21 mill. Somalie. — Espèce distincte, à première vue, et caractérisée par la ponctuation granuleuse des élytres.

**Megacantha curvatipes** n. sp. Allongé, un peu rétréci aux deux extrémités, opa-

que, noir. Thorax court et assez large, un peu plus étroit que les élytres, assez finement et éparsément ponctué. Elytres longs, atténués à l'extrémité, nettement striés et peu fortement ponctués. Cuisses postérieures avec une dent pointue nette, tibias un peu incurvés en dehors. Long. 23 mill. Côte-d'Ivoire : Dunbroko. — Voisin de *brevipennis* Pic, mais aspect mat, tibias antérieurs non incurvés, plutôt sinués. etc.

**Megacantha benitcensis** n. sp. Relativement petit et un peu trapu, très brillant, noir. Thorax court, plus large chez ♂, à ponctuation fine et non rapprochée. Elytres relativement courts, atténués à l'extrémité, nettement strié-ponctués, intervalles en partie convexes. Cuisses antérieures ♂ à longue dent mince, presque droite; ♀ à petite dent. Long. 16-18 m. Congo Fr. : Benito. — Caractérisé, conjointement par sa forme courte et son aspect brillant, avec la dent fémorale différente ♂.

**Megacantha diversipes** n. sp. Oblong-suballongé, un peu brillant, noir. Thorax court et large, plus étroit que les élytres, à ponctuation assez fine, mais bien distincte. Elytres strié-ponctués, intervalles plutôt plans. Cuisses antérieures munies d'une dent triangulaire. Long. 15 mill. Libreville (Congo Français). — A placer près de l'espèce précédente, moins brillant, plus allongé avec la ponctuation thoracique moins fine.

**Strongylium diverseimpressum** n. sp. [Hétér.]. Allongé, brillant, vert métallique, membres bleus. Antennes aplaties et élargies à l'extrémité. Tête assez fortement et diversement ponctué, yeux grands, rapprochés. Thorax peu plus large que long, rebordé sur son pourtour, sans sillon médian. mais impressionné en travers sur le milieu de la base, à ponctuation assez forte, non dense. Elytres un peu plus larges que le thorax, convexes, non striés, à sculpture embrouillée, ayant des plis avec des points petits et des fovéoles plutôt longues, plus fortes antérieurement. Long. 11 mill. Sénégal. Kayes. — Espèce voisine de *Baumannii* Kolbe, mais avec une sculpture élytrale autre et une taille moindre.

**Strongylium Donckieri** n. sp. Oblong-allongé, brillant, convexe, entièrement bleu avec les antennes en partie noires. Antennes aplaties, plus larges à l'extrémité. Tête ayant plutôt une ponctuation éparsée, yeux grands, rapprochés. Thorax un peu plus long que large, rebordé sur le pourtour, à ponctuation assez fine, diversement écartée. Elytres un peu longs, atténués à l'extrémité, finement strié-ponctués, les intervalles étant diversement larges et plans. L. 17 mill. Benito. — A placer près de *clavigerum* Geb., qui a l'avant-corps vert.

**Strongylium variipenne** (nouv.). Assez petit, allongé, peu brillant, jaune, rembruni sur les côtés du dessous du corps et le milieu du thorax, élytres noirs ou rembrunis, avec le sommet et les côtés largement jaunes. Antennes noires à base testacée, dernier article clair au sommet; pattes antérieures testacées, cuisses marquées de brun, les autres noires. Long. 10 mill. Gabon. — Peut-être var. de *ogouense* Pic, avec une coloration élytrale spéciale.

**S. xanthozonum** Ths. variétés. On peut distinguer chez cette espèce les var. suivantes, toutes du Gabon, et ayant de commun le dessous du corps presque entièrement clair, la tête jaune marquée de noir sur le vertex, le thorax bicolore, les élytres avec une bande basale étroite jaune, ceux-ci étant : soit munis d'une bande étroite pré-

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE  
DE FRANCE  
BIBLIOTHÈQUE

médiane jaune complète (*v. n. ininterruptum*), soit avec cette bande interrompue (*v. n. interruptum*). La *v. n. lateluteum* offre des bandes très élargies, le thorax jaune en dessus a une bande discale noire.

**Bruchidius Chujo** n. sp. [Bruchide]. Oblong-allongé, noir, revêtu d'une pubescence grise à peu près uniforme, parfois avec la base du thorax à pubescence un peu plus dense. Antennes noires avec les premiers articles roux, plus longues chez ♂. Pattes antérieures et intermédiaires testacées et grêles, les postérieures épaissies, entièrement, ou presque, noires, cuisses sans dent marquée, tibias avec un long éperon interne. Thorax étroit, rétréci en avant, assez long, densément ponctué. Elytres non larges, finement striés, intervalles ponctués. Pygidium vertical, à pubescence uniforme grise, non dense. Long. 2,5-3 mill. Japon (ex Chujo). Type in coll. Pic, paratypes in coll. Chujo et Pic. — Peut-être voisin de *comptus* Sharp, en diffère (ex description) par la pubescence uniforme du thorax en surplus de la forme non raccourcie, les antennes bicolores, etc.

Chez la *var. diversimembris* mihi, les antennes et pattes sont entièrement, ou presque, testacées.

**Bruchidius amurensis** n. sp. Oblong, un peu large, peu pubescent de gris, noir, base des antennes et 4 pattes antérieures jaunes. Antennes courtes, un peu robustes. Thorax court et large, un peu plus étroit que les élytres, peu rétréci en avant, à ponctuation granuleuse dense. Elytres larges et assez courts, striés, intervalles peu larges, finement ponctués. Cuisses postérieures courtement dentées. Long. 2,5 mill. Amur. — Ressemble un peu à *maculatipes* Pic, mais le thorax est différent, les antennes sont moins larges à l'extrémité, les pattes intermédiaires sont claires.

Dans *Miscellanea Entomologica* XLVI, p. 77, a été décrite la *v. insignaticollis* Pic (attribuée à *Silidius Auberti*) ; ce dernier nom est de Fairmaire, mais n'aurait pas été publié ; en voici le signalement :

**Silidius Auberti** ♀. Peu allongé, atténué postérieurement, peu brillant, noir, thorax roux avec deux vagues macules brunes discales, abdomen en partie roux. Thorax simple, sinué latéralement, sans échancrure nette, sillonné au milieu, plus étroit que les élytres. Elytres assez courts, très atténués postérieurement avec, sur chacun, deux faibles costules. Long. 10 m. Madag. : Majunga. — Peut-être simple variété de *expansicollis* Fairm.

**Bruchidius varipubens** n. sp. [Bruchide]. Oblong, rétréci en avant, noir, membres compris, avec une pubescence non continue, mi-partie blanche, mi-partie jaune, disposée largement en dessous et sur le pygidium, de façon réduite en dessus, avec une tache médiane basale sur le thorax et, sur les élytres, une bande suturale non régulière, élargie en arrière et enclosant une macule postérieure noire, avec deux étroites bandes transversales, 1<sup>re</sup> vers le milieu, 2<sup>e</sup> avant le sommet. Cuisses postérieures sans dent. Long. 4 mill. Erzerum. — A placer près de *B. urbanus* Sharp.

(A suivre.)

M. Pic.

Le Cérant : E. REVERET