



L'Échange, Revue Linnéenne

Coléoptères du globe (suite) (1)

Eumolpamarygmus perroti n. sp. [Hétér.]. Oblong, assez court, peu brillant et peu pubescent, d'un noir faiblement olivâtre, membres foncés. Tête creusée entre les yeux, à ponctuation irrégulière, en partie rapprochée et un peu pupilleuse. Thorax plus large que la tête, court et large, un peu rétréci en avant, droit sur les côtés postérieurs, à impression transversale postérieure non droite et inégale, orné de points de grosseurs diverses, et différemment écartés, ceux-ci étant un peu pupilleux. Elytres plus larges que le thorax, à épaules effacées, courts, atténués à l'extrémité, ayant, près de la base et vers la suture, une forte impression transversale interne qui se prolonge sur la suture avec une gibbosité peu élevée sur chaque étui ; en plus, des stries diverses et diversement ponctuées, très fortement sur les côtés antérieurs, moins sur le reste, avec des côtes préapicales nettes. Pattes longues et minces, tibias antérieurs faiblement et intermédiaires un peu plus arqués. Long. 8 mll. Tonkin : Tam Dao (Général Perrot et type unique dans la collection du récolteur). — Se rapproche de *nitidus* Pic, mais élytres plus courts, à gibbosités moins fortes et ponctuation latérale plus grosse ; en surplus, les tibias intermédiaires sont nettement courbés, tandis qu'ils sont presque droits chez *nitidus* Pic.

Eucyalesthus mixticolor n. sp. [Hétér.]. Un peu allongé, convexe, brillant, foncé, avant-corps d'un noir olivâtre, élytres à couleurs métalliques alternées verte ou pourprée, la couleur verte s'étendant sur la suture et les intervalles, la pourprée autour des rangées de points à fond bleu. Avant-corps à ponctuation diversement petite, ainsi qu'espacée, le thorax étant plus large que long. Elytres peu longs, élargis avant le sommet et atténués à l'extrémité, à stries presque nulles, mais avec des rangées de points diversement petits. Épaules subarrondies, mais un peu saillantes en dessus et intervalles des élytres plans et très finement ponctués. Long. 13 mill. : Indochine. — A placer près de *viridi-striatus* Fairm., en diffère (ex description) par la coloration plus foncée, la disposition différente des couleurs sur les élytres et la ponctuation non dense du thorax.

Amarygmus salvazai n. sp. [Hétér.]. Subovale, peu convexe, brillant, foncé, thorax vert, élytres d'un vert métallique avec reflets doré-pourprés. Tête à ponctuation ruguleuse dense. Thorax court, très rétréci en avant, et, en arrière, peu plus étroit que les élytres, à ponctuation assez fine et écartée. Elytres courts, arqués sur les côtés, brièvement atténués au sommet, à stries plutôt nulles, mais avec des rangées

(1) Quand il n'y a pas d'indication spéciale, les types des nouveautés se trouvent dans ma collection.

de points assez gros, intervalles larges, déprimés, finement ponctués. Long. 6 mill. : Cambodge (ex Vitalis). — Peut se placer près de *diversetinctus* Pic. Espèce caractérisée surtout par la particulière ponctuation de sa tête.

Amarygmus leseieuei n. sp. Subovale, très convexe, brillant brunâtre en dessous, dessus d'un vert métallique avec partie antérieure de la tête rousse. Antennes noires, à la base rousse, pattes rousses. Tête à ponctuation moyenne et rapprochée, à peu près analogue à celle du thorax, ce dernier court, rétréci en avant, en arrière peu plus étroit que les élytres. Elytres assez courts, subarqués sur les côtés, atténués à l'extrémité, ayant de fines stries ponctuées de points assez gros, intervalles larges, non aplanis, à ponctuation modérément fine. Long. 6 m. Iles Andaman. — Peut se placer près de *fruhstorferi* Pic, dont il se rapproche par la forme, mais d'une autre coloration d'ensemble avec l'avant-corps plus fortement ponctué et les élytres d'une autre sculpture.

Eutrapelodes subolivaceus n. sp. [Hétér.]. Assez allongé, peu brillant, noir un peu olivâtre en dessus, membres foncés. Tête peu longue et assez large, yeux écartés. Thorax assez court, mais non large, rétréci en avant, nettement plus étroit que les élytres, finement et densément ponctué. Elytres assez longs, atténués à l'extrémité, finement striés, les stries ponctuées de points assez petits, intervalles finement ponctués. Long. 7 mill. Kenya. — A placer près de *ruficollis* Pic, qui a le thorax roux, les élytres noirs entièrement foncés, etc.

Aderus usambaranus n. sp. [Hétér.]. Oblong, brillant, à pubescence claire un peu soulevée, roux, légèrement brunâtre avec le devant de la tête plus clair, les élytres rembrunis sur la suture, plus largement en arrière, mais non à l'apex, côtés aussi en partie rembrunis sur leur milieu; pattes claires avec les postérieures en partie rembrunies. Tête aquée en arrière, yeux grands, mais écartés. Thorax court et large, fortement ponctué. Elytres bien plus larges que le thorax, peu longs, atténués à l'extrémité, nettement déprimés et impressionnés vers la base, à ponctuation forte, peu dense. Long. 3 mill. environ. Usambara. — Voisin de *trilineatus* Pic, avec la coloration foncée plus étendue sur la suture, le thorax pourvu d'un sillon médian.

Aderus fortepunctatus (Nouv.). Oblong, à pubescence grise fine et couchée, brillant, ayant une ponctuation forte sur le thorax et les élytres, fine et écartée sur la tête, avec une coloration générale d'un roux-testacé, membres clairs; yeux noirs, grands et un peu rapprochés. Tête assez large, subarquée postérieurement; antennes peu grêles et assez longues avec les articles 2 et suivants non courts et à peu près égaux, dernier tronqué au sommet. Thorax un peu large, à angles antérieurs nuls. Elytres un peu plus larges que le thorax, courts, peu atténués postérieurement, nettement déprimés et impressionnés près de la base. Long. 2 mill. environ. Congo. — A placer près de *stanlayi* Pic, dont il n'est peut-être qu'une variété.

Monomma luteomaculatum n. sp. Oblong, un peu atténué postérieurement, presque déprimé, peu brillant, de coloration générale fauve, mais un peu rembrunie par places, avec les élytres ornée de nombreuses taches jaunes, non régulièrement disposées, ayant un revêtement pubescent jaune fait de poils plutôt longs et minces qui

dessinent, sur les élytres, des lignes longitudinales étroites pileuses ; membres roux avec la massue des antennes foncée. Thorax court et large, un peu rétréci en avant avec les angles antérieurs peu avancés et subarqués, les postérieurs droits, à ponctuation ruguleuse rapprochée avec une large impression vers la base, de chaque côté. Elytres à épaules droites, nettement rebordés, à ponctuation ruguleuse rapprochée, ayant des traces de côtes, progressivement atténués postérieurement. Long. 7 mill. Madagascar. — Espèce caractérisée conjointement par la présence de macules claires sur les élytres et la disposition pubescente de ces organes qui forme des lignes étroites, nettes, faites de longs poils jaunes.

Monomma singularipenne n. sp. Assez étroit et allongé, brillant, plutôt glabre, noir, côtés du thorax teintés de roussâtre ; antennes rousses, pattes foncées. Tête à ponctuation assez forte et rapprochée, impressionnée de chaque côté. Thorax court et large, très rétréci en avant, avec les angles antérieurs avancés, mais non pointus, les postérieurs presque droits, diversement impressionné latéralement, à ponctuation fine, écartée. Elytres à peu près de la largeur du thorax, longs, très atténués postérieurement, à faibles stries ponctuées de points plus ou moins gros, avec une plaque lisse suturale prémédiane bordée, de chaque côté, par une strie arquée. Long. 4 mill. Indochine. — Peut se placer près de *stenotarsoide* Ancy, dont il diffère par la taille moindre et la forme plus allongée, les élytres à ponctuation plus nette ou plus forte. Ressemble un peu à *horni* Pic et s'en distinguant, en outre de la coloration, par la forme plus allongée et les élytres moins bombés sur le dos.

Crioceris latior v. n. *latiorithorax* [Phyt.]. Se distingue du type *latior* Pic par le thorax plus large, ainsi que les élytres et ces derniers organes ayant antérieurement une ponctuation moins régulière et plus espacée. — Chine : Tchao Pin Jo.

Psatyrocerus unifasciatus n. sp. [Phyt.]. Oblong, robuste, presque mat, densément pubescent de gris, roux, thorax obscurci au milieu, élytres avec une bande prémédiane transversale réduite noire et brièvement maculés de brun extérieurement, en dessous des épaules. Membres testacés. Tête robuste, avec les yeux qui sont grands plus large que le thorax, celui-ci rétréci en avant, à large impression transversale médiane, densément et ruguleusement ponctué. Elytres nettement plus larges que le thorax, un peu longs, atténués à l'extrémité, à faible impression basale et préhumérale sur chaque étui, finement et densément ponctués. Long. 5 à 6 mill. Brésil à Corumbá. — A placer près de *robustus* Pic, dont la coloration est autre.

Lycus flammeatus v. n. *discoluteus*. Elytres jaunes avec une large bande humérale noire un peu élargie à l'apex sans recouvrir les bords latéraux, en surplus avec une bande raccourcie discale, en dessous des épaules, et le rebord latéral noir. Afr. Or. Angl.

L. flammeatus v. n. *kenyanus*. Elytres largement jaunes, seulement marqués de noir vers la suture, assez largement autour de l'écusson et brièvement à l'apex. Kenya.

La figure due à Kleine, représentant (selon lui) *Hololytus intermedius* Bourg. (fig. 68, p. 73, in Ann. Mus. Congo-Belge, 1937) est une toute autre espèce que celle

décrite par Bourgeois (Ann. Soc. Ent. Fr. 1884, pl. 4, fig. 2) : en conséquence, *H. intermedius* Kleine (nec Bourgeois) devra prendre le nom muté de *subundulatus*.

La figure 8, p. 64, de Kleine, dans le même ouvrage, attribuée à *collarti* Pic, présente une coloration spéciale que je n'hésite pas à nommer, bien que ne connaissant pas l'insecte en nature. Cette forme a les élytres entièrement noirs, sauf une macule discale claire en forme de virgule, et je propose pour la désigner le nom de *luteodiscoidalis*.

Le *Lycus apicefasciatus* selon Kleine (loc. cit. p. 81, fig. 114) ne correspond pas à mon espèce *Hololytus apicefasciatus* (qui est de forme courte, plus élargie, avec la partie apicale noire autrement conformée et dont les élytres au sommet n'ont pas de saillie suturale courbée extérieurement) et cette figure représente une autre espèce, pour laquelle je propose le nom de *multiincisus*.

Lycus (Acantholytus) minor n. sp. Allongé, un peu élargi avant le sommet, puis atténué à l'extrémité, à peine brillant, noir, côtés du thorax largement orangés; élytres orangés, marqués de noir vers l'écusson et assez largement au sommet, plus brièvement sur la suture que latéralement, sur le disque surtout. Thorax large, mais pas très court, sinué sur son bord antérieur avec les angles postérieurs très saillants. Elytres ornés de côtes nettes avec les intervalles ponctués et munis de nombreuses rides plutôt irrégulières, épaules saillantes, arquées, inerme chez ♀, mais avec une longue épine chez ♂, l'apex chez la ♀ est subarrondi, inerme, tandis que chez le ♂ il est un peu échancré et muni d'une longue dent suturale. Long. 11 mill. Gabon. — A placer près de *longispinus* Pic, dessin noir des élytres différent et forme plus allongée.

Lycus (Lopholytus) angolensis n. sp. Assez allongé, modérément élargi avant l'extrémité, opaque, majeure partie du dessous du corps claire, en dessus orangé avec le thorax brièvement bilinéolé de noir à la base et les élytres peu largement noirs au sommet, la partie noire étant réduite en avant sur la suture et peu ondulée; membres foncés. Rostre roux et long. Thorax large, très avancé triangulairement sur son milieu antérieur et surélevé dans cette partie. Elytres peu longs, un peu plus larges que le thorax, faiblement dilatés derrière les épaules en s'élargissant peu en arrière, courtement atténués à l'extrémité et subarrondis à l'apex, ayant 4 côtes bien marquées, les intervalles étant nettement et multiponctués, à peine plissés. Long. 4 mill. Angola. — Espèce à forme et coloration du thorax particulières. Peut se placer près de *longipennis* Pic.

Je vois, nommées dans ma collection, mais non notées comme décrites sur mon catalogue, les espèces suivantes du genre *Spermophagus*, originaires de l'Am. M^h.

Biolleyi mihl. Petit, étroit, testacé avec le milieu du dessous du corps noir, la suture rembrunie, ayant une pubescence grise à peu près uniforme. L. 2,5 m. Costa-Rica. — Espèce particulière par sa petite taille jointe à sa coloration presque entièrement claire.

M. Pic.

(A suivre.)

Le Gérant : E. REVERET.