

# L'Échange, Revue Linnéenne

## Coléoptères du globe (suite) <sup>(1)</sup>



**Zonabris nubica v. n. mauritanica** [Hétér.]. La fascie jaune prémédiane des élytres est jointe à la macule préscutellaire jaune. Mauritanie.

**Z. nubica v. n. basifasciata**. Comme la var. précédente, mais avec la base des élytres ornée d'une fascie jaune complète. Sénégal. Mauritanie.

**Z. nubica v. n. disco-angustejuncta**. Comme la var. *mauritanica*, mais avec les bandes noires jointes sur le disque par une ligne longitudinale noire. Sénégal. Mauritanie.

**Z. nubica v. n. mauritanensis**. Comme la var. *interruptefasciata*, mais avec la différence que la macule prémédiane interne jaune n'est pas isolée, mais se joint à la macule préscutellaire jaune. Mauritanie.

**Zonabris fisselensis v. n. bisbiseparata**. Les deux macules noires de chaque élytre, situées avant leur milieu, sont disjointes. Mauritanie.

**Z. fisselensis v. n. laurantiana**. La fascie antepiciale noire est, sur chaque élytre, divisée en macules. Sénégal.

**Pseudopidonia Staudingeri** Pic [Longicorne]. Espèce variable du Japon. La macule postérieure externe noire est oblitérée (*v. n. subimmaculata*), ou bien se prolonge en fascie atteignant la suture (*v. n. subfasciata*), avec la macule antérieure externe remontant sur les épaules. J'attribue encore à la même espèce, au titre de sous-espèce, et sous le nom de *Breuningi*, un ex. ayant la tête un peu rétrécie en arrière, le thorax bombé, nettement rétréci en avant, les élytres un peu longs, faiblement plus larges à la base, non absolument arrondis à l'apex, ayant les antennes presque entièrement claires, les pattes aussi avec les cuisses postérieures seulement marquées de foncé. Les élytres jaunes sont ornés chacun de 3 macules noires externes, de formes diverses et superposées, ayant la suture étroitement noire avec une courte portion faiblement élargie avant le milieu.

**Anthicus Leleupi** Pic, du Kivu, préoccupé par *Leleupi* Pic, du Katanga, publié in Bull. S. Ent. Belg., 1952, p. 257, devra prendre le nom de *kivuensis*.

**Anthicus fortepunctatus** n. sp. [Hétér.] Petit, oblong, brillant, à pubescence grise en partie hirsute, de coloration générale roussâtre-testacée, les élytres étant plus clairs à l'extrémité, membres testacés. Tête subtronquée postérieurement, à ponctuation fine et écartée. Thorax court, assez élargi et subarrondi en avant, à ponctuation assez forte, rapprochée. Elytres plus larges que le thorax, peu longs, un peu atténués à

(1) Quand il n'y a pas d'indication spéciale, les types font partie de ma collection.

l'extrémité, ayant les épaules un peu effacées, à ponctuation forte et peu écartée sur la base, fine vers l'extrémité. Long. 2 mill. environ. Dakar (ex Barbier). — Voisin de *ininsignifer* Pic, élytres moins larges, en partie plus fortement ponctués.

**Cryptocephalus rufipes** v. n. *subflavoapicalis* [Phyt.]. Thorax rouge, élytres noirs, à bordure antérieure externe flave et marqués de flave-jaunâtre à l'extrémité. Dreux. Hyères (Var).

**Pachybrachus exclusus** v. n. *Guilhelmi* [Phyt.]. Un peu trapu, thorax peu court, ayant 3 bandes discales jaunes incomplètes, assez longues, une antérieure, 2 basales. Elytres assez courts et un peu larges, noirs, bordés presque complètement de flave jaunâtre, avec, en surplus, les dessins clairs suivants sur chaque étui : des petites macules externes prémédianes, une longue ligne discale, de courtes bandes antérieures internes, les dessins clairs étant en partie ponctués de noir. Epimères et pygidium marqués de flave. St-Guilhem (Schaeffer in collection Schaeffer et Pic). — Diffère au moins de *exclusus* Rey par la disposition particulière des parties claires sur les élytres dont le disque n'a pas de macules jaunes, mais des lignes irrégulières.

**P. Gavoyi** (Nouv.). Oblong-allongé, dessous du corps noir, pubescent de blanc avec les épimères, le sommet de l'abdomen et le pygidium marqués de flave, dessus du corps glabre, noir avec des dessins flaves ou jaunâtres; pattes diversement rousses, cuisses maculées de blanc. Tête robuste, à ponctuation assez forte, rapprochée, ayant de nombreux dessins jaunes entre et devant les yeux. Thorax peu court, rétréci en avant, à ponctuation assez forte et plutôt écartée, bordé de jaune sur les côtés et antérieurement, plus étroitement sur le milieu antérieur ayant un prolongement médian long avec deux courtes lignes claires sur la base. Ecusson noir. Elytres un peu plus larges que le thorax, peu longs, irrégulièrement ponctués, noirs, bordés presque complètement de flave ou jaunâtre avec, en surplus, sur chacun, les dessins clairs suivants : des macules postérieures externes, une ligne discale non régulière et presque complète, des lignes antérieures internes abrégées, les parties claires étant en partie ponctuées de points noirs. Long. 3 mill. M<sup>l</sup> Alaric (ex Gavoy). — Sans doute à rapporter à *pallidulus* Suf. comme sous-espèce. Caractérisé par la sculpture et les dessins particuliers des élytres.

**P. pallidulus** v. n. *molloensis*. Elytres, moins une étroite bordure noire, à fond clair flave et ayant une large bande présuturale noire, et 3 macules latérales superposées sur chaque élytre. Epimères pâles. Pattes non marquées de noir. Prats de Mollo.

**P. hypophaes** v. n. *pratsensis*. Dessin élytral analogue à la var. précédente avec la différence que la bande noire est jointe à la macule postérieure externe noire. En surplus, comme différences, épimères noirs et pattes marquées de noir. Localité précédente.

**Falsoanthocomus metallicus** n. sp. [Malachide]. Oblong-allongé, très brillant, métallique, avant-corps violacé, élytres verts ayant postérieurement un mélange variable de couleurs bleue, dorée et pourprée, tout au moins diversement pourprés, ces organes étant multiimpressionnés et fortement costés sur le disque. Membres plutôt testacés. Long. 3 mill. Madagascar. Aussi Museum de Paris. — Espèce caractérisée par sa coloration jointe à sa structure élytrale excavée et carénée.

**Dromanthus Theresæ** n. sp. [Malachide]. Oblong-allongé, avant-corps un peu brillant, élytres presque mats, noir, devant de la tête à partir des antennes et thorax jaunes, celui-ci orné d'une bande médiane noire élargie en arrière; antennes noires, dessous des premiers articles clairs; pattes largement roussâtres. Tête multiimpressionnée entre les yeux. Thorax court et large, un peu rétréci en arrière, presque de la largeur des élytres, ceux-ci assez longs, subarrondis à l'extrémité, à suture et rebord relevés, ayant une ponctuation fine et dense. Long. 5 m. Merida. — Voisin de *testaceicollis* Pic, mais thorax marqué de noir, tête plus claire en avant et élytres plutôt mats.

**D. Clermonti** n. sp. Oblong-allongé, brillant, hirsute, noir, thorax avec une bande médiane noire (*forme typique*), parfois divisée en macules (*v. divisus*), membres noirs, premiers articles des antennes à peine marqués de roux. Tête biimpressionnée entre les yeux. Thorax subarqué sur les côtés, à peu près de la largeur des élytres, ceux-ci pas très longs, élargis postérieurement, à suture un peu relevée, ponctuation un peu fine et dense. Long. 5,5 m. Brésil: Hansa. — Voisin du précédent, avec les élytres brillants et moins finement ponctués, le dessin noir du thorax réduit.

**Manizalesum** n. g. [Malac.]. Antennes longues, aplaties, à articles 3 et suivants angulés au sommet. Thorax avec une callosité latérale. Elytres costés. — Voisin de *Plectonotum* Gorb. par la sculpture thoracique, mais s'en distingue par la structure antennaire et les élytres nettement costés. Genre établi pour l'espèce nouvelle suivante.

**M. costatum** n. sp. Allongé, subparallèle, presque glabre, avant-corps très brillant, élytres moins, noir, élytres à suture et sommet orangés, membres foncés, derniers articles des antennes clairs; cuisses teintées de roussâtre. Tête courte, rétrécie en arrière, yeux saillants, plus étroite que le thorax, celui-ci large, très inégal en dessus et un peu granuleux. Élytres peu plus larges que le thorax, longs, parallèles, finement et densément granuleux, ayant chacun 3 côtes discales, la partie jaune apicale de ces organes remontant sur les côtés et entre les côtes 2 et 3. Long. 8 m. Manizales.

**Podabrus sikkimanus** n. sp. [Malac.]. Allongé, étroit, peu brillant, pubescent de gris, noir, dessus jaune, thorax ayant une ligne discale noire raccourcie, membres foncés. Tête plus large que le thorax, rétrécie postérieurement; antennes un peu aplaties. Thorax assez long, un peu rétréci en avant, faiblement sinué. Elytres longs et étroits, ayant des granulations peu denses. Long. 9 m. Sikkim. — Voisin de *parallelus* Chp., mais en différant par le thorax ayant une ligne médiane noire et les pattes foncées.

J'ai décrit en 1922 le *Silidius magniceps*, de l'Erythrée, sur un sujet un peu défraîchi, décoloré et, en surplus, la description a été mutilée (à l'impression) des mots *apice piceis*, se rapportant aux élytres; normalement, l'espèce a les élytres largement et nettement noirs à l'extrémité et l'avant-corps est tout noir, ou peu marqué de clair sur les côtés du thorax; comme son nom l'indique, la tête est grosse.

**Javaesilis** n. g. [Malac.]. Antennes particulières, non grêles, ayant le 4<sup>e</sup> article d'une forme spéciale, celui-ci épaissi, globuleux à la base et muni au sommet externe

d'un lobe un peu pointu. Thorax simplement sinué latéralement, sans incision marquée. — Voisin du genre *Silis* Charp. Le double caractère du thorax et de la structure des antennes caractérise le genre créé pour l'espèce nouvelle suivante.

*Javaesilis specialicornis* n. sp. Allongé, subparallèle, brillant, hirsute, dessous du corps paraissant foncé, avant-corps roux, écusson et élytres noirs. Antennes noires, à premiers articles roussâtres en dessous, ayant le 3<sup>e</sup> article plus long que le 2<sup>e</sup>, élargi au sommet, le 4<sup>e</sup> particulier, 5<sup>e</sup> épais et creusé, suivants peu épais et longs. Tête avec les yeux saillants un peu plus large que le thorax, impressionnée entre les yeux, peu ponctuée. Thorax un peu plus long que large, sinué sur les côtés, bisinué à la base, un peu plus étroit que les élytres, inégal en dessus, en partie lisse. Elytres assez longs, subparallèles, subarrondis à l'extrémité, à ponctuation ruguleuse dense. Pattes largement roussâtres avec quelques parties un peu rembrunies. Long. 6 mill. Java : Monts Djampang (coll. Oberthur).

*Platynoptera peruviana* v. n. *Mathani* [Cleride]. La coloration apicale bleue des élytres, infléchie sur les côtés, remonte, par contre, un peu sur la suture. Colombie (coll. Oberthur).

(A suivre.)

M. Pic.

## A propos du genre *Stibara* Hope (suite)

Avant de rien publier, j'ai écrit au Dr Breuning pour le prier de revoir de plus près certains *Stibara* Hope, étant donné que je ne partageais pas sa façon de voir en plusieurs cas. Et voici, plus loin, ce qu'il m'a répondu (à propos de deux noms seulement) pour les insectes désignés par lui sous les noms de *tricolor* F. et *dichroma* Ths.

Voyons d'abord le premier nom, c'est-à-dire *tricolor* F. J'avais élevé une vive protestation *in litteris* au sujet du nom de *multiplicata* Pic, se rapportant à un insecte bicolore, réuni à un insecte nommé *tricolor* F. Et voici la réponse à ce sujet : « J'ai reçu des indications assez précises de la part du musée de Copenhague, ainsi que de très bonnes photos et c'est sur ces données que je me suis basé. » Ces mots représentent l'exposition d'un fait et non la justification de la synonymie établie, qui ne peuvent pas modifier ma façon de juger, c'est-à-dire que mon insecte *multiplicata* ne se rapporte pas à la description du *tricolor* F.

Voyons le cas de *dichroma* Ths. Je n'admettais pas la synonymie de Breuning concernant *grisescens* Pic (insecte ayant les élytres entièrement noirs) avec *dichroma* Ths. (ne les ayant pas, suivant sa description).

(A suivre.)

M. Pic.

Le Gérant : E. REVERET.