



L'Échange, Revue Linnéenne

Coléoptères du globe (suite) ⁽¹⁾

Xeniscus nigronotatipes v. n. **Gaujoni** [Malac.]. Tête noire, thorax concolore clair, élytres jaunes à base peu largement marquée de noir. Équateur : Loja. Type (coll. Pic) ; paratypes (M. Paris, c. Pic). — Se distingue de la forme typique par le thorax non marqué de foncé.

Dromanthus griseus n. sp. [Malac.]. Oblong-allongé, peu brillant avec les élytres plutôt mats, hirsute, noir, élytres un peu grisâtres, épistome et dessous des 1^{ers} articles des antennes testacés, thorax jaune à bande discale noire assez large, pattes entièrement et antennes largement noires. Antennes assez longues, un peu épaisses avec les articles en partie dentés. Tête biimpressionnée entre les yeux, nettement ponctuée. Thorax court et large, subarqué sur les côtés, presque de la largeur des élytres. Elytres assez longs, un peu atténués à l'extrémité, à suture et bord latéral surélevés, finement et densément ponctués. Long. 5 mill. Mauzaneles. — Peut se placer près de *lateralis* Pic, s'en distingue par la forme plus allongée, l'aspect moins brillant, le thorax largement noir sur son milieu et les élytres sans bordure claire.

Maronius biimpressus n. sp. [Malac.]. Un peu allongé, presque opaque, noir fuligineux avec le sommet des élytres marqué de jaune. Antennes noires avec les 1^{ers} articles tachés de clair en dessous, longues, grêles. Pattes en partie rembrunies avec les cuisses plus ou moins claires. Tête grosse, avec les yeux très saillants bien plus large que le thorax, profondément creusée entre les yeux, à ponctuation dense. Thorax presque carré, nettement rebordé, à 2 larges impressions postérieures et une autre antérieure médiane, finement et densément ponctué. Elytres peu plus larges que le thorax, très déhiscentes, à ponctuation ruguleuse dense et fine. Long. 6 m. Pérou. — Ressemble à *obscurus* Pic, moins robuste et très caractérisé par les fortes impressions de l'avant-corps, avec la tête plus grosse.

Discodon elongatum n. sp. Étroit et allongé, un peu brillant, à pubescence grise. noir, côtés du thorax largement orangés, élytres orangés avec une courte bande suturale antérieure noire et, sur chaque étui, une macule discale allongée noire. Antennes grêles. Thorax presque carré, un peu plus étroit que les élytres, faiblement sinué latéralement. Elytres longs, sinués, à ponctuation granuleuse dense. L. 10 m. Pérou. — Espèce très caractérisée par sa forme allongée conjointement à son système de coloration.

D. Bolivari n. sp. Oblong-allongé, brillant, pubescent de gris, noir, avec le thorax bordé de clair, l'écusson testacé, les élytres rembrunies avec la suture étroitement,

(1) Les types sont en principe au Museum de Paris, dans la collection Oberthur : des indications seulement seront données pour les formes dans ma collection.

les côtés et le sommet largement testacés ; membres noirs, cuisses largement rousses à la base. Antennes assez grêles. Thorax assez court et un peu large, plus étroit que les élytres, sinué latéralement avec une entaille latérale très prononcée ♂, faible ♀. Elytres assez longs, faiblement élargis après le milieu et courtement atténués à l'extrémité, munis d'une dépression longitudinale présuturale plus forte vers la base. à ponctuation fine, irrégulière. L. 8-9 m. Equateur. Aussi c. Pic. — Espèce caractérisée par sa dépression présuturale.

D. lateflavofasciatum n. sp. Allongé, subparallèle, pubescent de gris, un peu brillant, paraissant obscur en dessous. Tête noire avec les parties buccales flaves, celle-ci très robuste ; antennes noires, aplaties, avec presque tous les articles impressionnés. Thorax jaune, celui-ci assez large, subarqué en avant et nettement incisé de chaque côté. Ecusson foncé. Elytres roux, ornés d'une large fascie transversale prémédiane sinuée blanche, ces organes peu longs, impressionnés vers la suture. L. 8 mill. Balgamba. — Espèce voisine de *flavocinctellum* Delk. et très distincte par sa bande élytrale flave.

Silidius incertus (nouv.). Allongé, brillant, dessous largement roussâtre, avant-corps roux, écusson et élytres jaunâtres, ces derniers courtement et un peu obliquement noirs au sommet. Membres noirs, base des cuisses largement claire. Tête de la largeur du thorax ; antennes grêles et assez longues. Thorax assez large, sinué latéralement, à peine échancré sur les côtés près de la base, impressionné et inégal en dessous. Elytres plus larges que le thorax, longs, subparallèles, finement et densément ponctués. L. 9 mill. Congo. (coll. Pic). Peut-être simple var. de *Graueri* Pic, que je n'ai plus sous les yeux, et s'en distinguant au moins par la tête entièrement rousse.

Silidius nigrolateapicaiis n. sp. ♀ [Malac.]. Assez allongé, un peu brillant, noir, tête, sauf parties buccales, thorax (un peu rembruni au milieu), écusson et un peu plus de la moitié basale des élytres orangés, membres noirs, extrême base des cuisses rousse. Tête large, avec les yeux à peu près de la largeur du thorax ; antennes peu longues et grêles. Thorax assez court et large, subarqué en avant, à peine échancré de chaque côté, près de la base, à impression discale postérieure. Elytres plus larges que le thorax, pas très longs, subparallèles, à ponctuation très fine et dense, avec la partie apicale noire irrégulière en avant. L. 9 mill. Congo (coll. Pic). — Se rapproche de *Anceyi* Pic. mais la partie noire des élytres est plus étendue, le thorax est moins large.

Silidius costatus v. n. *diverseniger*. Etroit, noir, thorax orangé sur les côtés, plus largement en arrière, avec les élytres orangés sur un peu plus de la moitié basale, la partie postérieure noire étant oblique et sinuée en avant en remontant un peu et étroitement sur la suture. Congo : Kivu (coll. Pic). — La partie noire apicale des élytres est différente de celle de la forme typique.

Strangalia 4-fasciata ab. n. *amanusensis* [Longic.]. La coloration noire est très étendue sur les élytres, qui ont sur chacun les dessins jaunes suivants : une grande macule basale préscutellaire, une autre petite externe (non visible du dessus) et 3 fascies étroites de même coloration. Syrie (coll. Pic). Dessins jaunes des élytres plus réduits que chez forme typique.

Dans la *Fauna C.S.R.* traitant les Longicornes, qui vient de paraître, le grand spécialiste de Prague, Leo Heyrovsky, a (p. 126, fig. 8) attribué à l'ab. *Mesmini* Pic, de *Strangalia aurulenta* F., un dessin qui n'est pas exact, mais en représente un inédit caractérisé par sa 3^e fascie jaune munie d'une étroite ligne transversale noire et qui peut prendre le nom de *angustenigrofasciata*. L'ab. *Mesmini* vera a la même fascie jaune divisée en deux, sur chaque élytre, par un trait longitudinal noir.

Dans le même ouvrage, pour *St. 4-fasciata* L., l'ab. *morvandica* Pic (p. 127, fig. 5) est très différente de coloris de la vraie *morvandica* Pic et devra prendre un nom spécial, je propose celui de *falsomorvandica*. L'ab. *morvandica* Pic a les 3 fascies antérieures noires non prolongées sur les côtés latéraux. L'ab. *eibessensis* (L.c.f. 49) n'a pas non plus les dessins du type et devra prendre un nom spécial, je propose celui de *Leoi*. Cette aberration présente, sur un fond noir, et sur chaque élytre, les dessins maculiformes jaunes suivants : 2 macules prébasales réduites, une macule allongée oblique prémédiane, 2 petites macules postérieures superposées. Chez l'ab. *eibessensis* Pic, on voit une grosse macule préscutellaire (une 2^e réduite externe n'est pas visible du dessus), une fascie prémédiane étroite et ondulée, deux macules postérieures superposées.

Agathomerus postmaculatus n. sp. [Phytoph.]. Oblong, brillant, dessous noir et clair, dessus largement noir, tête, thorax (celui-ci à bordure latérale flave), écusson noirs, élytres d'un flave jaunâtre ayant les dessins noirs suivants, sur chacun : une macule basale humérale triangulaire éloignée du bord qui est étroitement clair, une large fascie préhumérale, une macule discale ante-apicale plus large en avant qu'en arrière. Membres noirs. L. 8 mill. Mexique. — Espèce pouvant se placer près de *marginatus* Klug., mais très caractérisée par son dessin noir particulier.

Ag. luteoreductus n. sp. Oblong, brillant, dessous bicolore, en dessus avant-corps noir, devant de la tête et du thorax marqués de roux, écusson noir, élytres noirs avec un étroit rebord antérieur latéral clair et, sur chacun, en surplus d'une bande antérieure sinuée jaune, remontant un peu vers l'écusson, avec une macule anteapicale jaune plus rapprochée de la suture que du bord latéral. Membres en grande partie testacés. L. 10 mill. Sans provenance. — A placer près de *bifasciatus* Klug., dessins des élytres différents et thorax presque tout noir.

Ag. inapicalis n. sp. Oblong, brillant, noir, tête diversement marquée de roux antérieurement et entre les yeux, thorax en majeure partie bordé de clair, élytres ayant deux larges bandes jaunes, l'une près de la base, l'autre avant le sommet, antennes cassées ; pattes testacées avec les cuisses noires. L. 10 mill. Sans provenance. — Plus robuste que le précédent et caractérisé par ses larges bandes claires complètes et presque droites.

Macrolopha major n. sp. [Phytoph.]. Oblong, brillant, ayant des poils blancs espacés, de coloration testacée avec l'extrémité des élytres teintée de flave, antennes, tibias et tarses noirs. Thorax assez court, orné postérieurement, de chaque côté, d'une dent prébasale aplatie et large, à ponctuation fine et écartée. Elytres plus larges que le thorax, peu longs, faiblement étranglés vers le milieu, courtement atténués

à l'extrémité, à ponctuation forte, en partie assez espacée. L. 10 mill. Sierra-Leone. — Voisin de *insignata* Pic, en diffère par les élytres teintés de flave à l'extrémité, les tibias avec les tarses noirs, la taille plus avantageuse.

Callimerus Dureli n. sp. [Cleride]. Etroit et allongé, atténué postérieurement, brillant, noir, dessus à reflets métalliques verdâtres ou bleutés et orné de dessins pubescents jaunâtres, membres testacés, pattes avec des lignes noires aux cuisses ou tibias, les postérieures étant plus largement noires. Les dessins pubescents du dessus comprennent : une macule sur les côtés antérieurs et postérieurs du thorax et, sur chaque élytre : un c basal et sutural, une macule externe, une macule présuturale vers le milieu, une fascie postmédiane faite de 2 macules connées, une macule allongée apicale. L. 11-12 m. Br. Bootang. Aussi c. Pic. — Voisin de *Drescheri* Sch.

Pytocera lineatohumeralis n. sp. [Cleride]. Oblong, brillant, noir, thorax jaune sur les côtes avec une faible ligne médiane claire, élytres noirs, offrant les dessins suivants d'un jaune flave, sur chaque étui : une ligne humérale oblique, partant de la base en passant par les épaules, une bordure latérale allant de la base à la fascie, une fascie postmédiane ondulée pas très large. Antennes avec le 1^{er} article de la massue plus court et plus large que les suivants. Elytres diversement ponctués. Membres noirs. L. 10 m. Teffe. — Espèce d'un dessin élytral très particulier, qui la caractérise au premier coup d'œil.

P. albofasciata n. sp. Oblong, brillant, noir, tête avec une ligne postérieure jaune se prolongeant sur le thorax, écusson jaune, élytres noirs avec, sur chacun, près du milieu, une fascie blanche un peu oblique et sinuée qui n'atteint pas la suture et ayant une macule basale externe plus ou moins longue, membres noirs. L. 10 m. Amazones. Aussi c. Pic. — Espèce se rapprochant de *coronata* Gorh., qui n'a pas de fascie blanche.

Gracilotillus fasciatus v. n. rubrithorax [Cleride]. Tête noire, thorax rouge, élytres à base rousse avec une fascie blanche complète. Trichonopoly.

Evenus Vadoni n. sp. [Cleride]. Allongé, mais pas très étroit, foncé, d'un noir métallique, tête plus ou moins roussâtre, élytres d'un vert métallique, non acuminés, mais brièvement atténués à l'extrémité, à rangées de points fins. Membres testacés. L. 5 mill. Périnet (Type in coll. type, paratype coll. Lebis). — Coloration analogue à celle de *Sicardi* Pic, mais forme moins allongée et élytres plus courts.

Evenus albolateralis n. sp. Etroit et allongé, brillant, dessous testacé, dessus olivâtre et flave, cette dernière coloration étendue largement sur la tête, puis sur les côtés du thorax, ainsi que des élytres. Membres flaves. L. 5 m. Madagascar (coll. Pic). — Espèce bien caractérisée par sa particulière coloration. A placer près de *flavonotata* Pic.

(A suivre.)

M. PIC.

Le Gérant : E. REVERET.