



L'Échange, Revue Linnéenne

Coléoptères du globe *suite*

Discodon bilineatithorax n. sp. [Malac.]. Allongé, subparallèle, peu brillant, pubescent de gris, noir, tête marquée de roux antérieurement, thorax roux avec deux lignes postérieures noires (*forme typique*), ou avec une grande macule discale noire (*var. friburgoense*). Elytres jaunes avec une bande suturale noire s'élargissant vers l'extrémité et progressivement antérieurement, ayant, en surplus, une ligne antérieure externe noire. Membres en majeure partie noirs, parfois cuisses teintées de roux. Tête avec les yeux plus large que le thorax ♂, ou un peu plus étroite ♀, bicolore ; antennes peu grêles ♂ avec quelques articles médians impressionnés, ou grêles et simples ♀. Thorax peu long, sinué latéralement ♂, ou un peu large, aussi sinué ♀, diversement ponctué. Elytres peu longs, subsinués, finement ponctués avec des granules un peu écartées. Long. 9-10 mill, Brésil : Novo-Friburgo. ♂ forme typique in coll. Pic, ♀ (*v. friburgoense*) au Muséum de Paris. — Plus allongé que *bisbicoatum* Pic avec le dessin noir des élytres différent.

Discodon bisbicoatum v. n. *indisjunctum*. Les élytres sont ornés d'une bande suturale noire continue et le sommet est largement noir. Brésil. Type unique au Muséum de Paris.

Discodon subobseuriceps v. n. *chimboense*. Diffère de la forme typique par le thorax moins court, ayant 2 petites lignes discales rousses, sur coloration foncière flave avec la tête moins foncée, rousse ou brunâtre, plus claire en avant. Equateur : Chimbo (Muséum de Paris).

D. subobseuriceps v. n. *chausianum*. Coloration générale du dessus du corps foncée : pattes noires avec la base des cuisses largement claire. Equateur : Pucay (coll. Pic).

Lygisterus nigroreductus n. sp. [Lycide]. Allongé, brillant, avec les élytres plutôt opaques, noir, thorax jaune à macule allongée médiane noire, éloignée du bord antérieur, élytres jaunes avec une petite macule préscutellaire noire et presque la moitié postérieure également noire, membres noirs. Thorax court et large, largement impressionné sur son milieu. Elytres longs, courtement rétrécis à la base, à côtes peu marquées et ponctuation fenestrée petite et dense. Long. 10 m. Brésil : Minas (1). — Caractérisé par le dessin noir réduit du thorax, avec cet organe muni d'une large impression. Peut se placer près de *subparallelus* Pic.

Scelodonta Theresæ n. sp. [Phytophage]. Oblong-brillant, vert métallique, pattes à fond roussâtre et un peu pourprées. Thorax peu large, bien plus étroit que les

(1) Les nouveautés sans indications spéciales sont dans ma collection.

élytres, en partie granulé et plissé transversalement au milieu. Elytres courts, atténués postérieurement, à épaules marquées, ornés de nombreux tubercules émoussés avec portion basale interne plutôt ponctuée et impressionnée. Cuisses épineuses. Long. 4-5 mill. Gabon. — Voisin de *Murrayi* Baly (ex description) et paraissant en différer par la forme moins allongée, le thorax plutôt granuleux que strigueux avec la coloration nettement verte.

La *v. n. cameruna*, du Cameroun, est moins large, avec la sculpture du dessus plus uniforme, surtout sur le thorax.

Scelodonta costatipennis n. sp. Court, subovale, avec la coloration d'un vert métallique, peu brillant, pattes plutôt pourprées. Thorax court et large, arrondi sur les côtés, orné de nombreuses granulations rapprochées, bien plus étroit que les élytres. Elytres très courts et atténués postérieurement, ornés de plusieurs côtes bien marquées et de longueurs diverses avec les intervalles en partie ponctués ou plissés, ayant sur chacun une forte impression externe subhumérale. Cuisses en partie inermes. Long. 4 mill. Gabon. — Voisin de *costata* Jac., en diffère par la coloration générale verte et les élytres munis de côtes diverses.

S. humeralis n. sp. Court et large, très brillant, dessous noir avec les côtés de la poitrine et dessous du thorax très densément pubescents de blanc, dessus vert métallique, pattes pourprées, cuisses un peu dentées. Thorax court et large, subarrondi sur les côtés, bien plus étroit que les élytres, ayant de nombreux plis transversaux fins et rapprochés. Elytres courts, atténués postérieurement, à épaules très saillantes, ayant un mélange de points et de plis courts et rapprochés. L. 6. mill. Ethiopie. — Par sa coloration, rappelle *Raffrayi* Lef., mais d'une toute autre forme et épaules très proéminentes.

Apatophysis Richteri n. sp. [Longicorne] (1). Étroit et allongé, peu brillant, revêtu d'une pubescence fine et courte grisâtre, de coloration générale testacée avec l'avant-corps un peu roussâtre. Tête avec les yeux nettement plus large que le thorax, yeux grands et saillants, un peu écartés, celle-ci densément ponctuée. Antennes grêles, bien plus longues que le corps, filiformes, à articles 3 et 4 longs, à peu près égaux, les suivants diversement plus longs. Thorax assez court et peu large, plus étroit en avant, nettement angulé de chaque côté près du milieu, inégal en dessus, plutôt densément ponctué. Elytres bien plus larges que le thorax, assez longs, atténués postérieurement, subarrondis à l'apex, très finement et densément ponctués. Pattes longues et grêles, tarsi compris. Long. 15 mill. Iran, Belouchistan (W. Richter). — Se rapproche vaguement de *tonkinae* Pic par la structure de son thorax, mais avec une forme tout autre, très étroite, et une coloration plus claire. Sans doute voisin de *modica* Gahan.

Espèce pouvant se classer dans un s.-g. nouveau (*Angustephysis*), caractérisé par sa forme très étroite, sa tête tout à fait large par rapport au thorax, qui est court et assez étroit et les tarsi tout à fait grêles.

(1). Cette espèce et les Longicornes suivants m'ont été communiqués par le D^r Breuning. Les types sont au musée de Stuttgart.

Osphranteria lata n. sp. [Longicorne]. Un peu large, atténué à l'extrémité, légèrement brillant, à fine et courte pubescence grise, bleu, un peu verdâtre par places, membres noirs. Tête à museau assez court, à ponctuation ruguleuse forte et dense, yeux écartés; antennes filiformes, un peu plus longues que le corps, à 3^e article très long. Thorax plus long que large, rétréci en avant et en arrière, à ponctuation granuleuse dense et forte, plus étroit que les élytres. Ecusson triangulaire. Elytres pas très longs, progressivement atténués postérieurement, subarrondis à l'apex, à ponctuation dense et très fine, sauf sur la base, où elle est plus forte, avec des traces de costules discales. Pattes longues, les antérieures plus courtes avec les cuisses un peu épaissies. Long. 25 mill. Iran (Richter et Schaufelé). — Diffère de *coerulescens* Redt. par la forme plus robuste et l'aspect moins terne.

Purpuricenus Schaufelei n. sp. [Longicorne]. Assez robuste, peu allongé, presque opaque, noir, tête en partie rouge postérieurement, thorax entièrement rouge, élytres rouges ayant une bande basale noire peu large et presque droite, postérieurement avec la partie apicale largement noire et subarquée antérieurement. Tête plus étroite que le thorax; antennes plus longues que le corps. Thorax peu long et assez large, très faiblement tuberculé, à ponctuation ruguleuse forte et dense. Elytres peu plus larges que le thorax, assez courts, un peu élargis vers les épaules, à apex faiblement subtronqué, à ponctuation granuleuse peu forte et dense. Long. 15 mill. Iran. Même origine que le précédent. — Voisin de *Haussknechti* White, en diffère par le thorax entièrement rouge, les dessins noirs des élytres différents, non prolongés sur la suture.

Derolus mauritanicus subspec. iranensis [Longicorne]. — Allongé, assez étroit, brillant, revêtu d'une fine pubescence soyeuse grise, noir à transparence roussâtre sur la majeure partie du corps, membres roux. Tête avec les yeux un peu plus large que la partie antérieure du thorax, diversement granuleuse ou ponctuée, sillonnée entre les yeux; antennes pas plus longues que le corps, à 4^e article plus court que 3 et 5, les premiers étant un peu noduleux au sommet et les suivants un peu élargis et subangulés au sommet extérieurement. Thorax long, plus étroit en avant, sinué latéralement, faiblement, mais nettement incisé près de la base de chaque côté, inégal en dessus et orné de quelques plis raccourcis, sillonné transversalement en avant, en partie impressionné sur son milieu et sur les côtés, bien plus étroit que les élytres. Elytres assez longs, subparallèles, un peu atténués à l'extrémité, faiblement tronqués au sommet. Long. 20-21 mill. : Iran, à Granshar (Richter et Schaufelé). Un *paratype* dans ma collection. — Distinct de *mauritanicus* Buq. par la forme plus allongée, le thorax plus étroit, la taille moindre.

La var. nouvelle *angustior* (ex unique de Makran) est très étroite, plus petite de taille, en ayant la tête sans sillon apparent et le thorax à échancrure postérieure nulle. — Long. 14 mill.

Lagria andaiensis n. sp. [Hétér.]. Oblong, avant-corps hirsute et subopaque, roux-testacé, ainsi que le dessous, les membres et l'écusson, élytres verdâtres métalliques, à forte sculpture. Tête courte, à ponctuation forte, rapprochée. Thorax assez court et large, bien plus étroit que les élytres, à forte ponctuation dense. Elytres peu larges, atténués à l'extrémité, à forte ponctuation rapprochée. Long. 7-8 mill. Nouvelle-Gui-

née : Andai. — Par sa coloration ressemble à *S. hirticollis* Borch., en diffère nettement par le thorax plus large, à ponctuation forte et dense, les élytres métalliques et à plus forte sculpture.

Mimocelenopalpus bilineaticollis n. sp. [Hétér.]. Etroit et allongé, peu brillant, pubescent de gris, testacé, thorax orné, de chaque côté, d'une bande longitudinale raccourcie foncée, élytres d'un noir gris, en partie bordés de clair, suture plus largement claire antérieurement ; pattes rousses, sommet des cuisses et genoux foncés. Avant-corps plutôt étroit, dernier article des palpes subtriangulaire, antennes grêles. Elytres plus larges que le thorax, assez longs, atténués à l'extrémité, finement et densément ruguleusement ponctués. Long. 10 mill. Nouvelle-Guinée. — Très différent de *bicoloriceps* Pic par le dernier article des palpes large et plus anguleusement échancré avec une coloration très différente.

Evenus latior n. sp. [Cleride]. Grand, allongé mais non étroit, peu brillant, foncé, dessus à avant-corps verdâtre-métallique et élytres d'un vert bleuté, ceux-ci plus larges que le thorax, assez longs, courtement atténués à l'extrémité, ayant de faibles stries et une ponctuation dense. Membres testacés. Long. 8 mill. Madagascar (ex Vadon). — Espèce particulière par sa forme moins étroite que d'ordinaire, jointe à sa taille avantageuse.

Myrmecomea bigibbosa n. sp. [Cleride]. Allongé, un peu étranglé postérieurement, mat, noir, élytres, vers le milieu, avec une bande raccourcie étroite, un peu oblique, blanche, ayant, sur chaque étui, une gibbosité élevée basale, faiblement déprimés avant le sommet, avec la portion apicale peu bombée. Membres foncés. Thorax globuleux, à ponctuation granuleuse dense. Elytres à rangées de gros points sur la base, postérieurement à ponctuation fine, irrégulière. Long. 6 mill. Madagascar (ex Vadon). — Espèce caractérisée par ses gibbosités basales très élevées conjointement à sa coloration générale noire, sauf une bande éburnée raccourcie et oblique.

Platynoptera peruviana v. n. **lineatithorax**. Le thorax a une ligne claire discale, la suture est marquée de foncé sur la base et les élytres sont postérieurement très largement métalliques. Pérou (Coll. Oberthur et Pic).

P. testaceiceps v. n. **diversiceps**. Tête largement marquée de noir vers les yeux, pattes antérieures plus foncées, élytres avec la coloration postérieure noire plus remontante que chez le type. Brésil (Coll. Oberthur et Pic).

P. ampliata v. n. **insignata**. Les élytres noirs dans leur ensemble sont dépourvus de dessins clairs discaux. Brésil.

Masostethus dimidiatus v. n. **innotaticeps** [Phytophage]. Roux avec les élytres largement obscurcis postérieurement, les antennes étant noires. Cayenne (coll. Oberthur et Pic). — La forme typique a la tête marquée de foncé.

(A suivre.)

M. Pic.