

L'ÉCHANGE

Revue Linnéenne

FONDÉE PAR LE DOCTEUR JACQUET

Organe mensuel des Naturalistes de la Région Lyonnaise et du Centre

CONTENANT LES DEMANDES D'ÉCHANGE

D'ACHAT OU DE VENTE DE LIVRES ET DE TOUT AUTRE OBJET D'HISTOIRE NATURELLE

M. PIC (C. I. P.), Directeur

Membre correspondant du Museum de Paris

COMITÉ DE RÉDACTION OU COMITÉ D'ÉTUDES

BERTHOUMIEU — Capitaine XAMBEU

Berthoumieu, abbé, 3, rue de l'Épargne, MOULINS.
— *Ichneumoniens*.J. Clermont, 162, rue Jeanne-d'Arc prolongée, PARIS
(13^e). — *Aphodius paléarctiques*, *Histériides* français.L. Davy, à FOUGÈRES par CLÉVES (Maine-et-Loire). —
Ornithologie.J. Sainte-Claire-Deville, à PARIS. — *Hydrophilides*
de France. — *Staphylinides* du bassin de la Seine.
— *Coleoptères* de Corse.Maurice Pic, DIGOIN (Saône-et-Loire). — *Coleoptères*
d'Europe, *Melyridae*, *Pitridae*, *Nanophyes*, *Anthi-*
cidae, *Pedilidae*, etc. du globe. — *Cerambycides* de
la Chine, du Japon, etc. *Cryptocephalides paléar-*
ctiques. *Malacodermes* du globe.A. Dubois, rue Ernestine, villa Euréka, FONTAINE-
BLEAU, (Seine-et-Marne). — *Coleoptères*.A. Hustache, à LAGNY (Seine-et-Marne) : *Apten* et
Ceuthorrhynchus de France.A. Méquignon, 88, rue Bannier, à Orléans, *Coleop-*
tères de France (*Curculionides* exceptés).

ADRESSER TOUTES COMMUNICATIONS CONCERNANT LA RÉDACTION ET LES ÉCHANGES

A. M. M. PIC, à Digoïn

Celles concernant les Abonnements et les Annonces, à l'Imprimerie AUCLAIRE, à Moulins

(10 Octobre 1915)

SOMMAIRE

Notes diverses, descriptions et diagnoses, par M. Pic (suite).

Une localité nouvelle de *Mantis Religiosa* L. variété brune, par
Paul PIONNEAU.

Ichneumoniens du Beaujolais, par M. Pic.

Diagnoses de nouveaux genres et nouvelles espèces de « Scaphi-
diides », par M. Pic (suite).PRIX D'ABONNEMENT: UN AN, A PARTIR DU 1^{er} JANVIER

France, 5 francs. | Étranger : 6 francs.

MOULINS
IMPRIMERIE ÉTIENNE AUCLAIRE
ANCIENNE MAISON CH. DESROSIERS

ANNONCES

La page 16 fr. | Le 1/4 de page. 5 fr.
 La 1/2 page 9 fr. | Le 1/8 de page. 3 fr.

Réduction de 25 % pour les insertions plusieurs fois répétées

TARIF SPECIAL POUR LES ANNONCES ANNUELLES

TARIF DES SEPARATA

	25 EX.	50 EX.	100 EX.
16 pages	6 fr. 50	8 fr. »»	10 fr. »»
8 pages	4 »»	5 »»	6 50
4 pages	2 50	3 »»	4 »»
Couverture blanche	» 75	1 25	2 »»
Couverture imprimée	3 50	4 50	6 »»

Pour les separata les auteurs doivent s'adresser directement à l'imprimerie.

EN VENTE

Chez l'auteur : Maurice Pic, à Digoin (Saône-et-Loire) : 1° **Matériaux pour servir à l'étude des Longicornes**, ouvrage ayant obtenu, en 1911, le prix Dollfus.

Cet ouvrage, commencé en 1891, comprend une série de fascicules ou cahiers dont les premiers sont presque épuisés. Le prix varie suivant les fascicules, celui des anciens étant plus élevé ; les plus récents peuvent être cédés au prix de 3 fr. 50 le fascicule, port non compris. Le dernier cahier paru, c'est-à-dire la deuxième partie du 9° cahier, a été distribué aux souscripteurs dans le courant de février 1915.

On peut céder quelques collections, avec le 1° cahier réimprimé, à des prix modérés. Envoi de l'ouvrage contre remboursement, ou après réception de son prix.

2° **Mélanges Exotico-Entomologiques** comprenant actuellement 15 fascicules (le dernier a paru le 10 juillet 1915), au prix de 2 fr. le fascicule port non compris. Réduction de prix pour la collection complète.

"Miscellanea Entomologica"

Revue entomologique internationale

Abonnement annuel (12 numéros). 6 fr.
 Abonnement aux annonces seules. 2,50

Direction et Rédaction : E. BARTHE
 Professeur, route d'Alais, 23, Uzès (Gard).

AU BUREAU DE L'ÉCHANGE

Prix : 2 francs le fascicule

Mélanges Exotico-Entomologiques

Par M. PIC

- 1° fascicule (10 novembre 1911)
- 2° et 3° fascicules (10 février-avril 1912).
- 4° fascicule (18 septembre 1912).
- 5° fascicule (25 mars 1913).
- 6° fascicule (12 juillet 1913).
- 7° fascicule (30 septembre 1913). Etc.

L'Échange, Revue Linnéenne

Notes diverses, descriptions et diagnoses

(Suite.)

Dromius 4-maculatus var. Viturati Pic. — Voici la diagnose latine de cette variété qui a été publiée en 1912 (*Bul. Soc. Hist. Nat. Autun*, p. 100) (1).

Elytris nigris, in disco longe et longitudinaliter testaceo lineatis. — Les macules testacées séparées, existant chez la forme type, sont, chez cette variété, réunies 2 à 2 sur chaque élytre, formant ainsi une bande longitudinale à contours irréguliers.

Dapsa (Phylira) trimaculata v. nov. subfasciata. — Elytris testaceis, postice in disco nigro fasciatis. Marseille (coll. Pic).

Les élytres ont, au delà de leur milieu, une bande noire commune, isolée des bords, celle-ci arquée en avant et prolongée en arrière sur la suture.

Dapsa trimaculata v. nov. unimaculata. — Elytris testaceis, ad suturam postice nigro maculatis. France Méridionale : Marignane (Sieveking in coll. Pic).

Cette variété est très distincte par la présence d'une seule macule noire placée sur la suture.

Anthicus coniceps v. nov. subopacicollis. — Capite thoraceque dense punctatis, illo subopaco. Tunisie : Sousse. Communiqué par le D^r Normand, ainsi que l'espèce suivante.

Distinct de la forme type par la ponctuation très dense, surtout sur le prothorax, de l'avant-corps. Correspond à la var. *punctatithorax* Pic, de *A. longipilis* Bris.

Anthicus Normandi n. sp. ♀ — Oblongus, subconvexus, nitidus, griseo sat sparse pubescens, niger, tibiis ad basin tarsisque pro parte testaceis.

Oblong, un peu convexe, brillant, revêtu d'une pubescence grise, assez écartée, noir à reflets un peu plombés, avec la base des tibias et partie des tarses testacées. Tête grosse, assez longue, subarquée postérieurement, fortement et assez densément ponctuée ; antennes subfiliformes, à dernier article long, acuminé ; prothorax peu plus long que large, un peu dilaté-arrondi en avant, à fossette basale pubescente nette, à ponctuation forte, rapprochée surtout en avant ; élytres bien plus larges que le prothorax, assez longs, un peu rétrécis et subarrondis au sommet, à ponctuation ruguleuse, assez fine et écartée ; pygidium un peu saillant ; pattes robustes. Long. 5 mill. environ. Tunisie : Le Kef (D^r Normand).

(1) Une erreur a fait imprimer comme nom de genre *Agonum* au lieu de *Dromius* Bon. Puisque je suis dans les corrigenda, je signale deux coquilles dans un autre de mes articles (*Misc. Ent. XXIII*, p. 2, 3^e paragr.) : il faut lire Arag. (nom d'auteur), au lieu de Rag., et noire au lieu de vive.

Voisin de *A. torsticelis* Mars., en diffère par les tibias bicolores, la pubescence uniforme et moins soyeuse, la ponctuation plus forte de l'avant-corps, etc.

Leptura (Strangalia) 7-punctata v. nov. *atrosuturalis*. — Thorace bicolore, testaceo et nigro, elytris antice multi maculatis, sutura nigra (1). Morée (coll. Pic).

Le dessin des élytres comprend antérieurement une macule suturale commune et, sur chacun, 2 macules (transversalement disposées) voisines, dont une discale, l'autre externe, sur le repli.

Leptura (Strangalia) 7-punctata v. nov. *Roberti*. — Thorace nigro, elytris antice multi maculatis, sutura nigra. Transsylvanie et Turquie (coll. Pic).

Analogue comme dessins élytraux à la variété précédente, mais prothorax entièrement foncé, au lieu d'être en partie testacé roussâtre.

Leptura (Strangalia) 7-punctata v. nov. *gasturica*. — Thorace rufo-testaceo, elytris testaceis, cinq nigro maculatis, apice vage rufescente. Corfou : Gasturi (Pic).

Cette variété n'a pas le sommet des élytres noir et présente cinq macules noires : une antérieure suturale commune et, sur chacun, une macule médiane et une autre antéapicale externes.

(A suivre.)

M. Pic.

UNE LOCALITÉ NOUVELLE DE « MANTIS RELIGIOSA » L.

Variété brune

Par Paul PIONNEAU.

Si la *Mantis Religiosa* (forme type) est très commune dans certaines régions de la France et particulièrement dans le Midi, il n'en est pas de même de sa variété brune, qui est, à mon avis, beaucoup plus rare. Celle-ci a cependant été signalée dans un certain nombre de localités.

Je dois dire que *Mantis Religiosa* et sa variété brune ont été observées par M. Henri Danède dans un département non encore cité jusqu'à ce jour, celui de la Dordogne. Plusieurs échantillons ont été recueillis par notre collègue aux environs de Nontron, à 1 kilomètre de la ville, sur les collines calcaires bien exposées au soleil. L'espèce et la variété seraient communes à cet endroit. En terminant cette notice je ne crois pas inutile de rappeler ici quelques-unes des localités où a été capturée la variété brune :

Toulouse (Clermont) ; Foix (Langlosse) ; Mont-Aimé, près des Vertus, Rilly, près Reims (Bellevoye) ; Sens (Houlbert) ; Perpignan (Combes) ; Aix-les-Bains (Agassiez) ; Dun-sur-Auron (Faure), etc. (2).

(1) Les autres dessins noirs des élytres, chez cette variété et la suivante, sont ordinaires, c'est-à-dire composés sur chaque élytre de : une macule médiane externe, une macule ou fascie antéapicale, une autre apicale.

(2) Consultez à ce sujet Maurice Lambertie : *Sur la Mantis Religiosa* var. brune dans la Gironde, *Bulletin Société Linnéenne* (Bordeaux, mars 1910).

Ichneumoniens du Beaujolais

Lors d'une petite excursion entomologique de trois jours, entreprise à la fin de juillet dernier, dans les environs de Poule et à Belleroche (principalement du côté du Mont-Pinay, un des contreforts des Monts du Beaujolais), la saison étant un peu avancée pour la chasse aux coléoptères, j'ai tenté de récolter plutôt des Ichneumoniens. Mes chasses ont été maigres, sans doute par suite d'un temps couvert peu favorable ; malgré cela, j'ai pu capturer plusieurs variétés nouvelles. On trouvera la description (1) des nouveautés à la suite de la courte énumération des espèces et variétés récoltées et que j'ai pu identifier sans trop de peine.

Ichneumon pictorius v. nov. luteoannulatus ♂. Poule. Pedibus pro parte nigris, pro parte luteis.

<i>Ichneumon leucocerus</i> Grav. var.	Poule (Rhône).
<i>Ichneumon scutellator</i> Grav.	Belleroche (Loire).
<i>Ichneumon latrator</i> F. var.	Poule.
<i>Ichneumon simulans</i> Tischb.	Poule, Belleroche.
<i>Ichneumon computatorius</i> Wesm.	Belleroche.
<i>Ichneumon gracilicornis</i> Grav.	Poule, Belleroche.
<i>Ichneumon gracilentus</i> Wesm.	Belleroche.
<i>Ichneumon varipes</i> Grav.	Poule, Belleroche.
<i>Ichneumon sanguinator</i> Rossi.	Poule.
<i>Ichneumon nigritarius</i> Grav.	Poule, Belleroche.
<i>Ichneumon fabricator</i> F.	Poule, Belleroche.
<i>Ichneumon annulator</i> F.	Poule.
<i>Ichneumon ? dissimilis</i> Grav.	Poule.
<i>Ichneumon defraudator</i> Koch.	Poule, Belleroche.
<i>Amblyteles castanopygus</i> Grav.	Poule, Belleroche.
<i>Amblyteles palliatorius v. nov. rufotriangularis</i> ♀, Poule. Abdomine nigro, segmentis 2° et 3° lateraliter rufo notatis, 6° et 7° albo marginatis.	
<i>Dicælotus pumilus</i> Grav.	Poule, Belleroche.
<i>Dicælotus pusillus</i> Holm. var.	Poule.
<i>Diadromus ? arrisor</i> Wesm.	Poule.
<i>Diadromus troglodytes</i> Wesm.	Poule.
<i>Phæogenes planifrons</i> Wesm.	Belleroche.
<i>Phæogenes tenuis</i> Berth.	Poule.

Ichnogaster albibuca v. nov. atriventris ♀, Poule. Thorace pro parte rufo, pro parte nigro, abdomine nigro, scutello postscutelloque luteis.

Je termine ce petit article par les descriptions françaises des trois variétés jugées nouvelles.

Ichneumon var. luteoannulatus. — Chez cette variété la face est d'un blanc jaunâtre avec le milieu noir, le scape est maculé de jaune, l'écusson blanc, il y a une ligne blanche devant et sous les ailes, le reste du corps et les antennes étant noirs ; les

(1) La diagnose latine sera tout d'abord donnée dans l'énumération.

quatre pattes antérieures sont jaunâtres avec la base des cuisses et le sommet des tibias en dessus noirs, les tarses intermédiaires sont bicolores, les pattes postérieures sont noires avec la moitié basale des tibias jaune. Cette nouvelle variété est caractérisée par les antennes non annelées de blanc, la face bicolore et les pattes en partie jaunâtres.

Amblyteles var. rufotriangularis. — Voisin de la var. *spoliator* Wesm. (1). Le 3^e et le 2^e segment de l'abdomen sont triangulairement marqués de roux sur fond noir, en outre la coloration rousse est étendue transversalement sur la base du 2^e.

Ichnogaster var. atriventris. — Cette variété diffère de *I. abibuca* Krich., au moins par la coloration différente, l'abdomen n'ayant pas les segments intermédiaires bordés de pâle (les derniers segments sont brièvement maculés de blanc) ; le postécusson est jaune, les joues sont brièvement, et peu distinctement, marquées de clair.

M. PIC.

Diagnoses de nouveaux genres et nouvelles espèces de Scaphidiides

(Suite)

PAR M. PIC

Scaphidium bifasciatum n. sp. Niger, antennis ad basin rufis, elytris ad basin late et ad apicem breve rufo-testaceo fasciatis. Long. 4 mill. Malacca.

Peut se placer près de *Chapuisi* Gestro, celui-ci a la base des fémurs rousse, tandis que chez *bifasciatum* les fémurs sont tout noirs.

S. javanum n. sp. Niger, antennis ad basin rufis, elytris ad basin late et ad apicem breve rufo-testaceo fasciatis, fasciis ad suturam junctis. Long. 4 mill. Java.

Très voisin du précédent, mais la fascie antérieure claire est plus sinuée et se joint à l'apicale près de la suture.

S. notaticolle n. sp. Niger, antennis ad basin, pedibus pro majore parte, abdomine, pygidio thoraceque antice et lateraliter rufis, elytris nigris, antice late apiceque sat breve testaceo maculatis. Long. 4 mill. Bornéo.

Diffère du précédent par les élytres maculés, et non fasciés, de clair, ainsi que par le prothorax moins court et bicolore.

S. atosuturale n. sp. Rufus, antennis ad medium nigris, elytris ad suturam nigro lineatis. Long. 4 mill. Bornéo.

Cette espèce est des plus distinctes par sa forme relativement courte et sa coloration particulière, rousse en dessus avec une bordure suturale noire n'atteignant pas le sommet et un peu élargie à la base, le dernier article des antennes est plus clair au sommet.

S. borneense n. sp. Rufus, antennis apice nigris, elytris in disco fortiter lineato punctatis. Long. 4 mill. Bornéo.

Espèce très distincte par la coloration générale rousse jointe à la ponctuation élytrale. Peut se placer près de *S. unicolor* Cast.

(A suivre.)

(1) Paraît correspondre à la var. 1 de l'*Amblyteles spoliator* de Wesmael (*Tentamen* p. 118).

Avis importants et Renseignements divers

La publication, forcément réduite, de notre journal se continuera, je l'espère. Mais, si quelque impossibilité matérielle arrivait à se produire, son impression pourrait être momentanément interrompue, ou encore l'impression en devenir irrégulière, cela dit pour éviter aux abonnés toute surprise désagréable pour l'avenir. Nous marchons de l'avant dans la plus grande incertitude du lendemain, ce qui fait que, raisonnablement, nulle promesse ne peut être formulée aujourd'hui. Mais espérons, l'espérance est en ce moment la force et la consolation de tout.

Il convient de redire, ce qui a été déjà publié dans les numéros précédents, c'est que, par suite de l'état de guerre, la distribution régulière du journal n'a pu être faite. Plus tard, les numéros perdus seront remplacés sur demande et dans la mesure du possible, et les abonnés à qui rien n'aura pu être envoyé recevront, sur leur réclamation, les numéros nécessaires pour compléter l'année écoulée.

Il ne semble pas prudent d'expédier, jusqu'à nouvel ordre, l'*Echange* dans diverses régions; il y a d'ailleurs impossibilité matérielle de communiquer avec certains pays étrangers.

Les abonnés sont priés, dans le but d'alléger les frais généraux, d'adresser le montant de leur abonnement soit à l'imprimerie Auclair, place de la Bibliothèque à Moulins, soit à M. Pic Maurice, à Digoin (Saône-et-Loire). Les abonnés qui n'auraient pas reçu le journal depuis la déclaration de guerre et qui le désireraient maintenant, devront le réclamer en s'adressant directement à M. Pic, et avertir en même temps s'ils désirent voir continuer leur abonnement pour l'année nouvelle. L'envoi du journal sera fait seulement aux abonnés qui auront versé leur abonnement pour l'année courante.

En principe, seront considérés toujours comme abonnés ceux qui n'auront pas renvoyé les premiers numéros de 1915 ou n'ont pas fait savoir qu'ils se désabonnaient. Il est recommandé particulièrement de signaler *de suite*, à la Direction, tout changement d'adresse pouvant se produire. Cet avis concerne surtout les abonnés actuellement mobilisés.

En vente chez l'auteur, Maurice Pic, le périodique *Mélanges Exotico-Entomologiques* consacré à l'étude des Coléoptères exotiques.

Ce périodique, publié à dates irrégulières, comprend aujourd'hui 15 fascicules (le 15^e vient de paraître) de 16 à 20 pages dont le premier a paru le 10 novembre 1911 et le dernier a été édité le 10 juillet 1915. L'importance de cette publication où sont décrits des genres, espèces et variétés multiples ne saurait échapper à personne et quelques chiffres en donneront une idée approximative. Le 8^e fascicule, paru en 1913, contient la table générale des formes précédemment décrites et qui comprennent 14 genres ou sous-genres, 291 espèces et 53 variétés. Depuis, dans les plus récents fascicules, sont décrits 16 genres ou sous-genres, 376 espèces et 59 variétés. — Les nouveautés appartiennent aux familles suivantes : *Carabidae*, *Staphyridae*, *Scaphidiidae*, *Dermestidae*, *Ptinidae* et *Anobiidae*, *Dasytididae*, *Malacodermes* (diverses sous-familles), *Hétéromères* (diverses sous-familles), *Bruchidae*, *Curculionidae*, *Cerambycidae* et *Phytophages*.

En outre, plusieurs tableaux dichotomiques figurent dans divers fascicules.

M. Maurice Pic, avant de publier un essai dichotomique (en projet depuis quelques années) pour faciliter l'étude du genre *Stagetus* Wol. ou *Theca* M. R., serait désireux d'obtenir, pour mener à bien cette entreprise :

1° Des renseignements biologiques (le plus détaillés possible) sur toutes les espèces du genre.

2° Communication des espèces rares ou litigieuses des collections.

M. M. Pic désire obtenir par voie d'échange, à défaut de recevoir en communication, les trois espèces suivantes : *Theca Andalusica* Aubé, *striatula* Schils. et *conicicollis* Schils. — Il offre en échange : *Theca cribricollis* Aubé, *pellita* Chevr., *Ptinus palliatus* Perris, *italicus* Arag., *obscuricollis* Pic, *Elater ruficeps* M. G., *Cryptocephalus tibialis* Bris. et autres espèces variées de diverses familles.

Notes de chasses

MM. Maurice Pic et Léon Robert ont capturé près de Digoin, en août dernier, dans les détritons non complètement desséchés, ou sur la vase humide d'un creux d'eau tari, entre autres espèces : *Elaphrus riparius* L., *Heterocerus levigatus* Panz., ? *fuscus* Ksw.; *Bledius opacus* Block, *Stenus longipes* Heer, *Paederus fuscipes* Curt. (*longipennis* Er.)

M. l'abbé Sandre a capturé dans les Hautes-Alpes, principalement à Charance près de Gap : *Malachius inornatus* Ksw. et *lusitanicus* var. *australis* Muls. Rey, *Malthinus facialis* var. *maritimus* Pic, *Cantharis figurata* Man., *Lizus ascanii* L., *Cassida ornata* Creutz, *Cryptocephalus rufipes* Goeze (*gracilis* F.), etc.

Le gérant : E. REVÉRET.