Trente-huitième année. — N° 409. 1922.

L'ÉCHANGE
Revue Linnéenne

FONDÉE PAR LE DOCTEUR J[illegible]ET

Organe mensuel des Naturalistes de la Région Lyonnaise et du Centre

CONTENANT LES DEMANDES D'ÉCHANGE
D'ACHAT OU DE VENTE DE LIVRES ET DE TOUT AUTRE OBJET D'HISTOIRE NATURELLE

M. PIC (✿, I. P., O. ✠), Directeur
Membre correspondant du Museum de Paris

COMITÉ DE RÉDACTION OU COMITÉ D'ÉTUDES

J. Clermont, 162, rue Jeanne-d'Arc prolongée, PARIS (13e). — *Aphodiens paléarctiques, Histérides* français.

L. Falcoz, 5, Place de l'Eperon, VIENNE (Isère). — *Cryptophagides, Nitidulides, Cucujides, Erotylides, Phalacrides, Lathridiides.*

J. Sainte-Claire-Deville, à PARIS. — *Hydrophilides* de France. — *Staphylinides* du bassin de la Seine. — *Coléoptères* de Corse.

Maurice Pic, DIGOIN (Saône-et-Loire). — *Coléoptères d'Europe, Melyridæ, Ptinidæ, Nanophyes, Anthicidæ, Pedilidæ*, etc. du globe. — *Cerambycides* de la Chine, du Japon, etc. *Cryptocephalides paléarctiques, Malacodermes* du globe.

A. Méquignon, 86, rue Bannier, à Orléans. *Coléoptères* de France (*Curculionides* exceptés.)

Adresser toutes Communications
Concernant la Rédaction, les Échanges, les Abonnements et les Annonces
A M. M. PIC, à Digoin

(2 Août 1922)

SOMMAIRE

Notes diverses, descriptions et diagnoses, par M. PIC (*suite*).
Contribution à l'étude des Lycides, par M. PIC (hors texte) (*suite*).
Coléoptères exotiques en partie nouveaux, par M. PIC (*suite*).

PRIX D'ABONNEMENT : UN AN, A PARTIR DU 1er JANVIER
France : 5 francs. | Étranger : 6 francs.

MOULINS
LES IMPRIMERIES RÉUNIES
15, RUE D'ENGHIEN, 15

Numérisation Société linnéenne de Lyon

ANNONCES

La page	**32** fr.	Le 1/4 de page.	**10** fr.
La 1/2 page	**18** fr.	Le 1/8 de page.	**6** fr.

Réduction de 25 °/o pour les insertions plusieurs fois répétées

TARIF SPECIAL POUR LES ANNONCES ANNUELLES

PRIX DES SEPARATA

En raison des difficultés actuelles (papiers, matières premières, main-d'œuvre, etc.), les auteurs désirant des « Separata » de leurs articles, voudront bien s'entendre directement avec l'imprimeur.

EN VENTE

Chez l'auteur : Maurice Pic, à Digoin (Saône-et-Loire) : 1° **Matériaux pour servir à l'étude des Longicornes**, ouvrage ayant obtenu, en 1911, le prix Dollfus.

Cet ouvrage, commencé en 1891, comprend une série de fascicules ou cahiers dont les premiers sont presque épuisés. Le prix varie suivant les fascicules, celui des anciens étant plus élevé ; les plus récents peuvent être cédés au prix de 4 fr. 50 le fascicule, port non compris. L'avant-dernier cahier paru, c'est-à-dire la deuxième partie du 9e cahier, a été distribué aux souscripteurs dans le courant de février 1915, depuis a paru (en 1916) la première partie, et (en 1917) la deuxième partie du 10e cahier.

On peut céder quelques collections, avec le 1er cahier réimprimé, à des prix modérés. Envoi de l'ouvrage contre remboursement, ou après réception de son prix.

2° **Mélanges Exotico-Entomologiques** comprenant 14 fascicules anciens au prix de 2 francs : deux autres au prix de 2 fr. 50, enfin 7 autres plus récemment édités, au prix de 3 fr. 50 pièce, port non compris. (Les autres à 4 francs (24 à 27.) Les suivants à des prix divers. Réduction de prix pour la collection complète. Petite majoration pour l'étranger.

"Miscellanea Entomologica"

Revue entomologique internationale

Abonnement annuel (12 numéros). 7 fr.
Abonnement aux annonces seules. 3 fr.

Direction et Rédaction : E. BARTHE
Professeur, route d'Alais, 23, Uzès (Gard).

AU BUREAU DE *L'ÉCHANGE*

Mélanges Exotico-Entomologiques

Par M. PIC

Comprenant actuellement 35 fascicules pouvant se vendre séparément à des prix divers. Réduction de prix pour la collection complète, et petite majoration pour l'étranger. Le dernier fascicule publié porte la date du 10 février 1922.

Numérisation *Société linnéenne de Lyon*

L'Échange, Revue Linnéenne

Notes diverses, descriptions et diagnoses

(*Suite.*)

Lebia brevelimbata n. sp. Oblongus, nitidus, subalutaceus, niger, pedibus, thorace scutelloque, testaceis, elytris nigris, externe minute testaceo marginatis. Long. 6 mill. Sibérie (coll. Pic). — Espèce très distincte par sa coloration en même temps que par la forme de son prothorax, celui-ci étant fortement dilaté transversalement, et les antennes à articles 5 et suivants, longs et un peu épaissis. Les deux derniers caractères peuvent motiver la création d'un nouveau sous-genre que je nomme **Morpholebia.**

Lebia atriceps n. sp. Oblongus, nitidus, rufo-testaceus, capite nigro, antice rufo, antennis apice rufescentibus, elytris postice nigro undulato-fasciatis. Long. 4 mill. Bagdad (coll. Pic). — Voisin de *syriaca* Pic, distinct, à première vue, par la tête foncée.

Lebia cyanocephala L. — Je possède, originaire d'Orange, un exemplaire anormal ayant l'élytre droit non concolore (élytre gauche normal, entièrement vert) mais marqué de roux au sommet.

Choleva macedonica n. sp. Parum elongatus, subnitidus, breve fulvo-pubescens, niger, thorace infra, membris elytrisque testaceis.

Tête pas très courte, un peu plus étroite que le prothorax, celui-ci court, nettement arqué sur les côtés, à ponctuation fine et écartée, angles postérieurs émoussés et peu relevés ; élytres un peu plus larges que le prothorax, rétrécis et séparément arrondis au sommet, nettement, mais finement, striés sur le disque ; trochanters des cuisses postérieures ♂ triangulaires, en forme de cornet au sommet. Long. 6 mill. Macédoine (coll. Pic). — Voisin de *cisteloides* Froh. avec les trochanters différents et le prothorax plus court, nettement arrondi latéralement.

Cantharis violacea v. nov. piceobinotata. Capite rufo, postice nigro notato, thorace rufo, in disco piceo bimaculato, pedibus testaceis, posticis pro parte tarsisque nigris. La Bourboule (coll. Pic).

Malthodes (Maltharcus) Marchii n. sp. Satis robustus, nitidus, niger, pro parte sat late testaceus, capite antice testaceo, thorace testaceo, nigro notato, elytris pro parte testaceis, apice sulphureis, membris testaceis et nigris.

Assez robuste, brillant, noir, largement marqué de testacé, membres bicolores. Tête pas très grosse, noire avec le devant testacé ; antennes longues, noires, à base testacée ; prothorax court, un peu élargi en avant, testacé, maculé plus ou moins de noir de chaque côté antérieurement ; élytres larges et courts, plus ou moins grisâtres, obscurcis par places, à macule apicale jaune soufre ; abdomen simple ♀, chez ♂ à segments dorsaux allongés, le terminal fourchu et terminé par 2 longues lanières, avant-dernier ventral subtriangulaire, dernier en forme de style recourbé et élargi-

Numérisation Société linnéenne de Lyon

échancré au sommet ; dessous du corps en majeure partie jaune ; pattes foncées avec les tibias plus ou moins testacés, surtout chez ♂. Long. 3 mill. Toscane : Mont Cetona (A. Marchi, in coll. Marchi et Pic).

Espèce ressemblant à *cordiger* Ksw. par sa coloration, mais très distincte par sa structure abdominale différente.

M. (Maltharcus) Pirazzolii (Gglb.). Satis robustus, nitidus, piceus, elytris apice sulphureis.

Assez robuste, brillant, foncé, membres compris, avec le sommet des élytres à tache jaune soufrée ; antennes assez longues ; prothorax court et large ; élytres pas très longs ; abdomen simple ♀, avant-dernier segment dorsal ♂ muni en dessous d'un petit appendice, dernier assez étroit et fourchu, avant-dernier segment abdominal à lobes allongés, dernier en forme de style un peu courbé et fourchu au sommet. Long. 3 mill. Italie : Emilia (coll. Pic). — Voisin de ***hexacanthus*** Ksw., membres plus foncés et segments abdominaux un peu différents chez ♂.

Malthodes (Maltharcus) Montandoni n. sp. Satis robustus, nitidus, piceus, elytris aliquot pallidioribus, articulis 2 primis antennarum, capite antice in mare, pedibus pro parte testaceis, abdomine plus minusve luteo aut rufo. Long. 3 mill. Roumanie (coll. Pic). — Le ♂ a les derniers segments dorsaux allongés avec le terminal étroit, le dernier ventral est en forme de style un peu coudé et longuement fourchu au sommet. — La var. nov. **comanensis** ♀ a les antennes foncées, les élytres grisâtres, un peu soufrés au sommet. — La var. nov. **vlascana** ♀ a le prothorax roussâtre. A placer près de ***tokatensis*** Pic.

Danacæa strangulata n. sp. Elongatus, nitidus, supra parum dense albido pubescens, viridi-æneus aut cuprescens, membris testaceis, palpis nigris ; capite parum lato ; thorace transverso, parum elongato ; elytris elongatis, antice et postice attenuatis, humeris nullis. Long. 3 mill. Tunisie : Kebilli (coll. Pic). — Par la disposition de la pubescence prothoracique et la forme du corps tout à fait voisin de ***tripolitana*** Schils., mais dessus brillant, antennes de coloration plus claire, etc.

Danacæa 4-collis v. nov. tunisea. Elongatus, olivaceus, luteo aut griseo pubescens, membris testaceis, palpis nigris ; thorace paulo elongato. Tunisie. — Prothorax moins court que chez la forme typique et corps plus allongé.

Danacæa luteopubens n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, olivaceus, supra sat dense luteo pubescens, infra dense albo pubescens, membris rufis ; capite parum elongato ; thorace breve, lateraliter paulo arcuato ; elytris brevibus. Long. 3 mill. Espagne : Valence. — Par la disposition de la pubescence prothoracique et la forme, voisin de ***Korbi*** Schils., en diffère, à première vue, par la pubescence jaunâtre du dessus du corps.

Amauronia elegans v. nov. infasciata. Elongatus, ænescens, parum pubescens et indistincte fasciatus. Espagne (coll. Pic).

Haplocnemus (Diplambe) baborensis n. sp. Oblongus, robustus, nitidus, minute et sparse punctatus, griseo-hirsutus, viridi-ænescens, labro pedibusque pro parte rufis. Long. 4 mill. Algérie : Mont Babor (coll. Pic). — A placer près de ***afer*** Schils. et caractérisé par la ponctuation générale fine et écartée, même sur les élytres.

Numérisation Société linnéenne de Lyon

Flaneteros atriventris n. sp. Elongatus, sat dense pubescens, testaceus, articulis 3-7 antennarum, tibiis pro parte abdomineque nigris. Long. 7 mill. Congo. — A placer près de *flavus* Brg.

P. soppoensis n. sp. Elongatus, pubescens, niger, fronte, antennis apice, femoribus ad basin, thorace, scutello elytrisque testaceis. Long. 8 mill. Cameroun. — Plus brillant que le précédent avec le prothorax plus droit sur les côtés, etc.

P. rectithorax n. sp. Elongatus, pubescens, testaceus, antennis ad medium, pedibus pro parte et infra corpore nigris, elytris testaceis, apice breve nigro maculatis. Long. 8 mill. Congo. — Distinct, à première vue, du précédent par les élytres à sommet noir et le prothorax à angles postérieurs peu avancés.

P. bicoloricornis n. sp. Elongatus, paulo pubescens, niger, antennis apice, femoribus ad basin, capite, thorace, scutello pro majore parte elytrisque, testaceis, his apice late nigris. Long. 7 mill. Afrique. — Voisin de *Escaleræ* Brg. et distinct, à première vue, par les antennes testacées au sommet et le prothorax très transversal.

P. sibutensis n. sp. Elongatus, nitidus, sparse pubescens, niger, pro parte piceus, femoribus ad basin, thorace elytrisque antice satis late testaceis. Long. 5 mill. Fort Sibut. — Voisin du précédent, prothorax moins transversal, élytres à ponctuation moins régulière, plus longuement noirs.

Ceratopriomorphus n. gen. Capite prominulo, impresso ; antennis valde depressis, satis elongatis, longioribus ♂ ; thorace breve, sulcato ; elytris rugulosis, 4 costatis. — Très voisin de *Ceratoprion* Gorh. et distinct, à première vue, par le prothorax sillonné au milieu, la tête plus robuste.

Ceratopriomorphus humeralis n. sp. Nigro-piceus, thorace lateraliter humerisque testaceis. Long. 5 mill. Brésil. La ♀ a les antennes un peu plus courtes et la tête un peu plus large que le ♂.

Callanganum n. gen. Capite prominulo, impresso [antennis fractis] ; thorace antice attenuato, subcarinato ; elytris antice costatis, postice rugulosis et attenuatis. — Voisin du genre précédent, très distinct par la structure de son prothorax et les élytres présentant des côtes visibles seulement sur leur partie antérieure.

Callanganum piceum n. sp. Unicolor, piceus, subopacus. Long. 6 mill. Pérou.

Macrolycinella nov. gen. Capite parum prominulo ; antennis validis, apice attenuatis, articulo tertio elongato ; thorace breve, medio antice subcarinato et postice foveolato ; elytris minute 4 costatis, intervallis parum distincte biseriate foveolatis. — Voisin de *Lycinella* Gorh., prothorax et antennes différents, tête moins excerte, etc.

Macrolycinella bicolor n. sp. Niger, thorace pubescente, testaceo, postice nigro notato. Long. 7 mill. Mexique.

Linoptes atronotatus n. sp. Elongatus, parallelus, niger, thorace lateraliter late et femoribus ad basin breve testaceis, elytris nigris, ad humeros longe testaceo maculatis et postice testaceo fasciatis. Long. 10 mill. Pérou. — Très distinct de *imbrex* Gorh. par sa coloration et le prothorax à angles postérieurs moins saillants.

HORS-TEXTE de l'*Echange*, n° 409.

Numérisation Société linnéenne de Lyon

Microlycus n. gen. Thorace transverso, parum valido, lateraliter reflexo, medio postice depresso, angulis posticis non prominulis. — Voisin de *Calolycus* Gorh. avec le prothorax de structure différente et la taille moindre.

Microlycus minutus n. sp. Oblongus, postice dilatatus, parum nitidus, pubescens, niger, thorace pallido, postice piceo notato. Long. 5 mill. Mexique.

Lycoplateros n. gen. Capite satis breve ; antennis compressis ; thorace valde sinuato, medio carinato ; elytris elongatis, bicostatis, intervallis 1er et 2e lineato quadrifoveolatis, 3e lineato bifoveolato. — Ce nouveau genre, caractérisé par sa sculpture élytrale jointe à sa structure prothoracique, peut se placer près de *Mesopteron* Brg.

Lycoplateros mimicus n. sp. Elongatus, niger, testaceo notatus. Long. 8 mill. Pérou. — Mime la forme et la coloration de *Linoptes atronotatus* Pic, décrit ci-dessus.

Samanga longicollis n. sp. Elongatus, nitidus, piceus, capite antice, thorace, illo in disco piceo, pectore pro parte femoribusque ad basin testaceis. Long. 6 mill. Célèbes.

Calleros peruvianus (Brg.). Elongatus, niger, elytris apice irregulariter flavo-testaceis. Long. 7-8 mill. Pérou. — Voisin de *phænicurus* Kirsh. mais antennes toutes noires et macule apicale claire différente, irrégulièrement terminée en avant.

C. purpureipennis n. sp. Elongatus, rufo-brunneus, elytris rubro-purpureis, infra corpore pro parte nigro ; thorace subquadrato, antice subarquato ; elytris multicostatis. Long. 7 mill. Guatemala. — A placer près de *puniceus* Gorh.

C. Batesi n. sp. Elongatus, niger, articulo ultimo antennarum, pedibus pro parte, scutello, thorace, illo postice nigro bimaculato, elytrisque testaceis, his ad scutellum et apice nigro maculatis. Long. 7 mill. Amazones. — A placer près de *scutellaris* Brg.

C. egaensis n. sp. Elongatus, piceus, capite antice, thorace circa femoribusque ad basin testaceis, elytris piceis, ad humeros longe testaceis. Long. 8 mill. Amazones. — Voisin du précédent.

C. bimaculatus n. sp. Elongatus, niger, elytris postice et lateraliter testaceo maculatis, multi costatis ; thorace obconico. Long. 6 mill. Pérou. — Espèce très distincte par sa coloration.

C. quadrinotatus n. sp. Elongatus, niger, thorace lateraliter et antennis apice testaceis, elytris nigris, ad humeros breve, ad medium et lateraliter late, testaceo maculatis, multicostatis. Long. 7 mill. Pérou. — Voisin du précédent avec le prothorax largement arqué en avant, les élytres plus longs, etc. A placer près d'*aterrimus* Gorh.

C. diosensis n. sp. Elongatus, niger, thorace lateraliter, antennis apice elytrisque ad humeros longe testaceis. Long. 16 mill. Pérou. — La variété **inhumeralis** n'a pas de macule humérale. — Voisin du précédent.

Le **C. diversecostatus** mihi, du Pérou, est noir avec le pourtour du prothorax étroitement, l'extrémité des antennes et les élytres largement testacés sur leur milieu externe ; diffère des précédents par le prothorax peu arqué en avant et les élytres à côtes alternées plus élevées.

Numérisation Société linnéenne de Lyon

Plateros semilimbatus n. sp. Elongatus, parallelus, niger, antennis apice, thorace lateraliter elytrisque lateraliter et antice testaceis ; elytris 4 costatis. Long. 8 mill. Pérou. — Par sa sculpture élytrale peut se placer près de *collaris* Brg.

P. crocatus (Brg.). Elongatus, niger, fronte, antennis apice, thorace, illo nigro bilineato, femoribusque ad basin testaceis, elytris antice triangulariter nigro notatis, antice 4 costatis. Long 10-11 mill. Pérou.— Voisin du précédent et aussi de *forreranus* Gorh.

Le **P. subapicalis** mihi, du Pérou, très voisin, est plus allongé, l'écusson est noir, les antennes sont à peine rousses au sommet et les élytres testacés sont ornés d'une ligne antérieure suturale et d'une petite macule subapicale discale noires.

Le **P. inapicalis** mihi, de l'Equateur, ressemble beaucoup au précédent, mais il n'a pas de macule apicale noire aux élytres et le prothorax offre une longue bande médiane discale.

P. elongatior n. sp. Elongatus, niger, thorace, illo in disco postice nigro lineato, elytris femoribusque ad basin testaceis ; thorace antice subsinuato ; costis alternatis elytrorum parum prominulis. Long. 10 mill. Brésil. — A placer près de *amplectoides* Brg. et de *luridus* Gorh.

P. Reitteri n. sp. Elongatus, parallelus, niger, supra et femoribus ad basin testaceis ; thorace subquadrato, medio piceo notato ; elytris 4 costatis. Long. 8 mill. Brésil. — A placer près de *evanidus* Gorh.

P. ephippiger (Brg.). Elongatus, niger, thorace, illo in disco nigro lineato, elytrisque ochraceis, his antice nigro notatis. Long. 11 mill. Vénézuela. — Voisin de *lateritius* Gorh. et très distinct par ses dessins noirs élytraux composés d'une bande antérieure suturale sagittiforme et d'une étroite bordure apicale.

P. roseicollis v. nov. Sallei. Niger, thorace roseo. Mexique. — Diffère de la forme type par les élytres entièrement noirs.

Calopteron infasciatum n. sp. Elongatus, postice parum dilatatus, niger, elytris nitidis, cyanescentibus, intervallis elytrorum bifenestratis ; thorace postice lateraliter rufo-notato. Long. 22 mill. Amérique Méridionale (coll. Pic).

C. cyaneipenne n. sp. Elongatus, postice dilatatus, niger, elytris nitidis, cyaneis, postice albo fasciatis, ad humeros rufo-notatis ; thorace lateraliter late rufo ; intervallis elytrorum bifenestratis. Long. 20 mill. Guyane française. — Voisin de *tropicum* L. avec les élytres à coloration foncière bleue.

C. testaceithorax n. sp. Oblongus, ad medium parum latus, subnitidus, niger, antennis ad basin, pedibus pro parte, thorace, scutello elytrisque ad humeros testaceis, intervallis elytrorum irregulariter et unifenestratis. Long. 9 mill. Paraguay. — Voisin du précédent.

Le **goyasense** mihi, du Brésil, voisin du précédent, a le prothorax moins transversal, largement foncé sur le disque, les élytres foncés, à peine teintés de roux aux épaules.

Numérisation Société linnéenne de Lyon

Idiopteron s. g. nov. Falsocænia. Elytris non parallelis, tricostatis, intervallis late et unifenestratis ; antennis plus minusve compressis. — Dans ce sous-genre rentre *meridanum* et voisins, ainsi que des espèces nouvelles du synopsis.

F. meridanum n. sp. Elongatus, postice dilatatus, opacus, niger, elytris rufis, ad medium late nigro fasciatis et apice breve nigro maculatis. Long. 9 mill. Vénézuela.— Peut se placer près de *C. bellum* K.

F. longehumerale n. sp. Elongatus, postice parum latus, opacus, niger, thorace lateraliter rufo, elytris nigris, ad humeros longe et postice sat late rufo notatis. Long. 8 mill. Pérou. — Voisin du précédent et de *elongatum* Brg.

Le **callanganum** mihi, du Pérou, de coloration analogue, est un peu plus étroit avec le prothorax presque entièrement noir et moins large.

I. latefasciatum n. sp. Oblongus-ovatus, niger, thorace rufo-testaceo, in disco nigro vittato, elytris rufo-testaceis, ad medium late nigro fasciatis. Long. 12 mill. Bogota. — A placer près de *xanthomelas* K., tout autre par son dessin élytral.

I. binotaticolle n. sp. Elongatus, postice paulo latus, nitidus, rufescens, pro parte piceus, thorace testaceo, in disco piceo binotato ; elytris piceis, antice testaceo notatis, abdomine nigro, pedibus pro parte testaceis. Long. 7 mill. Brésil. — Peut se placer près de *pusillum* K.

D'autres petites espèces, voisines des *acroleucum* K. ou *pusillum* K, du même sous-genre, ayant parfois à la base une trace de 4e côte raccourcie, se distingueront plus facilement à l'aide du synopsis suivant :

1 Elytres marqués de noir au sommet, en partie et diversement testacés ou roussâtres en avant ou au milieu. 3

1' Elytres, soit entièrement foncés, soit seulement marqués de roux vers les épaules, Antennes noires, sauf chez *Pauli* dont le dernier article est testacé. 2

2 Elytres entièrement foncés ; prothorax, soit entièrement foncé et obconique (**piceum**, du Maroni), soit testacé sur les côtés et assez large (**bicoloricolle**, du Brésil).

2' Prothorax plus étroit avec les élytres brièvement testacés vers les épaules (**maroniense**, du Maroni), ou prothorax un peu large et élytres assez largement et irrégulièrement marqués de testacé aux épaules (**Pauli**, du Brésil).

3 Antennes testacées à l'extrémité. Espèces à élytres noirs, marqués de roux-testacé, aux épaules et au milieu. 7

3' Antennes foncées à l'extrémité. 4

4 Elytres largement noirs au sommet, testacés antérieurement avec une macule foncée prescutellaire. 5

4' Elytres brièvement noirs au sommet, à fascie postmédiane et macule humérale roussâtres. Long. 7 mill. Pérou. **breveapicale**

5 Macule scutellaire foncée, petite. 6

5' Macule scutellaire grande, couvrant presque toute la base. Long. 10 mill. Brésil. **mendesense**

6 Prothorax à angles postérieurs peu saillants, en outre peu rétréci et subarqué en avant. Long. 6 mill. Rép. Argentine. **parananum**

Numérisation Société linnéenne de Lyon

Haplocnemus subcostatus v. nov. Viberti. Niger, robustus, thorace fortiter sat sparse punctato. ? Maroc (coll. Pic). — Distinct, à première vue, de ***subcostulatus*** Schils., par le prothorax à ponctuation assez écartée.

Haplocnemus æstivus v. nov. subviolaceus. Supra plus minusve violaceus. Bozen, dans le Tyrol (coll. Pic).

Haplocnemus longulus v. nov. brunnescens. Elongatus, capite thoraceque viridescentibus, elytris brunnescentibus, pedibus brunneis, tarsis rufis. Ain Sefra (coll. Pic). — Facilement distinguable de la forme typique par sa coloration.

Haplocnemus cribripennis n. sp. Oblongo-elongatus, parum nitidus, niger, supra viridi-subæneus, sparse hirsutus ; capite thoraceque dense pustulato-punctatis ; elytris latis, parum elongatis, fortiter et dense punctatis. Long. 6 mill. Algérie : O. Sebou (Vibert, in coll. Pic). — Voisin de ***nigripes*** M. R., très distinct par la ponctuation différente du dessus du corps.

Dasytes (Mesodasytes) Viberti n. sp. Elongatus, nitidus, supra olivaceus aut niger, griseo-pubescens, et in parte denudatus. Long. 4 mill. Algérie : Batna (Vibert, in coll. Pic). — A placer près de ***nigroæneus*** Kust. et distinct à première vue par les tibias foncés.

Dasytes (Hapalogluta) sefrensis v. nov. semiauratus. Avant-corps et parfois une portion des élytres revêtus en partie de poils jaunes ou dorés. Chellalá (Vibert, in coll. Pic).

Calchænesthes 6-maculatus v. nov. junctus. Macules noires des élytres très étendues et jointes sur les côtés, d'où élytres noirs bordés de testacé avec une fascie médiane raccourcie testacée. Kabylie (Pic).

Purpuricenus Desfontainei v. nov. V-signatus. Thorace nigro, rufo trisignato. — Prothorax noir, maculé de roux sur les côtés et au milieu, la macule médiane en forme de V renversé, élytres largement noirs aux épaules. Algérie (coll. Pic).

Cyaniris atricollis n. sp. Satis elongatus, parum nitidus, niger, antennis ad basin et labro antice rufo notatis, elytris testaceis, ad humeros breve, et ad medium parum lato piceo maculatis ; thorace breve, minute et sparse punctato ; elytris mediocre et sparse punctatis. Long. 5 mill. ? Egypte (coll. Pic). — Espèce très distincte par sa coloration. Peut se placer près de ***crassifer*** Duv.

Cyaniris bicoloripes n. sp. Parum elongatus, nigro-cyanescens, antennis ad basin, thorace lateraliter late pedibusque testaceis, femoribus plus minusve metallicis. Long. 5 mill. Angora (coll. Pic). — Voisin de ***judaica*** Lef., en diffère par la forme plus allongée, la bande métallique médiane du prothorax rétrécie en avant et les cuisses marquées de foncé.

Cyaniris semiviridis n. sp. Oblongus, nitidus, testaceus, antennis apice brunnescentibus, capite postice late, scutello elytrisque viridis, infra corpore nigro ; capite breve, foveolato ; thorace breve, transverse, lateraliter arcuato, minutissime punctato ; elytris lateraliter sinuatis, minute sat sparse punctatis. Long. 5 mill. Thibet

Numérisation Société linnéenne de Lyon

coll. Pic). — A placer près de *rufilabris* W., tête plus largement foncée, écusson métallique, etc.

Cryptocephalus Koltzei v. nov. ussuriskensis. La macule postérieure discale jaune élytrale est interrompue et isolée de la bordure apicale. Sibérie (coll. Pic).

(*A suivre.*) M. Pic.

Coléoptères exotiques en partie nouveaux

(*Suite.*)

Macromolorchus n. gen. Thorace parum elongato, noduloso, antice strangulato; elytris latis, brevibus, apice dehiscentibus; pedibus validis, femoribus plus minusve clavatis, tibiis posticis brevibus, dense rufo villosis. — Rappelle *Merionæda* Pascœ par plusieurs caractères, s'en distingue, à première vue, par les élytres différents ainsi que par la structure des pattes, notamment les tibias postérieurs longuement et densément villeux.

Macromolorchus curtipennis n. sp. Parum elongatus, nitidus, niger, elytris his apice breve nigro notatis, abdomine pedibusque rufis, femoribus apice plus minusve nigris. Long. 15 mill. Tonkin. (coll. Pic).

Ibidiomimus nov. gen. Capite satis elongato, oculis prominulis; antennis gracilibus, articulo tertio elongato, 4e breve, sequentibus elongatis; thorace longissimo, implicato, lateraliter sinuato, ad basin marginato; pedibus satis elongatis, femoribus apice valde clavatis, tibiis carinatis; segmento primo abdominis breve. — Ce genre peut se placer près de *Ibidionidium* Gah. dont il diffère, à première vue, par la forme encore plus allongée, les membres plus graciles et le premier segment de l'abdomen court.

Ibidiomimus bicoloripes n. sp. Angustatus, nitidus, rufus, elytris pallidioribus, antennis testaceis, ad basin nigris, pectore, abdomine, pedibus pro majore parte elytrisque apice breve nigris. Long. 12 mill. Tonkin: Cao Bang. (Don de J. Clermont).

Oberea subspinosa n. sp. Elongatus, subparallelus, opacus, purpureus, infra corpore, antennis et pedibus pro majore parte nigris; capite robusto, antice suloato, postice carinulato, lateraliter post oculos nigro notato; antennis gracilibus, corpore paulo longioribus; thorace breve, antice et postice transverse sulcato, lateraliter sinuato; elytris thorace paulo latioribus, satis elongatis, apice breve subacuminatis, sat fortiter et pro parte lineato-punctatis; pedibus parum brevibus, anticis pro parte et coxis testaceis; pygidio rufescente. Long. 13 mill. Chine: Nyhia-ho (coll. Clermont). — Espèce très distincte par son dessus uniforme pourpré joint à la terminaison élytrale, les élytres n'offrant qu'une courte dent médiane apicale.

Tetraommatus minor n. sp. Angustatus, nitidus, testaceus, griseo pubescens, oculis nigris. Long. 6 mill. Tonkin (coll. Pic). — Espèce caractérisée par sa petite taille jointe à sa coloration.

(*A suivre.*) M. Pic.

Numérisation Société linnéenne de Lyon

Annonces

J'ai le plaisir d'informer mes collègues Lépidoptéristes que je viens d'acheter tous les droits de traduction, d'édition et de réédition de l'ouvrage de M. le Professeur Dr Seitz : « **Les Macrolépidoptères du Globe** », partie édition française. S'adresser mon Cabinet pour toutes les souscriptions et pour la suite de l'ouvrage.

En attendant l'impression du texte, je peux fournir toutes les planches déjà parues au prix de la planche : 2 francs.

A vendre de suite : de la Faune exotique jusqu'au n° 202 inclus, à 4 francs le fascicule.
Faune paléarctique complète, comprenant 130 fascicules : 360 francs.
Pour conditions complémentaires, me demander circulaire contre 0 fr. 25 en timbres.

E. Le Moult, 4, rue Duméril, Paris (XIIIe).

Recherche de Coléoptères

Je recherche pour ma collection des Coléoptères anormaux :

1° Coléoptères avec monstruosités : antennes, tarses, pattes, crochets, élytres, etc., doubles ou triples, ou autres anomalies.

2° Coléoptères hybrides (Bastards) avec parents.

3° Coléoptères hermaphrodites.

Je ne m'intéresse pas pour les insectes atrophiés, déformés, défectueux, ou avec ailes séparées ou mal développées.

J'achète au comptant ou j'échange contre Coléoptères Argentins ou rares et anciens timbres-poste d'Argentine.

Dr DALLAS, 1790 Mendes de Andes,
Buenos-Aires, **Argentine**,
SUD-AMERICA.

Monsieur Séraphin, 22, faubourg Montmartre, Paris-9e, demande par quantité, bien étalés et premier choix des LYCÆNA ♂, Boetica, Amyntas, Argon, Argus, Alexis, Escheri, Adonis, Dorylas, Acis, Corydon, Sebrus, Damon, Dolus, Melanops, Cyllarus. — Polyonmatus Phlacas, Gordius Virganna. — Zygaena alpina, Transalpina, Lavandulæ, Charon, Occitanea, Fausta, Hilaris, Vagueri, Stoechadis, etc., et toutes petites espèces brillantes ne dépassant pas 3 centimètres ; indiquer prix et quantité ; on échangerait autres espèces Françaises et exotiques.

M. J. Clermont, 162, rue Jeanne-d'Arc prolongée, Paris-13e, offre en échange d'excellentes espèces de *Coléoptères paléarctiques*.

Désire acquérir par achat, ou par échange, des **Cavernicoles du globe, Histérides, Buprestides, Cerambycides** paléarctiques. Il accepte les espèces intéressantes même par un exemplaire.

Répond à toutes les offres et est volontiers acquéreur de chasses originales de tous pays.

J. D. Sornborger, Rowley, Massachusetts, Etats-Unis (U. S. A.)
désire des spécimens de **Saturnidæ** et de **Cicindelidæ** du globe.

M. Roger, à Port d'Envaux (Charente-Inférieure), désire échanger des *Coléoptères européens* contre *exotiques* et *européens*.

Notes de Chasse

M. M. Pic a recueilli, du 12 au 30 mai, dans son cabinet d'élevage aux Guerreaux : *Priobium tricolor* Ol., *Metacantharis discoidea* Ahr., *Opilo mollis* L., *Megapenthes tibialis* Lac., *Elater pomorum* Herbst. et *æthiops* Lac. var., *Denticollis linearis* L. et var., *Melasis buprestoides* L., *Melandrya caraboides* L., divers Mordellides, *Grammoptera variegata* Germ. *Clytus arietis* L., *Anaglyptus mysticus* L.

Dans le cabinet d'élevage, au commencement de juin 1922 : *Ctesias serra* F., *Ernobius mollis* L., *Mesocœlopus niger* Mull., *Malthinus flaveolus* Payk., *Dasytes niger* L., *Gnorimus nobilis* L., *Abdera 4 fasciata* Crt. et *griseoguttata* Frm., *Anisoxya fuscula* Ill., *Eryx melanarius* Germ., *Mycetochara linearis* Ill., *Strangalia maculata* Poda, *Leiopus nebulosus* L., *Exocentrus adspersus* Muls., *Saperda scalaris* L., *Heterogaster rufescens* H. S.

M. M. Pic a recueilli à Gueugnon (S.-et-L.) au bois du Breuil, le 5 mai 1922, lors d'une chasse aux sangliers : *Xylodrepa 4 punctata* Sch., *Staphylinus stercorarius* Ol., *Ludius purpureus* Poda et *tesselatus* L., *Sericus brunneus* L. var., *Systenocerus caraboides* L.

Numérisation Société linnéenne de Lyon