

L'ÉCHANGE

Revue Linnéenne

FONDÉE PAR LE DOCTEUR JACQUET

Organe mensuel des Naturalistes de la Région Lyonnaise et du Centre

CONTENANT LES DEMANDES D'ÉCHANGE

D'ACHAT OU DE VENTE DE LIVRES ET DE TOUT AUTRE OBJET D'HISTOIRE NATURELLE

M. PIC (G. I. P., O. S.), Directeur

Membre correspondant du Muséum de Paris

COMITÉ DE RÉDACTION OU COMITÉ D'ÉTUDES

J. Clermont, 162, rue Jeanne-d'Arc prolongée, PARIS (13^e). — *Aphodius paléarctiques*, *Histerides* français.

L. Falcoz, 5, Place de l'Éperon, VIENNE (Isère). — *Cryptophagides*, *Nitidulides*, *Cucujides*, *Erotulides*, *Phalacrides*, *Lathridiides*.

J. Sainte-Claire-Deville, à PARIS. — *Hydrophilides* de France. — *Staphylinides* du bassin de la Seine. — *Coléoptères* de Corse.

Maurice Pic, DIGOIN (Saône-et-Loire). — *Coléoptères* d'Europe, *Melyridae*, *Ptinidae*, *Nanophyes*, *Anthicidae*, *Pedilidae*, etc. du globe. — *Cerambycides* de la Chine, du Japon, etc. *Cryptocephalides paléarctiques*, *Malacodermes* du globe.

A. Méquignon, 66, rue Bannier, à Orléans. *Coléoptères* de France (*Circulionides* exceptés.)

Adresser toutes Communications

Concernant la Rédaction, les Échanges, les Abonnements et les Annonces

A. M. M. PIC, à Digoïn

(12 Décembre 1922)

SOMMAIRE

Notes diverses, descriptions et diagnoses, par M. Pic (suite).

Anomalies diverses (Col.), par M. Pic.

Contribution à l'étude des Lycides, par M. Pic (hors texte) (suite).

Coléoptères exotiques en partie nouveaux, par M. Pic (suite).

PRIX D'ABONNEMENT: UN AN, A PARTIR DU 1^{er} JANVIER

France: 5 francs. | Étranger: 6 francs.

MOULINS

LES IMPRIMERIES RÉUNIES

15, RUE D'ENGHIEN, 15

Annonce

J. D. Sornborger, Rowley, Massachusetts, Etats-Unis (U. S. A.) désire des spécimens de *Saturnidae* et de *Cicindelidae* du globe.

Bulletin des Echanges

M. Tarel, avocat, Bergerac, place du Port. offre Coléoptères de France de toutes familles en échange de *Cicindela litterata* et toutes var. et ab. des *Cicindèles* de la Faune Franco-Rhénane.

M. J.-M. Bedoc, 21, rue du Val-de-Grâce, **Paris (5^e)**. Désire *Cetonides-Ornithoptera Morphos-Agrias*. — Offre Exotiques et lots non préparés provenant de ses chasseurs — en échange.

M. V. Demange, 3, chemin de la Justice, à **Epinal** (Vosges), échangerait ouvrages d'histoire naturelle ainsi que nombreux matériaux de collections rapportés du Tonkin : lichens, coquilles, insectes déterminés, objets préhistoriques, curiosités, timbres, etc., contre : livres et tous objets se rapportant à l'histoire naturelle.

EN VENTE

Chez l'auteur : Maurice Pic, à Digoïn (Saône-et-Loire) : 1^{er} **Matériaux pour servir à l'étude des Longicornes**, ouvrage ayant obtenu, en 1911, le prix Dollfus.

Cet ouvrage, commencé en 1891, comprend une série de fascicules ou cahiers dont les premiers sont presque épuisés. Le prix varie suivant les fascicules, celui des anciens étant plus élevé ; les plus récents peuvent être cédés au prix de 4 fr. 50 le fascicule, port non compris. L'avant-dernier cahier paru, c'est-à-dire la deuxième partie du 9^e cahier, a été distribué aux souscripteurs dans le courant de février 1915, depuis a paru (en 1916) la première partie, et (en 1917) la deuxième partie du 10^e cahier.

On peut céder quelques collections, avec le 1^{er} cahier réimprimé, à des prix modérés. Envoi de l'ouvrage contre remboursement, ou après réception de son prix.

2^e **Mélanges Exotico-Entomologiques** comprenant 14 fascicules anciens au prix de 2 francs : deux autres au prix de 2 fr. 50, enfin 7 autres plus récemment édités, au prix de 3 fr. 50 pièce, port non compris. (Les autres à 4 francs (24 à 27.) Les suivants à des prix divers. Réduction de prix pour la collection complète. Petite majoration pour l'étranger. Le dernier fascicule paru est le 37.

"Miscellanea Entomologica"

Revue entomologique internationale

Abonnement annuel (12 numéros). 7 fr.
Abonnement aux annonces seules. 3 fr.

Direction et Rédaction : E. BARTHE
Professeur, route d'Alais, 23, Uzès (Gard).

AU BUREAU DE L'ÉCHANGE

Mélanges Exotico-Entomologiques

Par M. PIC

Comprenant actuellement 35 fascicules pouvant se vendre séparément à des prix divers. Réduction de prix pour la collection complète, et petite majoration pour l'étranger. Le dernier fascicule publié porte la date du 10 février 1922.

L'Échange, Revue Linnéenne

Notes diverses, descriptions et diagnoses

(Suite.)

Agrilus roscidus v. nov. varensis. Robustus, capite, thorace scutelloque auratis, elytris nigro-olivaceis; capite non plicato, in vertice punctato. France M^l: Var. Communiqué par mon collègue Lascols. — Variété caractérisée par sa coloration conjointement à sa forme robuste et la sculpture de sa tête.

Perotis unicolor v. nov. Leprieuri. Thorace elytrisque supra late cyaneis. Algérie: Bou-Saada (coll. Pic).

Trachys minutus L. — En parlant de la var. *pæcilochrous* Ob., Bedel (Faune B. Seine IV, 2, *Serricornia*, p. 221) lui donne une coloration bleuâtre, tandis qu'Obenberger (*Rev. pal. Trachydiden*, p. 20) attribue à cette variété une coloration bicolore en dessus avec le prothorax rouge-violet et les élytres bleus, alors qu'il considère la forme type comme étant concolore, d'un brun violet foncé. La var. *Heyrovskyi* Ob. (1) (de Carniole et devant se retrouver en France) a les élytres noirs et le prothorax varié du laiton au rouge cuivreux. Je possède, de Corse, un exemplaire ayant les élytres d'un bleu violacé et l'avant-corps à reflets pourprés, devant se rapporter à la var. *pæcilochrous* Ob.

Trachys subacuminatus n. sp. Oblongus, postice valde attenuatus, sparse griseo pubescens, nigro-aeneus; capite inter oculos transverse sulcato, postice sulcatulo, fere læve; thorace breve, parum punctato; elytris latis, lateraliter sinuatis, postice valde attenuatis, apice subrotundatis, fortiter punctatis; unguiculis dentatis. Long. 3 mill. Pyrénées Or. (coll. Pic). — Ressemble à *dichrous* Ob., distinct, à première vue, par les élytres non pointus à l'apex et la coloration différente.

Trachys Theresæ, n. sp. Oblongus, sparse sat longe griseo pubescens, nigro-subaeneus; capite inter oculos late excavato, bisulcato, postice sulcato; thorace breve, æquale, fere impunctato; elytris latis, postice paulo attenuatis, apice rotundatis, mediocre et irregulariter punctatis; prosterno lato, postice attenuato; unguiculis dentatis. Long. 3 mill. Algérie: environs de Bougie (Pic). — Peut se placer près de *pygmaeus* F., très distinct par la coloration uniforme et la ponctuation plus faible.

Micipsa instriata n. sp. Oblongus, antice et postice attenuatus, parum nitidus, minute punctatus, parum convexus, castaneus, membris rufis; oculis prominulis; ♂ articulo ultimo antennarum satis elongato; tibiis anticis apice extus paulo angulatis. Long. 9-10 mill. Maroc: Quercif (coll. Georgel et Pic). — Voisin de *angustipennis* Fm. plus déprimé sur le dos, antennes du ♂ à dernier article moins long, etc.

Micipsa angustipennis v. nov. rufescens. Concolor, rufescens, aut rufo-testaceus. Algérie (coll. Pic).

(1) Je considère que les autres variétés, ou aberrations, à dessus du corps non, ou à peine, pubescent se rapportent à des individus frottés et ne méritent pas d'être reconnus valables.

Micipsa longiceps n. sp. ♀. Antice elongatus, elytris amplis, satis nitidus, rufus; capite elongato, antice sat fortiter punctato, postice fere læve, oculis non prominulis; antennis brevibus et gracilibus; thorace parum breve, antice attenuato, fere læve; elytris satis brevibus, latis, postice attenuatis, ad suturam subsulcatis, fere lævibus. Long. 20 mill. Algérie (coll. Pic). — Espèce très distincte par sa tête allongée et la partie avoisinant la suture enfoncée. — A placer près de *grandis* Kr.

Micipsa minuta n. sp. Par sa forme ressemble un peu au précédent, la tête est moins longue, peu et finement ponctuée, les antennes sont relativement longues, les élytres moins ventrus, non enfoncés sur la suture, la coloration est foncée avec les palpes, antennes et tarses roussâtres. Long. 10 mill. Egypte (coll. Pic). — A placer près de *Douei* Luc.

Micipsa (1) **atrimembris** n. sp. Elongatus, elytris paulo ampliatis, minute punctatus, pro parte lævis, parum nitidus, niger; capite satis elongato, antice biimpresso, oculis non prominulis; antennis elongatis, articulo ultimo breve; thorace parum breve, lateraliter subarcuato; elytris satis brevibus, ad medium dilatatis, apice attenuatis, subopacis, ad suturam non depressis, sutura pro parte elevata; tibiis anticis paulo curvatis, apice extus subangulatis. Long. 11 mill. Maroc: Guercif. Don de M. Georgel. — Espèce distincte par ses membres foncés et la forme non transversale de son prothorax. Peut se placer près de *Mulsanti* Levrat.

Baridius Carnerii n. sp. Elongatus, niger, sat dense albo squamulatus; rostro elongato, curvato; elytris substriatis, postice attenuatis. Long. 4 mill. Egypte: Mex (Carneri, in collection Carneri et Pic). — Voisin de *alboseriatus* Reit, en diffère par le revêtement blanc presque uniforme et les pattes foncées.

Cantharis mauritanica v. nov. **Alluandi**. Satis robustus, niger, capite antice late, antennis ad basin, femoribus ad basin et tibiis anticis pro parte, thorace, scutello elytrisque testaceis. Atlas (Alluand). — Communiqué par mon collègue A. Théry. — Plus robuste que var. *Vaucherii* Pic, en différant, en outre, par la tête marquée de noir postérieurement, le dessous du corps et les pattes en majeure partie noires.

Troglops verticalis v. nov. **laticeps** ♀. Robustus, capite lato, pedibus 4 anticis rufis, femoribus supra nigris, posticis nigris, tibiis ad basin rufis. Maroc: Forêt de Mamora (Théry, in coll. Théry et Pic). — Variété caractérisée par sa grosse tête et la coloration des pattes.

Dasytiscus diversipes n. sp. Elongatus, nigro-olivaceus, articulis 2-4 antennarum pedibusque testaceis, femoribus supra piceo lineolatis; thorace parum breve, lateraliter subarcuato. Long. 3-3,1 mill. Maroc (coll. Théry et Pic). — Voisin de *vestitus* Ksw. par la disposition de la pubescence, en diffère par le prothorax moins robuste, plus étroit par rapport aux élytres, et la coloration des cuisses.

(A suivre.)

M. Pic.

(1) A ma connaissance, le genre *Micipsa* Luc., n'est pas signalé du Maroc.

6' Prothorax à angles postérieurs très prononcés, cet organe étant, soit plus ou moins large (**prescutellare**), soit étroit et obconique (**obconicicolle**). Long. 7-8 mill. Brésil.

7 Dernier article des antennes seul testacé et prothorax assez large, ou moins étroit. Prothorax, soit très transversal avec les élytres brièvement marqués de roux sur les côtés médians (**brevenotatum**, du Pérou), soit non transversal avec les élytres à fascie médiane rousse (**apicicorne**, du Pérou).

7' Deux derniers articles des antennes testacés et prothorax plus ou moins étroit ou allongé. Prothorax, soit tout noir et long (**elongaticolle**, du Pérou), soit assez court, obconique et foncé sur le milieu seulement (**angusticolle**, du Pérou).

Ces deux dernières espèces peuvent rentrer dans un groupement nouveau, ou **Lycomorphon**, caractérisé par la structure du prothorax et la tête assez dégagée de cet organe en avant. Les *Falsocenia* Pic comprennent, en résumé, quelques espèces nouvelles décrites ci-dessus, les anciens *Calopteron* Guer. ayant le prothorax muni d'une carène effacée postérieurement, ou plus ou moins sillonnée en arrière.

Idiopteron signatum n. sp. Elongatus, postice parum dilatatus, fere opacus, niger, thorace lateraliter elytrisque rufis, his antice et apice nigro notatis. Long. 9 mill. Pérou. — Espèce très distincte par ses dessins élytraux, la macule noire antérieure suturale se dilatant postérieurement en forme de bande transversale.

I. Kourouanum n. sp. Elongatus, subparallelus, fere opacus, niger, thorace, illo in disco nigro bimaculato, elytris ad humeros et lateraliter testaceis. Long. 8 mill. Guyane Fr. — A placer près de *morio* Kirsh.

I. testaceicostatatum n. sp. Parum elongatus, niger, thorace testaceo, in disco nigro bimaculato, elytris nigris, costis antice plus minusve testaceis. Long. 10 mill. Brésil. — Voisin du précédent.

Le **I. latetestaceum** mihi, du Brésil, très voisin, a les élytres foncés au sommet et largement testacés antérieurement.

— Le **I. subapicale** mihi, du Pérou, est étroit et subparallèle, testacé en dessus avec les élytres foncés à l'extrémité.

Cartagonum n. gen. Antennis depressis: capite rostro breve munito; thorace medio carinato; elytris bicostatis, costis valde prominulis. — Ce nouveau genre, voisin de *Idiopteron* Brg., se distingue, à première vue, par la sculpture des élytres qui n'ont que deux côtes saillantes avec (peut-être accidentellement) seulement une trace de costule intermédiaire sur le haut du premier intervalle.

C. Bernardi n. sp. Parum elongatus, postice paulo latus, piceus, capite antice, antennis femoribusque ad basin, thorace, illo in disco piceo bimaculato, elytrisque testaceis, intervallis plus minusve piceis. Long. 5 mill. Colombie.

Metapteron atronotatum n. sp. Elongatus, niger, capite antice, femoribus ad basin, articulis 10-11 antennarum et thorace circa testaceis, elytris nigris, ad humeros longe testaceo maculatis et postmedium testaceo fasciatis. Long. 9 mill. Pérou. — Très distinct par sa coloration.

M. apicicorne n. sp. Elongatus, niger, thorace lateraliter, elytris ad et infra humeros longe, femoribus ad basin et articulo ultimo antennarum testaceis. Long. 7 mill.

Bolivie. — Voisin de *xanthomelas* Luc., dessins des élytres différents et dernier article des antennes roux.

M. geniculatum n. sp. Elongatus, niger, articulo ultimo antennarum, thorace lateraliter, elytris ad humeros, femoribus et tibiis ad basin testaceis. Long. 8 mill. Brésil. — Voisin du précédent.

Le **M. angustatum** mihi, du Brésil, ressemble au précédent, il est plus étroit, un peu brillant avec les aréoles des élytres plus étroites, les épaules sont brièvement rousses et les membres sont foncés.

M. testaceipenne n. sp. Elongatus, niger, antennis apice, femoribus tibiisque ad basin et supra corpore testaceis, thorace postice et scutello lateraliter nigro notatis. Long. 9 mill. Cuba. — Espèce très distincte par sa coloration.

M. signaticolle n. sp. Elongatus, niger, thorace elytrisque testaceis, illo nigro vittato, vitta in medio rufo notato. Long. 12 mill. Brésil. — Espèce très distincte par sa coloration.

M. reductum n. sp. Elongatus, niger, thorace testaceo, medio nigro vittato, elytris testaceis, apice minute nigro notatis. 1^{re} intervallis antice ad suturam paulo brunnescentibus. Long. 10 mill. Brésil. — Voisin du précédent et de *xanthomelas* Luc.

Le **M. apicale** mihi, du Brésil, est un peu moins étroit, largement marqué de foncé à l'extrémité des élytres, tandis que le prothorax est plus courtement noir sur le disque.

M. bogotense n. sp. Elongatus, niger, antennis apice flavis, thorace testaceo, postice nigro maculato, elytris testaceis, ad suturam antice breve piceis. Long. 12 mill. Bogota. — A placer près de *melanurum* K. qui a les élytres noirs au sommet.

Pseudolinoptes n. gen. Antennis compressis, subdentatis; thorace postice in medio longe foveolato et antice carinato; elytris bicostatis, intervallis diverse lineato-punctatis. — Genre près de *Metapteron* Brg. et voisins, très distinct par sa structure prothoracique jointe à celle des élytres, le 1^{er} intervalle ayant 3 ou quatre rangées de points aréolés, les autres deux.

Pseudolinoptes foveolatus n. sp. Elongatus, piceus, femoribus ad basin, thorace circa elytrisque testaceis, his apice vage brunnescentibus. Long. 8 mill. Brésil. — Le **P. multipunctatus**, du Brésil, diffère du précédent par la macule discale foncée du prothorax plus étendue, la foveole de cet organe plus longue, les élytres concolores, à premier intervalle autrement ponctuée.

Cyrtopteron atripenne n. sp. Parum elongatus, postice paulo dilatatus, niger, thorace lateraliter femoribusque ad basin testaceis, elytris nigris, costa humeralis antice rufa. Long. 7 mill. Guyane Fr. — Espèce très distincte par sa coloration.

C. atricorne n. sp. Parum elongatus, niger, infra rufo notato, thorace lateraliter rufo-testaceo, elytris rufo-testaceis, ad suturam antice breve nigro notatis, ad medium sat late nigro fasciatis. Long. 15 mill. ? Brésil. — A placer près de *Muhlenbecki* Brg.

C. fasciatum n. sp. Parum elongatus, ad medium paulo latus, niger, thorace lateraliter femoribusque ad basin testaceis, elytris nigris, ad humeros longe rufo-testaceo maculatis et postice rufo-testaceo fasciatis, costa externa antice pro parte rufa. Long. 15 mill. Pérou. — Voisin de *atricorne* mihi, mais élytres à sommet noir.

C. obliquum mihi, du Pérou, est très voisin du précédent, le prothorax est moins large, les dessins des élytres sont plus testacés et la fascie postérieure moins droite, élargie sur les côtés.

Mesopteron longipenne n. sp. Angustatus, niger, thorace circa, femoribus ad basin elytrisque testaceis, his in disco postmedium nigro bimaculatis. Long. 13 mill. Bogota. — A placer près de *suave* Kir.

Le **M. plurinotatum** mihi, du Pérou, voisin du précédent, est un peu moins allongé et les élytres ont, en plus des macules discales plus allongées, une macule apicale noire remontant sur son milieu.

M. Staudingeri n. sp. Angustatus, niger, thorace lateraliter, elytris ad humeros et apice testaceis. Long. 9-12 mill. Pérou. — Voisin des précédents, ainsi que le suivant.

M. bolivianum n. sp. Angustatus, niger, thorace circa elytrisque testaceis, his apice nigro cinctis. Bolivie. Long. 11 mill.

M. longeapicale n. sp. Angustatus, niger, elytris apice longe et irregulariter testaceis. Equateur. Long. 9 mill. — Peut se placer près de *Riveti* Brg.

Le **M. longissimum** mihi, de l'Equateur, voisin de ce dernier par sa coloration, est plus long et présente, en plus de sa grande macule apicale claire, quelques côtes plus ou moins longuement testacées en avant de celles-ci.

M. scitum (Brg.) n. sp. Angustatus, niger, thorace lateraliter, elytris ad humeros longe et ante apicem transverse testaceis. Long. 10 mill. Pérou.

Le **M. carinatum** mihi, du Pérou, très voisin du précédent par sa coloration, est plus étroit avec le prothorax plus allongé, à carène médiane flave, la coloration des parties claires est plus pâle et les cuisses sont testacées à la base.

M. panamense n. sp. Angustatus, niger, thorace, illi nigro bilineato, femoribus ad basin breve elytrisque testaceis, his antice ad suturam nigro lineatis. Long. 9-10 mill. Panama. — Voisin de *lineare* Gorh.

M. notaticolle n. sp. Parum elongatus, niger, thorace, illo in disco piceo notato, femoribus ad basin elytrisque testaceis. Long. 9 mill. Brésil. — A placer près de *angulicolle* Luc.

Le **M. mapiriense** mihi, de Bolivie, est plus allongé que le précédent avec le prothorax moins large et plus long, l'écusson est noir à la base et les élytres sont brièvement marqués de noir au sommet.

M. Baeri n. sp. Satis elongatus, nitidus, niger, thorace lateraliter, femoribus ad basin, elytris ad humeros longe et postmedium late et transverse testaceis. Long. 8 mill. Republ. Argentine. — A placer près de *pennatum* Brg.

M. minutum n. sp. Elongatus, subopacus, niger, articulo ultimo antennarum, femoribus ad basin, elytris ad humeros breve et postmedium transverse testaceis. Long. 5 mill. Pérou. — Prothorax moins large que le précédent, macule humérale plus réduite, etc.

Le **M. unimaculatum** mihi, de Bolivie, très voisin de ce dernier, est entièrement noir avec une assez longue macule médiane externe testacée sur les élytres.

Le **M. unifasciatum** mihi, du Pérou, également petit et foncé, a sur les élytres une

bande postmédiane transversale assez large, flave, tandis que le *diversicolle* mihi, du Pérou, a une bande moins pâle et moins élargie avec un prothorax tout autre, échancré sur les côtés.

M. reductum n. sp. Angustatus, niger, antennis apice testaceis, thorace lateraliter rufo-notato, elytris nigris, postice testaceo fasciatis. Long. 6 mill. Pérou. — Voisin des précédents ainsi que les suivants.

M. peruvianum n. sp. Elongatus, niger, thorace lateraliter, elytris ad humeros minute et ad medium late testaceo notatis. Long. 7 mill. Pérou.

Le **M. inhumérale** mihi, du Pérou, très voisin du précédent, n'a pas de macule humérale claire; quant au **prolongatum** mihi, de Bolivie, il présente aux élytres une macule médiane externe remontant, sous forme de ligne longitudinale, jusqu'aux épaules.

M. depressicorne n. sp. Elongatus, opacus, niger, articulo ultimo antennarum, femoribus ad basin breve, thorace, illo in disco late nigro vittato, elytris testaceis, his apice breve nigro notatis. Long. 11 mill. Vénézuëla. — Espèce très distincte par ses antennes déprimées jointes à sa coloration.

M. grande n. sp. Elongatus, opacus, piceus, femoribus ad basin breve testaceis, thorace, illo in disco late piceo notato, elytris rufo-testaceis, his apice sat late nigris. Long. 14 mill. Bogota. — Voisin du précédent.

Haplobothris meridanus n. sp. Elongatus, nitidus, niger, thorace circa, femoribus ad basin elytrisque antice et lateraliter longe testaceis. Long. 5 mill. Vénézuëla. — Espèce très distincte par sa coloration. A placer près de *nigronotatus* Pic.

H. Gounellei n. sp. Elongatus, parum nitidus, piceus, thorace circa, femoribus ad basin elytrisque ad humeros et ad medium lateraliter testaceis. Long. 4, 5-5 mill. Brésil. — A placer près de *pumilus* Brg.

Trois espèces nouvelles, à élytres noirs, parfois avec les épaules vaguement teintées de roux, et le prothorax testacé, à grande macule postérieure médiane noire, se distingueront ainsi qu'il suit :

1 Fovéole prothoracique longue, atteignant presque le bord antérieur, antennes noires. Robuste avec le prothorax transversal (**robustus**), ou étroit et allongé avec le prothorax subcarré (**elongatus**) Brésil.

1' Fovéole prothoracique un peu éloignée du bord antérieur; antennes à dernier article testacé. Long. 4 mill. Guyane Fr. **minutus**.

Euplectus basilaris n. sp. Elongatus, niger, elytris ochraceis, ad basin triangulariter nigris. Long. 10 mill. Equateur. — Voisin de *Erichsoni* Brg.

E. Championi n. sp. Elongatus, niger, thorace lateraliter testaceo, elytris rubris, ad suturam antice sat longe et apice irregulariter nigro notatis. Long. 5-6 mill. Panama. C'est la var. de Gorham (in *Biologia*, 246). — Plus petit et plus étroit que le précédent avec le prothorax différent.

E. angustatus n. sp. Angustatus, niger, femoribus ad basin et thorace lateraliter testaceis, elytris nigris, ad humeros parum breve testaceo lineatis et postice testaceo fasciatis. Long. 7 mill. Pérou. — Plus étroit que *ephippium* Gorb. avec les élytres autrement maculés.

ANOMALIES DIVERSES (Col.)

PAR M. PIC

Les premiers insectes sont paléarctiques, les deux derniers américains, tous font partie de ma collection.

Trechus Diecki maculipennis Bedel, de Yakourem (Pic), à antenne droite n'ayant que 7 articles, avec le dernier mince et atrophié (1).

Dasytes ? Grenieri Kiesw., de Corse, exemplaire remarquable par la structure de l'antenne gauche qui est fortement épaissie sur son milieu avec les articles 3 et suivants subglobuleux.

Trichodes apiarius L. Massue des antennes ne présentant que 2 articles distincts, par suite de la soudure des deux derniers caractérisant la forme normale. Anomalie intéressante ; de la Grande Chartreuse.

Clytus arietis L. Thorax difforme, échancré fortement sur le milieu des bords antérieur et postérieur. France M^{re}.

Cryptocephalus vittatus F. var., à élytre droit plus court que le gauche. Décines (ex D^r Jacquet).

Je possède un curieux *Cantharis* anomal, de l'Amérique S^e, que je crois être le *divisus* Lec.; cet insecte a 2 tibias réunis et des tarses supplémentaires soudés à l'extrémité des cuisses postérieures, qui sont dilatées et aplaties sur cette partie.

Je dois à M. Baer, qui l'avait recueilli au Tucuman, un exemplaire anomal de *Photuris*, probablement *Ph. Brucki* E. Ol., ayant l'antenne gauche difforme, courte, composée d'articles irréguliers et en partie enveloppés d'une matière chitineuse.

Coléoptères exotiques en partie nouveaux

(Suite.)

Malchinomorphus n. gen. Articulo ultimo palparum subovato, externe sinuato; articulo penultimo tarsarum dilatato, parum lobato, unguiculis dentatis; thorace lateraliter deplanato, subsinuato. — Ressemble à *Malchinus* Ksw., avec une structure différente pour certains organes tels que le dernier article des palpes et des tarses.

Malchinomorphus longiceps n. sp. Elongatus, nitidus, piceus, capite antice, antennis ad basin, thorace pedibusque testaceis. Long. 5 mill. Chine (coll. Pic),

Scirtes robustus n. sp. Oblongo-ovatus, nitidus, rufus, femoribus posticis pro parte, thorace, scutello elytrisque nigris, his rufo notatis, sat fortiter et sparse punctatis; tibiis

(1) Une variété analogue se rencontre chez un *Podagrica semirufa* Kust, d'Algérie, qui a l'antenne droite de 9 articles, le dernier étant mince

posticis validis, paulo curvatis. Long. 5 mill. Tonkin : Lac Thô (coll. Pic). — Espèce très distincte par sa grande taille, ses pattes postérieures et sa coloration, les élytres ayant une macule antérieure discale en forme de C et une postérieure suturale commune, celles-ci rousses. — A placer près de *S. cribriceps* Clp. qui est concolore.

Cyrtonops rufipennis n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, rufus, membris et infra corpore pro parte castaneis; capite lato; thorace satis brevis; elytris brevibus, pro parte regulariter et late punctatis; femoribus posticis parum crassis. Long. 22 mill. Tonkin (coll. Pic). — Voisin de *nigra* Gah., élytres moins rétrécies postérieurement et coloration moins foncée.

Camelocerambyx n. gen. Corpus angustatus; capite elongato, oculis divisis; antennis longissimis, articulo 1° crasso 3-5 longissimis, 5° apice fasciculato, sequentibus minutis; thorace longissimo, lateraliter sinuato; femoribus clavatis, pedibus posticis longioribus. — Genre très curieux par son faciès, pouvant prendre place près de *Cosmisoma* Serv., reconnaissable, à première vue, par ses yeux divisés et son très long prothorax.

Camelocerambyx singularis n. sp. Angustatus, postice attenuatus, fere opacus, niger, capite rufo, antennis apice testaceis, ad basin rufo tinctis, pedibus anticis pro parte rufis, elytris antice brevis luteo lineatis; capite postice fortiter punctato; thorace dense ruguloso-punctato; elytris thorace paulo latioribus apice attenuatis, fortiter et irregulariter punctatis; infra corpore nigro, pro parte argenteo piloso. Long. 15 mill. Laos (Vitalis, in coll. Pic).

Mausarideus atrofasciatus n. sp. Angustatus, postice attenuatus, nigro-olivaceus, pubescens, elytris nigro trifasciatis et ante apicem nigro maculatis; pedibus gracilibus. Long. 18 mill. Laos (coll. Pic). — Jolie espèce, bien distincte par son système de coloration avec 3 bandes noires aux élytres, la 1^{re} transversale, dilatée sur les côtés puis remontant sur la suture jusqu'à l'écusson, la 2^e médiane, en forme d'accent circonflexe, la 3^e presque droite.

Leichrodes bimaculatus n. sp. Ovatus, nitidus, testaceus, antennis apice, capite postice, aliquot thorace in disco, piceis, elytris nigris, in disco late rufis et nigro maculatis, lateraliter antice minute rufo marginatis, his irregulariter punctatis. Long. 2 mill. Tonkin : Lac Thô (coll. Pic). — Très voisin de *annamitus* Pic, forme régulièrement ovale et dessins des élytres différents.

Dichræosis elongatus n. sp. Elongatus, pubescens, piceus, antennis testaceis; thorace parum elongato, antice gibboso et excavato, granulato; elytris subparallelis, intervallis alternis elevatis, pro parte tuberculatis. Long. 8 mill. Tonkin : Chapa (coll. Pic). — Par la structure de son prothorax se rapproche de *D. amphis* Geb., mais très distinct par sa forme allongée.

Macratria semiannulipes n. sp. Elongatus, nitidus, spase pubescens, niger, elytris antice late rufo fasciatis, palpis antennisque ad basin testaceis, femoribus 4 anticis testaceo annulatis. Long. 4 mill. Tonkin (coll. Pic). — Voisin de *instriata* Pic.

(A suivre.)

M. Pic.

TABLE DES MATIÈRES
de la « **Revue Linnéenne** »

1921-1922

— Numéros 403 à 410 —

	Pages.
Anomalies diverses [Col.], par M. PIC.	31
Coléoptères exotiques en partie nouveaux par M. PIC (<i>suite</i>)	19, 23, 28, 31, 31
Contribution à l'étude des Lycides, par M. PIC (article hors-texte, N° 404 à 410, p. 1 à 28).	
Diagnoses de Coléoptères exotiques par M. PIC (<i>suite</i>).	6, 10, 15
Etude détaillée de divers insectes, par M. PIC (<i>suite</i>). (Article hors-texte, N° 403, p. 21 à 24).	
Notes diverses, descriptions et diagnoses, par M. PIC (<i>suite</i>).	1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29
Nouvelle note sur les Histérides français, par le D ^r V. AUZAT.	10

Notes de chasses sur la couverture des N° 404 et 409.

Corrigenda p. 23 (5^e paragraphe, hors-texte). Mettre *maculés* au lieu de macules,
p. 22 (6^e paragr.) Supprimer la localité : Suisse.
