

L'ÉCHANGE Revue Linnéenne

FONDÉE PAR LE DOCTEUR MACQUET

Organe mensuel des Naturalistes de la Région Lyonnaise et du Centre

CONTENANT LES DEMANDES D'ÉCHANGE

D'ACHAT OU DE VENTE DE LIVRES ET DE TOUT AUTRE OBJET D'HISTOIRE NATURELLE

M. PIC (O. I. P., O. S.), Directeur

Membre correspondant du Museum de Paris

COMITÉ DE RÉDACTION OU COMITÉ D'ÉTUDES

J. Giermont, 162, rue Jeanne-d'Arc prolongée, PARIS (13^e). — *Aphodius palæarctiques, Histériides Français.*

L. Falcoz, 5, Place de l'Éperon, VIENNE (Isère). — *Cryptophagides, Nitidulides, Cucujides, Erotylides, Phalacridés, Lathridiides.*

⊗ Maurice PIC, DIGOIN (Saône-et-Loire). — *Coléoptères d'Europe, Melyridæ, Ptinidæ, Nanophyes, Anthicidæ, Psyllidæ, Crioceridæ, etc du globe. — Cerambycides de la Chine, du Japon, etc. Cryptocephalides palæarctiques. Malacodermes du globe.*

⊗ A. Méquignon, 7, rue Chasseloup-Laubat, PARIS (15^e). — *Coléoptères de France (Curculionidés exceptés.)*

Adresser toutes Communications

Concernant la Rédaction, les Échanges, les Abonnements et les Annonces

A M. M. PIC, à Digoïn

(20 Août 1925)

SOMMAIRE

Notes diverses, descriptions et diagnoses, par M. Pic (suite).
Malacodermes exotiques, par M. Pic (suite du hors-texte).
Coléoptères exotiques en partie nouveaux, par M. Pic (suite).
Hyménoptères nouveaux, par M. Pic.

PRIX D'ABONNEMENT: UN AN, A PARTIR DU 1^{er} JANVIER

France : 5 francs. | Étranger : 6 francs.

MOULINS
LES IMPRIMERIES RÉUNIES
15, RUE D'ENGHEN, 15

ANNONCES

La page	32 fr.	Le 1/4 de page	10 fr.
La 1/2 page	18 fr.	Le 1/8 de page	6 fr.

Réduction de 25 % pour les insertions plusieurs fois répétées

TARIF SPECIAL POUR LES ANNONCES ANNUELLES

PRIX DES SEPARATA

En raison des difficultés actuelles (papiers, matières premières, main-d'œuvre, etc.), les auteurs désirant des « Separata » de leurs articles, voudront bien s'entendre directement avec l'imprimeur.

EN VENTE

Chez l'auteur : Maurice Pic, à Digoïn (Saône-et-Loire) : **1^o Matériaux pour servir à l'étude des Longicornes**, ouvrage ayant obtenu, en 1911, le prix Dollfus.

Cet ouvrage, commencé en 1891, comprend une série de fascicules ou cahiers dont les premiers sont presque épuisés. Le prix varie suivant les fascicules, celui des anciens étant plus élevé ; les plus récents peuvent être cédés à divers prix par fascicule, port non compris. L'avant-dernier cahier paru, c'est-à-dire la deuxième partie du 9^e cahier, a été distribué aux souscripteurs dans le courant de février 1915, depuis a paru (en 1916) la première partie, et (en 1917) la deuxième partie du 10^e cahier.

On peut céder quelques collections, avec le 1^{er} cahier réimprimé, à des prix modérés. Envoi de l'ouvrage contre remboursement, ou après réception de son prix.

2^o Mélanges Exotico-Entomologiques comprenant 14 fascicules anciens au prix de 2 francs : deux autres au prix de 2 fr. 50, enfin 7 autres plus récemment édités, au prix de 3 fr. 50 pièce, port non compris. (Les autres à 4 francs (24 à 27.) Les suivants à des prix divers. Réduction de prix pour la collection complète. Petite majoration pour l'étranger. Le dernier fascicule paru est le 43.

"Miscellanea Entomologica"

Revue entomologique internationale

Abonnement annuel (12 numéros). 7 fr.

Abonnement aux annonces seules. 3 fr.

Direction et Rédaction : E. BARTHE

Professeur honoraire à CASTANET-TOLOSAN
(Haute-Garonne).

Pour les déterminations

Tous les frais de retour des insectes, envoyés en étude, sont à la charge de l'expéditeur.

Que les intéressés s'en souviennent à l'occasion, et fassent le nécessaire !

L'Échange, Revue Linnéenne

Notes diverses, descriptions et diagnoses

(Suite.)

Kisanthobia curta v. nov. *semipurpurea*. Largement pourpré sur son pourtour, milieu du dessus du corps d'un vert terne à reflets un peu dorés. Akbes (coll. Pic).

Phænops recticollis s.-esp. *tauricola*. *Angustatus*, *cœruleus*, thorace satis *angustato*, antice paulo *attenuato*, *angulis posticis non prominulis*, supra *impresso*. Taurus (coll. Pic). — Diffère de *recticollis* Pic, en outre de la coloration bleue, par la structure du prothorax.

Zeugophora flavicollis v. nov. *notatipes*. *Femoribus anticis et intermediis plus minusve brunnescentibus*. Morvan (Pic).

Phyllosecta laticollis v. nov. *purpurascens*. *Supra æneo-purpurascens*. Morvan (Pic).

Cryptocephalus 10-maculatus L. J'ai capturé dans le Morvan plusieurs variétés nouvelles, voisines de la v. *bothnicus* L., ayant les élytres noirs et le prothorax diversement marqué de jaune, celui-ci étant marqué de jaune sur les côtés, en plus de la bande médiane (v. *externesignatus*), ou noir et seulement marginé de jaune antérieurement (v. *morvandicus*), ou noir avec une linéole médiane antérieure (v. *Champenoisi*).

Barynotus alternans v. nov. *Tournieri*. *Squamules du dessus du corps plus ou moins verdâtres avec les latérales en partie rembrunies*. Jura: Reculet (Tournier, in coll. Pic).

Hypera albonotata n. sp. *Elongatus* ♂, aut *oblongo-subovatus* ♀, *niger, opacus, fusco et griseo squamulatus*, thorace *distincte albo trilineato et elytris lateraliter pro parte post medium in disco, ad suturam postice, distincte albo notatis*, *antennis pro parte rufis*; *rostrum satis breve, subarcuato, carinato*; *thorace parum elongato, antice paulo dilatato, dense punctato*; *elytris thorace paulo latioribus, sat angustatis, apice attenuatis, striatis*. Long. 8 et 9 mill. Algérie (coll. Pic). Espèce facilement reconnaissable à ses dessins blancs.

Hypera reductirostris n. sp., d'Algérie, très voisin du ♂ précédent, à revêtement analogue seulement un peu fauve, se distingue par le prothorax plus robuste, les élytres moins étroits; cette espèce est surtout caractérisée par son rostre court et robuste.

Tychius pulcher n. sp. *Elongatus, diverse squamulatus, squamis pro parte latis, pro parte piliformibus, niger, rostro, membris elytrisque rufis, supra fulvo-aurato squamulatus, medio et lateraliter albo lineatus aut maculatus, corpore infra albo squamulato; pedibus inermibus*. Long. 2,5 mill. Algérie: Bouira (coll. Peyerimhoff). Jolie petite espèce, à revêtement fauve doré avec le front, les côtés postérieurs et une ligne médiane du prothorax, la suture et une trace de bande humérale réduite sur les élytres blanches. De coloration rappelle *mekaliensis* Pic, en diffère par la

forme moins large du prothorax par rapport aux élytres, le rostre presque droit, les squamules différentes, la bande médiane blanche du prothorax.

Tychius auroillitus n. sp. Oblongus, nitidus, auro squamulatus, dense in thorace, sparse in elytris, et medio albo lineatus, niger, rostro apice, antennis ad basin, tibiis, tarsis elytrisque rufis; rostro fere recto; thorace breve, lateraliter subarcuato, antice strangulato; elytris thorace paulo latioribus, brevibus, postice attenuatis. Long. 2,5 mill. Tunisie (coll. Pic). — Jolie espèce, voisine de *hypætrus* Trn., moins trapue avec le prothorax moins dilaté sur les côtés, le revêtement élytral différent, etc.

Tychius identipes n. sp. Oblongo-elongatus, parum depressus, albo squamulatus, niger, rostro apice, antennis, tibiis tarsisque testaceis, elytris in disco rufo notatis. Long. 4 mill. Algérie: Constantine (Pic). — Voisin de *dentipes* Trn., mais tibias antérieurs inermes, prothorax plus robuste et transversal, revêtement fait de squamules moins allongées.

Tychius vestitipennis n. sp. Oblongo-elongatus, albo squamulatus et pilosus, niger, rostro antice, membris elytrisque in disco late rufis, femoribus posticis dentatis. Long. 3 mill. Algérie, Tagdempt (Pic). Voisin de *Vaulogeri* Pic, prothorax moins robuste et revêtement de coloration différente presque uniforme. La var. nov. *uniformis*, de Biskra, a quelques squamules jaunes mélangées aux squamules blanches propres à la forme typique.

Miccotrogus capucinus v. nov. auronotatus. Parum elongatus, subdéplanatus, opacus, dense albo squamulatus, thorace medio aurato notato. Algérie (coll. Pic). — Diffère de *capucinus* Boh., par la forme plus élargie des élytres par rapport au prothorax et le revêtement différent de ce dernier.

Cercomorphus syriacus n. sp. Oblongus, robustus, albo pubescens, parum nitidus, dense punctatus, nigro piceus, thorace antice rufescente, elytris apice luteo marginatis, membris testaceis; oculis parum prominulis; mandibulis ♂ validissimis. Long. 2 mill. Syrie (coll. Pic). — Caractérisé par la ponctuation relativement forte et très dense, un peu moins seulement sur le prothorax et à l'extrémité des élytres, du dessus du corps et les fortes mandibules très longues du ♂.

Pharus brevemaculatus n. sp. Subovatus, nitidus, parum pubescens, niger, elytris nigro-piceis, in disco postice late luteis et post medium breve piceo maculatis, membris testaceis; thorace fortiter sat dense punctato; elytris parum minute punctatis. Long. 2 mill. Espagne (coll. Pic). — Peut se placer près de *anchorago* Frm., en diffère, à première vue, par le dessin différent des élytres.

Dasytes tuniseus n. sp. Satis latus ♀, aut parum elongatus ♂, nitidus, nigro-olivaceus aut subæneus, sat regulariter griseo pubescens et nigro hirsutus; ♂ antennis parum elongatis; thorace breve et lato, nitido, irregulariter diverse punctato; ♂ coxis intermediis spinosis. Long. 4-4,5. Tunisie: Sousse (Pic). — Voisin de *reticulatus* Schils., mais prothorax non réticulé.

Plagionotus arcuatus v. nov. Pagnioni. Troisième et quatrième bandes jaunes des élytres en partie, mais non complètement, jointes entre elles. France: Voreppe (Pagnon in coll. Pic).

Conderis notatipennis n. sp. Angustatus, niger, thorace pro parte purpureo marginato, elytris purpureis, ad scutellum nigro notatis. Long. 6-7 mill. Tonkin. — Espèce distincte, à première vue, par les élytres marqués de foncé près de l'écusson.

Idiopteron reductum n. sp. ♂. Parum elongatus, niger, elytris ad basin mediocre et apice brevis aurantiacis, antennis subflabellatis; thorace brevis, antice paulo angulato; elytris tricostatis, postice paulo dilatatis. Long. 10 mill. Colombie. — Voisin de *pleiomelas* Kirsh., en diffère, à première vue, par le prothorax foncé et les élytres brièvement orangés à leur sommet.

Astilus unicolor var. nov. bisbinotata. Elytris ad basin et ante apicem rufo notatis. Colombie (ex. Frère Apollinaire, Maroc).

Attalus hirsuticornis (1) n. sp. Oblongo-elongatus, postice dilatatus, fere opacus, niger, antennis ad basin infra abdomineque lateraliter rufis; antennis longissimis, longe et multiciliatis. Long. 3 mill. Tonkin. — Par sa structure antennaire voisin de *verticillatus* Chp. en diffère, à première vue, par le thorax et les élytres entièrement noirs.

A. atropacus n. sp. Elongatus, postice dilatatus, hirsutus, antennis ad basin infra abdomineque rufo-notatis; antennis satis validis et brevibus, inhirsutis. Long. 3 mill. Tonkin. — Coloration du précédent, mais plus étroit et antennes différentes.

A. binhanus n. sp. Elongatus, postice satis dilatatus, hirsutus, parum nitidus, niger, antennis ad basin, thorace, pedibus pro parte et abdomine circa rufis, pectore lateraliter luteo notato. Long. 3 mill. Tonkin. — A placer près de *cuspidatus* Ch., en diffère, à première vue, par les élytres arrondis à l'angle sutural.

A. insuturalis n. sp. Elongatus, postice paulo dilatatus, hirsutus, parum nitidus, nigro-olivaceus, thorace, abdomine circa membrisque pro parte rufis, elytris lateraliter et apice testaceo marginatis. Long. 3 mill. Tonkin. — Diffère du précédent par les élytres moins élargis en arrière et bordés de clair.

A. discoluteus n. sp. Oblongo-elongatus, postice dilatatus, nitidus, hirsutus, niger, antennis ad basin infra abdomineque circa rufis, elytris medio late luteo notatis. Long. 3 mill. Tonkin. — Espèce très distincte par sa coloration élytrale, la grande macule jaune de ces organes plus rapprochée du sommet que de la base et, au milieu, n'atteignant ni la suture ni le bord externe.

A. Coomani n. sp. Elongatus, postice paulo attenuatus, hirsutus, nitidus, pro parte nigro viridescens, pro parte testaceus, supra testaceus, capite postice, scutello et, in elytris, maculis duabus, 1^{re} basalis, 2^e anteapicalis, nigro-viridescens, infra corpore nigro-viridescens, rufo notato, antennis ad basin pedibusque 4 anticis pro majeure parte rufo-testaceis. Long. 3 mill. Tonkin. Ressemble à *Kuluensis* Pic, élytres plus pâles, macule basale réduite, etc.

A. incertus n. sp. Satis angustatus, subparallelus, hirsutus, nitidus, niger, elytris violacis, antennis ad basin infra rufis, his parum gracilibus, capite lato; thorace

(1) Ces diverses espèces sont décrites sur des ♀, d'où peut-être certaines pourront rentrer ultérieurement dans le genre *Hypebaeus* Ksw., plusieurs proviennent des chasses du R. P. de Cooman.

subquadrato, fere impunctato ; elytris thorace paulo latioribus, elongatis, parum dense et parum fortiter punctatis ; pedibus gracilibus, tibiis posticis sinuatis. Long. 3 mill. Chine. Parait différer de *elongatulus* Lewis par la forme plus étroite, les élytres moins ponctués et violacés.

? *A. atrilabris* n. sp. ♀ Oblongus, postice paulo dilatatus, hirsutus, nitidus, viridi-metallicus, epistome flavo, antennis ad basin infra rufis, elytris minute et varium punctatis. Long. 3 mill. Chine. — A placer près de *sinensis* Pic qui, peut-être, rentre dans le genre *Malachiomimus* Chp., ainsi que le suivant.

? *A. tcheouensis* n. sp. ♀ Robustus, oblongus, postice paulo dilatatus, hirsutus, nitidus, nigro-metallicus, elytris viridescensibus, aut cœruleis, antennis ad basin rufo-notatis, thorace postice et lateraliter paulo testaceo marginato. Long. 3 mill. Chine. Plus robuste que le précédent avec le prothorax noir verdâtre, les élytres nettement et densément ponctués, etc.

Hypebaeus externecostatus n. sp. ♀ Oblongus, postice paulo dilatatus, inhirsutus, nitidus, diversicolor, capite, antennis apice, scutello, pectore pedibusque posticis pro parte nigris, thorace elytrisque apice rubro testaceis, his ad medium flavo fasciatis, ad basin et postice cyaneo maculatis, abdomine pedibusque pro majeure parte testaceis. Long. 3 mill. Indes. — Voisin de *cyaneonotatus* Pic, moins robuste et coloration élytrale différente.

Hypebaeus diversipennis Pic, ex. Champ. (1922), dont le ♂ n'a pas le 2^e article tarsal prolongé, ne peut pas être la même espèce que *Indiathalus diversipennis* Pic (1915), dont le ♂ a le 2^e article tarsal antérieur prolongé, en conséquence *diversipennis* Champ. nec Pic = *confusus* (muté).

Diverses espèces de *Silis* Latr. et genres voisins, de Palawan surtout, ayant tous le prothorax testacé ou roux, se distingueront ainsi :

1. Elytres roux ou testacés, plus ou moins marqués de foncé. 4
— Elytres concolores, testacés ou noirs. 2
2. Elytres testacés ou roux ainsi que la tête. 3
— Elytres noirs ainsi que la tête, prothorax et écusson testacés ♀ Palawan (coll. Corporaal et Pic). *Tylocerus palawanus* n. sp.
3. Un peu allongé, entièrement testacé, sauf le dessus du pygidium foncé, antennes grêles ♀ Palawan. *Silis simplex* Gorb. var.
— Non allongé sans être large, noir, dessous bordé de roux, antennes et pattes foncées avec la base des cuisses rousse ; antennes aplaties à partir du 3^e article. Mindanao (coll. Corporaal) *Polemiosilis subtriangularis* Pic var. Exemplaire mutilé à prothorax plus court que chez le *type*, très transversal.
4. Tête entièrement rousse ; élytres largement noirs au sommet ou sur les côtés ; antennes foncées à base rousse. 5
— Tête noire, rousse en avant ; élytres testacés, brièvement noirs au sommet ; antennes testacées, grêles. Prothorax particulier, presque droit sur les côtés, légèrement subsinué, arqué en avant, peu large ♀ Palawan (coll. Corporaal). *Silis brunneitarsis* n. sp. ♀.
5. Prothorax élargi en avant et transversal, peu impressionné en dessus. 6
— Prothorax non élargi en avant, subcarré, très impressionné en dessus ♀ Palawan (coll. Corporaal et Pic). ? *Silis obconicus* n. sp.

6. Prothorax dilaté un peu subanguleusement en avant, peu marginé sur les côtés ; antennes moins épaissies, à 1^{er} article presque entièrement testacé. Luzon (coll. Corporaal). *Silis bukidosus* Pic.

— Prothorax peu dilaté et non subanguleusement en avant, fortement marginé sur les côtés, antennes un peu plus épaissies, à 1^{er} article largement noir ? Luzon (coll. Pic), peut-être variété du précédent. *Silis longesuturalis* (nov.).

Psilocladus basalis n. sp. Elongatus, subparallelus, niger, articulo ultimo antenarum, thorace lateraliter elytrisque ad basin sat late aurantiacis, abdomine albo maculato. Long. 8 mill. Bogota. — Voisin de *bogotensis* Pic, plus étroit, avec la coloration élytrale différente.

P. atricornis n. sp. Elongatus, subparallelus, niger, thorace, illo postice in medio nigro maculato, elytris ad humeros breve et apice late aurantiacis. Long. 9 mill. Pérou. — Diffère du précédent par les antennes toutes noires, les élytres autrement colorées, marquées largement de clair au sommet et cette dernière coloration remontant un peu sur la suture et les côtés.

P. Claveri n. sp. Elongatus, subparallelus, niger, thorace lateraliter elytrisque testaceis, his antice lineato et fasciato nigris, abdomine albo notato. Long. 8 mill. Colombie. — Espèce voisine des précédentes et de *apicalis* Kirsh., distincte, à première vue, par la particulière coloration de ses élytres, ces organes présentant, sur un fond clair, une bande transversale antémédiane noire, jointe antérieurement à une bande suturale et une externe, longitudinales, noires.

P. testaceus n. sp. Oblongo-elongatus, testaceus, tarsis antennisque nigro-piceis, his ad basin rufis. Long. 8 mill. Bogota. — Espèce reconnaissable entre toutes par sa coloration générale testacée ; peut se placer près de *scutellaris* Gorb.

Amydetes suturalis n. sp. Elongatus, piceus, thorace, scutello elytrisque antice et lateraliter late, infra corpore pro parte femoribusque testaceis. Long. 8 mill. Brésil. — Voisin de *apicalis* Germ., mais avec les élytres largement foncés au sommet, en outre avec une bordure suturale antérieure foncée.

A. brasiliensis n. sp. Elongatus, nigro piceus, pro parte brunnescens, capite antice, thorace pedibusque pro parte testaceis, abdomine apice albo. Long. 8 mill. Brésil. — A placer près de *flavicollis* Ol.

Photuris Apollinairei n. sp. Satis latus, subparallelus, niger, thorace flavo marginato, elytris ad suturam et lateraliter medio rufo marginatis. Long. 10-11 mill. Colombie. — Espèce distincte par sa forme assez robuste jointe à sa coloration, pouvant se placer près de *rugicollis* Ol. L'abdomen a (suivant les sexes) un ou deux segments blancs.

Chauliognathus Obenbergeri n. sp. Parum elongatus, subparallelus, paulo nitidus, niger, thorace lateraliter luteo, in disco nigro et rufo notato, elytris luteis, ad basin plus minusve nigro maculatis, postice late nigris ; antennis latis, depressis. Long. 12-19 mill. Brésil (Musée de Prague et coll. Pic). — A placer près de *morio* Gorb., moins allongé et autrement coloré.

Ch. thermophilus v. *colombianus*. Elongatus, testaceus, thorace albedo, antennis (articulo primo rufo-notato), femoribus apice, tarsi, tibiis diverse et paulo nigris. Colombie.

Ch. atrotibialis n. sp. Elongatus, testaceus, membris nigris, femoribus ad basin diverse testaceis; thorace subquadrato, antice arcuato; elytris elongatis, apice paulo attenuatis. Long. 14-15 mill. Colombie. — Voisin de *thermophilus* Kirs., élytres moins allongés et pattes de coloration plus foncée, presque entièrement noires.

Ch. basiniger n. sp. Parum elongatus, subparallelus, opacus, niger, thorace circa rufo, abdomine elytrisque sulphureis, his ad basin nigro notatis. Long. 14 mill. Brésil. — Voisin de *flavipennis* Pic, plus parallèle avec les élytres opaques.

Ch. inbasalis n. sp. Oblongus, subnitidus, niger, capite antice, antennis ad basin, pectore et femoribus pro parte, scutello, elytris abdomineque flavis, thorace flavo, postice medio nigro notato. Long. 10 mill. Brésil. — Très voisin de *flavipennis* Pic, distinct, à première vue, par les élytres concolores et les membres moins foncés.

Ch. opacipennis v. nov. *postinterruptus*. Elytris medio in singulo nigro bipunctatis. Brésil.

Ch. fallax v. nov. *basireductus*. Elytris ochraceis, ad basin nigro notatis; v. *atrofasciatus*: elytris rufo-testaceis, ad medium nigro fasciatis. Brésil.

Ch. haereticus v. nov. *inlateralis*. Noir avec le devant de la tête, les côtés du prothorax, le repli huméral et la poitrine largement testacés. Pérou (coll. Pic).

Ch. sulfureoapicalis n. sp. Parum elongatus, apice attenuatus, opacus, niger, thorace rubro (forma typica), aut in disco nigro (var. *mapirianus*), elytris apice sulphureo notatis, brevibus, dehiscentibus, abdomine testaceo marginato. Long. 10-11 mill. Pérou, Bolivie. — Peut se placer près de *dispar* Chp.

Ch. ater n. sp. Parum elongatus, opacus, capite thoraceque nitidis, niger, abdomine pro parte rufo. Long. 18-19 mill. Costa Rica (Musée de Prague et coll. Pic). — Par sa forme voisine de *faustus* Gorh., très distinct par la coloration noire du dessus du corps.

Ch. bireductus n. sp. Angustus, subparallelus, opacus, flavus, membris, pro parte piceis, capite, brunneo bimaculato, elytris granulatis, flavis, ad basin et apice breve et paulo distincte piceo notatis. Long. 7 mill. Brésil. Plus allongé que *diamantinensis* Pic avec les pattes moins robustes, le prothorax immaculé.

Ch. brevelineatus n. sp. Parum elongatus ♂, aut subelongatus ♀, nitidus, testaceus, capite et infra corpore pro majeure parte nigris, thorace nigro multi maculato, subquadrato, elytris griseis, flavo marginatis et ad humeros breve flavo lineatis (forma typica), aut in lineatis (v. *obliteratus*). Long. 9-10 mill. R. Argentine. — Sans doute voisin de *nigricornis* Germ., en diffère au moins par les genoux testacés et le prothorax multimaculé de noir.

Ch. brevelineatus v. nov. *Wagneri*. Membris plus minusve nigris, thorace late nigro, lateraliter diverse luteo. R. Argentine.

Le *Ch. curtelineatus* mihi, de la R. Argentine, de coloration analogue au précédent, mais avec le prothorax roux, orné d'une bande médiane noire n'atteignant pas la base et les membres en majeure partie foncés, est fortement atténué à l'extrémité et a les élytres en partie bordées de flave.

Saperda (Amilia) similis v. nov. albo pubescens et nigro punctatus. Sibérie (coll. Pic).

Mordella Gacognei v. nov. brevifasciata. Maculis griseis binis posticis elytrorum in singulo junctis. Nice (coll. Pic).

Alphitobius piceus Ol. v. nov. ruficolor Concolor, rufus. Marseille (coll. Pic).

Conopalpus testaceus v. nov. obscuriceps. Capite plus minusve piceo et abdomine late piceo. Compiègne (coll. Pic).

Hypulus quercinus v. nov. undulatus. Fasciis nigris elytrorum pro parte longitudinaliter junctis. Vosges (coll. Pic).

(A suivre.)

M. Pic.

Coléoptères exotiques en partie nouveaux

(Suite.)

Pyrocælia Hickeri n. sp. Elongatus, parum angustatus, opacus, niger, thorace, illo postice nigro maculato, elytrisque circa testaceis, abdomine nigro, postice rufo marginato, 5, 6 segmentibus circa maculatis; pygidio sinuato; thorace parum breve, antice attenuato, medio subcarinato; scutello elongato, apice rufo; elytris thorace non latioribus, ad humeros paulo dilatatis. Long. 24-26 mill. Provenance ? (coll. Hicker et Pic). — Peut se placer près de *lateralis* Gorh.

Lema africana v. nov. bisbimaculata. Testaceus, thorace elytrisque nigro bimaculatis; thorace robusto, medio strangulato, parum punctato. Congo (A. Collart; communiqué par J. Delève). Diffère au moins de *africana* Jac. par le dessous du corps entièrement testacé et les dessins noirs du dessus réduits.

Basanus apicalis Gebien (1925), préoccupé par *apicalis* Pic (1916), prendra le nom de *subapicalis*.

Basanus javanus v. nov. prolongatus. Elytres à fascie claire étroite, très éloignée de la base mais émettant en son milieu antérieur un rameau qui se prolonge jusqu'au prothorax. Ile Banguey (coll. Pic).

Nanohemicera 4-maculata mihi. Noir avec les élytres violacés marqués chacun de 4 macules jaunes disposées deux à deux et obliquement, ces macules parfois jointes (v. *juncta* Pic (1)). Le *Dohertyi* mihi, de Malacca, très voisin, n'a postérieurement qu'une macule subarrondie. Le *6-maculata*, de Bornéo, voisin du précédent, en diffère par le corps en grande partie roux et la ponctuation moins marquée des élytres; le *trinotata* de l'île Banguey, se distingue de *Dohertyi* par la forme plus robuste, les élytres d'un noir verdâtre, plus finement ponctués.

Falsomophlus n. g. Capite antice satis prolongato, oculis mediocris, thorace approximatis, mandibulis longissimis, simplicibus; labro non transverso; thorace lateraliter postice valde et antice parum distincte marginato; elytris thorace valde latioribus, lateraliter reducte carinatis; coxis anticis separatis, non prominulis, tibiis

(1) C'est le *Basanomorphus 4-maculatus* v. *junctus*. in *Mel. Exot. Ent.*, 41, p. 25.

multi spinosis, tarsi anticis satis gracilibus. — Ressemble un peu à *Omophlus* Sol., mais s'en éloignant, à première vue, par la forme des hanches ; la structure de la tête et celle du prothorax distingueront facilement ce nouveau genre, qui peut se placer près de *Omophlina* Seidl.

Falsomophlus niger n. sp. Elongatus, nitidus, parum griseo pubescens, niger, femoribus late luteis, capite fortiter sat sparse punctato ; thorace densissime punctato-ruguloso ; elytris fortiter striatis, intervallis plus minusve elevatis et punctatis, externe reducte bicarinatis. Long. 10 mill. Himalaya (coll. Pic).

Falsomycterus hirsutus n. sp. Oblongus, griseo pubescens et hirsutus, rufus, antennis pro parte pectoreque nigris ; thorace robusto, lateraliter arcuato et crenulato, dense punctato, elytris externe striatis. Long. 5 mill. Colombie (coll. Pic). — Voisin de *Germaini* Pic, en diffère par le dessus du corps hérissé d'assez longs poils, le prothorax plus robuste, les antennes foncées au milieu.

Dipteroïdes nigrolineatus n. sp. Elongatus, parum nitidus, rufus, elytris testaceis, in singulo longitudinaliter nigro bilineatis, capite in vertice et infra corpore nigro maculatis, antennis pro parte nigris. Long. 17 mill. Colombie (coll. Pic). — Espèce très distincte par la particulière coloration de ses élytres et ses pattes claires.

(A suivre.)

M. Pic.

Hyménoptères nouveaux

Les diverses nouveautés suivantes, sauf les trois dernières, ont été recueillies par moi, en France, et les types figurent dans ma collection.

Sapyga 5-punctata v. nov. *arvernica* ♀. Satis elongatus, niger, segmento 1^o abdominis postice, 2^o et 3^o antice late rufis ; antennis validissimis, ad basin crassis. Royat. Caractérisé par le prothorax tout noir et les antennes robustes.

Ichneumon castaneiventris Gr. Varie par les segments médians de l'abdomen maculés de noir (v. ♂ *binigronotatus*), ou abdomen largement marqué de roux sur les côtés et au sommet (v. ♂ *vulcanius*).

Amblyletes occisorius v. nov. *morvandicus* ♀. Tête toute noire, peu robuste, aréole supéro médiane non fermée postérieurement ; pattes robustes, en majeure partie rousses, cuisses marquées de roux au sommet. Morvan.

Macrophia rustica L. Var. ♀, nouvelles : v. *martialis*, des Guerreaux, à 4^e segment abdominal maculé de jaune ; v. *luteonotata*, de Royat, à écusson noir maculé de jaune.

Allantus bifasciatus Mull. Var. nouvelles, de Royat : v. *arvernicus*, à 2^e segment abdominal maculé de blanc-jaunâtre au milieu, et 4^e sur les côtés, 3^e segment fascié ; v. *diversiventris*, 2^e segment maculé au milieu, 3^e et 4^e fasciés ; v. *reductenotatus*, 3^e segment fascié et 4^e maculé sur les côtés.

(A suivre.)

M. Pic.

AVIS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Malgré les avis réitérés publiés et le retard apporté à l'envoi des traites, (laissant ainsi le temps à chacun de bien réfléchir à ce qu'il doit faire), des traites pour « L'Echange » ont été refusées dernièrement. C'est là un procédé que la Direction du journal cr. it devoir blâmer publiquement, car il occasionne des frais à l'envoyeur qui ne mérite pas de les supporter. Celui qui refuse tardivement une traite, semble oublier qu'il a reçu plusieurs numéros d'un journal et, qu'en réalité, il les doit.

Si l'on a un motif sérieux de se désabonner, alors pourquoi ne pas en avvertir la direction dès le commencement de l'année? Les entomologistes qui, par leur sans gêne, augmentent les frais déjà considérables supportés par la Direction, n'ont pas une manière de faire très correcte qui, nous l'espérons, ne se renouvellera pas l'an prochain.

Dans « *The Entomologist*, LVIII, p. 166 », Maulik, qui persiste à vouloir réunir *Calispa latipennis* Pic à *mungphua* Maul., demande, par la voie du journal, communication d'un type unique (on peut s'étonner, soit dit en passant, de cette demande, étant donné qu'à Londres on n'admet pas la communication des uniques); par la voie d'un autre journal, le directeur de « L'Echange » annonce qu'il a le regret de ne pouvoir répondre favorablement à cette demande, parce que des types uniques, autrefois communiqués et réclamés plusieurs fois, n'ont pas été retournés à l'envoyeur. M. Maulik, espérons-le, sera le premier à excuser le directeur de *L'Echange* pour sa réserve motivée par une expérience acquise à ses dépens.

A propos des auteurs qui mettent trop facilement en synonymie les espèces étrangères (ce serait le cas de Arrow pour les *Eudomychides* décrits par Pic), il convient de faire remarquer que les synonymies établies à la légère ne suffisent pas pour supprimer l'espèce en réalité valable, et même les variétés méritant d'être nommées. La suppression des variétés par un *antivariétiste* est faite de parti pris, elle n'a aucune portée que celle de les voir rétablir aussitôt après par un *variétiste*; dès lors, ne serait-il pas plus simple de ne pas les mettre arbitrairement en synonymie. Les auteurs qui jugent, par un simple coup d'œil d'ensemble, que l'auteur Pic publie à la légère des variétés, et même aussi des espèces brièvement décrites, ne sont probablement pas aussi documentés qu'ils croient l'être pour se former un jugement. Ils ignorent notamment que la collection Pic est aujourd'hui une des plus importantes qui existe (représentée par plus de 2.000 boîtes, environ 14.500 types) et que les espèces y sont souvent représentées par des séries importantes et des nuances multiples (les unes nommées, les autres laissées sans noms comme variations). Un auteur qui possède de sérieux matériaux d'étude, et aussi du coup d'œil acquis par une assez longue pratique, a peut-être moins de facilité pour se tromper en décrivant que l'entomologiste qui conteste des dénominations sans se donner la peine de *comprendre les insectes*.

Le Dr **Maurice Royer**, 33, rue de l'Hôtel-de-Ville, Moret-sur-Loing (Seine-et-Marne), serait reconnaissant au collègue qui lui indiquerait où il pourrait consulter l'ouvrage de Schrank « *Beitrag zur Naturgeschichte, Leipzig, 1776* », ouvrage qu'il a vainement cherché dans les différentes bibliothèques de Paris.

BIBLIOGRAPHIE

A signaler, comme pouvant offrir quelque intérêt à des titres divers, les ouvrages, ou brochures, qui suivent:

Contribution à la faune des Coléoptères du Bonnaillais, par A. P. DURTRETRE, Lille, 1925. *La faune des orgues*, par C. PERRIER DE LA BATHIE, Ugent, 1925.

Missione Zoologica del Dr E. Festa in Cirenaica, XIV, Coleotteri, par A. DODERO, Naples, 1925.

Colcopteronum catalogus 81, Rhipiceridæ, par M. PIC.

Coléoptères recueillis à Saclas, par L. BEDEL et A. MEQUIGNON, [ex. An. Soc. Ent. France (1924) 1925.]

NOTES DE CHASSE

M. G. Hardy a capturé à Amélie-les-Bains, *Henicopus vittatus* Ksw.; à Pralognan, *Dasytes alpigradus* Ksw.; à Bessans, *Barinotus margaritaceus* Germ.; à Saclas, *Oliorrhynchus fulvus* v. *raucus* F.; puis au Poullingen, en avril: *Anthicus crotchii* Pic ou *salinus* Crotch, *A. humilis* Germ. et *A. tristis* Schm.

M. J. Jacquet a capturé à Thurins (Rhône), *Athous Dejeani* Lap.; à Bessans (Savoie), *Cryptoccephalus hypochaeridis* v. *bicolor* Gerh.

M. M. Pio a capturé à Royat, en juin dernier, sur branches sèches de pins et arbres verts: *Ernobius nigrinus* Germ. et *denticornis* Muls., *Clerus rufipes* Br., *Julistus fulvohirtus* Bris. var. *Magdalis rufa* Germ., *violacea* L. et *memnonia* Gylh., *Rhagium inquisitor* L., *Cortodera humeralis* v. *suturalis* F. et v. *inhumeralis* Pic, *Pogonocherus decoratus* Fairm., *Obrivum brunneum* F., etc.